

中医内科多选题集

湖南科学技术出版社

中医内科多选题集



湖南科学技术出版社

中医内科多选题集

主编：夏度衡 高德

责任编辑：鲍晓昕

*

湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1985年1月第1版第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：21.375 插页：5 字数：568,000

印数：1—25,300

统一书号：14204·116 定价：4.15元

前 言

中医学古奥艰深，易学难精，欲济世活人者，须精益求精。《医宗金鉴》曾云：“医者，书不熟则理不明，理不明则识不精，临证游移，漫无定见，药证不合，难以奏效。”岳美中教授在《温课与自律》一文中亦谓：“要入细。在临床上遇到复杂大症，也时有碰壁。追思其故，是学习不够入细。读书如果只学皮毛，不深入骨髓；只略解大意，不掌握规律；只粗涉藩篱，不步入堂奥，必然是临大症不能解，临细症不能入。”故读书、临证，临证、读书，须反复深究，持之以恒。如此方可明理善察、知常达变，起沉疴，疗痼疾。

多选题乃考试命题新法，具精深广细之特点，每寓毫厘纤微之异，于模棱众题之中，惟博览群书，基础牢固，概念明晰者始可回答无误。故用以考试或自测，既可察知学习质量，评定教学效果，尤能启迪新知，开拓思路。此则本书编写之宗旨。

本书分为《伤寒论》、《金匱要略》、《温病学》、《中医各家学说》(内科部分)、《内科学》五章，凡八十二节，每节均自立题号，包括A、B、C、K四种类型。其后附有答案。

本书编写，尚属新课题，限于水平，错误之处难免，尚祈专家及读者不吝匡正。

夏度衡

一九八四年二月

多选题考试简介

考试历来是评定学生学习成绩,衡量教学效果,开展教学研究以及作为升学和用人考核的一种重要手段。考试形式和考题类型较多,有问答题、填充题、是非题、选择题及改错题等。国外医学院校近三十多年来,逐渐采用多选题 (Multiple Choice Question, M. C. Q) 考试方法。它不仅应用于医学院校学生的基础和临床各科的考试,亦应用于临床医师进行知识自我评价及领取执照或进行注册的考试。自1946年美国最先在内科使用多选题考试以来,目前世界各国已将其广泛应用于医师的国家考试。

继1982年11月我国卫生部对全国部属高等医学院校应届毕业生采用多选题进行统考以后,1983年6月,中南五省中医学院也采用多选题对其应届毕业生进行了统一考试。随着教育改革的逐步深入,多选题考试已在全国逐步推广,并引起了医学界的广泛重视。目前全国已统一采用的多选题题型包括A型题、B型题、C型题及K型题四种类型。采用多选题考试的优点在于:①单位时间内考题数量多,从而保证了试题的广泛性,扩大了考试的知识面范围;②题意简明,要求明确,能考核考生对基本理论、基本知识和基本技能的掌握及分析、解决问题的能力;③命题严格细致,有助于教师在教学中发挥主导作用,使教学达到预定的要求,因为考核结果可信性较高,能客观地反映学习的成绩;④答案标准,便于主考部门客观公正地评阅试卷;⑤考题分析比较容易,好的考题可以输入库存,重复使用;⑥对于考核结果,教师和自我测试者都能及时地得到详细而明确的反馈,有利于开展医学教育研究工作;⑦便于大量考生试卷的阅卷和应用电子计算机进行统分。

现在，我们按卫生部统考中所采用的多选题试题类型，分别介绍如下：

A型题 为最佳回答题。常以叙述的形式提出问题，然后列出A、B、C、D、E五种答案供选择，是使用最广泛的多选题。五个备选答案中只有一个是最佳、最适当或最正确（亦可能试题要求指出错误的一个）的答案，称为正确答案或正确选择，其余四个称为干扰答案、迷惑答案或不正确的选择。干扰答案可以完全不正确，也可以部分正确，但不是最佳选择，应试者应仔细思考比较，从中选出最佳答案，并将答卷上相应的字母涂掉（如正确答案为D，则将A、B、C、D、E五个字母中的D字涂掉），以便阅卷和评分。

例一：男性，30岁，恶寒发热，咳嗽痰少而粘，胸痛，咳时尤甚，呼吸不利，口干鼻燥，舌苔薄黄，脉浮滑而数。应辨证为：

- A．风热感冒
- B．风热咳嗽
- C．燥热咳嗽
- D．肺痈初期
- E．痰热壅肺

答案：D

B型题 又称配伍题。本型试题首先列出五个备选答案，接着列出数道试题。应试者应在五个备选答案中，给每一道试题选配一个最适合的、正确的答案。B型题主要考核知识的密切相关性，如疾病与症状、体征的相互关系等。

B型题与A型题的区别是：

A型题是一道试题配一组A、B、C、D、E五个答案，而B型题是数道试题共用一组五个答案，每一个答案可被重复选择，也可不被选择。举例如下：

例二：问题 1～3

- A．帮助药力，持续发挥作用
- B．缓和药力，使之持续有效
- C．抑制药力，使其泻下勿过

D. 顾护胃气, 以免正气受损

E. 补养正气, 使邪去而正复

1. 服桂枝汤后啜热稀粥的目的

2. 服十枣汤取效后, 糜粥自养的目的

3. 服三物白散后需服冷粥一杯的目的

答案:

1. A

2. E

3. C

C型题 是一种变相的多项是非题。试题形式和B型题相似, 但备选答案只有四个, 其他无例外情况存在。这是因为C型题只对两种考查对象或现象进行比较, 因此只存在四种可能性。它要求应试者从备选答案中为每道试题选配一个正确答案。试题举例如下:

例三: 问题 1~2

A. 咽喉肿痛糜烂

B. 肌肤疥疹显现

C. 两者均是

D. 两者均非

1. 烂喉痧的临床特征有

2. 大头瘟的临床特征有

答案:

1. C

2. D

K型题 又称复合是非题。由一个考题和四个叙述式的备选答案组合而成, 组合的方法固定不变。应试者需选择其中一组作为正确答案。

我国现行的组合方式为:

答案A指备选答案中①、②、③是正确的;

答案B指备选答案中①、③是正确的;

答案C指备选答案中②、④是正确的;

答案D指备选答案中④是正确的；

答案E指备选答案中①、②、③、④都是正确的。

例四：大建中汤可用于治疗

①、阳衰所致心胸中大寒痛

②、疝瘕所致的寒性腹痛

③、蛔虫引起的寒性腹痛

④、大便不通之寒实腹痛

答案：A。即备选答案中①、②、③是正确的。

目 录

第1章 伤寒论	(1)
第1节 概说、太阳病	(1)
第2节 阳明、少阳病	(26)
第3节 太阴、少阴、厥阴病	(46)
第4节 其它	(68)
第2章 金匱要略	(76)
第1节 总论	(76)
第2节 痉百合证中风诸病	(86)
第3节 虚劳肺痿奔豚诸病	(100)
第4节 胸痹腹满积聚痰饮诸病	(112)
第5节 消渴水气黄疸惊悸诸病	(125)
第6节 呕吐肠痈虵虫诸病	(138)
第7节 妇人诸病	(146)
第3章 温病学	(156)
第1节 绪论及概念	(156)
第2节 病因、发病及辨证	(162)
第3节 温病的常用诊法	(169)
第4节 温病的治疗	(180)
第5节 风温、春温	(193)
第6节 暑温、伏暑	(204)
第7节 湿温	(219)
第8节 秋燥、温毒	(229)
第9节 温病学名著	(236)
第4章 各家学说	(244)
第1节 河间学派	(244)
第2节 易水学派	(253)
第3节 伤寒学派	(262)
第4节 温病学派	(274)
第5节 医经、经方学派	(284)
第6节 其它	(294)
第5章 内科学	(316)
第1节 感冒	(316)
第2节 咳嗽	(322)

第3节 哮喘	(328)	第31节 肠痛	(509)
第4节 喘证	(335)	第32节 湿阻	(514)
第5节 肺痿	(341)	第33节 胁痛	(521)
第6节 肺病	(345)	第34节 黄疸	(526)
第7节 肺癆	(350)	第35节 积聚	(535)
第8节 失音	(356)	第36节 鼓胀	(541)
第9节 痰证	(359)	第37节 奔豚气	(547)
第10节 饮证	(366)	第38节 头痛	(551)
第11节 水肿	(373)	第39节 眩晕	(558)
第12节 汗证	(381)	第40节 中风	(564)
第13节 血证	(388)	第41节 厥证	(573)
第14节 痰证	(397)	第42节 痉证 (附: 破伤 风)	(581)
第15节 惊悸、怔忡	(404)	第43节 昏迷	(587)
第16节 胸痛	(412)	第44节 疟证	(593)
第17节 不寐	(419)	第45节 脚气	(598)
第18节 郁证	(425)	第46节 淋证 (附: 尿 浊)	(602)
第19节 癫狂	(432)	第47节 癰闭	(608)
第20节 痢证	(439)	第48节 腰痛	(614)
第21节 胃脘痛 (附: 吐酸 嘈杂)	(446)	第49节 消渴	(621)
第22节 噎膈	(453)	第50节 遗精 (附: 阳 痿)	(629)
第23节 呕吐 (附: 反 胃)	(458)	第51节 遗尿	(635)
第24节 呃逆	(464)	第52节 耳鸣、耳聋	(649)
第25节 泄泻	(470)	第53节 痹证	(640)
第26节 痢疾	(477)	第54节 痿证	(654)
第27节 霍乱	(484)	第55节 内伤发热	(660)
第28节 便秘	(489)	第56节 虚劳	(667)
第29节 腹痛	(496)		
第30节 虫证	(502)		

第1章

伤寒论

第1节 概说、太阳病

【A型题】

1. 《伤寒论》一书的作者是：
A. 汉·张仲景
B. 晋·王叔和
C. 唐·孙思邈
D. 宋·林亿
E. 以上都不是
2. 属于《伤寒论》六经病证传变方式的是：
A. 表里传
B. 从表传里
C. 顺传
D. 逆传
E. 从营传卫
3. 太阳病必见恶寒的病机是：
A. 风寒外束，卫阳被遏，不能温煦分肉
B. 风寒外束，卫阳不足，温煦不及
C. 风寒外束，营阴郁滞
D. 风寒外束，肌腠致密
E. 以上都不是
4. 必与太阳病恶寒并见的临床表现是：
A. 发热
B. 脉浮
C. 身痛
D. 有汗
E. 四肢不温
5. 《伤寒论》所述温病的特点是：
A. 太阳病，下之后，其气上冲者
B. 太阳病，发热而渴，不恶寒者
C. 太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者
D. 太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者
E. 太阳病，发热恶寒，热

多寒少，脉浮者

出症

6. 原文第12条：“阳浮而阴弱”反映的病机是：

- E. 脏无他病，时发热自汗出者

- A. 阳气浮越，阴津亏虚
B. 阳气亢盛，阴液虚少
C. 卫气浮盛，营阴不足
D. 卫气浮盛于外，营阴不能内守
E. 卫气浮盛于外，营阴衰弱于内

9. 王某，女，成年。突然发病，发热恶寒，头痛，鼻塞流清涕，不思饮食，时时欲呕，四肢烦疼，有汗，小便可，大便溏，脉浮，舌苔薄白。治疗用方应选：

- A. 桂枝汤
B. 麻黄汤
C. 桂枝麻黄各半汤
D. 桂枝人参汤
E. 桂枝附子汤

7. 当用“桂枝汤主之”的病证是：

- A. 太阳病，头痛发热，汗出恶风者
B. 太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者
C. 太阳病，外证未解，脉浮弱者
D. 太阳病，脉浮者
E. 脏无他病，时发热自汗出而不愈者

10. 属于服桂枝汤不如法的因素是：

- A. 服药后啜热稀粥
B. 服药后温覆
C. 使遍身出汗
D. 得汗病除，不必尽剂
E. 服药后不出汗再服

8. 下列情况，不能单纯与桂枝汤治疗者是：

- A. 太阳病，下之后，其气上冲者
B. 太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者
C. 伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者
D. 属于营卫失调的常自汗

11. 桂枝加葛根汤证的项背强几几是指：

- A. 颈项强直
B. 项强
C. 突出的颈项拘急不舒
D. 如柔痉状
E. 落枕

12. 原文14条：“太阳病，项背强几几，反汗出恶风者”当

- 用：
- 桂枝汤主之
 - 桂枝加葛根汤主之
 - 葛根汤主之
 - 葛根加半夏汤主之
 - 麻黄加葛根汤主之
13. 桂枝加葛根汤体现的治法是：
- 解肌祛风，重以发汗
 - 解肌祛风，升津舒经
 - 解肌祛风，生津止渴
 - 解肌祛风，生津止利
 - 解肌祛风，舒筋柔经
14. 原文22条：“太阳病，下之后，胸满微恶寒者”宜用：
- 桂枝加附子汤
 - 桂枝附子汤
 - 桂枝去芍药汤
 - 桂枝去芍药加附子汤
 - 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤
15. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证的主要病因病机是：
- 发汗太过，损伤气营，筋脉失养
 - 发汗太过，表阳受损，筋脉失养
 - 发汗太过，耗伤阴液，筋脉失养
 - 发汗太过，表邪不解，筋脉失养
 - 发汗太过，表解邪陷，筋脉失养
16. 原文20条：“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者”的病机是：
- 表证未罢，阳气已虚，阴液耗伤
 - 表证未罢，阳气大虚，阴液外脱
 - 表证已解，阴阳两虚，阴虚为主
 - 表证已解，阴阳两虚，阳虚为主
 - 表证已解，水饮内停，泛溢于外
17. 桂枝加附子汤证出现小便不利的主要病机是：
- 阳虚漏汗，阴液不足
 - 阳虚漏汗，湿邪留滞
 - 表阳已虚，外邪未尽
 - 阳虚阴盛，水邪内停
 - 阳气虚衰，气化不行
18. 王×，女，成年。发热恶寒头痛二天。自服A.P.C发汗，反致时时恶风，自汗不止，动则更甚，四肢拘急，屈伸不便，小便量少且不畅。治

疗方当选：

- A. 桂枝汤
- B. 桂枝加葛根汤
- C. 桂枝加附子汤
- D. 桂枝附子汤
- E. 桂枝去桂加茯苓白术汤

19. 桂枝去芍药加附子汤与桂枝附子汤的药物组成完全相同，其不同点是：

- A. 前者桂枝用量轻，后者用量重
- B. 前者附子用量轻，后者用量重
- C. 前者生姜用量轻，后者用量重
- D. 前者炙甘草用量重，后者用量轻
- E. 前者附桂用量轻，后者用量重

20. 原文36条：“太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下”宜用：

- A. 桂枝去芍药汤
- B. 桂枝加厚朴杏子汤
- C. 麻黄汤
- D. 小青龙汤
- E. 麻黄杏仁甘草石膏汤

21. 太阳伤寒证，八九日不解，服麻黄汤后，表证已微除，“其人发烦目瞑，剧者必衄”

其发生衄血的机理是：

- A. 受邪过重，损伤阳络
- B. 里有邪热，损伤阳络
- C. 血热阴亏，损伤阳络
- D. 虚阳上浮，损伤阳络
- E. 阳气怫郁，损伤阳络

22. 太阳伤寒证与太阳中风证最主要的鉴别点是：

- A. 无汗与有汗
- B. 恶寒与恶风
- C. 不发热与发热
- D. 有无身痛
- E. 脉浮紧与浮缓

23. 服麻黄汤与桂枝汤后，都应该注意：

- A. 适寒温服一升
- B. 啜热稀粥以助药力
- C. 多饮暖水以助药力
- D. 覆取微似汗
- E. 令漐然汗出

24. 原文31条：“太阳病，项背强几几，无汗恶风”当以：

- A. 麻黄汤主之
- B. 麻黄加葛根汤主之
- C. 桂枝加葛根汤主之
- D. 葛根汤主之
- E. 葛根加半夏汤主之

25. 葛根汤方的组成是：

- A. 麻黄汤方加葛根
- B. 桂枝汤方加葛根

- C. 桂麻合方加葛根
D. 桂枝汤方加麻黄、葛根
E. 桂枝汤方加麻黄、葛根、半夏
26. 原文39条：“伤寒，脉浮缓，身不疼但重，乍有轻时，无少阴证者”治当：
A. 桂枝汤主之
B. 桂枝二越婢一汤主之
C. 桂枝麻黄各半汤主之
D. 大青龙汤发之
E. 麻黄杏仁甘草石膏汤主之
27. 某，32岁，男性。突然发热恶寒，无汗，一身疼痛，腰痛。望其呼吸急促，问其所苦，乃答心烦。舌苔薄白，脉象浮缓。治疗用方当选：
A. 麻黄汤
B. 桂枝汤
C. 栀子豉汤
D. 大青龙汤
E. 小青龙汤
28. 王×。发热恶寒三天。外感风寒之邪发病，今日加重。无汗，烦躁，口渴，呼吸急促，大便稀溏、味殊臭，小便黄，舌苔薄白微黄，脉象浮缓。治疗用方首选：
A. 桂枝汤
B. 麻黄汤
C. 麻黄杏仁甘草石膏汤
D. 葛根黄芩黄连汤
E. 大青龙汤
29. 原文38条“……若脉微弱，汗出恶风者，不可服”大青龙汤是因为：
A. 表邪入里，已无表证
B. 表里俱热
C. 太阳中风兼里寒
D. 太阳伤寒兼里寒
E. 阳虚里寒
30. 伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，小便不利，少腹满者，治疗用方当选：
A. 桂枝去桂加茯苓白术汤
B. 小青龙汤
C. 小青龙汤去麻黄加茯苓
D. 茯苓桂枝白术甘草汤
E. 茯苓甘草汤
31. 伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴，小青龙汤主之。服汤已渴者，为：
A. 病证未变，宜更服小青龙汤
B. 已成表有寒里有热之证，当与大青龙汤
C. 外邪化热壅肺，宜服麻黄杏仁甘草石膏汤
D. 已成阳明热盛之证，当

与白虎汤

E. 以上均不是

32. 大青龙汤证与小青龙汤证的主要区别点是:

- A. 表里俱实与表实里虚
- B. 表里俱热与表里俱寒
- C. 表寒里热与表热里实
- D. 表实兼里热与表实兼水饮
- E. 表虚兼里热与表虚兼水饮

33. 桂枝麻黄各半汤证见“面色反有热色”“身痒”的病机是:

- A. 阳气怫郁化热, 邪已入里
- B. 阳气怫郁化热, 热邪上亢
- C. 阳气怫郁化热, 有动风之兆
- D. 阳气怫郁在表, 不得汗解
- E. 表邪日久不解, 欲自解作汗

34. 服桂枝汤大汗出, 若发热恶寒, 形似疟, 一日再发者, 汗出必解, 宜与:

- A. 柴胡桂枝汤
- B. 小柴胡汤
- C. 桂枝麻黄各半汤
- D. 桂枝二麻黄一汤

E. 桂枝二越婢一汤

35. 原文70条:“发汗后, 恶寒者, 虚故也; 不恶寒, 但热者, 实也……”当与:

- A. 调胃承气汤
- B. 小陷胸汤
- C. 白虎汤
- D. 麻黄杏仁甘草石膏汤
- E. 黄芩汤

36. 栀子豉汤证的“虚烦”是指:

- A. 阳虚心烦
- B. 虚阳外扰发烦
- C. 阴虚内热作烦
- D. 无形邪热致发心烦
- E. 表邪不解, 正邪交争致烦

37. 栀子豉汤证中见到“但头汗出”治疗用方是:

- A. 仍与栀子豉汤
- B. 栀子生姜豉汤
- C. 栀子甘草豉汤
- D. 枳实栀子豉汤
- E. 栀子厚朴汤

38. 原文79条:“伤寒下后, 心烦腹满, 卧起不安者”最佳用方是:

- A. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- B. 厚朴生姜半夏甘草人参汤
- C. 栀子厚朴汤

- D. 枳实栀子豉汤
E. 调胃承气汤
39. 栀子厚朴汤的组成是：
A. 栀子豉汤方加厚朴
B. 栀子豉汤方加枳实、厚朴
C. 栀子豉汤方去香豉，加厚朴
D. 栀子豉汤方去香豉，加枳实、厚朴
E. 栀子豉汤方去香豉，加干姜、厚朴
40. 发汗后，汗出而喘，无大热者，可与：
A. 桂枝加厚朴杏子汤
B. 小青龙汤
C. 麻黄杏仁甘草石膏汤
D. 葛根黄芩黄连汤
E. 大承气汤
41. 李×，30岁。患病三日，发热恶寒，微微汗出，自服A.P.C发汗，汗出甚多，诸症不愈。见喘而汗出，胸闷口渴，腹泻不止，脉象短促。治疗用方当选：
A. 葛根汤
B. 麻黄杏仁甘草石膏汤
C. 桂枝去芍药汤
D. 葛根黄芩黄连汤
E. 赤石脂禹余粮汤
42. 谢某，30岁。素体虚弱，患感冒多日不愈，服发汗剂二付后，汗出甚多，病人即感心慌不宁，怔忡不眠，脉象结代。治疗用方当选：
A. 桂枝甘草汤
B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
C. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤
D. 桂枝加桂汤
E. 炙甘草汤
43. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤的组成是：
A. 桂枝甘草汤方去芍药，加蜀漆、牡蛎、龙骨
B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤方去芍药，加蜀漆
C. 桂枝汤方加蜀漆、牡蛎、龙骨
D. 桂枝去芍药汤方加蜀漆、牡蛎、龙骨
E. 桂枝加桂汤方加蜀漆、牡蛎、龙骨
44. 桂枝加桂汤方“更加桂二两”的作用是：
A. 增加解表之力
B. 增加调和营卫之力
C. 祛寒平冲
D. 祛风除湿
E. 通阳化气