

中华本草

国家中医药管理局
《中华本草》编委会

上海科学技术出版社




629a
:6

6

110536

国家中医药管理局
《中华本草》编委会

中华本草



上海科学技术出版社

趙樸初題



解放军医学图书馆(书)
C0204106



目 录

第十六卷

| | | | |
|-------------------|----|------------------|----|
| 岩梅科..... | 3 | 5275 金背枇杷果 | 41 |
| 5232 岩筋菜 | 3 | 5276 满山白 | 41 |
| 山柳科..... | 3 | 5277 杜鹃花 | 42 |
| 5233 山柳 | 3 | 5278 杜鹃花根 | 43 |
| 鹿蹄草科..... | 4 | 5279 杜鹃花叶 | 43 |
| 5234 长白假水晶兰 | 4 | 5280 杜鹃花果实 | 44 |
| 5235 伞形梅笠草 | 4 | 5281 黑香柴 | 44 |
| 5236 松下兰 | 5 | 5282 大叶树萝卜 | 45 |
| 5237 水晶兰 | 5 | 5283 南烛子 | 45 |
| 5238 鹿衔草 | 6 | 5284 南烛叶 | 47 |
| 杜鹃花科 | 10 | 5285 南烛根 | 47 |
| 5239 灯笼花 | 10 | 5286 石瓜子莲 | 48 |
| 5240 小叶爱楠 | 10 | 5287 岩檀香 | 48 |
| 5241 树萝卜 | 11 | 5288 大透骨草 | 48 |
| 5242 草灵芝 | 11 | 5289 土千年健 | 49 |
| 5243 碎骨红 | 11 | 5290 土千年健叶 | 50 |
| 5244 狗脚草根 | 12 | 5291 乌饭子 | 50 |
| 5245 金叶子 | 12 | 5292 饱饭花果 | 50 |
| 5246 大透骨消 | 13 | 5293 饱饭花枝叶 | 51 |
| 5247 沙果 | 14 | 5294 米饭花果 | 51 |
| 5248 白珠树 | 14 | 5295 越橘叶 | 51 |
| 5249 金钗 | 15 | 5296 越橘果 | 52 |
| 5250 透骨香 | 15 | 紫金牛科 | 53 |
| 5251 白山苔 | 16 | 5297 波叶紫金牛 | 53 |
| 5252 宽叶杜香 | 17 | 5298 少年红 | 53 |
| 5253 小米柴 | 18 | 5299 地打果树皮 | 54 |
| 5254 缙木 | 18 | 5300 九管血 | 54 |
| 5255 小豆柴 | 19 | 5301 石凉伞 | 55 |
| 5256 马醉木 | 20 | 5302 峨眉紫金牛 | 55 |
| 5257 小叶枇杷 | 20 | 5303 小紫金牛 | 56 |
| 5258 小叶杜鹃 | 23 | 5304 紫背绿 | 56 |
| 5259 满山红 | 24 | 5305 朱砂根 | 57 |
| 5260 大白杜鹃 | 27 | 5306 百两金 | 59 |
| 5261 白马鬃铃花 | 27 | 5307 萝芒树皮 | 60 |
| 5262 马缨花 | 27 | 5308 圆果罗伞 | 60 |
| 5263 紫杜鹃 | 28 | 5309 郎伞木 | 61 |
| 5264 照山白 | 29 | 5310 剑叶紫金牛 | 61 |
| 5265 酒瓶花 | 31 | 5311 毛青杠 | 62 |
| 5266 闹羊花 | 32 | 5312 咳喘木 | 62 |
| 5267 六轴子 | 36 | 5313 走马胎 | 62 |
| 5268 羊蹄躅根 | 37 | 5314 走马胎叶 | 63 |
| 5269 丝线吊芙蓉 | 38 | 5315 凉伞盖珍珠 | 63 |
| 5270 白花映山红 | 38 | 5316 平地木 | 64 |
| 5271 迎山红 | 39 | 5317 红云草 | 67 |
| 5272 马银花 | 40 | 5318 珍珠伞 | 68 |
| 5273 金背枇杷叶 | 40 | 5319 红毛走马胎 | 68 |
| 5274 金背枇杷花 | 41 | 5320 铺地罗伞 | 69 |

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|
| 5321 | 血党 | 70 | 5376 | 大散血 | 109 |
| 5322 | 小青 | 70 | 5377 | 黄开口 | 109 |
| 5323 | 罗伞树 | 72 | 5378 | 花被单 | 110 |
| 5324 | 矮脚罗伞 | 72 | 5379 | 长梗排草 | 111 |
| 5325 | 豹子眼睛果 | 73 | 5380 | 小果排草 | 111 |
| 5326 | 酸藤木 | 74 | 5381 | 四块瓦 | 112 |
| 5327 | 酸藤果 | 75 | 5382 | 追风伞 | 113 |
| 5328 | 吊罗果 | 75 | 5383 | 大四块瓦 | 114 |
| 5329 | 马桂花 | 75 | 5384 | 大过路黄 | 114 |
| 5330 | 当归藤 | 76 | 5385 | 合血香 | 115 |
| 5331 | 过山消根 | 77 | 5386 | 尖叶子打虫药 | 115 |
| 5332 | 咸酸蕨 | 77 | 5387 | 鱼肠草 | 115 |
| 5333 | 了哥利 | 78 | 5388 | 夏丸 | 116 |
| 5334 | 假刺藤 | 78 | 5389 | 野洋参 | 116 |
| 5335 | 大叶酸藤子 | 79 | 5390 | 三月花 | 117 |
| 5336 | 打虫果 | 79 | 5391 | 云苔草 | 117 |
| 5337 | 两面青 | 80 | 5392 | 豆叶参 | 117 |
| 5338 | 杜茎山 | 80 | 5393 | 峨山雪莲花 | 118 |
| 5339 | 金珠柳 | 81 | 5394 | 小报春 | 118 |
| 5340 | 空心花 | 82 | 5395 | 松打七 | 119 |
| 5341 | 大红袍 | 82 | 5396 | 白背小报春 | 119 |
| 5342 | 针刺铁仔 | 83 | 5397 | 报春花 | 120 |
| 5343 | 密花树 | 83 | 5398 | 胭脂花 | 120 |
| 报春花科 | | 84 | 5399 | 鄂报春 | 121 |
| 5344 | 四念瘡 | 84 | 5400 | 海仙花 | 121 |
| 5345 | 大红花点地梅 | 85 | 5401 | 滇海水仙花 | 122 |
| 5346 | 丝点地梅 | 85 | 5402 | 带叶报春花 | 122 |
| 5347 | 破头风 | 86 | 5403 | 烂泥蒿 | 123 |
| 5348 | 高原点地梅 | 86 | 5404 | 樱草根 | 123 |
| 5349 | 北方点地梅 | 86 | 5405 | 藏报春 | 124 |
| 5350 | 喉咙草 | 87 | 5406 | 华紫报春花 | 124 |
| 5351 | 广西过路黄 | 89 | 5407 | 红花雪莲花 | 125 |
| 5352 | 耳叶排草 | 89 | 5408 | 偷筋草 | 126 |
| 5353 | 狼尾巴花 | 90 | 5409 | 唐古特报春 | 126 |
| 5354 | 单条草 | 91 | 白花丹科 | | 126 |
| 5355 | 香排草 | 91 | 5410 | 紫金标 | 126 |
| 5356 | 浙江过路黄 | 92 | 5411 | 紫金莲 | 127 |
| 5357 | 金钱草 | 93 | 5412 | 金匙叶草 | 128 |
| 5358 | 水红袍 | 96 | 5413 | 二色补血草 | 129 |
| 5359 | 珍珠菜 | 96 | 5414 | 大叶矾松 | 130 |
| 5360 | 风寒草 | 98 | 5415 | 补血草 | 130 |
| 5361 | 黄连花 | 99 | 5416 | 石苻蓉 | 131 |
| 5362 | 痲子草 | 100 | 5417 | 鸡娃草 | 131 |
| 5363 | 小寸金黄 | 100 | 5418 | 紫雪花 | 132 |
| 5364 | 头顶一朵花 | 101 | 5419 | 白花丹 | 132 |
| 5365 | 灵香草 | 101 | 柿科 | | 134 |
| 5366 | 大叶排草 | 103 | 5420 | 黑塔子根 | 134 |
| 5367 | 大田基黄 | 103 | 5421 | 黑塔子叶 | 135 |
| 5368 | 福建排草 | 104 | 5422 | 猴闷子 | 135 |
| 5369 | 缝瓣珍珠菜 | 105 | 5423 | 毛叶柿叶 | 136 |
| 5370 | 苍白过路黄 | 105 | 5424 | 柿蒂 | 136 |
| 5371 | 金瓜儿 | 106 | 5425 | 柿子 | 138 |
| 5372 | 点腺过路黄 | 106 | 5426 | 柿饼 | 139 |
| 5373 | 黑腺珍珠菜 | 107 | 5427 | 柿霜 | 139 |
| 5374 | 红毛对筋草 | 108 | 5428 | 柿漆 | 140 |
| 5375 | 三张叶 | 108 | 5429 | 柿皮 | 140 |

| | | | | | |
|-------------|-------|-----|------|-------|-----|
| 5430 | 柿叶 | 140 | 5474 | 素馨花 | 171 |
| 5431 | 柿花 | 141 | 5475 | 败火草 | 172 |
| 5432 | 柿木皮 | 141 | 5476 | 破骨风 | 172 |
| 5433 | 柿根 | 141 | 5477 | 梔花素馨 | 173 |
| 5434 | 君迁子 | 141 | 5478 | 桂叶素馨 | 174 |
| 5435 | 罗浮柿 | 142 | 5479 | 青藤子 | 174 |
| 5436 | 罗浮柿果 | 143 | 5480 | 大叶接骨藤 | 175 |
| 5437 | 罗浮柿根 | 143 | 5481 | 迎春花 | 175 |
| 5438 | 老鸦柿 | 143 | 5482 | 迎春花叶 | 176 |
| 安息香科 | | 143 | 5483 | 迎春花根 | 176 |
| 5439 | 豆渣树 | 143 | 5484 | 厚叶素馨 | 177 |
| 5440 | 安息香 | 144 | 5485 | 素兴花 | 177 |
| 5441 | 白克马叶 | 146 | 5486 | 茉莉花 | 178 |
| 5442 | 候风藤 | 147 | 5487 | 茉莉花露 | 179 |
| 5443 | 玉铃花 | 147 | 5488 | 茉莉叶 | 179 |
| 5444 | 红皮 | 148 | 5489 | 茉莉根 | 179 |
| 山矾科 | | 149 | 5490 | 亮叶茉莉 | 180 |
| 5445 | 华山矾 | 149 | 5491 | 华清香藤 | 180 |
| 5446 | 华山矾果 | 149 | 5492 | 三枝叶 | 181 |
| 5447 | 华山矾根 | 149 | 5493 | 川素馨 | 181 |
| 5448 | 密花山矾 | 150 | 5494 | 地灵根 | 182 |
| 5449 | 羊舌树 | 151 | 5495 | 苦茶叶 | 182 |
| 5450 | 刀灰树 | 151 | 5496 | 女贞子 | 183 |
| 5451 | 泡花子 | 151 | 5497 | 女贞叶 | 188 |
| 5452 | 白檀 | 152 | 5498 | 女贞皮 | 189 |
| 5453 | 四川山矾 | 153 | 5499 | 女贞根 | 189 |
| 5454 | 小药木 | 153 | 5500 | 四川苦丁茶 | 189 |
| 5455 | 山矾叶 | 154 | 5501 | 水白腊 | 191 |
| 5456 | 山矾花 | 154 | 5502 | 小蜡树 | 191 |
| 5457 | 山矾根 | 155 | 5503 | 毛女贞 | 192 |
| 木犀科 | | 155 | 5504 | 齐墩果 | 193 |
| 5458 | 连翘 | 155 | 5505 | 鬼柳树 | 195 |
| 5459 | 连翘茎叶 | 159 | 5506 | 豆瓣香 | 195 |
| 5460 | 连翘根 | 160 | 5507 | 桂花 | 196 |
| 5461 | 金钟花 | 160 | 5508 | 桂花露 | 197 |
| 5462 | 锈毛白枪杆 | 161 | 5509 | 桂花子 | 197 |
| 5463 | 白枪杆 | 161 | 5510 | 桂花枝 | 197 |
| 5464 | 白枪杆根 | 162 | 5511 | 桂花根 | 197 |
| 5465 | 水曲柳 | 162 | 5512 | 香木茵桂 | 197 |
| 5466 | 洋白蜡树 | 162 | 5513 | 羊屎木 | 198 |
| 5467 | 秦皮 | 163 | 5514 | 紫丁香 | 198 |
| 5468 | 小酒饼花 | 167 | 5515 | 野丁香 | 199 |
| 5469 | 金丝藤 | 168 | 5516 | 羽叶丁香 | 200 |
| 5470 | 鸡爪花 | 168 | 5517 | 关东丁香 | 200 |
| 5471 | 扭肚藤 | 168 | 5518 | 暴马子 | 201 |
| 5472 | 小柳拐 | 169 | 5519 | 白花丁香 | 202 |
| 5473 | 茎皮 | 170 | | | |

第十七卷

| | | | | | |
|-------------|-------|-----|------------|------|-----|
| 醉鱼草科 | | 207 | 5525 | 醉鱼草花 | 210 |
| 5520 | 白鱼尾 | 207 | 5526 | 醉鱼草根 | 210 |
| 5521 | 白鱼尾果 | 207 | 5527 | 密蒙花 | 210 |
| 5522 | 黄花醉鱼草 | 207 | 马钱科 | | 212 |
| 5523 | 酒药花 | 208 | 5528 | 小血光藤 | 212 |
| 5524 | 醉鱼草 | 209 | 5529 | 蓬莱葛 | 213 |

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| 5530 钩吻····· | 213 | 5585 小筋骨藤····· | 269 |
| 5531 大茶药根····· | 217 | 5586 黄秦艽····· | 270 |
| 5532 牛眼珠····· | 217 | 夹竹桃科 ····· | 271 |
| 5533 牛目椒····· | 218 | 5587 闹狗药····· | 271 |
| 5534 吕宋果····· | 218 | 5588 象皮木····· | 271 |
| 5535 滇南马钱····· | 220 | 5589 滇鸡骨常山····· | 273 |
| 5536 马钱子····· | 220 | 5590 筋藤····· | 274 |
| 龙胆科 ····· | 226 | 5591 浆包藤····· | 274 |
| 5537 穿心草····· | 226 | 5592 瓜子藤····· | 275 |
| 5538 罗星草····· | 226 | 5593 毛车藤····· | 275 |
| 5539 埃蕾····· | 227 | 5594 水甘草····· | 276 |
| 5540 云南蔓龙胆····· | 227 | 5595 罗布麻····· | 276 |
| 5541 茺菘草····· | 228 | 5596 炮弹果····· | 280 |
| 5542 落地荷花····· | 228 | 5597 刺郎果····· | 280 |
| 5543 蓝花龙胆····· | 229 | 5598 长春花····· | 281 |
| 5544 黄斑龙胆····· | 229 | 5599 大萼鹿角藤····· | 285 |
| 5545 六叶龙胆····· | 230 | 5600 藤仲····· | 286 |
| 5546 龙胆地丁····· | 230 | 5601 红背酸藤····· | 286 |
| 5547 秦艽····· | 231 | 5602 花杜仲藤····· | 287 |
| 5548 矮脚龙胆····· | 236 | 5603 狗牙花····· | 288 |
| 5549 高山龙胆····· | 237 | 5604 单根木····· | 288 |
| 5550 小龙胆草····· | 238 | 5605 广西狗牙花····· | 289 |
| 5551 小儿血参····· | 239 | 5606 药用狗牙花····· | 290 |
| 5552 菊花参····· | 239 | 5607 止泻木皮····· | 290 |
| 5553 龙胆····· | 240 | 5608 仔榄树····· | 291 |
| 5554 匙叶龙胆····· | 245 | 5609 腰骨藤····· | 291 |
| 5555 石龙胆····· | 246 | 5610 柯蒲木····· | 292 |
| 5556 乌双龙胆····· | 247 | 5611 尖山橙····· | 293 |
| 5557 双色龙胆····· | 247 | 5612 川山橙根····· | 293 |
| 5558 扁蕾····· | 248 | 5613 川山橙果····· | 294 |
| 5559 湿生扁蕾····· | 248 | 5614 长果山橙····· | 294 |
| 5560 花锚····· | 249 | 5615 山橙····· | 294 |
| 5561 黑及草····· | 250 | 5616 山橙叶····· | 295 |
| 5562 匙叶草····· | 251 | 5617 夹竹桃····· | 295 |
| 5563 肋柱花····· | 252 | 5618 杜仲藤····· | 298 |
| 5564 睡菜····· | 252 | 5619 杜仲叶藤····· | 299 |
| 5565 睡菜根····· | 253 | 5620 金丝藤仲····· | 300 |
| 5566 铜苋菜····· | 253 | 5621 鸡蛋花····· | 300 |
| 5567 苜蓿菜····· | 254 | 5622 花拐藤根····· | 301 |
| 5568 乌金草····· | 255 | 5623 蛇根木····· | 302 |
| 5569 獐牙菜····· | 256 | 5624 萝芙木····· | 304 |
| 5570 鱼胆草····· | 256 | 5625 萝芙木茎叶····· | 307 |
| 5571 淡花当药····· | 257 | 5626 云南萝芙木····· | 308 |
| 5572 红直当药····· | 258 | 5627 土牛党七····· | 309 |
| 5573 黄花獐牙菜····· | 259 | 5628 羊角拗····· | 309 |
| 5574 贵州獐牙菜····· | 259 | 5629 羊角拗子····· | 311 |
| 5575 青叶胆····· | 260 | 5630 羊角纽花····· | 312 |
| 5576 藏茵陈····· | 262 | 5631 黄花夹竹桃····· | 312 |
| 5577 翼梗獐牙菜····· | 263 | 5632 黄花夹竹桃叶····· | 315 |
| 5578 小儿腹痛草····· | 263 | 5633 紫花络石····· | 315 |
| 5579 瘤毛獐牙菜····· | 264 | 5634 络石藤····· | 316 |
| 5580 山飘儿草····· | 266 | 5635 石血····· | 319 |
| 5581 肺形草····· | 266 | 5636 盆架树····· | 320 |
| 5582 青鱼胆草····· | 267 | 5637 蓝树····· | 320 |
| 5583 黄金线····· | 268 | 5638 倒吊蜡烛····· | 321 |
| 5584 台湾肺形草····· | 269 | 5639 倒吊笔叶····· | 322 |

| | | | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 5640 胭木····· | 322 | 5688 醉魂藤····· | 364 |
| 萝藦科····· | 323 | 5689 催乳藤····· | 364 |
| 5641 莲生桂子花····· | 323 | 5690 铰剪藤····· | 365 |
| 5642 捆仙丝····· | 324 | 5691 球兰····· | 365 |
| 5643 润肺草····· | 324 | 5692 护耳草····· | 366 |
| 5644 牛角瓜····· | 325 | 5693 荷秋藤····· | 367 |
| 5645 小鹅儿肠····· | 326 | 5694 石草鞋····· | 367 |
| 5646 双剪菜····· | 326 | 5695 公鱼藤····· | 367 |
| 5647 金雀马尾参····· | 327 | 5696 铁草鞋····· | 368 |
| 5648 对叶林····· | 327 | 5697 虎舌····· | 368 |
| 5649 古钩藤····· | 327 | 5698 台湾牛奶菜····· | 369 |
| 5650 白叶藤····· | 328 | 5699 大白药····· | 369 |
| 5651 合掌消····· | 329 | 5700 百灵草····· | 370 |
| 5652 白薇····· | 330 | 5701 药用牛奶菜····· | 370 |
| 5653 白首乌····· | 333 | 5702 背痛药····· | 371 |
| 5654 美翼杯冠藤····· | 337 | 5703 三百银····· | 371 |
| 5655 蔓剪草····· | 337 | 5704 通光散····· | 372 |
| 5656 鹅绒藤····· | 338 | 5705 蓝叶藤····· | 374 |
| 5657 刺瓜····· | 338 | 5706 蓝叶藤果····· | 375 |
| 5658 豹药藤····· | 339 | 5707 华萝藦····· | 375 |
| 5659 丽江白薇····· | 339 | 5708 萝藦····· | 376 |
| 5660 牛心朴····· | 340 | 5709 萝藦子····· | 377 |
| 5661 老君须····· | 341 | 5710 天浆壳····· | 377 |
| 5662 毛白薇····· | 342 | 5711 大对节生····· | 378 |
| 5663 朱砂藤····· | 343 | 5712 大对节生根····· | 378 |
| 5664 青羊参····· | 343 | 5713 尖槐藤····· | 378 |
| 5665 徐长卿····· | 345 | 5714 石萝藦····· | 379 |
| 5666 沙牛皮消根····· | 349 | 5715 乌骚风····· | 379 |
| 5667 白前····· | 350 | 5716 黑骨头····· | 380 |
| 5668 地梢瓜····· | 353 | 5717 香加皮····· | 381 |
| 5669 断节参····· | 354 | 5718 无叶藤····· | 383 |
| 5670 隔山消····· | 355 | 5719 黄花藤····· | 384 |
| 5671 上树瓜····· | 355 | 5720 吊山桃····· | 384 |
| 5672 上树鳖····· | 356 | 5721 生藤····· | 385 |
| 5673 圆叶眼树莲····· | 356 | 5722 假木通····· | 385 |
| 5674 金瓜核藤····· | 357 | 5723 黑鳗藤····· | 386 |
| 5675 小叶眼树莲····· | 357 | 5724 古羊藤····· | 387 |
| 5676 金凤藤····· | 357 | 5725 夜香花····· | 387 |
| 5677 白浆藤····· | 358 | 5726 弓果藤····· | 388 |
| 5678 贯筋藤····· | 358 | 5727 老虎须····· | 388 |
| 5679 南山藤····· | 359 | 5728 三分丹····· | 389 |
| 5680 丽子藤····· | 360 | 5729 七层楼····· | 389 |
| 5681 钉头果····· | 360 | 5730 人参娃儿藤····· | 390 |
| 5682 纤冠藤····· | 361 | 5731 通天连····· | 391 |
| 5683 大奶藤····· | 361 | 5732 通脉丹····· | 391 |
| 5684 跳八丈····· | 361 | 5733 三十六荡····· | 392 |
| 5685 会东藤····· | 362 | 5734 扒地蜈蚣····· | 393 |
| 5686 武靴藤····· | 362 | 5735 圆叶娃儿藤····· | 393 |
| 5687 化肉藤····· | 363 | 5736 小白薇····· | 394 |

第十八卷

| | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 茜草科····· | 397 | 5740 水杨梅····· | 398 |
| 5737 水团花····· | 397 | 5741 水杨梅根····· | 400 |
| 5738 水团花根····· | 398 | 5742 一柱香····· | 400 |
| 5739 水冬瓜····· | 398 | 5743 胖儿草····· | 401 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|-------|-----|
| 5744 | 团花 | 401 | 5800 | 滇丁香 | 446 |
| 5745 | 丰花草 | 402 | 5801 | 野丁香根 | 447 |
| 5746 | 猪肚木 | 402 | 5802 | 橘叶巴戟 | 447 |
| 5747 | 六大天王 | 402 | 5803 | 大果巴戟 | 448 |
| 5748 | 风箱树根 | 403 | 5804 | 巴戟天 | 448 |
| 5749 | 风箱树叶 | 404 | 5805 | 百眼藤 | 451 |
| 5750 | 风箱树花 | 404 | 5806 | 羊角藤 | 452 |
| 5751 | 弯管花 | 404 | 5807 | 羊角藤叶 | 453 |
| 5752 | 金鸡勒 | 405 | 5808 | 楠藤 | 453 |
| 5753 | 咖啡 | 410 | 5809 | 大叶白纸扇 | 453 |
| 5754 | 流苏子根 | 412 | 5810 | 山甘草 | 454 |
| 5755 | 虎刺 | 413 | 5811 | 白常山 | 455 |
| 5756 | 鸡筋参 | 414 | 5812 | 胆木 | 456 |
| 5757 | 岩石羊 | 415 | 5813 | 薄柱草 | 457 |
| 5758 | 香果树 | 416 | 5814 | 朱砂草 | 457 |
| 5759 | 八仙草 | 416 | 5815 | 蛇根草 | 458 |
| 5760 | 砧草 | 418 | 5816 | 短小蛇根草 | 459 |
| 5761 | 四叶草 | 419 | 5817 | 地贵草 | 459 |
| 5762 | 锯锯藤 | 419 | 5818 | 鸡屎藤 | 460 |
| 5763 | 蓬子菜 | 420 | 5819 | 鸡屎藤果 | 463 |
| 5764 | 梔子 | 421 | 5820 | 毛鸡屎藤 | 463 |
| 5765 | 梔子花 | 427 | 5821 | 毛叶黄药 | 463 |
| 5766 | 梔子叶 | 427 | 5822 | 大沙叶 | 464 |
| 5767 | 梔子根 | 428 | 5823 | 黄根 | 465 |
| 5768 | 水梔 | 428 | 5824 | 小功劳 | 466 |
| 5769 | 水梔叶 | 429 | 5825 | 山大刀 | 466 |
| 5770 | 水梔根 | 429 | 5826 | 山大刀根 | 467 |
| 5771 | 小果梔子 | 429 | 5827 | 穿根藤 | 467 |
| 5772 | 出山虎 | 429 | 5828 | 花叶九节木 | 468 |
| 5773 | 金草 | 430 | 5829 | 鸡爪筋 | 469 |
| 5774 | 亚婆潮 | 430 | 5830 | 山石榴 | 469 |
| 5775 | 耳草 | 430 | 5831 | 茜草 | 470 |
| 5776 | 沙糖根 | 431 | 5832 | 茜草藤 | 475 |
| 5777 | 黄毛耳草 | 432 | 5833 | 小红参 | 476 |
| 5778 | 黑节草 | 433 | 5834 | 小茜草 | 477 |
| 5779 | 白花蛇舌草 | 433 | 5835 | 大树甘草 | 477 |
| 5780 | 牛白藤 | 436 | 5836 | 白马骨 | 478 |
| 5781 | 牛白藤根 | 437 | 5837 | 达仓木 | 480 |
| 5782 | 粗叶耳草 | 437 | 5838 | 乌口树 | 480 |
| 5783 | 剑叶耳草 | 438 | 5839 | 狗骨柴 | 481 |
| 5784 | 鸚哥舌 | 438 | 5840 | 方儿茶 | 481 |
| 5785 | 理肺散 | 439 | 5841 | 四楞通 | 482 |
| 5786 | 石枫药 | 439 | 5842 | 钩藤 | 483 |
| 5787 | 牙疳药 | 440 | 5843 | 钩藤根 | 489 |
| 5788 | 藏丁香 | 441 | 5844 | 水锦树 | 489 |
| 5789 | 团花龙船花 | 441 | 花荵科 | | 490 |
| 5790 | 龙船花 | 442 | 5845 | 花荵 | 490 |
| 5791 | 龙船花茎叶 | 443 | 旋花科 | | 491 |
| 5792 | 龙船花根 | 443 | 5846 | 一匹绸 | 491 |
| 5793 | 黄龙船花 | 443 | 5847 | 白鹤藤根 | 491 |
| 5794 | 云南钩毛草 | 443 | 5848 | 银背藤 | 492 |
| 5795 | 红大戟 | 444 | 5849 | 藤本夜关门 | 492 |
| 5796 | 粗叶木 | 445 | 5850 | 滇一匹绸 | 492 |
| 5797 | 粗叶木叶 | 445 | 5851 | 山牡丹 | 493 |
| 5798 | 铁骨银参 | 445 | 5852 | 小团叶根 | 494 |
| 5799 | 毛野丁香叶 | 446 | 5853 | 月光花 | 494 |

| | | | | | |
|------|-------|-----|------|-------|-----|
| 5854 | 月光花种子 | 494 | 5909 | 大尾摇 | 539 |
| 5855 | 天茄子 | 495 | 5910 | 赖毛子 | 540 |
| 5856 | 狗狗秧 | 495 | 5911 | 田紫草 | 541 |
| 5857 | 面根藤 | 496 | 5912 | 白果紫草 | 541 |
| 5858 | 旋花 | 497 | 5913 | 地仙桃 | 542 |
| 5859 | 旋花苗 | 497 | 5914 | 野旱烟 | 542 |
| 5860 | 旋花根 | 498 | 5915 | 藏紫草 | 543 |
| 5861 | 孝扇草根 | 498 | 5916 | 滇紫草 | 544 |
| 5862 | 小旋花 | 498 | 5917 | 紫筒草 | 545 |
| 5863 | 田旋花 | 499 | 5918 | 盾果草 | 545 |
| 5864 | 菟丝子 | 500 | 5919 | 艳肠草 | 546 |
| 5865 | 菟丝 | 504 | 5920 | 附地菜 | 546 |
| 5866 | 小金钱草 | 505 | 马鞭草科 | | 547 |
| 5867 | 丁公藤 | 506 | 5921 | 乔木紫珠 | 547 |
| 5868 | 土丁桂 | 509 | 5922 | 珍珠风 | 548 |
| 5869 | 薤菜 | 509 | 5923 | 珍珠风子 | 549 |
| 5870 | 薤菜根 | 511 | 5924 | 紫珠 | 549 |
| 5871 | 番薯 | 511 | 5925 | 牛舌癩 | 553 |
| 5872 | 五叶藤 | 512 | 5926 | 金刀菜 | 553 |
| 5873 | 五爪金龙花 | 512 | 5927 | 尖尾风 | 554 |
| 5874 | 藤商陆 | 513 | 5928 | 尖尾风根 | 555 |
| 5875 | 马鞍藤 | 513 | 5929 | 大叶紫珠 | 555 |
| 5876 | 篱栏子 | 514 | 5930 | 赶风柴 | 556 |
| 5877 | 土瓜 | 515 | 5931 | 红紫珠 | 557 |
| 5878 | 铃当子 | 515 | 5932 | 对节树根 | 558 |
| 5879 | 北鱼黄草 | 516 | 5933 | 云南紫珠 | 558 |
| 5880 | 过腰蛇 | 516 | 5934 | 兰香草 | 558 |
| 5881 | 白云瓜 | 517 | 5935 | 蓝花茶 | 560 |
| 5882 | 白云瓜皮 | 517 | 5936 | 菟 | 561 |
| 5883 | 白云瓜花 | 517 | 5937 | 紫红鞭 | 561 |
| 5884 | 白云瓜梗 | 517 | 5938 | 小六月寒 | 562 |
| 5885 | 白云瓜叶 | 517 | 5939 | 六月寒 | 562 |
| 5886 | 盒果藤 | 517 | 5940 | 毛菟 | 563 |
| 5887 | 牵牛子 | 518 | 5941 | 臭牡丹 | 563 |
| 5888 | 红薯细辛 | 523 | 5942 | 臭牡丹根 | 565 |
| 5889 | 打米花 | 523 | 5943 | 大叶白灯笼 | 565 |
| 5890 | 莛萝松 | 523 | 5944 | 大青 | 566 |
| 紫草科 | | 524 | 5945 | 大青根 | 567 |
| 5891 | 黑阳参 | 524 | 5946 | 鬼灯笼 | 568 |
| 5892 | 紫草 | 525 | 5947 | 鬼灯笼根 | 568 |
| 5893 | 蛤蟆草 | 531 | 5948 | 长管假茉莉 | 569 |
| 5894 | 野山蚂蚱 | 532 | 5949 | 水胡满 | 569 |
| 5895 | 鬼点灯 | 532 | 5950 | 水胡满根 | 570 |
| 5896 | 青桐翠木 | 532 | 5951 | 荷苞花 | 571 |
| 5897 | 狗屎花 | 533 | 5952 | 赭桐叶 | 571 |
| 5898 | 狗屎花根 | 534 | 5953 | 荷苞花根 | 572 |
| 5899 | 琉璃草根 | 534 | 5954 | 过墙风 | 572 |
| 5900 | 琉璃草子 | 535 | 5955 | 海通 | 572 |
| 5901 | 牙痛草 | 535 | 5956 | 臭茉莉 | 573 |
| 5902 | 药用倒提壶 | 535 | 5957 | 臭茉莉叶 | 574 |
| 5903 | 铁箍散 | 536 | 5958 | 三台红花 | 574 |
| 5904 | 粗糠树皮 | 537 | 5959 | 九龙吐珠 | 576 |
| 5905 | 大岗茶 | 538 | 5960 | 臭梧桐 | 576 |
| 5906 | 大岗茶树皮 | 538 | 5961 | 臭梧桐花 | 579 |
| 5907 | 大岗茶叶 | 538 | 5962 | 臭梧桐子 | 579 |
| 5908 | 蓝梅 | 538 | 5963 | 臭梧桐根 | 579 |

| | | | | | |
|------|------|-----|------|------|-----|
| 5964 | 滇常山 | 579 | 5982 | 接骨树皮 | 589 |
| 5965 | 滇常山花 | 580 | 5983 | 筋骨散 | 590 |
| 5966 | 假连翘 | 580 | 5984 | 千解草 | 590 |
| 5967 | 假连翘叶 | 581 | 5985 | 玉龙鞭 | 591 |
| 5968 | 鼻血筋 | 581 | 5986 | 紫柚木 | 592 |
| 5969 | 矮子常山 | 581 | 5987 | 马鞭草 | 592 |
| 5970 | 五色梅 | 582 | 5988 | 黄荆子 | 596 |
| 5971 | 五色梅叶 | 583 | 5989 | 黄荆叶 | 598 |
| 5972 | 五色梅根 | 584 | 5990 | 黄荆枝 | 598 |
| 5973 | 蓬莱草 | 584 | 5991 | 黄荆沥 | 599 |
| 5974 | 臭黄荆 | 585 | 5992 | 黄荆根 | 599 |
| 5975 | 臭黄荆叶 | 586 | 5993 | 牡荆子 | 599 |
| 5976 | 臭黄荆根 | 586 | 5994 | 牡荆叶 | 602 |
| 5977 | 腐婢 | 586 | 5995 | 牡荆茎 | 603 |
| 5978 | 腐婢根 | 587 | 5996 | 牡荆沥 | 604 |
| 5979 | 斑鸠占 | 587 | 5997 | 牡荆根 | 604 |
| 5980 | 斑鸠占叶 | 588 | 5998 | 蔓荆子 | 604 |
| 5981 | 大臭黄荆 | 589 | | | |

第十六卷



岩梅科


5232 岩筋菜 *Yanjincai* (四川常用中草药)

[异名] 白奴花(四川常用中草药), 岩菠菜(四川), 石莲(云南)。

[来源] 为岩梅科植物岩匙的全草。

[原植物] 岩匙 *Berneuxia thibetica* Decne. [*Shortia thibetica* (Decne.) Franch.; *Berneuxia yunnanensis* Li]

多年生草本, 高10~25cm。根茎长, 近直立, 粗3~4mm, 有宽卵状鳞片, 顶端发出6~10片成莲座状的叶丛。叶基生; 叶柄与叶片等长或略超过叶片; 叶片革质, 倒卵状匙形, 长约5~10cm, 宽2.5~3.5cm, 先端宽钝形, 有凸尖, 向基部渐狭成狭楔形并下延于叶柄, 无毛, 上面深绿色, 下面灰绿色, 叶脉两面不甚明显, 全缘。花葶长往往几等于叶, 花后伸长, 有花8~12朵, 成伞形总状花序; 花梗长6~11mm, 常带红色, 有短硬毛, 基部有1大苞片, 中部有2小苞片; 花白色, 两性; 萼片5, 卵形, 长4~5mm, 宿存; 花冠钟状, 5深裂, 裂片舌形; 雄蕊5, 花丝颇宽, 下部有微睫毛, 与花冠裂片对生; 子房扁球形, 3室, 花柱单一, 长等于花冠(在果期伸长到9mm)。蒴果圆球形, 直径3mm, 包于萼内。花期5~7月, 果期7~9月。



岩匙

生于山坡林下阴处。分布于四川、贵州、云南、西藏等地。

[采收加工] 夏、秋季采收, 洗净, 晒干。

[化学成分] 地上部分含有岩筋菜素(berneuxin), 21-巴豆酰基玉蕊皂甙元(21-tigloylbarringtonol) C, 2 α , 3 α -二羟基熊果酸(2 α , 3 α -dihydroxyursolic acid)和 2 α , 3 β -二羟基熊果酸(2 α , 3 β -dihydroxyursolic acid)^[1]。

根中含有猫眼草黄素(chrysofenetin) B, 22, 23-二氢菠菜甾酮(22, 23-dihydrospinasterone), 菠菜甾醇(spinasterol)及 22, 23-二氢菠菜甾醇(22, 23-dihydrospinasterol)^[2]。

[药性] 味辛, 性微温。

〔四川常用中草药〕: “性平, 味辛。”

[功能与主治] 祛风散寒, 止咳平喘, 活血通络。主治风寒

感冒, 咳嗽, 哮喘, 跌打损伤。

〔四川常用中草药〕: “散寒, 平喘。治感冒风寒咳嗽, 劳伤, 吼喘, 跌打损伤等症。”

[用法用量] 内服: 煎汤, 6~9g。

参考文献

化学成分

[1] 王明奎, 等. 药学报, 1993, 28(11): 845

[2] 丁立生, 等. 中国中药杂志, 1991, 16(5): 289

山柳科

5233 山柳 *Shanliu* (全国中草药汇编)

[来源] 为山柳科植物华东山柳的根。

[原植物] 华东山柳 *Clethra barbinervis* Sieb. et Zucc.

落叶灌木至小乔木, 高达10m。当年生枝近无毛或有星状细柔毛。叶互生; 叶柄长1~2.5cm, 有伏生柔毛; 叶片倒卵状椭圆形, 长7~14cm, 宽3~6.5cm, 先端短渐尖, 基部楔形, 急尖, 上面无毛, 下面在中脉和侧脉上有硬毛, 腋间有单髯毛, 边缘有尖锐锯齿; 侧脉12~14对, 弧曲。总状花序3~6枝成圆锥花序, 总花梗有密锈色簇生糙硬毛; 花梗长4~6mm; 萼片圆卵形, 长5~6mm, 宽3~4mm, 先端有微缺并为流苏状; 雄蕊花丝无毛; 花柱无毛, 先端3深裂。蒴果近圆球形, 直径4mm, 宿存花柱长9~12mm; 果梗长1.5~2cm。花期4~5月, 果期7~9月。



华东山柳

生于疏林或灌丛中。分布于山东、安徽、浙江、江西、台湾、湖北等地。

[采收加工] 夏、秋季采挖, 洗净, 切片鲜用。

[化学成分] 华东山柳叶含山柳酸(clethric acid)^[1], 还含大量锰、钴、铜、锌及铁、镁、镉、镍、钙等元素^[2], 并含碱金属元素

(锂、钠、钾、铷、铯)^[3]。

【药性】 味苦，性寒。

【功能与主治】 清热解毒。主治热毒疮疖，痈疮。

《全国中草药汇编》：“清热解毒。主治疮毒痈肿。”

【用法用量】 外用：适量，鲜品捣汁涂。

【附方】 治疮毒痈肿 山柳鲜根适量，加米泔水和盐卤磨汁涂患处。（《全国中草药汇编》）

参考文献

化学成分

[1] Takahashi K, et al. C A, 1979, 90:39066j

[2] Okamoto K, et al. C A, 1978, 88:168974m

[3] Memon A R, et al. C A, 1983, 99:3088g

鹿蹄草科

5234 长白假水晶兰 *Changbaijiashuijinglan* (长白山植物药志)

【来源】 为鹿蹄草科植物球果假水晶兰的全草。


【原植物】 球果假水晶兰 *Cheilotheca humilis* (D. Don) H. Keng [*Monotropa humilis* D. Don; *Monotropastrum tschanbaischanicum* Y. L. Chang et Y. L. Chou] 又名：坛果拟水晶兰、长白拟水晶兰、球状拟水晶兰（拉汉种子植物名称），东北假水晶兰（植物分类学报）。

多年生腐生草本植物，高7~17cm。全株无毛，肉质，干后变黑。茎粗3~6mm，或顶部稍有毛。根细而分枝，集成鸟巢状，质脆。叶互生，鳞片状，无柄；在茎之基部较密，长圆形、阔椭圆形、阔倒卵形或披针状长圆形，长10~20mm，宽4~12mm，先端圆钝，基部较狭，边缘全缘或有细小齿，无毛，在茎顶端密集。花单一，顶生，下垂，无色；花冠管状钟形，长14~25mm，直径5~13mm；萼片(2~)3~5，长圆形，长17~19mm，宽6~8mm，先端钝头；花瓣3~5，长方状长圆形，长14~25mm，上部较宽，宽8~12mm，边缘外卷，基部成小囊状，内面有长毛；雄蕊8~12，长10~15mm，花药近倒卵圆形，紧贴于柱头周围，橙黄色，被细小疣，花丝稍扁平，有疏粗毛；子房卵形或长圆形，无毛，花柱长2~5mm，无毛，柱头宽大，中央凹入呈漏斗状，常为铅灰蓝色，有疏长毛。浆果近卵球形或椭圆形，长12~19mm，直径11~15mm，下垂，无毛；种子多数，椭圆形或卵状椭圆形，淡褐色，有光泽及网状突起。花期6~7月，果期8~9月。

生于海拔900~3100m的针阔混交林或阔叶林下。分布于东北及浙江、台湾、湖北、云南、西藏等地。

【采收加工】 7~8月采收，晾干。

【药性】 味甘、微咸，性平。



球果假水晶兰

《长白山植物药志》：“微咸，平。”

【功能与主治】 补肺止咳。主治虚咳。

《长白山植物药志》：“补虚。主治虚咳。”


【用法用量】 内服：煎汤，9~15g。

5235 伞形梅笠草 *Sanxingmeilicao* (长白山植物药志)

【来源】 为鹿蹄草科植物伞形喜冬草的全草。

【原植物】 伞形喜冬草 *Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton [*Pyrola umbellata* L.]

常绿小草本状半灌木，高10~20cm。根茎长而粗，斜升。叶近对生或多数轮生；叶柄短，长2~5(~6)mm；叶厚革质，倒卵状长楔形或匙状倒披针形，长3.5~6cm，上部最宽处0.8~1.5cm，先端圆钝，基部狭楔形，下延至叶柄，中部以上边缘有疏粗锯齿，下部边缘全缘，上面暗绿色，有皱纹，中脉及侧脉凹入，下面苍白色。花葶有细小疣，花(2~)3~8(~10)聚成伞形花序；花倾斜，白色，偶带红色，直径8~10(~12)mm；花梗直立，长1~1.7(~2)cm，有细小疣；苞片宽线形，长3~4mm，早落；萼片5，圆卵形，长1.5~2mm，最宽处2~2.2mm，先端圆钝，边缘有细齿；花瓣5，倒卵形，长5.5~6mm，宽4~4.5mm，先端圆钝；雄蕊10，花丝短，下半部膨大并有缘毛，花药长约2mm，宽约1mm，有小角，顶孔开裂，黄色；近无花柱，柱头宽圆盾状，5浅裂。蒴果扁球形，直径5~6mm。花期6~7月，果期7~8月。



伞形喜冬草

生于海拔1100m以下较干燥的阔叶林下。分布于吉林、辽宁、内蒙古等地。

【采收加工】 夏、秋季采收，洗净，晒干或阴干。

【化学成分】 含异高熊果酚甙(isohomoarbutin)和肾叶鹿蹄

草甙(renifolin)^[1]。

叶中含熊果酚甙(arbutin)17%~22%^[2]。

【药性】 味苦,性平。

【功能与主治】 清热利湿,理气止痛。主治小便淋涩疼痛,水肿,泄泻,胃痛,腹痛。

【长白山植物药志】:“利尿,收敛,镇痛。用于:①利尿及尿道消炎剂。本品精油对于肾病,膀胱炎,尿石症,肾炎淋病,慢性淋病型尿道炎有效。本品尚用于治疗各种水肿和积水。②糖尿病。③增加食欲,助消化。④滋补强壮剂。⑤胃肠炎。⑥上呼吸道感染。⑦肺结核。⑧镇静剂——产后痛,胃痛,牙痛。⑨肠结核,胃溃疡,前列腺炎。⑩各种癌症。”

【用法用量】 内服:煎汤,5~10g。

参考文献

化学成分

[1] Walewaska E. C A, 1972, 76:158253p

[2] Shnyakina G P. et al. C A, 1982, 96:3668s

倒卵状长圆形,长12~14mm,宽4.5~6mm,先端钝,上部有不整齐的锯齿,早落;雄蕊8~10,短于花冠,花药橙黄色,花丝无毛;子房无毛,4~5室,花柱直立,长2.5~4(~5)mm,柱头膨大成漏斗状,4~5圆裂。蒴果椭圆状球形,长7~10mm,直径5~7mm。花期6~7(~8)月,果期7~8(~9)月。

生于海拔1700~3650m的山地阔叶林或针阔叶混交林下。分布于东北南部、西北及山西、湖北、四川等地。

【采收加工】 6~8月采收,多为鲜用。

【药性】 味苦,性平。

【功能与主治】 镇咳,补虚。主治痉挛性咳嗽,气管炎及虚弱证。根利尿,主治小便不利。

【长白山植物药志】:“①全草浸剂做镇静、解痉、镇咳药,用于治疗痉挛性咳嗽,气管炎等。②用其地下部分可作利尿,催吐剂。”

【用法用量】 内服:煎汤,9~15g。


5236 松下兰 Songxialan
(长白山植物药志)

【异名】 土花、地花(陕西)。

【来源】 为鹿蹄草科植物松下兰的全草或根。

【原植物】 松下兰 *Monotropa hypopitys* L. [*Hypopitys multiflora* Scop.; *H. monotropa* Grantz]

多年生草本,腐生,高8~27cm。全株无叶绿素,白色或淡黄色,肉质,干后变黑褐色。根细而分枝密。叶鳞片状,直立,互生,上部较稀疏,下部较紧密,卵状长圆形或卵状披针形,长1~1.5cm,宽0.5~0.7cm,先端钝头,边缘近全缘,上部的常有不整齐的锯齿。总状花序有3~8花;花初下垂,后渐直立,花冠筒状钟形,长1~1.5cm,直径0.5~0.8cm;苞片卵状长圆形或卵状披针形,长10~16mm,宽4~7mm;萼片长圆状卵形,长7~10mm,宽2.5~3.5mm,先端急尖,早落;花瓣4~5。长圆形或



松下兰

5237 水晶兰 Shuijinglan
(贵州民间药物)

【异名】 梦兰花、水兰草(贵州民间药物),银锁匙(全国中草药汇编)。

【来源】 为鹿蹄草科植物水晶兰的根或全草。

【原植物】 水晶兰 *Monotropa uniflora* L.

多年生草本,高10~30cm。腐生。茎单一,全株无叶绿素,白色,肉质,干后变黑褐色。根细而分枝密,交结成鸟巢状。叶鳞片状,直立,互生;长圆形或狭长圆形或宽披针形,长1.4~1.5cm,宽4~4.5mm,先端钝头,无毛或上部叶稍有毛,边缘近全缘。花单一,顶生,先下垂,后直立;花冠筒状钟形,长1.4~2cm,直径1.1~1.6cm;苞片鳞片状,与叶同形;萼片鳞片状,早落;花瓣5~6,离生,楔形或倒卵状长圆形,长1.2~1.6cm,上部最宽5.5~7mm,有不整齐的齿,内侧常被密长粗毛,早落;雄蕊10~12,花丝有粗毛,花药黄色;花盘10齿裂;子房5室,花柱长2~3mm,柱头膨大成漏斗状。蒴果椭圆状球形,直立,向上,长1.3~1.4cm。花期8~9月,果期9~11月。

生于海拔800~3850m的山地林下。分布于西南及山西、陕西、甘肃、青海、安徽、浙江、江西、台湾、湖北、西藏等地。

【采收加工】 夏季采收,多为鲜用。

【化学成分】 含山柰酚(kaempferol)和槲皮素(querctin)的单葡萄糖和双葡萄糖甙^[1],甾醇类,主要有甾醇(sitosterol),脂肪酸类,主要为16~18



水晶兰

个碳的脂肪酸及少量的亚麻酸(linolenic acid)^[2]。

〔药性〕 味甘,性平。

〔贵州民间药物〕:“性平,味微咸。”

〔功能与主治〕 补肺止咳。主治肺虚咳嗽。

〔贵州民间药物〕:“补虚弱,治虚咳。”

〔用法用量〕 内服:煎汤,9~15g;或炖肉食。

〔附方〕 1. 补虚弱 梦兰花 30g。炖肉吃。

2. 治虚咳 梦兰花 30g。煎水服。(1~2方出自《贵州民间药物》)

参考文献

化学成分

[1] Bohm Bruce A, et al. C A, 1990, 112: 33353b

[2] Stanley J, et al. C A, 1977, 87: 164257m

5238 鹿衔草 *Luxiancao*
(滇南本草)

〔异名〕 鹿蹄草、小秦王草(纲目),破血丹(植物名实图考),纸背金牛草、大肺筋草、红肺筋草(重庆草药),鹿寿茶(陕西中草药),鹿安茶(山西中草药),鹿含草(浙江药用植物志)。

〔品种考证〕 本品始载于《滇南本草》,云:“鹿衔草,紫背者好。叶团,高尺余。出落雪厂(今东川)者效。”所述应为普通鹿蹄草 *Pyrola decorata* H. Andr.。《纲目》在草部以“鹿蹄草”为名,曰:“按《轩辕述宝藏论》云:鹿蹄多生江广平陆及寺院荒处,淮北绝少,川陕亦有。苗似堇菜,而叶颇大,背紫色。春生紫花,结青实,如天茄子。”按其记述,生境及形态与鹿蹄草 *P. calliantha* H. Andr. 相似。《植物名实图考》云:“鹿衔草,九江建昌山中有之。铺地生绿叶,紫背,面有白缕,略似蕺菜而微长,根亦紫。”又云:“《安徽志》:鹿衔草,性益阳,出婺源,即此。湖南山中亦有之,俗呼破血丹。滇南尤多。”根据文及附图,形态与《滇南本草》所载鹿衔草相符合。

〔来源〕 为鹿蹄草科植物普通鹿蹄草、鹿蹄草、日本鹿蹄草、红花鹿蹄草的全草。

〔原植物〕 1. 普通鹿蹄草 *Pyrola decorata* H. Andr. 又名:雅美鹿蹄草、山美人鹿蹄草(拉汉种子植物名称)。

常绿亚灌木状小草本,高15~35cm。根茎细长,横生或斜升,有分枝。叶3~6,近基生,叶柄长1.5~4cm;叶片薄革质,长圆形至倒卵状长圆形或匙形,稀为卵状长圆形,长3~7cm,宽2.5~4cm,先端钝尖,基部楔形或阔楔形,下延于叶柄,上面绿色,沿叶脉为淡绿白色或稍白色,下面色较淡,常带紫色,边缘有疏齿。花葶常带紫色,有1~2



图1 普通鹿蹄草

先端渐尖,基部稍抱花葶。总状花序长2.5~4cm,有花4~10,半下垂;花冠碗形,淡绿色、黄绿色或近白色;花梗腋间有膜质苞片,与花梗近等长;萼片先端急尖,边缘色较淡;花瓣倒卵状椭圆形,长达1cm,宽达7mm,先端圆形;雄蕊10,花丝无毛,花药黄色,具小角;花柱倾斜,上部弯曲,先端有环状突起稀不明显,伸出花冠,柱头5圆裂。蒴果扁球形,直径7~10mm。花期6~7月,果期7~8月。(图1)

生于海拔600~3000m的山地阔叶林或灌丛下。分布于西南及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西等地。

2. 鹿蹄草 *Pyrola calliantha* H. Andr. [*P. rotundifolia* L. subsp. *chinensis* H. Andr.] 又名:河北鹿蹄草、美花鹿蹄草(拉汉种子植物名称),川北鹿蹄草(中国高等植物图鉴),罗汉茶(四川),常绿茶(山西、安徽、江西)。

本品与普通鹿蹄草的区别在于:叶下面常有白霜;萼片较长,长(4~)5~7.5mm,边缘近全缘;花较大,直径1.5~2cm。花期6~8月,果期8~9月。(图2)

生于海拔300~4100m山地针叶林、针阔叶混交林或阔叶林下。分布于华东、西南及河北、山西、陕西、甘肃、青海、河南、湖北、湖南、西藏等地。

3. 日本鹿蹄草 *Pyrola japonica* Klenze ex Alef.

本品与前两种的区别在于:叶片椭圆形或卵状椭圆形,稀广椭圆形。萼片披针状三角形;苞片线状披针形;花冠白色;花瓣倒卵状椭圆形或卵状椭圆形,先端圆钝;花柱较长,长11~13mm。蒴果扁球形。花期6~7月,果期8~9月。(图3)

生于海拔800~2000m的山地针阔叶混交林或阔叶林下。分布于东北及内蒙古、河北、河南。

4. 红花鹿蹄草 *Pyrola incarnata* Fisch. ex DC.

本品与前3种的区别在于:植株较大,高15~30cm。叶片较大,近圆形、圆卵形至卵状椭圆形,长3.5~6cm,宽2.5~5.5cm,两面有时带紫色。花葶上的鳞片状叶狭长圆形或长圆状卵形;萼片三角状宽披针形,长3.5~5mm;花冠紫色;花柱长6~10mm,伸出花冠。蒴果带紫红色。花期6~7月,果期8~9月。(图4)

生于海拔1000~2500m的针叶林、针阔叶混交林或阔叶林下。分布于华北及吉林、辽宁、新疆、河南。

〔栽培要点〕 生物学特性 喜较冷凉阴湿。土壤以有较多枯朽落叶而排水良好的腐殖质土较好,可在林下栽培。

栽培技术 用分株繁殖。在9~10月,结合采收,连匍匐茎一齐扯起,分成单株,每株都要带有部分匍匐茎和须根。在选好的林下,把灌木杂草除去,不要翻动土层,开1.3m宽的畦,按行距25cm开小沟,深6~7cm,把幼苗放入沟里,每隔10cm放1



图2 鹿蹄草



图3 日本鹿蹄草



图4 红花鹿蹄草

株，斜靠沟壁，盖腐质土与地面齐平。栽后淋1次水。平时要勤除杂草，每年冬季要盖腐殖土拌石灰。

【采收加工】栽后3~4年采收，在9~10月结合分株进行。采大留小，扯密留稀，每隔6~10cm留苗1株。以后每隔1年，又可采收1次，除去杂草，晒至发软，堆积发汗，盖麻袋等物，使叶片变紫红或紫褐色后，晒或炕干。

【药材及产销】1. 普通鹿蹄草 *Herba Pyrolae Decoratae*

产于河南、甘肃、陕西、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、福建、贵州、四川、云南、西藏。销全国各地。

2. 鹿蹄草 *Herba Pyrolae Callianthae* 产地与上种近似。销全国各地。

3. 日本鹿蹄草 *Herba Pyrolae Japonicae* 主产于东北、华北。自产自销。

4. 红花鹿蹄草 *Herba Pyrolae Incarnatae* 主产于东北、内蒙古、山西、河北、新疆。自产自销。

【药材鉴别】性状鉴别 (1) 普通鹿蹄草 全草长14~30cm，全体无毛，棕绿色或近浅红棕色。根茎细长，具细根及鳞叶；稍具纵棱，棱间有细纵皱纹。叶互生；基生叶3~6片，叶柄长2~4cm，具棱；叶片革质，较厚，长卵形、椭圆形或长椭圆形，长3.5~7cm，宽2.3~4cm，先端钝尖，有小突尖头，叶基广楔形，下延至叶柄，叶缘有稀疏小齿；表面枯绿色，背面紫红色。花葶高15~30cm；总状花序具花5~8朵；苞片线状披针形，花广钟状；萼5深裂。蒴果深棕色，扁球形。

(2) 鹿蹄草 全草长(10~)15~30cm。根茎细长，有分枝。基生叶4~7片，叶片椭圆形或卵圆形，稀近圆形，长达5.2cm，宽达3.5cm，叶背面常有白霜，有时带紫色。

(3) 日本鹿蹄草 总状花序有花3~12朵；萼片宽披针形；叶宽卵圆形至宽卵形；花葶上无苞片或有1片。

(4) 红花鹿蹄草 花深紫红色；萼片三角状披针形，渐尖头。

【化学成分】1. 普通鹿蹄草 含鹿蹄草素即2,5-二羟基甲苯(2,5-dihydroxytoluene)^[1]，山柰酚-3-O-葡萄糖甙(kaempferol-3-O-glucoside)，槲皮素-3-O-葡萄糖甙(querletin-3-O-glucoside)^[2]。

2. 鹿蹄草 含N-苯基-2-萘胺(N-phenyl-2-naphthylamine)，伞形梅笠草素(chimaphilin)，高熊果酚甙(homoarbutin)，没食子酸(gallic acid)，原儿茶酸(protocatechuic acid)，鹿蹄草素，槲皮素(querletin)^[3]，没食子鞣质(gallotannin)^[4]，肾叶鹿蹄草甙(renifolin)，6-O-没食子酰高熊果酚甙(6-O-galloylhomoarbutin)，金丝桃甙(hyperin)，没食子酰金丝桃甙(galloylhyperin)^[5]。

3. 日本鹿蹄草 含鹿蹄草甙(pirolatin)，高熊果酚甙，熊果酚甙(arbutin)，甲基熊果酚甙(methyl arbutin)以及槲皮素(querletin)，三十一烷(hentriacontane)， β -谷甾醇(β -sitosterol)， α_3 -谷甾醇(α_3 -sitosterol)，齐墩果酸(oleanolic acid)，熊果酸(ursolic acid)^[6]。

4. 红花鹿蹄草 含高熊果酚甙、异高熊果酚甙(isohomoarbutin)^[7]，6-O-没食子酰高熊果酚甙，右旋儿茶精(catechin)，左旋表儿茶精没食子酸酯(epicatechin gallate)，原矢车菊素(procyanidin)_{B₁}及_{B₃}，原矢车菊素_{B₂}-3'-O-没食子酸酯(procyanidin_{B₂}-3'-O-gallate)，原矢车菊素_{B₂}-3,3'-O-没食子酸酯(procyanidin_{B₂}-3,3'-di-O-gallate)，金丝桃甙，金丝桃甙-2''-O-没食子酸酯(hyperin-2''-O-gallate)^[8]。

【药理】1. 对心血管系统的作用 (1) 强心作用 圆叶鹿蹄草醚浸出液对衰弱的离体蛙心有强心作用，但对正常蛙心作用不显著。水或醇浸出液的这种强心作用较弱^[1]。

(2) 降压和扩血管作用 麻醉犬静脉注射圆叶鹿蹄草的水或醇或醚的浸出液皆有降压作用^[1]，但鹿蹄草的水煎醇沉液对猫和狗血压无明显影响，0.5g/kg对猫心率有减慢作用^[2]。药理实验证明，鹿蹄草煎剂有增加离体兔四肢、耳、冠状血管与脑部血流量的作用^[1,3,4]。圆叶鹿蹄草的几种制剂和鹿蹄草煎剂都能不同程度地增加小鼠心肌对⁸⁶Rb的摄取，说明鹿蹄草不仅能增加冠脉总血流量，而且能增加心肌营养性血流量，改善冠脉循环^[5,6]。连续服用鹿蹄草煎剂10d，还可明显增加小鼠