

經

方

集

集



经方要义

石国璧 陈庆平

岳湘萍 舒远

编著

甘肃人民出版社

责任编辑 王季瑜
书 题 任应秋
封面设计 王占国
技术设计 杜绮德

经方要义

石国璧 陈庆平 编著
岳湘萍 舒 远

甘肃人民出版社出版 (兰州第一新村五一号)

甘肃省新华书店发行 天水新华印刷厂印刷

开本: 八五〇乘一一六八毫米三二分之一

印张: 一五·七五 插页: 二 字数 二二〇,〇〇〇

一九八六年六月第一版 一九八六年六月第一次印刷

印数: 七〇七〇

书号: 一四〇九六·二七 定价: 二·八五元

前言

本书是在已故名老中医、原北京中医学院伤寒教研室主任陈慎吾老师遗著《经方证治》归纳的基础上，结合我们在临床、教学中的体会，并参考一些书刊的见解编辑而成的。尤其是我们的业师秦伯未、任应秋、于道济、祝湛予、方鸣谦、张志纯、刘渡舟、钱达根、朱颜、耿鉴庭、王慎轩、董建华、马龙伯、印会河、王绵之、赵绍琴、谢海洲、李介鸣、程莘农、杨甲三、程士德、戈敬恒和张汉祥、柯与参等老前辈的著述及讲授，以及我们所私淑的何任、李今庸教授等的书章，均是我们对经方探讨的主要参考。从付世垣、毛翼楷、吴伯平、张田仁、高德等良师益友的笔下口中，也颇多受益。

汉·张仲景所著《伤寒论》和《金匱要略》，向称为方剂之祖，历千余年而不衰，至今仍然是中医学中研究的重要课题。也是学习中医必读之课本。但是，由于文字古奥，言简意深，较难理解和掌握。有鉴于此，本书综合归纳，以表格形式，用很少文字，点明经方的功用、主证和禁

忌，便于提纲挈领地掌握其要义。冀对从事中医临床、教学、科研工作者和学习中医的同志们能有所裨益。

限于我们的水平和条件，本书挂一漏万，尚不能完整地反映出老师们对经方研究的造诣和倾注给我们的心血，更难以符合当代科学发展的趋势。其中脱误难免，尚祈中医前辈和同道们不吝指教，以资改进。

本书在编写过程中曾得到甘肃省卫生厅和北京中医学院及有关同志的大力支持，在此表示感谢。特别是任应秋老师离世前在病中为本书编写作了指导和题了书名，这将激励我们为继承发扬祖国医学更加勤奋的努力奋斗。

编者

一九八五年三月

凡 例

经方，指出自东汉张仲景所著《伤寒杂病论》的方剂，主要包括现存于《伤寒论》的一四方和《金匱要略方论》的二〇五方。其中两书重复方六二首。除去重复者，共计二五七方。

《经方要义》由七个表组成：

一、经方证治第一表，为出自《伤寒论》的一四方。表中各项内容包括：

〔方名〕指经方的名称。以其方在《伤寒论》中出现的先后为序。故第一方为桂枝汤，第一四方为竹叶石膏汤。

〔主治〕指主病主治及原文的概括。

〔附注〕指治则治法及简略注解。

〔证候及脉象〕指所列条文中该方主治的脉证。

〔篇名条文号〕指《伤寒论》及《金匱要略》中的篇名和条文。其中条文号以上海科技出版

社一九七六年再版《伤寒论》为准。

〔经文节录〕指节录《伤寒论》、《金匱要略方论》有关条文。有的加以归纳。其他书的条文则节录其大意。凡有括弧者均不属于该方的主要内容。

二、经方证治第二表，为出自《金匱要略方论》的方剂及所属附方的证治。方号继第一表。由第一一五方起至第二五七方止，共一四三方及附方一七首。凡附方均加（），不排方号，以别于张仲景原方，并注明出处及所附篇名。各项目含义，同第一表。


三、经方病、脉、证、药归纳四个表，是分别以病、脉、证、药为纲进行归纳，从而可以看出每病篇都用过何方，每种脉象都见于什么方证，各证都用过何方，各主要药物都在何方中用过。进一步可以研究探讨它们的内在联系，和规律性。各种表中都注明了方名、方号、篇名（略写）、条文号等，便于查找。经方主证表中，每证之后附有简略的分析以资参考。

四、经方方剂表，为二五七方的药物组成、剂量、制法及方后注节录。排列的顺序以两书中方剂出现的先后为序。药物剂量为原书古剂量。使用时可以参考附录中古今剂量折算表折算。

目 录

经方证治第一表·····	一
经方证治第二表·····	一一一
经方主病表·····	一六七
经方主脉表·····	一八七
经方主证表·····	二一三
经方药物表·····	三七一
经方方剂表·····	四三三
附录 古今剂量折算表·····	四九六

经方证治第一表



方名				汤枝桂一	
经方要义	主治	附注	脉证	条文号	经文节录
太阳病，中 风	太阳病，中 风	平冲解肌， 调和营卫	啬啬恶寒， 淅淅恶风， 翕翕发热， 自汗，鼻鸣 干呕	太阳病 一二	太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者， 热自发，阴弱者，汗自出。啬啬恶 寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干 呕者，桂枝汤主之。
中风，太阳 表虚	桂枝汤主证 凭证法	头痛、发热、 汗出、恶风	太阳病 一三	太阳病 一五	太阳病，头痛、发热、汗出、恶风， 桂枝汤主之。
太阳病误下， 气上冲者	外邪未陷， 仍从外解	气上冲	太阳病 一五	太阳病 一六	太阳病，下之后，其气上冲者，可 与桂枝汤，方用前法；若不上冲者， 不得与之。
误治坏病不 可与					太阳病三日，已发汗，若吐、若下、 若温针，仍不解者，此为坏病，

方名					方名				
桂枝					桂枝				
汤					汤				
解后，反烦不解					解后，反烦不解				
服桂枝汤后，反烦不解					服桂枝汤后，反烦不解				
刺风池、风府，以治经					刺风池、风府，以治经				
络之邪					络之邪				
酒客病不可与					酒客病不可与				
表实者，不可与					表实者，不可与				
热盛于内，风寒在外，失治之预后					热盛于内，风寒在外，失治之预后				
药后吐者，必吐衄血					药后吐者，必吐衄血				
太阳病					太阳病				
一六					一六				
一七					一七				
二二					二二				
一九					一九				
凡服桂枝汤吐者，其后必吐衄血也。					凡服桂枝汤吐者，其后必吐衄血也。				
若酒客病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒客不喜甘故也。					若酒客病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒客不喜甘故也。				
太阳病，初服桂枝汤，反烦，不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。					太阳病，初服桂枝汤，反烦，不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。				
桂枝本为解肌，若其人脉浮紧、发热、汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。					桂枝本为解肌，若其人脉浮紧、发热、汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。				
桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。					桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。				
主					主				
治					治				
附					附				
注					注				
证					证				
候					候				
脉象					脉象				
条文号					条文号				
篇名					篇名				
经					经				
文					文				
节					节				
录					录				

枝 枝 枝					方 名	
解 汗下后脉 浮，主外未 解	外证未解	脉浮弱者	外证未解， 脉浮弱者	不解	主 治	经 方 要 义
	（禁下） 先表后里法	解 肌		热法	附 注	脉 证
	外证未解	外证未解		大汗出	证 候	证
浮		浮弱		洪大	脉 象	篇 名
四 五 太阳病	四 四 太阳病	四 二 太阳病		二 五 太阳病	条 文 号	经 文 节 录
解外则愈，宜桂枝汤。	太阳病，先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈。浮为在外，而反下之，故令不愈。令脉浮，故在外，当须解外则愈，宜桂枝汤。	太阳病，外证未解，不可下也，下之为逆；欲解外者，宜桂枝汤。	太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。	太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。		

病 枝 梗			方 名	
主里无热	伤寒，不大便六七日，头痛有热，小便清者，	和	主 治	经 方 要 义
	病在表当发汗。桂枝、承气两方比较	先其时发汗以和卫气	附 注	脉 证
衄	不大便六七日，头痛有热，小便清，	自汗出时发热	证 候	脉 象
	太阳病五六	太阳病五四	条文号	篇 名
伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤，其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗，若头痛者必衄。宜桂枝汤。			经 文 节 录	
病人常自汗出者，此为荣气和。荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中，卫行脉外。复发其汗，营卫和则愈。宜桂枝汤。				
病人藏无他病，时发热，自汗出，而不愈者，此卫气不和故也。先其时发汗则愈，宜桂枝汤。				

方名				方名			
桂枝汤				桂枝汤			
伤寒，大下	当先解表，	心下痞，	太阳病	伤寒，大下后复发汗，心下痞，恶寒	当先解表，	心下痞，	太阳病
发汗汗出， 荣弱卫强	调和荣卫， 以救邪风	汗出	九五	发汗汗出， 荣弱卫强，故使汗出。欲救邪风者，宜桂枝汤。	调和荣卫， 以救邪风	汗出	九五
者	本方	身疼痛，清便自调	九一	身疼痛者，急当救里；后身疼痛，清便自调者，急当救表，救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。	本方	身疼痛，清便自调	九一
身痛，温里后利止	先里后表法，后表宜	身疼痛，清便自调	太阳病	身疼痛者，急当救里；后身疼痛，清便自调者，急当救表，救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。	先里后表法，后表宜	身疼痛，清便自调	太阳病
尽而复集	黄汤	浮数	五七	数者，可更发汗，宜桂枝汤。	黄汤	浮数	五七
伤寒汗解后复烦，脉浮数，余邪未尽而复集	可发汗，用桂枝汤代麻黄汤	半日许复烦	太阳病	伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤。	可发汗，用桂枝汤代麻黄汤	半日许复烦	太阳病
主	附	证	条文号	主	附	证	条文号
治	注	候	脉象	治	注	候	脉象
经方要义	脉证	篇名	条文号	经方要义	脉证	篇名	条文号
经方要义	脉证	篇名	条文号	经方要义	脉证	篇名	条文号

桂枝汤			方名号	
主 治	附 注	证 候	脉 证	篇 名
后复汗，心下痞恶寒	先表后里法	恶寒		一六四
阳明病，脉迟汗多微恶寒，表未解	可发汗	汗出多，微恶寒	迟	阳明病二三四
阳明病，烦热如疟脉浮虚，宜发汗	桂枝汤与承气汤用法之比较。阳明病可攻与不可攻辨	烦热如疟状，日晡发热	浮虚	阳明病二四〇
太阴病脉浮者，太阴经表证治	宜发汗解肌		浮	太阴病二七六
太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。			经 文 节 录	
病人烦热，汗出则解；又如疟状，日晡所发热者，属阳明也。脉实者，宜下之；脉浮虚者，宜发汗。下之与大承气汤，发汗宜桂枝汤。				
阳明病脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。				
者，表未解也。不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞；解表宜桂枝汤。				

方名			方号		
经方要义	脉证	条文号	桂枝	枝	汤
主 治	附 注	证 候	下利腹胀身痛，先温里用四逆汤，后攻表用桂枝汤	霍乱吐利止，而身痛不休	妊娠，渴（呕）不能食，血聚以养胎，脾胃升降失和
脉	证	脉象	先温里后攻表法，里寒与表邪之治则	消息和解其外	调阴阳和气血
脉 证	脉 象	脉 象	下利，腹胀满，身疼痛	身痛不休	妊娠渴（呕）不能食
篇 名	条 文 号	条 文 号	厥阴病三三二金匱下利三六	霍乱病三三七	平脉金匱妇人妊娠病小弱阴脉一
经 文 节 录	下利腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。		吐利止而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。		师曰：妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴（一作呕），不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之。于法六十日当有此证，设有医治逆者，却一月，加吐下者，则绝之。