

傷寒百問歌

钱闻礼 撰

中國書局



R2

钱闻礼 撰

傷寒百病歌

中國書局

伤寒百问歌

钱闻礼 撰

中国书店出版

新华书店首都发行所发行 北京大中印刷厂印刷

850×1168 1/32 印张：5.625

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数：0.001—5 000册

ISBN 7-80568-300-X/R·11

定价：3.50元

序

雜病有治法傷寒無定方蓋以其傳
變於俄頃非他疾比也精是技者曠
千載惟張長沙一人孫真人著千金
探賾鉤微亦特於仲景法推廣之耳
宋宣和閒朱朝奉肱進活人書及歸
中途猶有餘論以是見盡美盡善爲

難也雖然業醫者心誠求之亦思過半矣神聖工巧則存乎其人湯氏錢公又作解惑論百問歌彙析條分使用藥者如執兵捕寇明指其巢穴掃清之數君子之用心仁矣蓋朱公乃長沙太守之忠臣錢倅又朱朝奉之忠臣也繁人之生六氣不齊而七情

汨之苟失其養則疾生焉世之醫者以數君子之心爲心善用其書使含靈不至夭枉同躋壽域其仁豈不博哉市肆刊書節略舛訛藥方又關繫最重者曹君仲立目擊斯弊取而精刻之惟恐是書誤人之披閱也迹其存心又數君子之忠臣矣可不謂賢

乎仲立冀人隨其伯父遊宦江南撫
其弟而教之不翅猶已子以慰其伯
父地下之靈此尤人之所難能蓋薰
陶唐氏之遺風其所漸深矣不賢而
能如是乎予故樂書之且以敦薄俗
云至大己酉臘月圓日武夷詹清子
子敬序

類證增註傷寒百問歌目錄

卷之一

傷寒解惑論

卷之二

一 太陽

二 陽明

三 少陽

四 太陰

五 少陰

六 厥陰

七 表證

八 裏病

九 表裏兩證

十 無表裏證

十一 表裏寒熱

十二 陰毒

十三 陽毒

十四 潮熱譫語

【五】陰盛隔陽

【六】陰證似陽陽證似陰

【七】手足厥冷

【八】吐長蟲

【九】陰陽易

【十】汗下貳證

【十一】陰陽虛盛

【十二】病合和解忌大汗

【十三】病有宜和不宜下

【十四】兩感傷寒
【十五】壞證傷寒

【十六】傷寒
【十七】傷風

【十八】傷風見寒脈傷寒見風脈

卷之三

【十九】熱病
【二十】中暑

【二十一】溫病
【二十二】溫瘧

☰

風温

☱

温疫

☱

中溼

☱

風溼

☱

溼温

☱

痲病

☱

温毒

☱

痰疾

☱

食積

☱

虚煩

☱

脚氣

☱

發熱

☱

潮熱

☱

熱多寒少

☱

寒熱往來

☱

傷寒瘧狀

☱

汗後寒熱

☱

汗後熱

☱

下後熱

☱

勞復食復

☱

惡寒

☱

惡風

不得汗

自汗

頭汗

頭痛

體痛

喘

頭眩身搖筋惕肉瞤

湯

鼻衄

三陽合病

結胃

痞氣

卷之四

嘔逆

吐

嘔吐而利

欬嗽

咽喉痛

舌乾口燥

㊦

漱水不欲嚥

㊦

不得眠

㊦

多眠

㊦

身涼汗出兩脇
疼痛或乾嘔

㊦

欬逆

㊦

發黃

㊦

狂言

㊦

發斑

㊦

譫語鄭聲

㊦

吐血

㊦

腹痛 脹滿附

㊦

煩躁

㊦

下利

㊦

小便不利小便難

㊦

小便自利小便數

㊦

大便鞭大便溏

狐惑傷寒

㊦

百合病

㊦

婦人傷寒

㊦

小兒傷寒

㊦

小兒瘡疹

類證增註傷寒百問歌卷之一

傷寒解惑論 并序

解惑論之作非務新奇而沽世譽也一本於作景之正經且仲景之書昔人以金匱名之其貴重如此無求子謂孫思邈未能詳仲景之用心夫如是豈庸人粗工能窺其髣髴哉愚因三餘將傷寒或兩證相近而用藥不同者或汗下失度而辨證不明者冷厥熱厥之異宜陽毒陰毒之異候其開錯綜互見未易概舉輒備舉而別白之庶幾洞曉亦足以見解惑之深意焉乾道癸巳中秋日龍溪隱士湯尹才謹序

尹才嘗聞世之言大病者不過曰傷寒性命死生在乎

旬日之間粵自古初軒轅皇帝與岐伯天師問答而成
內經雖備言傷寒經絡砭刺之法且無方論以明治療
之源伊尹以元聖之才著湯液醪醴之論迨東漢時有
長沙太守張仲景撰成傷寒之書爲生民之司命厥後
曾無發明其隱奧者隋大業閒巢元方撰病源亦備載
傷寒及時氣病證極詳義則竊取魏有華陀乃號良醫
讀仲景之書歎曰此可以活人後世名曰活人書雖三
百九十七法義極幽微然一百一十三方理宜區別本
朝政和之初有朱肱奉議致仕將仲景之書析爲百問
該載諸說首尾幾二十一年前後僅九萬餘字遣男

直詣

闕投進被

旨令國子監鏤板頒行天下寥寥千百年間使仲景之書大備於

我宋神而明之固有所待使君臣無天枉之期夷夏有延齡之望豈小補哉且冬曰傷寒春曰溫病夏曰熱病通而言之爲傷寒也班固有言曰有病不治得中醫且傷寒傳六經一日足太陽膀胱之經二日足陽明胃之經三日足少陽膽之經四日足太陰脾之經五日足少陰腎之經六日足厥陰肝之經內經云七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹滿如故十一日少陰病衰渴

止舌乾已而噫十三日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣
乃去病再傳六經有自安者儻一藥之誤悔將噬臍仲
景云桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛則亡是謂實
實虛虛損不足而益有餘醫殺之耳假如陽證反用桂
枝是謂實實陰證反用大黃是謂虛虛陽證用熱藥是
謂益有餘陰證用涼藥是謂損不足爲醫所殺夫復何
疑仲景云有汗不得用麻黃無汗不得用桂枝又曰發
表攻裏本自不同黃帝云未滿三日可汗滿三日可泄
且病人有虛實邪氣有遲速豈可拘以日數日雖多尙
有表證而脈浮數猶當發汗日數雖少已有裏證而脈
沈細卽當下但隨證虛實與脈而汗下之不可拘以日

數也又況四時發汗輕重不同**春**不可大發汗以陽氣
尙微**冬**不可大發汗以陽氣伏藏夏月天氣熱立府開
脈洪大可正發汗但不可用麻黃桂枝藥性太熱麻黃
桂枝隨四時加減且如桂枝自西北二方居人四時服
之無不應驗自江淮閒惟冬及春可行之自春及夏至
以前桂枝加黃芩半兩謂之陽旦湯夏至後有桂枝證
可加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若人虛寒止
用正方不必加減桂枝傷寒要藥若病人身無汗小便
數或手足逆冷不惡寒不可行桂枝且傷寒與傷風相
似傷寒者脈緊而濇傷風者脈浮而緩傷寒無汗傷風
有汗以此別之且熱病與中暑相似二證皆發熱惡寒