

植物学名解释

丁广奇 王学文 编

360107

科学出版社

1986

内 容 简 介

本书诠释植物拉丁学名的含意。全书共收载国产高等植物和引种栽培的植物属名 4000 余条和种加词 15000 余条。属名解释分别列出其性别、汉名、词源及其含义和所属科别。

本书可供植物学工作者、高等院校生物系师生、农林干部和翻译工作者以及爱好植物的同志在认识植物过程中帮助记忆植物学名参考用。

植 物 学 名 解 释

丁广奇 王学文 编

责任编辑 夏敬娥

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1986年3月第 一 版 开本：787×1092 1/32

1986年3月第一次印刷 印张：14 7/8 插页：2

印数：0001—5,500 字数：528,000

统一书号：17031·218

本社书号：4785·17—1

定 价：4.10元

代 序

丁广奇同志于 1957 年曾编译《植物种名释》一书，问世后为学习、记忆、拟定植物学名提供了很大的方便，因而深受读者的欢迎。现在又将植物的属名一并编译出来，这样就更全面了。因为植物的种名是包含属名和种加词 (epithet) 两个部分的双名。丁广奇同志邀我作序，我想乘此机会介绍一点有关植物学名的知识，对于本书的读者，尤其是青年读者，也许是有益的。

一、学名的意义

一种植物在不同的国家，不同的民族，不同的地区往往有不同的名称，即所谓土名或俗名。由于名称不统一，往往引起许多混乱，妨碍科学交流。如同拉丁语的学名（非拉丁词源亦作拉丁语处理）就不同了，学名依《国际植物命名法规》而厘定（栽培植物据《国际栽培植物命名法规》），一种植物只能有一个合法的学名，因此名称相对稳定和统一，能够国际通用。同时采用拉丁语的学名亦不会因为语言的发展而引起含意上的变更，因目前并无一个国家用拉丁语作口语。这样既照顾了植物学本身的发展历史，又消除了可能产生的民族偏见，因而各国学者均乐于接受。由于种名中包含有属名，因此知道一个种名，实际上也就不难查知该种在植物分类系统中所处的位置，这也是双名的优点之一。

二、属名的来源

属名是单数名词或作单数名词处理的词，不拘来源，甚至可任意组成，书写时第一个字母要大写。现将属名之来源举例

如下:

1. 来自古拉丁名,如 *Rosa* 蔷薇属, *Olea* 木樨榄属。
2. 来自神话,如 *Nyssa* 紫树属;为希腊神话中的水神名, *Typhonium* 犁头草属,神话中的巨人。
3. 地名,如 *Fokienia* 福建柏属。
4. 根据习性,如 *Eleocharis* 荸荠属,喜欢沼泽之意。
5. 根据用途,如 *Ormosia* 红豆属,意为项链;指其鲜红色的种子可作项链。
6. 经过简化的字,如 *Sapindus* 无患子属,由 *Sapo* 皂和 *indicus* 印度的二字合并简化而成。
7. 根据方言,如 *Litchi* 荔枝属,自广东方言, *Thea* 茶属,自闽南方言。
8. 文字游戏,如 *Saruma* 马蹄香属,系将 *asarum* 细辛属的首字母调到字末而成。
9. 纪念人名,如 *Tsoongia* 钟木属,系纪念我国植物学家钟观光教授。
10. 加前后缀,如 *Pseudotsuga* 黄杉属,系在 *Tsuga* (铁杉属)前加前缀 *Pseudo* (伪)而成, *Castanopsis* 锥栗属,系由 *Castanea* (板栗属)加后缀 *-opsis* (拟)而成。

据上可知,属名之来源实不胜枚举。甚至可以用绝对任意的方式组成,但有二点需要注意:1. 不可与现时使用的形态学上的专门术语相同;2. 倘用二词组成,则要用连词符号联系,如 *Neves-armondia* 属。

三、属名的性别

1. 拉丁语名词有阳性、阴性和中性之分,属名亦不例外。在一般情况下,字源来自希腊或拉丁语的属名,均根据原性别,其字尾与性别的关系可参拉丁文法书,但每有例外,如 *Adonis* 侧金盏花属, *Diospyros* 柿属, *Strychnos* 马钱属,按古

典用法是阳性,但按植物学上的习惯用法都是阴性。

2. 如属名是由 2 个以上的希腊语或拉丁语的词所构成,则性别取决于最后一个词的性别;若最后一词的接尾有改变,其性别亦随之改变。如 *Dipterocarpus* 龙脑香属和 *Podocarpus* 罗汉松属为阳性。但如接尾改为 *-carpa* 或 *carpaea* 则为阴性,如 *Callicarpa* 紫珠属, *Polycarpaea* 白鼓丁属。如接尾改为 *-carpon*, *-carpum* 或 *carpium* 则为中性,如 *Polycarpon* 多莢草属, *Ormocarpum* 链莢木属和 *Podocarpium* 长柄山蚂蝗属。

3. 树木名称或古拉丁名常为阴性,即使其字尾为 *-o*, *-os*, *-us* 或不等音节的 *-es* 亦是如此,如 *Symplocos* 灰木属, *Quercus* 栎属, *Abies* 冷杉属, *Plantago* 车前草属。但如果不是树木,则为阳性,如 *Desmos* 假鹰爪属, *Senecio* 千里光属。

4. 任意起的属名或以形容词作属名者,由原著者指定性别,若原著者未指定,则后人可选定一性别,一经指定,应予承认。

5. 当一个属被分成几个属时,新属名的性别应该与原属名的性别相同。如 *Boletus* 属,被分成 *Serocomus*, *Bolelellus* 等属时,其性别应均为阳性。

6. «命名法规»明确规定的下列接尾的性别有:

(a) 以 *-codon*, *-myces*, *-odon*, *-panax*, *-pogon*, *-stemon* 等阳性词接尾的复合词,应为阳性,如 *Andropogon* 须芒草属, *Acanthopanax* 五加属, *Trigonostemon* 三宝木属等。

(b) 以 *-achne*, *-chlamys*, *-daphe*, *-mecon*, *-osma* 等阴性词接尾的复合词,应为阴性。但以 *-gaster* 接尾的词应按植物学上的习惯用法,作阳性处理(原应为阴性)是为例外。

(c) 以 *-ceras*, *-dendron*, *-nema*, *-stigma*, *-stoma* 等中性词接尾的复合词,应为中性。但以 *-anthos* (或 *-anthus*) 和

-chilus(或 -cheilos)结尾的词应按植物学上的习惯用法,作阳性处理(原应为中性),是为例外。

(d) 以 -oides 或 -odes 结尾的词,不管原著者曾给他们指定为何种性别,均作阴性处理。

(e) 来自人名的属名,无论是纪念男人或女人,都作阴性处理。

四、种加词

1. 如前所述种名是双名,即由属名加种加词所组成。种加词大多为形容词,在文法上要与属名一致,少数种加词为名词,此时则不要求在文法上与属名一致。在书写时,第一个字母要小写。

2. 种加词的来源亦同样不拘,但不可重复属名。若种加词由 2 个或多个词组成,则必须连写或用连词符号连接。

3. 用人名、地名、国名作种加词时可以用名词属格的形式,也可以用形容词的形式,如 *hemsleyana* (形容词形式), *hemsleyi* (名词属格形式)。

(a) 用形容词形式的构词法为以母音或 -er 结尾的,要先加 -an- (以 a 接尾的只加 -n-),以子音结尾的,要先加 -ian-,然后再加表示性、(单)数、(主)格的结尾,如 *Hassler* → *hasslerana* (-us, -um), *Webb* → *webbianus* (a-um)。

(b) 用名词属格形式的构词法为,以母音或 -er 结尾的,直接加属格字尾,如 *Lace* → *laceae* (女性); *Glaziou* → *glazioui* (男性);若以子音结尾,则要先加 i,然后再按被纪念的人的性别和数,给予适当的字尾,如 *Lecard* → *lecardii* (男性), *Wilson* → *wilsoniae* (女性), *Vorlot* → *vorlotiorum*。

4. 用地名作种加词,通常都采用形容词的形式,并用 -ensis, -(a)nus, -inus, -ianus 或 -icus 等词尾。

5. 用同格名词作种加词时,则该词无须与其属名的性别

一致,如 *Allium cepa* 洋葱,*Allium* 为中性,*cepa* 是阴性。

6. 名词多数属格亦可作种加词,唯不多见,如 *Saccharum officinarum* 甘蔗,*Calystegia sepium* 篱天剑。

吴德邻

一九八四年九月二十五日于广州

凡 例

1. 本书是在《植物种名释》基础上增充、并增加“属名解释”编写而成。供植物学工作者、专科以上学校师生和农林干部及植物学爱好者在认识植物过程中帮助记忆植物学名时参考之用。

2. 本书主要收载国产及引种的显花植物和高等隐花植物名称,其中属名约 4000 条,种加词(epithet) 15000 条。在编写过程中参考了《中国种子植物科属词典》、《中国植物志》、《中国高等植物图鉴》、各地方植物志和各有关植物学刊物。词类解说参考了:

Bailey, L. H. The Standard Cyclopedia of Horticulture, 1929-1930.

Jaerger, E. C. A Source Book of Biological Names and Terms, 1955.

Lindley, J. An Introduction to Botany, 1848.

Zimmer, G. F. A Popular Dictionary of Botanical Names and Terms, 1956.

牧野富太郎等:植物学名词典, 1935

3. 属名解释分别指出该词的性别、词源和含义,并指出其中文名称和科别,性别放在< >号内,词源放在〔 〕号内,文字类别放在()内。在种加词中的圆括号内为说明用词,六角号内为可略用词,如 *Aidzu-ensis* 会津〔岩代〕的(日本地方)。

4. 本书使用的略语:

希	希腊语	阳	阳性
拉	拉丁语	阴	阴性
汉	汉语	中	中性
法	法语	日	日语
英	英语	阿拉伯	阿拉伯语
地	地名	人	人名

5. 土名是指拉丁语和希腊语以外, 该植物发现地的当地名称。

6. 本书所用希腊起源的词均已拉丁化。有些希腊起源和拉丁起源的词, 在组成属名和种加词字形已发生变化。重要的如下:

词源	原型	词头	接尾
希	aix 山羊	aego-	—
希	aner 男人	andre-	-andrus
希	aspis 盾	aspido-	-aspis
拉	caput 头	capti-	-ceps
	cheilos 唇	chilo-	-chilus, -chilos
希	cheir 手	chiro-	-chirus, -chir
希	chlamys 斗篷	chlamydo-	-chlamys, -chlamydeus
希	chroma 颜色	chromo-	-chromus, -chrous
拉	dens 牙齿	denti-	-dens
拉	fido- 裂开	fissi-	-fidus
拉	flos 花	flori-	-florus
拉	hydro 水	hydro-	—
希	keras 角	cerato	-ceras, -ceres, -cerus
希	kyon 狗	cyno-	—
拉	lac 乳	lacti-	—
希	leon 狮	leonto-	-leon

希	lepis 鳞片	lepid-	-lepis
希	nema 丝	nemato-	-nemus
希	odous 牙齿	odonto-	-odon, -odontus
希	ornis 鸟	ornitho-	-ornis
拉	os 口	ori-	--
希	oura 尾	uro-	-urus
希	ous 耳	oto-	-otus, -otis
拉	pes 足	pedi-	-pes
希	phoreo 负载, 生有		-phorus
希	pous 足	podo-	-pus, podus
希	pterus 翼	ptero-	-pus, -pterus, -pterys
希	rhis 鼻	rhino-	-rhinus
拉	ruber 红色的	rubri-	-ruber
希	sperma 种子	spermato-	-spermus, -sperma, -spermo
希	thrix 毛发	trich-	-thrix, -trichus
希	trepo 向	tropo-	-tropus

8. 为记忆方便起见, 种加词中, 由两个以上词根构成的复合词, 用“—”分开。有些地方名, 有几种拼写法, 亦分别列出。

目 录

代序	i—v
凡例	vi—viii
正文：种加词	1—265
属名	266—463

种 加 词

A

Ab-axialis 远轴的
Abbreiatus 缩短的
Aberrans ① 异常的 ② 奇异的
Abessin-icus 阿比西尼亚的
 (Abyssinia = Ethiopia 今埃塞俄比亚)
Abiens 一时的
Abiete-torum 冷杉林生的
Abiet-inus 像冷杉的 (Abies 为松科中的一属)
Ab-normalis, Ab-normis ① 反常的 ② 异常的
Ab-originalis 土著的
Abortiens, Abortivus 败育的
Abrasus 擦去的
Abri-spermus 想思子种子的
 (Abrus 为豆科中的一属)
Abrotani-folius 青蒿叶的 (Abrotanum = Artemisia 为菊科中的一属)
Abrotan-oides 像青蒿的
Abrupte-(拉丁词冠) 截
Abrupte-acuminatus 急尖的
Abrupti-folius 截形叶的
Abrupti-pinnatus 偶羽状 [分裂的]
Abruptus 突然的
Abscissus 剥离的, 切开的
Absconditus 匿藏的
Absidatus 弓形的
Ab-similis 不相似的

Absinthius 苦味的
Absolutus 绝对的
Abstemius ① 空腹的 ② 节食的
Abundans, Abundus 丰富的, 多的
Abutil-oides 像苘麻的 (Abutilon 为锦葵科中的一属)
Abyssin-icus 阿比西尼亚的
 (Abyssinia = Ethiopia 今埃塞俄比亚)
A-calycinus 无萼的
A-calyculatus, A-calycalis ① 无萼的 ② 不与萼附贴的
Acanthi-folius 老鼠筋叶的 (Acanthus 为爵床科中的一属, 叶缘有刺)
Acantho-carpus 刺果的
Acantho-caulis 刺茎的
Acantho-cladus 刺枝的
Acantho-comus 簇刺的
Acanth-oides 像老鼠筋的 (Acanthus 为爵床科中的一属)
Acantho-lepis 刺鳞的
Acantho-phlegmus 具刺缠结的
Acantho-phorus 具刺的
Acantho-phyllus 具刺叶的
Acantho-podius, Acantho-podus 刺柄的
Acantho-stachys, Acantho-stachyus 具刺穗状花序的
Acantho-stephus 四周具刺的
Acanthus 具刺的
Acari-fer, -era, -erum ① 庇蝨

的② 具蕊的
A-caulis, A-caulescens 无茎的
Accedens 相近的, 相似的
Accesorius 次的, 副的, 附加的
Acclivis, Acclivus 上升的, 渐升的
Accola (通性名词) 邻居者
Accomodatus 适应的, 适合的
Accrescens 花后增大的
Accretus 自然接合的, 合生的
Accumbens 依伏的
A-cephalus 无头的
Acer, -cris, -cre ① 酸涩的 ② 锐尖的
Acerbus ① 酸涩的 ② 锐尖的
Aceri-folius 槭叶的 (Acer 为槭树科中的一属)
Acer-inus, Acer-oides 像槭树的
Acerosus 针状的
Acerrimus ① 极尖的 ② 极酸的
Acervatus 堆积的, 成堆的
Acetabuli-formis 杯状的
Acetosellus, Acetosus 微酸的
Achatinus 玛瑙色的
Achilleae-folius 蓍草叶的 (Achillea 为菊科中的一属)
Achille-oides 像蓍草的
A-chlamydeus 无被的
Achras 野梨
A-chromaticus, A-chromus, A-chrous 无色的
Achyranth-oides 像牛膝的 (Achyranthes 为苋科中的一属)
Aci-anthus 尖花的
Acicularis 针状的
Aciculatus 具针状刻痕的, 具细痕的

Acidissimus 极酸的
Acido-fugus 避酸的, 嫌酸的
Acido-philus 适酸的, 喜酸的
Acido-phobus 避酸的, 嫌酸的
Acidosus 酸极的
Acido-trophicus 酸性营养型的
Acidulus 微酸的
Acidus 酸的
Aci-fer, -era, -erum 具针的
Aci-folius 针叶的
Aci-formis 针形的
Acinaceus ① 多核的 ② 弯刀状的
Acinaci-folius 弯刀形叶的
Acinaci-formis 弯刀形的
Acinatus 葡萄状的
Acino-dendrus 葡萄状树
Acin-oides 像新风轮菜的 (Acinos = Calamintha 为唇形科中的一属)
Acinos 葡萄种子
Acinosus ① 颗粒状的 ② 葡萄状的
Aci-phyllus 针叶的
A-cladotus 无枝的
Acmellus 完整的
Acmo-calyx 尖萼的
Acmo-dontus 尖齿的
Acmono-trichus 尖毛的
Acmo-phyllus 尖叶的
Aconiti-folius 乌头叶的 (Aconitum 为毛茛科中的一属)
Acor-oides 像菖蒲的 (Acorus 为天南星科中的一属)
Acr-, Acro- (希腊词冠) ① 顶端 ② 辛辣 ③ 酸
Acr-acanthus 尖刺的
Acr-anthus 具顶生花的

Acris, Acre ① 尖锐的 ② 辛辣的

Acro-botrys, Acro-botryus 顶生总状花序的

Acro-carpus 顶生果的, 尖果的

Acro-dontus 尖齿的

Acro-dromus 顶间集聚的

Acro-fugus 离顶的

Acro-genus 顶生的

Acro-glandis 顶生腺的

Acro-gynus 顶生雌器的

Acro-lasius 粗绵毛的

Acro-leucus 顶端白色的

Acro-melus 顶端黑色的

Acro-petalus 尖瓣的

Acro-petus 向顶的

Acro-pterus 顶生翅的

Acro-scopicus 上侧的

Acro-sporangiat 顶生孢子囊的

Acro-sporus 具顶生孢子的

Acro-stachys, Acro-stachyus 尖穗的

Acrostich-oides 像卤蕨的 (**Acrostichum** 为卤蕨科中的一属)

Acro-trichus 尖毛的

Actaeae-folius 类叶升麻叶的 (**Actaea** 为毛茛科中的一属)

Actae-oides 像类叶升麻的

Actin-(希腊词冠)放射, 星状

Actin-acanthus 星芒状刺的

Actinidi-oides 像猕猴桃的 (**Actinidia** 为猕猴桃科中的一属)

Actino-carpicus, Actino-carpus 具放射状果

Actino-dromus 掌状脉的

Actino-morphicus, Actino-morphus 辐射对称的

Actino-phyllus 掌状叶的

Actinopter-oides 像 **Actinopteris** 的 (**Actinopteris** 为水龙骨科中的一属)

Actino-thrix, Actino-trichus 具星状毛的

Acto-philus 栖海岸的

Actuatus 尖顶的, 锐棱的

Aculeati-florus 针形花的

Aculeat-issimus 多皮刺的

Aculeatus 具皮刺的

Acuminati-folius 具渐尖叶的

Acuminat-issimus 长渐尖的

Acuminatus 渐尖的

Acuminosus 近渐尖的

Acut-angularis, Acut-angularatus, Acut-angulus 锐角的

Acutatus 微尖的

Acuti-dens, acuti-dentatus 尖齿的

Acuti-fidus 尖半裂的

Acuti-florus 尖花的

Acuti-folius 尖叶的

Acuti-formis 刺状的

Acuti-frons 尖叶状体的

Acuti-labellus 尖唇瓣的

Acuti-lobus 尖浅裂的

Acuti-petalus 尖瓣的

Acuti-rhombi-folius 尖菱形叶的

Acuti-sepalus 尖萼片的

Acuti-serratus 尖锯齿的

Acut-issimus 极尖锐的

Acuti-usculus 微急尖的, 微短尖的

Acuti-venus 尖脉的

Acutus 急尖的, 短尖的

Adamantinus 极坚硬的

Adaphniphyll-oides 非交让木型的

Adauctus 增加的, 加倍的

Adelphicus 合生雄蕊的

Ademptus 剥掉的

Aden-anthus 腺花的

Adeno-calycus, Adeno-calyx 腺萼的

Adeno-carpus 腺果的

Adeno-caulis 腺茎的

Adeno-chaetus 腺刚毛的

Adeno-chlamys 腺被的

Adeno-chlorus 有色腺体

Adeno-cladus 腺枝的

Adenodes 具腺节的

Adeno-loma 具腺边缘的

Adeno-phorus 具腺的

Adeno-phyllus 腺叶的

Adeno-podus 腺柄的

Adeno-pteris 腺翼的

Adeno-pus 腺柄的

Adeno-rhachis 腺肋的, 腺轴的

Adenostyl-oides 像腺柱兰的 (Adenostylis 为兰科中的一属)

Adeno-thrix, Adeno-trichus 腺毛的

Adenotricho-podus 腺毛柄的

Ad-glutinatus 合生的

Adhaerens, Adhaerescens 附着的

Adianti-folius 铁线蕨叶的 (Adiantum 为铁线蕨科中的一属)

Adianti-frons 铁线蕨叶的

Adiant-oides 像铁线蕨的

Adiantum-nigrum 黑铁线蕨

Adinandri-folius 杨桐叶的 (Adinandra 为茶科中的一属)

Adiposus 多脂的

Admirabilis ① 奇异的 ② 值得赞赏的

Adnascens 附着的

Adnatus 贴生的

Adnexus 连着的

Ado-ensis 亚丁的 (Aden 也门民主人民共和国首都)

Adonidi-folius 侧银盏花叶的 (Adonis 为毛茛科中的一属)

Adornatus ① 美丽的 ② 修饰的

Adox-oides 像五福花的 (Adoxa 为五福花科中的一属)

Adpressus 紧贴的, 伏着的

Adscendens 上升的, 上举的

Adscensionis 阿森松岛的 (Ascension 为南大西洋中的岛屿)

Adspersus 散生的

Adstrictus ① 拉紧的 ② 收敛的

Adstringens ① 拉紧的, 拉近的 ② 收敛性的

Adsurgens ① 直立的 ② 上升的

Adulescens 未成熟的

Adulterinus 混杂的

Adultus 成长的, 成熟的

Aduncatus, Aduncus 钩状的, 具钩的

Adustus 煤烟色的

Adventicius, Adventitus, Ad-venus ① 外来的, 异乡的 ② 不定的

Adversalis 对生的, 相对的

Adversarius 转向一侧的

Adversi-folius 对生叶的

Adversi-spinus 对生刺的

Adversus 相对的, 对面的

Aegaeus 爱琴海的 (Aegean 欧洲

南

北林图 A00067999

Aeger 有柄的

Aegilopodes 一种野马
南欧)

Aegiro-phyllus 具深绿色叶的

Aegopodi-oides 像羊角芹的
(*Aegopodium* 为伞形花科中的一属)

Aegrostans 不可思议的

Aegyptiacus, Aegyptius 埃及的
(*Egypt* 北非国家)

Aemulans, Aemulus 匹敌的,
酷似的

Aeneus 古铜色的, 青铜色的

Aequabilis, Aequalis, Aequans
一致的, 相等的

Aequatorialis, Aequatorius 赤道
道的

Aequatus 均分的

Aequi-(拉丁词冠) 等, 同

Aequi-altus 同高的

Aequi-crassus 同厚度的

Aequi-distans 等距离的

Aequi-glumis 等长颖片的

Aequi-labrium 相等的, 平衡的

Aequi-lateralis 等侧的

Aequi-limbus 等边的

Aequi-lobus 等浅裂的

Aequi-longus 等长的

Aequi-noctialis ① 昼夜等长的
地方 ② 热带的

Aequi-petalus ① 等大花瓣的
② 同形花瓣的

Aequi-retusus 等凹的

Aequi-tricus 三等分的

Aequi-trilobus ① 具三等分裂
片的 ② 同形三裂片的

Aequi-venulosus 具等脉的

Aequi-voeus 两种含义的

Aequoreus 沼泽生的

Aereus ① 在空中的, 气生的
② 青铜色的

Aerialis 属于空气的, 气生的

Aerius 在空中的, 气生的

Aerobius 需气的

Aer-odes 像银须草的(*Aira* 为禾
本科中的一属)

Aerugineus, Aeruginosus 铜绿
色的

Aesculi-folius 七叶树叶的
(*Aesculus* 为七叶树科中的一
属)

Aestivalis, Aestivus ① 夏季
的 ② 夏季开花的

Aestuans 火焰状的, 摆动的

Aethiopicus 埃塞俄比亚的(非洲
国家)

Aethiopum(*Ethiopia* 的众数所有
格) 埃塞俄比亚的

Aethusi-folius 具 *Aethusa* 叶的
(*Aethusa* 为伞形花科中的一属)

Aetn-ensis 埃特纳火山的(*Etna*
意大利地方)

Afer, Afra, Afrum 非洲的

Affinis 相似的, 近缘的

Affixus 固定的, 固着的

Afflatus 吹动的

Afghanicus, Afghanisticus
阿富汗的(*Afghanistan* 亚洲国
家)

Africanus, Africus 非洲的

Agallocha 像沉香的

A-gamicus, A-gamus 无性的

Agano-philus 嗜泉的, 嗜湿的

Agano-phyllus 美叶的

Aga-stachys, Aga-stachys 多

360107

• 5 •