

陳存仁編校

皇漢醫學叢書

生堂治驗

中神琴溪著  
小野匡輔輯

上海中醫學院出版社

7/16/34 10208

# 生 堂 治 驗 提 要

本書上下二卷。爲中神氏琴溪先生之驗案。門人小野匡輔所輯。匡輔三世其業。又承家訓。復負笈於千里之外。忝列於琴溪先生之門。數易寒暑。盡得其秘。輯錄平日疑難驗案。以資精研。臨牀學識。日積月累。集集成冊。刊布行世。以垂不朽也。本書所錄主名證候。或取矩於周漢。或參術於元宋。博采羣論。折衷古今。以成一家之言。可謂集粹之精細矣。此昔琴溪先生天稟異常。胆略過人。其所揮霍刀圭。驅使藥石。有如良將使兵。龍蛇豹略。雖奇正百出。而機捷縱橫。宜乎所施無往而不利也。

# 生生堂治驗序

甚矣。醫之難明也。夫人命雖繫乎天。以七寸之七生死人尺之軀。診候倉卒之際。辨冷暖於疑似之間。索虛實於冥漠之中。豈易易乎。其診與方合。病與藥值。而後可始。與言醫而已。吾友匡輔。三世其業。既承家訓。猶以爲不足。慨然負笈千里之外。得中神氏於京師學焉。數歲而歸。歸則言論纏繩可得而聽也。於才診大徵之技。陰陽不測之術。一循師家之規則。標幟傳響。以爲己有。唯其有之。是以似之。且言余初所志者。欲遍問洛諸名家。搜其帳祕。而營營逐逐。徒費神力。竟無所得。是以輯錄師家經驗之言。夜闇燈下。稍稍墮下一紙。積日之久。集而成冊子。其方則吾師神知所發。妙手所施。治驗之迹。了然可觀。獨意記寫綴敍。滯齒脫略。恐不能宣其義。雖然文句之陋。青囊家素所不恥。况方脈之言。以辭爲勝哉。但如其事實毛舉纖微。苟可傳以爲法者。無遺漏也。於吁。祕諸帳乎。抑公諸世。與獨再三思之。懷其寶不如表章其言。令人免夭折之患。遂刻示諸同門。不窺室家之好者。若能隨余所選。斯繹斯取。思通半矣。其書上下卷。主名論候。無不具備焉。若夫金石奇疾。刲炙異病。汗于陰。下于陽。參附于沈。石黃于浮。無足異者。至吐以下劑。溫以冷藥。斷然不疑。則不可得而測知者。余嘗見其所著醫談。非溫補主攻擊。以張一己之說。竟不免自固之誹。自言其青年客氣所令。然今此書所錄。非復彼偏倚可驚。詭劇可畏之比。取矩於周漢。

參術於宋元。旁撫西洋之所傳。博采衆方。折中古今。以立一家之才。可謂熟夫用之用。而不熟不用之用者非邪。噫。秦漢邈矣。張機氏以還。誰謂無張機氏西州逃矣。誰謂東方乏其人。余也武人。雖未嘗存心於刀圭之技。於琴溪氏竊嘆夫醫之不難明矣。鄉者匡輔親炙之日淺矣。若能再游而潤色。鵠業則十全之效。蓋有所期。是所望乎匡輔也。享和癸亥季冬。

同藩 生駒厚撰

# 生生堂治驗目錄

## 卷上

發癩紫黑	一	浮腫	一	五
兩目生翳	一	癰癧	一	六
妊娠水腫	二	瘡熱發黃	一	六
微毒	一	瘀血發瘡	一	六
聲挺生癰	一	瞼膜遮睛	一	六
產後塊痛	二	便血	一	七
腹脹	三	咳嗽遺溺	一	七
妊娠頭痛目翳	三	痧毒發瘡	一	七
微毒作痛	三	微毒喉痛	一	八
癲狂	四	微毒發癰	一	八
頭瘡	四	益死治法	一	九
雙眼迷痛	四	四肢疼痛	一	九
麻木	四	頑癬	一	九
癰結	五	腹痛	一	〇
痧毒	五	浮腫	一	〇
手指痺弱	五	手	一	一

微瘡輕粉發毒	一	蹶仆損傷	一
腫脹咳嗽	一	哮喘	一
身體短氣	一	肝聲驚人	一
微瘡潰爛	一	熱結膀胱	一
身發奇痒	一	下疳瘡毒	一
痧毒頭痛	二	痘	一
兩足不伸	二	腹癰	一
浸血	二	肢腫黃病	一
心痛	二	傷寒食復	一
血室有熱	三	微毒發瘡	一
吃逆	三	交感小腹急痛	一
痧病癰癰	三	失瘡	一
癲狂	三	微毒陰瘡	一
膝腫不伸	四	憲怒卒倒	一
遺毒發瘡	四	傷寒	一
咳嗽白沫	五	滯渴	一
脫肛	五	驚風吐乳	一
奇疾	五	微毒脚癆	一
喘急	五		○

痧毒	一	酒毒	二	下利	二
噎膈	二	兒見口腫	二	嬰兒口腫	二
癲病	三	痘瘡	二	痘瘡	二
狐惑	三	腳氣	二	腳氣	二
卷下		產後嘔吐	一	產後嘔吐	一
熱入血室	一	吐血	一	吐血	一
交腸	一	產後水飲嘔吐	一	產後水飲嘔吐	一
頭痛	一	腫滿	一	腫滿	一
背痛肢痙	一	胸痛嘔吐	一	胸痛嘔吐	一
癲狂	一	泡瘡	一	泡瘡	一
胸痛	一	蓄血	一	蓄血	一
麻木	一	反胃	一	反胃	一
頭瘡	一	寒熱	一	寒熱	一
腫滿	一	瘻毒	一	瘻毒	一
蛇蟲	一	兒頭杵僵	一	兒頭杵僵	一
產後齒齦脣痛	一	跌仆成瘡	一	跌仆成瘡	一
脚氣	一				
反胃	一				
笑病	一				

脛脹	三二	微毒咳嗽潮熱	三九
痧證暴發	三一	傳尸勞藥	三三
鼓脹	三一	腹痛吐酸	三九
疳蟲	三三	耳輪作痛	三〇
腹痛	三四	右身不仁	四〇
經來腹痛	三四	寒飲嘔吐	四〇
陽明熱厥	三四	頭痛眩晕	四〇
微毒身痛	三五	痞滿惡食	四〇
咳嗽臭痰脹血	三五	眩晕	四〇
紫癥	三六	鷄膝風	四〇
下血	三六	腰痛	四〇
中暑	三六	霍亂	四一
便祕	三六	耳聾腰曲	四一
發疹	三七	背癩	四一
惡阻	三七	腹痛	四一
漏產浮腫	三七	瘀熱發黃	四二
痧毒眩倒	三八	背疽	四二
蛲虫腹痛	三八	脫疽	四二
微毒頭痛目翳	三八	脛不仁便常秘	四三

腹痛腳痙	血症	四三
膝腫腳痛	微毒耳聾喉爛	四四
蟲疊病	奔豚	四五
胃中停水		四五
		四五

# 生生堂治驗卷上

門人 小倉小野遜匡輔 輯

吾師琴溪先生。天稟之異。膽略過人。其揮擣刀圭。驅使藥石也。如良將使兵。龍騎豹略。奇正百出。機捷縱橫。所向無前。以小子所聞見其起痼救危。溫補攻擊。各適其宜。百不失一。蓋思慮之精。施術之工。可謂醫之神者。古云。英俊隱醫卜信矣。是以乞治者。日盛月熾。莫不感其恩而服其妙矣。小子往者在于左右。私錄其治驗響應者。藏諸篋中。積得數紙。因繼次條記。謀諸同門之士。以上木公于世云。唯小子之拙文字。陳言爛說不足盡其妙。愧懼良多。觀者莫以此而輕視先生幸甚。

【發癩紫黑】京師油小路五條。北近江屋甚助之妻。總身發癩。大者如錢。小者如豆。色皆紫黑。日晡所必發痛痒。又牙齦常出血。先生診之。臍下拘痛徹腰。與桃核承氣湯兼坐藥。前陰出濃血。數日乃痊。

【兩目生翳】岩神街木屋某。雙眼生翳日久。先生診之。曰莎也。刺委中放血。日一次。三日乃痊。

【妊娠水腫】車屋街夷川北萬屋喜兵衛之妻。妊娠至五個月。患水腫。及分免尙甚。一醫人治之。用許多利水之方劑無效。既而胸滿短氣。煩躁幾死。一坐倉遑不知所爲焉。時向半夜。病者二云。腹上津津似有水流狀。皆異之。卽披衾視之。臍傍臍理自開。腫水流瀉。自是腫減者過半。然尙大便溏泄。形狀殊危。醫以爲表虛裏奪。榮陽益氣。亦不可及。勇退而去。因迓先生。

先生診之脈微而促。指甲暗黑。面色鮮白。四肢腫存半。按其腹無痛。唯臍下鼓然如未製皮中包絮者。問家人曰。小便利否。答曰。就蓐以來。未會見其快通。卽作麥門冬木通湯與之。小便快利。大便時通。仍與前方數十貼。腹皮竟軟。爾後發癇狂呼妄詈。晝夜無常。先生往將脈之。則張目舉拳。勢不可近。因換以甘麥大棗湯服百數貼。而漸漸得復故。

麥門冬木通湯方  
麥門冬三錢  
木通四錢

右一味。以水三合。煮取一合溫服。

【徵】一男子年六十餘。患瘧瘧。來請治於先生。先生診之曰。毒甚深矣。今不以輕粉朱砂輩治之。則後必悔。其人憚而辭。後半年餘。又來請。卽診之。其毒殆結痼。先生爲言曰。毒非發於耳目。則必發于口鼻四肢。不急除之。恐爲廢人。又不肯。比及三年。總身麻痺煩疼。不能轉側。目盲耳聾。其族來謝罪。且謂渠前不用先生教。故今果如此。死無日矣。不忍坐視其死。渠縱令不治。一蒙辱先生之治。死且無恨。萬一得開生路。何惠如之。懇請不已。先生謂之曰。今百倍於初所見。非一日以其最峻者攻之。則病勢不可撓屈。迺與七寶丸八錢四分。朝六分。暮六分。服之七日。咽喉大腫。齒齦斷切。吐出紫黑血。及涎沫約一斗許。凡二十有七日。始得起。由是諸症稍退。但目未明。更與風流湯。期年復常。

【臂腿生癰】寺街綾小路南象牙屋入兵衛之女。年甫十餘。自膝至臂腿。其大幾類於中人。而無癰色亦不變。身唯仰臥而不得反側。歲餘衆醫僉

以爲疳癬。不可療也。而辭竟乞拯於先生。先生脈之細數而有力。按撫其腿膝間良久。顧謂門弟子曰。其狀殆難言。爾等按之。以能諳識諸掌。是此中大癰。不急除之。後必有大害。迺使召外科某具告由。某危疑有憚色。先生諭之曰。余有所見也。子解疑惑乎。即使某以藥湯熨腿膝間。而與浮萍加廣東人參湯五六日。浮腫穴上果大泡起。又使某帖腐藥。遂漿膜水流出。二旬餘得爲常人。

【產後塊痛】鳥丸一條。北丹後屋某妻。年四十。產後其左脇下。有一塊。閑臥則無所患。動展輒疼痛不禁。四肢亦然。如此者二年。然身體常肥大。先生診之。心下滿。卽與桃花湯取瀉。日三行或五行。月餘乃愈。塊亦自消。

【腹脹】四條堺街西近江屋總七之妻。患腹脹者一年餘。先生與之桃花湯下利。則其腹從軟。利止復脹滿如初。因作雞屎白散服之。小便快利。百餘日遂愈。

雞屎白散方

雞屎白二合

麴一升

右二味。細末。以白湯下之。日二錢。

【妊娠頭痛目翳】河東小野田屋重兵衛之妻。妊娠五月。患頭痛。六月左眼生浮翳。遂失明。右眼尋亦發赤色。醫治多方不効。先生與涼膈散。作吹鼻散兼用之。使以出鼻涕。眼翳隨去。數日全差。又一婦人年二十餘妊娠七月。頭痛如割。而雙眼赤色。如湧血。左遂不得視。復以前方療之。吹鼻散方

瓜蒂

皂莢各等分

右末搐之鼻內。

【徵瘡】一娼婦二十歲患徵。先生診之。脈沉澀。而非全無力。顏色青黃。肌肉消瘦。咳唾白沫。額有一瘡。其口流膿。滴滴然。陰門亦腐爛崩塌。臭氣掩鼻。自謂曰。賤妾始所請醫藥。皆如應而不應。羈遲數年。柱蕪至此。病最奇。胸中鬱悶。飲食減少。今願委治於公。生死唯命。先生卽與涼膈散。并以七寶丸三分服之。居二三日。口爲之將腐爛。因以龍門丸三十許丸下之。如此者十數次。口遂不爛。疾亦漸漸而愈。

【徵毒作痛】錦小路近江屋治兵衛妻。四體疼痛。痛處無定。或手或足。或在其左。或在其右。醫認爲風毒治之無驗。脈沈結。舌上白苔。其臍旁有一塊。先生曰。徵毒也。與龍門丸一錢。酒服之。卽大瀉泄。幾昏倒矣。稍覺其痛減。更飲浮萍加大黃湯。十許日。復與前丸。如法服之。月餘全已。

【癲狂】夷川間街北井筒屋喜兵衛妻。發狂癇。發則欲把刀自殺。或欲投於井。終夜狂躁不寢。聞則脫然謹厚。女功無一怠。先生以瓜蒂散一錢五分。上湯三二升。服白虎加人參黃連湯。不再發。

【頭瘡】佛光寺街山形屋久右衛門之妻。患頭瘡。其瘡蔓衍。狀如覆釜。歲餘不愈。先生與浮萍加大黃湯。時時以龍門丸一錢取瀉。不出十日復故。

【雙眼竇痛】佛光寺火宅僧妻。雙眼竇痛不開。先生診之。小腹拘急。與桃核承氣湯。兼用吹鼻散。一日。大衄。眼疾全愈。

【麻木】柳馬場四條南丹波屋九兵衛。年三十。總身麻木。目不能視。口不

能言。其人肥大。性好酒。先生診之。脈遊而不結。心下急喜嘔。卽飲三聖散六分。不吐而暴瀉五六次。越三日又服。分量湧出可三升。由是日得見口得言。兩手亦漸漸得動。後與桃花湯百餘貼全已。

【藏結】高倉錦小路北桔梗屋某僕二十歲。晡飯後可半時。卒然腹痛入陰囊。陰囊挺脹。其疼如剜。身爲之屈不能復伸。轉轉悶亂。叫喊振伏。邀迎先生診之。其脈弦。而三動一止。或五動一止。四肢微冷。而腹熱如燔。囊大如瓜。按之石硬。先生曰。此不可治。卽張機所謂藏結入陰筋者死是也。如此疾余嘗見二三人。輒大黃芒消烏頭天雄。或銚鍼以挫其急暴。然皆自如不起矣。爲憫然。拱手苦思者良久焉。病者昏憒之中。愀然告曰。心下有物。如欲上衝咽者狀。先生聞之。乃釋然撫掌謂曰。汝可拯矣。以瓜蒂散一錢。湧寒痰一升餘。次與紫圓三分。瀉五六行。及其夜半。熟睡達明。前日之病頓如忘。居三日自來謝。噫呼。師遇若病作若奇術。實神之所通。人有不可知者。

【痧毒】一男子。年二十。胸膈鬱塞。似痛不痛。時時嘔吐。每吐鮮血線線。從之先生診之。脈結而口吻黎黑。舌生白苔。曰此痧病也。便刺口吻。及手大指頭。及尺澤取紫黑血。病乃愈。

【浮腫】六角新街東終屋重兵衛。通面浮腫。口爲之被封。纔得臘粥。數日。然猶無有他患。先生切之。脈浮數。背彊惡風。無汗。頭痛如錐。與葛根湯十數貼不應。因以瓜蒂散五分。嘔其粘黃水六七合。明日復以葛根湯發汗。

如流。諸證霍然愈。唯腫氣十餘一二三。轉葛根加烏頭湯。

【癲癇】一婦人幼而患癲癇。長益劇。立輒暈厥。有少時而甦者。日一二。如此三十有餘年。而衆醫雜療無効。其主人偶聞先生異術。乃來請治。往診之脈緊數。心下硬滿。乳下悸動。乃謂先生曰。心神惛惛。不須臾安寢食。數十年一日也。視其顏色。愁容可憐。先生慰之曰。可治矣。病婦實信之。乃服柴胡加龍骨牡蠣湯。精神頗旺。調瓜蒂散五分。使吐粘痰升餘。臭氣衝鼻。減毒過半。或五日。或六日一發。凡期年全愈。其間行吐劑約之十六度。渠性忌雷。每聞雷聲隆隆。輒發前病。自用瓜蒂散以往。迅雷震動。舉家畏伏。蔽耳。渠獨自若不畏。於是乎益懷先生恩。終身不忘云。

【瘀熱發黃】富小路五條北伏見屋重兵衛。年三十。心中懊惱。水藥入口。輒吐。經日益劇。先生視之。眼中成黃。心下滿。按之癟。乳下扇動。紊亂不定。先生爲言曰。此瘀熱在裏也。蓋不日身當發黃色。迺食鹽三五匕。以白湯仰吞之。大吐冷水。更與茵陳蒿湯。身果發黃色。圍黑糞。仍服前方十有五日復常。

【瘀血發瘡】一婦人年三十。久患頭瘡。臭濃滴滌。流而不止。或髮粘結不可梳。醫因以爲黴毒。攻之不愈。痛痒無止。請之先生。其脈弦細小。腹急痛引腰腿。曰瘀血也。投桂枝茯苓丸。加大黃湯。兼以坐藥。不出月全瘥。後一夜腹痛二三陣。大下畜血云。

【翳膜遮睛】一婦人年四十。頭痛項背僵。兩眼翳膜遮障。積年以茶調散

六分乃快吐。後桃花湯取瀉。不日愈。

【便血】一男子腰痛。每大便下血者合餘。面色鮮明。立則昏眩。先生處桂枝茯苓白朮甘艸加五靈脂湯頓愈。

【咳嗽遺溺】一婦人行年三十餘。每咳嗽。轉小便涓滴汚下。夢者數回。醫或爲下部虛。或爲畜血。萬盤換術。百數日。先生切按之。其腹微滿。心下急。按之則痛。牽兩乳及咽。而至咳不禁。與之十棗湯。每夜五分。五六日差。

【痧毒發瘡】柳馬場綾小路南近江屋三郎兵衛父年七旬餘。人中發疔。疔頭紫黑。四邊泡興。唯覺痒而已。總身煩熱。口苦咽乾。其子來請曰。吾聞疔瘡之爲毒也。猛劇少壯之人。尙且可懼。况家翁春秋高。氣力甚衰。唯恐其不堪。先生乃診之。脈遲。曰。郭志邃所謂脈證相反者。痧也。翁之所患亦痧而非疔也。今毒所釀。雖纔在於寸步間。不速治之。以砭石。則毒必陷攻其內。竟至以蔓衍。卽瘡不旋踵。窘迫如此。老少強弱何別焉。然則安危之機。在今日所任。唯砭石而已矣。他奇方毒藥。非所能及。醫之猶蛇蠍之生于園也。其始生纔在一枝一葉。速折其枝。剪其葉。則其災一朝可除。不然。則說說蕃息至舉園死之。三郎兵衛大悅。託治先生。迺以鍛鍼十字。截之。入二步而深。血逎食頃。氣宇爽然。翌亦刺血滴二合。三四日腫減。諸症盡退。又建仁寺街四條南道具屋仁兵衛。行年四十有二。兩眉間生一瘡。有亂列。曰是痧也。可速割去毒血矣。因引前老人之病以證之。其人不可明。

日復往喻之。猶有憚色。爲言曰。然則先試延他醫診視之一。醫視之曰。形色不變。聲音如常。非危證也。乃帖膏藥於瘡上。於是愈不信先生。而其夜遠走人來叩門。而請曰。果如先生之言。今病者通面渾然。焮腫呼吸塞迫。呻吟之聲達四隣。衆醫皆辭去。唯仰先生辱臨耳。辭曰。毒既熾矣。余往亦莫奈之何。使人復至。不得已。往見之。脈絕四肢厥。鼻內腐爛。膿血如湧。呼吸之氣甚臭。曰不可濟。竟不投藥而歸。訐尋至。

【**徽毒喉痛**】一男子。咽喉腫痛。一醫刮之出血。而疾頓已。日後尋復發。其腫痛倍于前。飲食不下。死在旦夕。先生迺窺其咽中赤如燃。而舌白苔。曰嚮陰莖發一瘡。不待藥自愈。先生曰徽也。與章門丸一錢服之。經二日。其人自來謝曰。服已畢。而腹痛暴至。瀉下數十行。以達曉。而腹中缺然。腰脚罷弱。力不能出廁。匍匐就寢。便食餅子數枚。咽喉不痛。始知其疾之愈矣。後與再造散。以酒服之。數月不再發。

【**徽毒發癰**】釜坐楓木街北石野長右衛門之家。保年三十餘。患徽毒日久矣。自肛門至陰囊其間。潰作巨孔。腐膿淋漓。食飲頗禁。形體悴羸。而煩熱盜汗等諸證。日篤。治理百端。功皆不就。偶聞先生一代名醫也。急延視之。其脈數而暗。帶力。曰可治矣。與風流湯。兼龍門丸。每日服三十九。百餘日。毒盡除。唯以胸中彭滿。飲食猶未進。先生謂病夫曰。今疾既已矣。而獨所以食之不進者。無他。佳味珍羞。常不撤枕邊。而飽厭其氣之所致也。請屏之。絕食三日。以開胞內。病者慎守教。一日半飢不自堪。乃就食則覺菜