

# 实用中草药 彩色图集

第三册

罗献瑞 主编  
广东科技出版社



# 实用中草药彩色图集

## 第三册

**主编** 罗献瑞

**编写** 罗献瑞 刘 明 麦镇球 黄淑美

吴德邻 程用谦 林有润 卫兆芬

陈邦余 阮云珍 苏耀富

**绘图** 邓盈丰 余汉平 邓晶发 余 峰

**摄影** 李泽贤

# 粤新登字 04 号

## 图书在版编目 (CIP) 数据

实用中草药彩色图集 (第三册) / 罗献瑞主编

· 广州: 广东科技出版社, 1994. 8.

ISBN7-5359-1253-2

I. 实…

II. 罗…

III. 中草药, 图谱

IV. R281

16254

## 实用中草药彩色图集 第三册

---

主 编: 罗献瑞

责任编辑: 陈 岩

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销: 广东省新华书店

印 刷: 广东美术印刷厂

规 格: 787×1092 1/32 15.25 印张 33 万字

版 次: 1994 年 8 月 第 1 版

1994 年 8 月 第 1 次印刷

印 数: 1—25200 册

ISBN 7-5359-1253-2

R · 229 定价 35 元

---

## 内容简介

本图集以实用为宗旨，故植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，并取图文对照形式编排。全书共收载中草药 720 余种，彩图 730 余幅，分三册出版。第一册收录 207 种，以华南地区常用中药为主，其中相当部分为该地区习惯用药，故有一定的地区特色。第二册收录 230 种，全为植物药，主要是我国南部、东部和中部疗效较确切的民间草药和部分中药，故该册对热心研究民间草药的人士特别有用。第三册收录 280 种，其中动物药约 80 种，矿物药约 40 种，并于植物药中选收我国产名贵中药近 20 种以及部分进口药材。这些内容在通常所见普及性中草药书籍中尚不多见，故可补其不足。

## 编写说明

1. 本册收载中草药 279 种。其中植物药 162 种、动物药 76 种、矿物药 41 种。原植物和药材彩图共 280 幅。
2. 动物药由于有些生活原动物不易找到，也由于绘图和摄影存在不少技术上的困难，故原动物图形和形态描述均从略，仅收录药材部分。植物药中的 4 种树脂类药材，大体上也由于同样的原因，其植物图形和形态描述均阙如。
3. 《中华人民共和国药典》（一部），简称《药典》，本册中均指 1990 年版。
4. 本册编写体例同于第一、二册，不再赘述。

# 目 录

一、全草类	1	空心莲子草	46
土荆芥	2	虎刺	48
小红根草	4	垂盆草	50
六月雪	6	金线风	52
元宝草	8	金盏银盘	54
瓦松	10	荆芥	56
五月艾	12	荔枝草	58
布狗尾	14	肺形草	60
龙葵	16	凉粉草	62
四块瓦	18	鸭跖草	64
白英	20	铁苋菜	66
白毛将	22	麻黄	68
冬凌草	24	断血流	70
灯笼草	26	菥蓂	72
向天盏	28	野马追	74
百蕊草	30	啜腋膏	76
地锦草	32	猪殃殃	78
肉苁蓉	34	猪鬃草	80
农吉利	36	博落回	82
杠板归	38	紫花地丁	84
佛甲草	40	筋骨草	86
伸筋草	42	鹅脚板	88
空心花	44	锁阳	90
		蓝花参	92

糙苏	94	刺三甲	148
颠茄草	96	板蓝根	150
爵床	98	春根藤	152
蟛蜞菊	100	茜草	154
<b>二、根和根状茎类</b>	<b>103</b>	浙贝母	156
人参	104	秤钩风	158
三十六荡	106	黄芩	160
土荆皮	108	黄芪	162
大黄	110	黄药	164
小叶双眼龙	112	黄药子	166
川乌	114	菊三七	168
川贝母	116	猫爪草	170
川牛膝	118	萱草根	172
飞龙掌血	120	朝天罐	174
云实皮	122	紫茉莉	176
水半夏	124	紫草	178
牛皮消	126	紫萁贯众	180
乌柏根	128	漏芦	182
丹参	130	薯莨	184
甘草	132	<b>三、茎、枝和树皮类</b>	<b>187</b>
北豆根	134	土加藤	188
白头翁	136	山大颜	190
西洋参	138	山桂皮	192
地桃花	140	汉桃叶	194
防风	142	石吊兰	196
远志	144	地枫皮	198
紫麻根	146	买麻藤	200

鸡矢藤	202	番红花	254
香叶树皮	204	蜡梅花	256
浙桐皮	206	<b>六、果实、种子和孢子类</b>	...
野木瓜	208		259
黑风藤	210	刀豆	260
<b>四、叶类</b>	213	大枣	262
大叶桉	214	大蕉皮	264
大金花草	216	山茱萸	266
石楠叶	218	五味子	268
四季青	220	白花菜子	270
灯台叶	222	白果	272
岗松	224	丝瓜络	274
牡荆叶	226	芫荽子	276
罗裙带	228	泡桐果	278
枸骨叶	230	苘麻子	280
臭梧桐叶	232	青果	282
櫟木叶	234	苦瓜干	284
紫珠叶	236	苦杏仁	286
裸花紫珠	238	板栗壳	288
<b>五、花类</b>	241	郁李仁	290
月季花	242	南天竹子	292
红花	244	草果	294
芫花	246	枸杞子	296
玫瑰花	248	娑罗子	298
松花粉	250	莲子	
粟米须	252	(附:莲子心、莲房、莲须、 藕节)	300
		核桃仁	304

梧桐子	306	水蛭	344
喜树果	308	水獭肝	344
葶苈子	310	牛草结	346
葫芦	312	牛黄	346
棕榈子	314	乌梢蛇	348
黑芝麻	316	龙涎香	348
蓖麻子	318	石决明	350
蝴蝶果	320	白贝齿	350
薏苡仁	322	白鸽屎	352
<b>七、树脂及藻、菌类</b>	<b>325</b>	地龙	352
没药	326	全蝎	354
乳香	326	竹蜂	354
苏合香	328	血余炭	356
藤黄	328	红娘子	356
冬虫夏草	330	龟板	358
昆布	332	鸡内金	358
猪苓	332	牡蛎	360
<b>八、动物类</b>	<b>335</b>	夜明珠	360
人中白	336	刺猬皮	362
九香虫	336	金边土鳖	362
广西白花蛇	338	金沙牛	364
干蟾	338	金钱白花蛇	364
五谷虫	340	鱼脑石	366
五灵脂	340	穿山甲	366
瓦楞子	342	狗鞭	368
水牛角	342	珍珠	368
		玳瑁	370
		虻虫	370

海马	372	燕窝	400
海底柏	372	熊胆	402
海龙	374	僵蚕	402
海星	374	蕲蛇	404
海麻雀	376	鳖甲	404
海螵蛸	376	麝香	406
海螺厣	378	蟾酥	408
盐蛇干	378	蟛蜞	408
桑螵蛸	380		
羚羊角	380	<b>九、矿物和化石类</b>	<b>411</b>
鹿茸	382	云母石	412
豹骨	384	无名异	412
望月砂	384	水银	414
蛇蜕	386	升丹	414
游虫珠	386	玄明粉	416
斑蝥	388	玄精石	416
蛤壳	388	石膏	418
蛤蚧	390	石燕	418
蛤蟆油	390	石蟹	420
紫贝齿	392	龙齿	420
紫河车	392	龙骨	422
鹅管石	394	白石英	422
猴枣	394	白矾	424
猴骨	396	白降丹	424
鲎壳	396	芒硝	426
蜈蚣	398	阳起石	426
蝉蜕	398	自然铜	428
蜂房	400	朱砂	428

辰砂	430	密陀僧	444
赤石脂	430	浮石	446
花蕊石	432	滑石	446
玛瑙	432	琥珀	448
炉甘石	434	硫黄	448
青矾	434	雄黄	450
金礞石	436	紫石英	450
南寒水石	436	磁石	452
砒石	438	赭石	452
轻粉	440		
禹余粮	440		
秋石	442	<b>中文名索引</b>	455
钟乳石	442		
胆矾	444	<b>拉丁名索引</b>	470

## 一、全草类



# 土荆芥

**别名** 钩虫草、臭藜藿。

**来源** 本品为藜科植物土荆芥 *Chenopodium ambrosioides* Linn. 的干燥全草。

**原植物** 土荆芥（图1）为一年生或多年生草本，高50~80厘米，揉之有强烈臭气；茎直立，多分枝，具条纹，近无毛。叶互生，披针形或狭披针形，下部叶较大，长达15厘米，宽达5厘米，顶端渐尖，基部渐狭成短柄，边缘有不整齐的钝齿，上部叶渐小而近全缘，上面光滑无毛，下面有黄色腺点，沿脉稍被柔毛。花夏季开放，绿色，两性或部分雌性，组成腋生、分枝或不分枝的穗状花序；花被裂片5，少有3，结果时常闭合；雄蕊5枚，突出，花药长约0.5毫米；子房球形，两端稍压扁，花柱不明显，柱头3或4裂，线形，伸出于花被外。胞果扁球形，完全包藏于花被内；种子肾形，直径约0.7毫米，黑色或暗红色，光亮。

生于村旁、路边、旷野及河岸等地。分布我国长江以南各省区，北部各省常有栽培。原产热带美洲，现广布于各热带地和温带地。

**采收加工** 夏、秋季采收全草，摊放通风处或捆扎成束，悬挂阴干。

**药材性状** 本品长50~80厘米或过之，常带果穗，青绿色。茎下部圆柱形，粗壮光滑，上部方柱形有纵沟，具毛茸。下部叶大多脱落，仅茎梢留有线状披针形的苞片。茎梢或枝梢常见残留簇生果穗，触之即脱落，淡绿色或黄绿色。剥除宿萼，内有棕黑色的细小果实1枚。全草有强烈异臭气，味微苦、辛。以茎嫩、带果穗、色黄绿者为佳。

**性味和功用** 辛、苦，微温。有小毒。祛风消肿，杀虫止痒。用于驱钩虫、蛔虫和蛲虫，皮肤湿疹，脚癣，瘙痒，杀蛆虫。常用量3~6克，研末或制丸入药。外用适量，煎水洗患处。

**附注** 广东等华南部分地区通常以唇形科石荠苧 *Mosla scabra* (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li 的全草作土荆芥入药。（参阅本图集第二册第18页广东土荆芥条）



图1 土荆芥

## 小 红 根 草

别名 小丹参。

来源 本品为唇形科植物黄埔鼠尾草 *Salvia prionitis* Hance 的干燥全草。

原植物 黄埔鼠尾草(图2)为一年生草本，有短小的根茎；地上茎直立，高20~35厘米或过之，被白色长硬毛。基生叶多数，单叶或三出复叶，单叶长圆形、椭圆形或卵状披针形，长2.5~7.5厘米，上面被长硬毛，下面仅脉上被毛，复叶的顶生小叶明显较侧生小叶大。轮伞花序有花6~14朵，组成顶生、间断的穗状花序式；花春末夏初开放，萼管状钟形，长约4毫米，外被腺毛，里面喉部被硬毛；花冠蓝色或紫色，长约1厘米，冠管内有毛环，下唇中裂倒心形；雄蕊药隔长约5毫米，下臂较短，顶端连合。小坚果椭圆形。

生于山坡草丛和林缘。分布广东、广西、湖南、浙江、安徽、江西等省区。

采收加工 秋季采收，除去杂质，晒干。

药材性状 本品根状茎短，上有纤细的须状根，其长可达10厘米，棕褐色。地上茎方柱形，长20~35厘米或过之，直径0.1~0.2厘米；被白色长硬毛；质稍脆，断面灰白色。基生叶为单叶或三出复叶，叶片多卷缩，展平后呈长圆形或椭圆形，长2.5~7厘米，宽1~3.5厘米，黑褐色，顶生小叶特大，先端钝，边缘有粗齿，上面被白色长硬毛；茎生叶对生，均为单叶。气微，味微苦。以根多、棕褐色、叶被毛浓密者为佳。

性味和功用 微苦，凉。清热解毒。用于急性扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎，肠炎，细菌性痢疾。常用量15~45克。



图 2 黄埔鼠尾草

# 六月雪

**来源** 本品为茜草科植物白马骨 *Serissa serisoides* (DC.) Druce 的干燥全草。

**原植物** 白马骨(图3)为多枝灌木，高0.5~1米，有时可达1.5米。叶对生，有短柄，常聚生于小枝近顶部；叶片近革质，通常卵形或披针形，长1~3厘米或过之，宽达1.5厘米，顶端短尖或稍钝，侧脉每边3或4条，两面均凸起；托叶基部阔，顶部有几条刺状裂片。花秋季开放，白色或微红，近无梗，多朵簇生枝顶；萼5深裂，裂片狭披针形，锐尖，被缘毛；花冠管状漏斗形，长7~9毫米，喉部密被白色长毛，檐部5裂，裂片伸展或略反卷，几与冠管等长。核果球状，有2个分核。

生溪边、林缘或灌丛中，亦常见栽培供观赏或作绿篱。长江下游各省区以及广西和广东北部有野生，四川、云南、贵州等省区有栽培。日本亦有。

**采收加工** 全年均可采挖，除去泥沙，晒干。

**药材性状** 本品全长40~100厘米。根细长，灰白色。茎圆柱形，多分枝，直径0.3~0.8厘米，深灰色，有纵裂纹，外皮易剥离，嫩枝灰色，被微毛。叶对生，有短柄；叶片卵形至披针形，长1.5~3厘米，宽0.8~1.5厘米，绿黄色，全缘。花无梗，苞片及萼片刺尖，灰绿色；花冠漏斗状，白色，核果近球形。气微，味淡。以枝茂盛、叶带绿者为佳。

**性味和功用** 味淡、微辛，凉。健脾利湿，舒肝活血。用于小儿疳积，急慢性肝炎，经闭，白带，风湿腰痛。常用量15~30克。

**附注** 同属植物六月雪 *Serissa foetida* Comm. 和本种同等入药，不加区分。