

陳存仁編校

皇漢醫學叢書

賀古壽公山著

奇
正
方

上海中醫學院出版社

EV45/2702
1102

奇 正 方

提 要

天下事有正必有奇。正者其經常。而奇者其權變也。治兵然。治醫亦然。

本書爲阿波賀古壽公山所著。取傷寒論金匱要略及千金外臺諸書之

方證。以分晰其奇正。使讀者開卷了然。得此一書。乃知傷寒金匱等之辨

證處方。皆寓有精意。復從而研究之。自然瞭如指掌。不至墮入五里霧中。

其有裨於醫學。實非淺鮮。

序

恬菴子奇正方脫稿將鐫板行之或聞其名詰諸其門人曰是以兵喻醫其說必陳腐門人曰因病之常變示方之奇正釋仲景氏書古來未有如此之明且切者子盍嘗讀焉詰者曰孫子云戰以正合以奇勝善出奇者無窮如天地不竭如江海夫奇者臨機制變之謂非可預示其可示者皆正耳恬菴乃欲并示正與奇不亦異乎門人不能對以質于余余曰吾不知醫又不知兵然以吾所聞想之醫方有奇正亦猶吾道有經權事之常變固不可無經權則亦何異乎方有奇正以應病之常變也今夫男女有別道之正也嫂溺手援道之奇也直道而行道之正也父子相隱道之奇也居喪哀毀而病則酒肉明哲保身而殺身成仁其於六藝也書正而詩奇禮正而樂奇春秋兼奇正以誅亂賊亦猶良醫兼奇正以治百病因此推之天下無往不正亦莫不奇矧於兵乎矧於醫乎何奇正之不可示也雖然吾道也主常兵也醫也主變主變者貴乎奇主常者貴乎正正有定而奇無窮仲景氏之論雖備矣恬菴之所示雖明且切矣豈能悉天地江海之奇乎哉舉一反三運而用之妙在其人則以詰者之意讀恬菴之書

其益於醫術也必大矣恬菴聞余言喜曰然矣請題卷端遍告讀者於是乎書

文政庚寅夏月小竹散人筱崎弼撰

奇正方序

譬則一而二二卽一之加一未嘗不資於二也譬則二而一一卽二之省二未嘗不歸於一也則知一二之變固非一自一二自二而不相關者也故以陳虎龍之列正包奇奇承正鉤角聯絡代爲應變按行其營壘爲落膽嘗有人而今吾觀之於仲景方書編旨蓋編旨亦如云遺一而執二不可遺二而執一不可一二時執而時相遺又不可必也推一於二之中括二於一之表類其異而統於同夫然後以爲可明矣攻病截亂原一揆而恬菴始發明其旨功亦偉矣抑亦不能無惑焉恬菴子原吾州武弁之族遇事擔當卽其人也而今來遊茲土舊業不諳乃措諸醫意者奇正之可施於今日昇平者其以爲醫而已乎將巨細一貫姑措諸所遇而已乎吾亦夙習武矣

文政庚寅仲冬阿波齋藤象武教撰於大阪梶木坊奉海老漁書屋

凡例

凡方之治病有正有奇又有別正有別奇其正者乃如桂枝湯之治病入臟無他病云云證若病常自汗出者云云證及承氣湯之治腹中滿痛者抵當湯之治經水不利十棗湯之主懸飲苓桂朮甘湯之利微飲半夏瀉心湯之治嘔而腸鳴者之類是也其奇者乃如大小青龍湯之發盜飲猪苓湯之治少陰病下利云云證白虎湯之治太陽中熱云云證調胃承氣湯之發汗後惡寒云云證及陽明病不吐不下心煩者等之類是也其別正者假令其病始出於桂枝湯之正治終入其殊途異域者乃如桂枝加芍藥湯同加大黃湯小建中湯之類是也其別奇者乃如桂枝甘草湯之於發汗過多云云證桂枝甘草龍骨牡蠣湯之於火逆之類但治其一變證而不可移用於他者是也

凡醫法之隨證亦有奇正其正者乃如桂枝湯之於病人臟無他病云云證及病常自汗出云云等證服藥後不須歠粥溫覆但任其藥性和榮衛或大小青龍湯之於傷寒服後必溫覆以助藥力之類是也其奇者乃如桂枝湯之於中風服後必歠熱粥溫覆以助藥力或大青龍湯之

於盜飲麻黃加朮湯之於濕家不須溫覆而取汗之法或承氣湯十棗湯之於傷寒一快利則止後服消息斟酌以觀後變之類是也

凡傷寒論金匱要略中之方有二類焉蓋古聖醫爲治一傷寒而設之范曄所謂風寒熱病論中之遺方者仲景氏取以錄之傷寒論中麻黃柴胡白虎青龍等是一類也二者撰擇古昔治雜病之方以備傷寒正治後及誤治後不虞之變證者其方卽承氣抵當十棗湯等是一類也

凡方後曰得快利止後服曰得快吐則止後服曰得小便利餘勿服者單示傷寒治法而已夫傷寒之爲病變化百出無有定極而非一吐一下之可愈故雖施發散之輕劑猶周時觀之以候其後變之機况於吐下之法乎故其汗之不欲流漓其下之戒大泄其吐之慎暴劇唯要臨機應變以收全效爾是仲景氏治傷寒之法而非治雜病之例也若夫治雜病不期小快而欲其病毒盡脫故下之吐之不中止以愈爲限焉

凡醫事以陰陽五行司天在泉引經報使等爲之說者皆妄誕也夫支那醫流自唐宋而下舍條理而驚空理其論可喜其實則戾其論傷寒也以經絡爲受病之地以陰陽分風寒以蕞爾之人身配當無涯之天地支離荒唐實誤後進經年之久舊染難除我皇國五七十年來唱古醫

方者雖不乏其人亦唯踵支那醫風之弊而不能改其轍略作之辨而已或改太陽陽明少陽經絡附會之說以爲熱毒所屯之營塞或以六經爲病位之記號或以中風傷寒爲病之狀態以三陽爲陽氣盛微實之三名義亦皆一時之建言奇論而已獨東洞吉益氏斷然不惑其可疑者圈而不取可謂東漢以來一人矣余此編亦書中妄誕者皆圈以示學者

傷寒論中以六經分編立病之部位論邪熱之傳經者王叔和氏之妄誕也宋後數百年莫識破其妄者嗚呼何醫之乏其人獨明吳又可不憑六經別建熱病之論可謂豪傑之士也繼而興者我邦吉益東洞而已嗚呼何醫之乏其人往歲東洞氏作類聚方圈六經而刪之然世醫讀傷寒論者若斥六經則如瞽者之於文章聾者之於鐘鼓茫然不知所向故今存其名目所係之大略如左

所謂太陽者邪毒侵入筋骨肉分當發汗者乃如桂枝湯各半湯葛根湯麻黃湯大小青龍湯等證是也所謂少陽者邪毒結着胸脇心下口苦咽乾目眩耳聾乃如大小柴胡湯柴胡薑桂湯黃連湯等證是也所謂陽明者邪毒充漲于胃中腸內乃三承氣湯白虎湯等證是也所謂

太陰者乃太陽之反對而腹滿吐食或自利乃如桂枝加芍藥湯同加大黃湯及四逆輩之證是也所謂少陰者乃少陽之反對而脈微細或發熱脈沈或惡寒四肢逆冷心中煩或嗜寐或吐利或咽痛乃如黃連阿膠湯麻黃附子細辛湯附子湯真武湯猪苓湯證是也所謂厥陰者乃陽明之反對而手足厥冷心中疼熱內拘急脈沈而遲或脈微細或欲絕或下利清穀或吐衄乃如四逆湯白通湯烏梅圓等證是也夫反對者乃變化也或因誤治而爲脫陽之證或因病人氣化衰弱而精氣不能抗邪毒熱陽變化遂爲寒陰之謂也

凡方後攬舉諸書所載之方證者欲以廣其方之奇而益明其正之所存也而其中往往有妄妖虛誕者大紊其真而余不肯識而圈之舉以存舊而已學者能明奇正之條理則妖怪何之害

凡證先於方者所謂正而證後於方者奇也蓋仲景氏之作傷寒論也特爲治一傷寒而已故專論古方治傷寒之奇而其正乃略者間亦有焉今就外臺千金及雜書中取其可證者而補焉夫外臺千金者本稗載古代名醫面命之方論及當時民間口碑之藥方之書也故其方劑論說邪正相混雅俗相依今取其正而雅者耳

凡此編本傷寒論金匱要略之方以分其奇正然而其中多有似關其奇正者其實非關如也何則其似無正無奇者多是淡泊平易之藥不足以論奇正也世醫概以爲傷寒金匱要略中之方藥求必合正義而後世之方劑悉皆杜撰者此我邦僞古方醫之弊也蓋傷寒金匱中之方劑其能味淡泊者不爲不多雖然有物有則有輕微之病則有輕易之藥又有一方止治一證而不能泛治他病者疑是仲景氏臨時所製也凡編中曰辨誤曰發明曰試效曰方意者是余所嘗考試辨明也其間曰說具于傷寒論系傳者亦余所嘗著述之書名也後單稱系傳者略辭也若夫方意之解概論其大略以發童蒙而已

凡附方者所嘗親試之方也若金匱要略中附外臺千金等方雖非仲景氏之舊而其利于病者豈可捨耶今更增附數方于此者欲弘先哲之意以供于今日之用非添蛇足也

凡丸散之功亦偉矣而其爲用有先隨證處湯藥時兼用之以拔其毒者乃如抵當丸控涎丹滾痰丸等之類是也又有先投之以丸散殺其大勢而後與湯液者乃如瓜蒂散備急圓白散等之類是也又有嘔惡不容藥汁者換之以丸散者乃如五苓散之於水逆乾薑人參半夏丸之

於惡阻之類是也又有單用之者乃如入味丸之於消渴當歸芍藥散之於妊娠牡蠣澤瀉散之於差後腫之類是也又有應病之機而丸散湯液交相用者有常服湯液時別用丸散類以拔絛病之根源者此用丸散之要法也

每章於證傍加圈亦欲使其正與奇瞭然于一瞬之中也其例如左

○○○○○ 爲緊圈是緊要正證

○○○○○ 爲母圈象母腹受胎汗吐下及誤治所以生種種奇證

、、、、、 爲子點凡加母圈下文必施此點以示證之奇

庚寅秋重陽日恬菴賀古壽誌

目錄

桂枝湯	一	當歸建中湯	六
桂枝加桂湯	二	當歸四逆湯	七
桂枝加芍藥湯	二	黃耆桂枝五物湯	七
桂枝加葛根湯	二	黃耆桂枝苦酒湯	七
桂枝加黃耆湯	二	桂枝甘草湯	八
桂枝加附子湯	二	桂枝甘草龍骨牡蠣湯	八
桂枝附子湯	三	人參湯	八
桂枝甘草附子湯	三	桂枝人參湯	九
烏頭桂枝湯	三	茯苓杏仁甘草湯	九
桂薑草棗黃辛附湯	四	茯苓乾薑白朮甘草湯	九
桂枝加龍骨牡蠣湯	四	茯苓桂枝白朮甘草湯	一〇
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣	四	茯苓桂枝甘草大棗湯	一〇
救逆湯	四	茯苓桂枝五味甘草湯	一〇
桂枝加芍藥生薑人參湯	五	茯苓澤瀉湯	一〇
桂枝麻黃各半湯	五	澤瀉湯	一一
小建中湯	五	猪苓湯	一一
黃耆建中湯	六	葛根湯	一二

葛根黃連黃芩湯	一二	厚朴大黃湯	一一
麻黃湯	一三	厚朴三物湯	一三
麻黃附子細辛湯	一三	厚朴七物湯	一三
麻黃附子甘草湯	一四	小承氣湯	一三
麻黃杏仁甘草石膏湯	一四	大承氣湯	一四
麻黃杏仁薏苡甘草湯	一四	瀉心湯	一五
牡蠣湯	一四	附子瀉心湯	一五
小青龍湯	一五	大黃附子湯	一六
大青龍湯	一五	大黃甘遂湯	一六
越婢湯	一六	抵當湯	一六
小柴胡湯	一六	橘皮大黃朴硝湯	一七
柴胡加芒硝湯	一八	大黃硝石湯	一七
柴胡桂枝湯	一八	大黃牡丹皮湯	一七
柴胡桂枝乾薑湯	一八	大黃甘草湯	一八
大柴胡湯	一九	調胃承氣湯	一八
柴胡加龍骨牡蠣湯	二〇	桃仁承氣湯	一九
白虎湯	二〇	桔梗湯	一九
白虎加桂枝湯	二二	排膿湯	二〇
白虎加人參湯	二二	芍藥甘草湯	二〇

芍藥甘草附子湯	三〇	茵陳蒿湯	三六
甘遂半夏湯	三一	梔子蘗皮湯	三六
甘麥大棗湯	三一	梔子厚朴湯	三七
甘草粉蜜湯	三一	大陷胸湯	三七
甘草乾薑湯	三一	小陷胸湯	三八
四逆湯	三一	栝蒌薤白白酒湯	三八
通脈四逆湯	三二	大半夏湯	三八
通脈四逆加猪膽汁湯	三二	小半夏湯	三九
四逆加人參湯	三三	生薑半夏湯	三九
茯苓四逆湯	三三	小半夏加茯苓湯	三九
乾薑附子湯	三三	半夏厚朴湯	四〇
附子粳米湯	三三	半夏瀉心湯	四〇
大烏頭煎	三四	甘草瀉心湯	四〇
烏頭湯	三四	生薑瀉心湯	四一
真武湯	三四	吳茱萸湯	四一
附子湯	三五	厚朴生薑甘草半夏人參湯	四二
梔子豉湯	三五	黃連湯	四二
枳實梔子豉湯	三六	乾薑黃連黃芩人參湯	四二
梔子大黃豉湯	三六	大建中湯	四二

黃連阿膠湯	四三	升麻鼈甲湯	四九
黃芩湯	四三	射乾麻黃湯	四九
白頭翁湯	四三	厚朴麻黃湯	四九
木防己湯	四四	葦莖湯	五〇
防己茯苓湯	四四	炙甘草湯	五〇
枳朮湯	四四	十棗湯	五〇
桂枝枳實生薑湯	四四	走馬湯	五一
枳實薤白桂枝湯	四五	扶苓飲	五二
橘皮枳實生薑湯	四五	延年扶苓飲	五二
橘皮竹茹湯	四五	溫膽湯	五二
橘皮湯	四五	六物黃芩湯	五三
竹葉石膏湯	四六	黃連解毒湯	五三
芎歸膠艾湯	四七	五蒸湯	五四
旋覆花代赭石湯	四七	溫脾湯	五四
赤石脂禹餘糧湯	四八	檳榔湯	五四
桃花湯	四八	唐侍中檳榔湯	五四
酸棗仁湯	四八	烏頭檳榔湯	五五
黃土湯	四八	黑豆湯	五五
桂枝芍藥知母湯	四八		

犀角吳茱萸湯	五五	麻子仁丸	六二
續命湯	五六	八味丸	六二
小續命湯	五六	栝蒌瞿麥丸	六三
三物黃芩湯	五七	赤丸	六三
三黃湯	五七	乾薑人參半夏丸	六三
木茱湯	五七	桂枝茯苓丸	六四
三和散	五七	大黃蟄蟲丸	六四
涼膈散	五八	己椒藶黃丸	六五
升麻散	五八	備急圓	六五
犀角地黃湯	五九	礬石丸	六六
逍遙散	五九	歸母苦參丸	六六
薤苳湯	五九	紫圓	六六
透膿湯	六〇	硝石大圓	六七
搜風解毒湯	六〇	平水丸	六八
赤小豆湯	六〇	滾痰丸	六八
琥珀湯	六一	控涎丹	六八
赤小豆煎	六一	左經丸	六九
抵當丸	六二	十棗丸	六九
大陷胸丸	六二	五苓散	七〇

奇正方目錄

茵陳五苓散	七〇
豬苓散	七一
牡蠣澤瀉散	七一
葵子茯苓散	七一
土瓜根散	七一
瓜蒂散	七一
薏苡附子敗壞散	七三
天雄散	七三
排膿散	七三
當歸芍藥散	七三
蜀漆散	七四
桔梗白散	七四
四逆散	七四
消礬散	七四
蛇床子散	七五

奇正方

阿波賀古壽公山甫 著

桂枝湯

病人臟無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也○病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾

右二章桂枝湯常候但不須微粥溫覆求發汗者也

桂枝三

芍藥三

甘草二

生薑三

大棗十二枚

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓適寒溫服一升此服法之正也服已須臾

飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時計遍身絳熱微似有汗者益

佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若

不汗更服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡若病重

者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若不汗出者

乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物此活用桂枝湯於中風者乃法之奇也

太陽中風千金方作中風其脈「陽」浮而「陰」弱「陽」浮者熱自發陰弱者汗自出

「啻啻惡寒」浙浙惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者○太陽病頭痛發熱汗

出惡風者桂枝湯本和解新氣鬱結比乃常也若夫活用之於中風則微助藥力溫覆求發汗此乃法之奇也又運用之於裏證則和解拘攣腹痛等證乃如桂枝加芍藥湯同加大黃湯等之