

丹臺玉案

(下冊)



〔明〕孫文胤著

丹臺玉案

中國醫學珍本叢書

上海科學技術出版社

金壽山
吳文鼎

裘沛然
何傳毅

伯編選

刻本寬一五八×高二六〇毫米
板框寬一三九×高二一毫米

丹台玉案（上下册）

〔明〕孫文龍著

上海中醫文獻研究所古籍研究室選

上海中醫學院圖書館藏

上海科學技術出版社出版

（上海瑞金二路四五〇號）

上海發行所發行 上海市印刷七廠印刷

開本七八七×一〇九二 三十二開 印張三二·二五

插頁八 字數一八〇,〇〇〇

一九八四年十一月第二版 一九八四年十一月第一次印刷

統一書號：一四二一九·一六九三 定價：精裝八·五五元

丹臺玉案卷之四

明新安休邑後學孫文胤對薇父

嵎峨縣令友生游士進旂揚父較正

平湖縣庠盟弟俞允昌爾迪父

全閱

仁和縣庠兄有緒武卿父

諸血門

吐血 便血 尿血 血汗 血潛
鼻血 五竅出血

血乃水穀之精化於脾生於心藏於肝布於肺施於
腎。善調攝者不妄作勞則血之運於身者無一息之
停。自然肌膚潤澤筋脉和暢何病之有。後生少年輩

待其壯盛。恣情酒色。而貧窮勞苦之人。又不暇自惜。涉遠負重。奔走於衣食。而無日夜之安寧。其能不傷於血乎。傷於上部。則胃臆痛。傷於中部。則兩脇中脘痛。傷於下部。則小腹痛。由是吐血。衄血。便血。尿血之病作矣。夫吐血與衄血無異。但所由之經不同。而要之皆累於脾也。脾能裹血。不能使血之不升。胃火上蒸。則血從口出。肺火上騰。則血從鼻出。然有輕重之差焉。衄血太甚。始於吐血。無異不甚不足爲慮也。至於吐血。雖不甚。而實爲可畏。用藥者其可以混訛耶。

夫吐血固甚於衄血矣。而就其吐血言之。則亦有輕重如一咯一塊者。胃口血也。其所從來者近。痰中見血色如瑪瑙而成塊者。亦胃口血也。其所從來者。亦近。二者勢若可畏。而猶可調理。法當任其自出。又必看其色不鮮者。舊血也。勿以藥止之。其色鮮者。新血也。所積者必不甚多。宜以藥止之。蓋舊血終不歸經。不任其自出。及於增劇。新血終當歸經。若所出者多。則損人矣。故宜藥止之。以引血歸經。此皆可以調理而愈者也。若痰中見血。或一點之小。或一絲之細。

語其勢若無可畏。而病根反深。此血非胃口之血也。乃從肺臟中來。肺爲虛火所逼。血從痰出。故也。其所以少者何也。蓋肺臟以氣爲主。本多氣而少血。是以所出者亦少也。肺臟之血本少。又火逼而出之。則肺以枯。而無以領一身之氣矣。所害不亦大乎。至於五竅出血者。勢如潮湧。耳目口鼻一齊逆流。藥不及煎。針不及下。歿在頃刻間。此猶血症之至極者也。醫者豈可無急治之法。若夫滲入腸間。從下部而出。則爲腸風。爲臟毒。爲溺血。其病易治。非若上焦之血也。又

有從汗孔出者。爲肌衄。從舌出者。爲舌衄。從委中穴出。爲腠血。皆有治法。諸血見若身熱脉大者。難治。是火邪熱甚也。身涼脉淨者。易治。是正氣復也。治法未見血。則宜消。宜和。旣見血。則宜涼。宜止。舊血未盡。則化其血。新血未盡。則補其血。因其勢之輕重。而爲緩急之施。則無不中矣。若婦人崩漏。女子月信。則自見本科。而此不及載云。

脉云

失血之症。脉皆見芤。芤在何經。血亦從何經。只宜微

細不宜浮大。訣云。鼻衄吐血沉細宜。忽然浮大必傾危。

立方

涼血抑火湯 治吐血衄血初起氣盛上逆不能下

降歸經

當歸

赤芍

各二錢

大黃

三錢

黃芩

黃連

丹皮

生地

川芎

各一錢五分

燈心三十莖臨服加藕汁半杯

必勝飲

治男子婦人血妄流溢或吐或衄血并

皆効驗。

生地

當歸

各三錢

川芎

一錢

蒲黃

炒黑二錢

小薊

取汁半酒梧

加烏梅五箇空心服

茜根散 治吐血衄血錯經妄行并婦人月信不止。

茜草

阿膠

各二錢蛤粉炒

側柏葉

炒過一錢

生地

甘草

黃芩

各一錢五分

加童便半酒梧溫服。

犀角地黄湯 治怒氣傷肝積熱不散鬱於經絡隨

氣湧泄。爲吐血衄血便血等症。并各經宜加錄後。

懷生地

犀角

丹皮

赤芍

各二錢

加童便半杯空心服。

心經血加麥冬黃連。

肝

經血加青皮黃芩。

脾經血加百合白芍。

肺經

血加百部天冬山梔。

腎經血加知母黃栢玄參

青蒿。

膽經血加柴胡竹葉。

胃經血加乾葛大

黃。

心胞絡血加茅根丹皮。

大腸經血加槐花

地榆。

小腸經血加山梔側栢木通。

膀胱經血

加茅根牛膝。

三焦血加地骨皮連翹。

吐血不

止。陳棕灰炒黑荊芥穗。蓄血不消。加桃仁七黃。

四生丸 治血熱妄行吐咯不止。

生栢葉

生荷葉

生地黄

生艾葉

各等分

四味共搗極爛。丸如芡實大。每一丸白滾湯下。

保真神應丸

治男婦吐血咳嗽氣喘痰涎壅盛骨

蒸潮熱。面色痿黃。日晡面熾。睡臥不寧。服之神效。

遼五味

揀淨一觔

杜仲

薑汁炒

阿膠

白朮

各二兩

貝母

白茯苓

花椒目

荷葉

煨灰存性

懷生地

各四兩用栢子仁三錢砂仁三錢絹袋盛之入生地同煮

棟去栝子
仁砂仁

右爲末以黑棗肉同地黄汁搗爲丸。每服三錢空
心白滾湯下。

急濟飲 治吐血如泉之甚一服立止

小薊

搗汁

童便

磨墨汁 藕汁

各半
鍾

沉香

磨一
錢

作二次緩緩呷下。

神寶飲 治風邪入於胃經下血鮮紫及腸胃濕毒

下如豆汁一

蒼朮

白朮

人參各五錢 茯苓

當歸

白芍

川芎

槐角炒黑各一錢五分

升麻一錢

水煎食前服。

槐花散 治腸風臟毒下血。

扁栢葉炒黑 槐花

枳殼炒 荊芥穗炒黑各等分

右爲末。每服三錢。空心白滾湯下。

對金飲 治大腸下血。

黃連

槐花

蒼朮各一錢二分

甘草

白朮

厚朴

枳殼

陳皮

藿香

當歸

升麻

水煎食前服。

栢灰散

治臟毒下血諸藥不効。

側栢葉

取發春東夏南秋西冬北煨灰存性

每服二錢空心滾湯調下。

仙露飲

治小便出血

生地

蒲黃

黃連

升麻

各二錢

小蓟

旱蓮草

川芎

各一錢

水煎空心服。

又方

當歸

川芎

各一錢五分

益母草

阿膠

人參

劉寄奴

龍膽草

荊芥穗

各二錢

水煎溫服。

固元湯

治血從毛孔中出。名曰血汗。此元氣不足。

人參

五味子

各五錢

黃耆

甘草

棗仁

各二錢

水煎溫服。

又方 治血汗初起。

人中白

二錢

人參

一兩

麝香

半分臨服加入

水煎溫服。

靈秘散 治偶然抓傷血絡血出不止名曰血潛若

不急救血盡卽危。

糞桶箍

煨灰三錢

胎髮

煨灰一錢

煮酒餅上紙

煨二錢

右爲末和勻摻上卽止再服犀角地黃湯。

方見前

寸金散

治鼻衄不止。

黃藥子

五錢

土馬糞

五錢有足者生占牆上多有之