

全國醫藥衛生技術革命展覽會資料彙編

驗方

全國醫藥衛生技術革命展覽會 編

人民衛生出版社

全国医药卫生技术革命展览会资料汇编

驗方

开本: 850×1168/32

印张: $5\frac{5}{8}$

字数: 97 千字

全国医药卫生技术革命展览会 編

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京苍龙街出版委员会印刷 局字第C四六号)

• 北京崇文区禄子胡同三十六号 •


北京市印刷一厂印刷 • 新华书店發行

统一书号: 19048·1839

定 价: 0.38 元

1958年12月第1版 第1次印刷

(北京版)印数: 1-20,000



目 录

内 科

預防流感	1	癰病	20
流感	1	精神病	20
感冒	2	癲癇病	20
疳腮	2	上呼吸道感染	21
腮腺炎	3	大叶性肺炎	21
乙型腦炎	3	支氣管肺炎	22
傳染性肝炎	3	肺膿腫	22
狂犬病	5	浸潤型肺結核	22
白喉	5	肺膿瘍	23
急性扁桃體炎	6	肺結核	23
流行性腦脊髓膜炎	6	滲透性肺結核	23
預防痢疾	7	肺結核大咯血	24
細菌性病疾	7	咯血	24
急性細菌性病疾	7	支氣管哮喘	25
急性阿米巴痢、急性細菌性病	8	哮喘	25
預防瘧疾	8	寒喘	26
男性原發性高血壓	9	氣喘	26
高血壓(肝陽)	9	咳嗽	27
半身不遂	13	消化性潰瘍	27
中風	13	胃潰瘍	28
中風后肢體癱瘓	14	胃、十二指腸潰瘍	28
偏癱	14	十二指腸潰瘍	29
面癱	14	胃病	29
言語困難	15	胃、十二指腸病	29
顏面神經麻痺	15	肝胃氣痛、月經痛	30
神經衰弱	16	胆結石	30
神經衰弱——失眠	18	慢性潰瘍性結腸炎	31
多夢	18	中毒性消化不良	31
頭暈	19	慢性腹瀉	32
虛勞	19	肝硬變	32
		慢性肝炎	34

單腹脹、水腫	35
心臟病	35
風濕性關節炎	36
慢性關節炎	37
關節炎	38
關節疼痛	39
單純性甲狀腺腫	39
腎炎	39
慢性腎炎	40
慢性腎炎水腫	40
浮腫	40
尿路結石	41
結石症	41
腎結石、輸尿管結石	41
尿道結石	42
尿潴留	42
遺尿症	42
陽萎	43
攝波腺液溢出症	43
血吸虫病	43
囊虫病	43
象皮腫(血絲虫病)	44
蟯虫病	44
糖尿病	45
再生不良貧血	46
再生障礙性貧血	46
原發性再生障礙性貧血	48
大衄(紫斑病)	48
過敏性紫癜症	48
出血	49
太陽灸	49

外 科

脫骨疽	50
外傷感染	50
局部丹毒	50
乳腺炎	50

癰疽	51
癰疽瘡瘍	51
癰疽惡瘡	52
癰病及慢性毛囊炎	52
九疳十八串	53
深部膿腫	54
蜂窩織炎	54
直腸后膿腫	54
癰腫	54
熱瘡癰腫	55
疔毒	55
疔瘡癰毒	55
脫疽	56
破傷風	56
口腔炎	57
潰瘍性口腔炎	57
口腔急性疾患	58
口腔潰瘍	58
頑固性口腔炎	58
潰瘍性口炎	59
走馬牙疳	60
鵝口瘡	61
闌尾炎	61
腸癰(急性闌尾炎)	62
痔瘡	63
內痔、混合痔	64
肛瘻	65
骨與關節結核	66
肋骨結核	67
療癰	67
淋巴腺結核	68
頸淋巴結核	70
骨結核、淋巴腺結核	70
化膿性、非特異性瘻管	71
結核瘻孔	71

鶴膝風	72
食道癌	72
髌大肌坐骨囊腫	72
腱鞘囊腫	73
精索胚胎性瘤	73
骨折	73
瘀血、骨折	74
陈旧性肩关节脱位	75
慢性扭伤挫伤	76
燙伤、外伤、化膿性炎腫	76
燙伤、燒伤	77
燙火伤	77
燙伤	77
冻瘡	78
鵝掌瘋	78
鵝眼	79
鵝眼、疣目、胼胝	79
脚气	80
脫髮	80
汗斑、雀斑	80
灰指甲	81
各种蛇咬	81

兒 科

小兒麻疹症	82
小兒惊癇	84
預防嬰兒癲癇	85
小兒流感与上呼吸道炎症	85
預防麻疹	85
預防百日咳	86
百日咳	86
小兒喘息性支气管炎	88
小兒傳染性肝炎	88
嘔吐	89
小兒腹瀉	89
小兒消化不良	89
小兒疳積	90

疳積	90
小兒胃炎	90
小兒蟻虫症	91

婦 科

婦女性高血压	92
妇女胸腹脹痛	92
月經病	93
月經不調	93
白帶	93
引产	94
催奶	94
产后乳汁不足	94
阿米巴原虫性陰道炎	95
滴虫性陰道炎	95
陰部搔痒	96
子宮頸癌	96
子宮頸上皮样癌	96
子宮頸糜爛及不育症	97

五 官 科

火眼	98
树枝狀角膜潰瘍	98
角膜翳障	98
視網膜出血	99
視神經萎縮	99
色盲症	100
耳疾(聾子例外)	101
美尼尔氏病	101
咽吧	102
聾啞症	102
先天性聾啞症	102
慢性副鼻窦炎	103
慢性萎縮性鼻炎	103
鼻衄	104
酒糟鼻	104
咽炎、喉炎	105

喉头肌麻痹症..... 105

皮膚性病科

神經性皮炎..... 106

皮炎..... 107

癬..... 108

頑癬..... 108

头癬..... 108

体癬股癬..... 109

慢性湿疹..... 109

小兒湿疹..... 109

急性泛發性湿疹..... 110

白癬..... 110

白癬、疣..... 110

梅毒..... 111

楊梅結毒..... 112

內 科

預 防 流 感

云南双柏县法敏委甸区中医联合診所

处方 金銀花树(火炮干)3錢 避瘟丹1錢 柏树叶2錢
生姜1錢 酸木3錢 秀灵丹3錢 吳萸2錢。
用法 开水煮服(成人用量)此方冬季用。

流 感

云南双柏县法敏区中医联合診所

处方 生姜1錢 秀灵丹3錢 葛根3錢 野苕苕2錢 鷄
屎藤2錢 馬尾連1錢 升麻2錢 吳萸1錢
用法 开水煮服(成人用量)此方春季用。

流 感

云南双柏县法敏委甸区中医联合診所

处方 大全麻根2錢 野馬媽花(要叶嫩尖)2錢 馬栗树皮
(去粗皮)3錢 松树皮(去粗皮)3錢 秀灵丹2錢 生姜1錢
柏枝叶2錢 酸木瓜2錢
用法 开水煮服(成人用量)此方夏秋兩季用。

流 感

云南双柏县法敏委甸区中医联合診所

处方 升麻2錢 毛貞草根2錢 秀灵丹3錢 薄荷1錢

秧草根2錢 松树皮(去粗皮)3錢 楊馬媽樹(嫩尖)2錢 生姜1錢

用法 開水煮沸(成人量)此方春季用。

感 冒

河南省中醫院

方名 救焚丹

主治 流行性感冒，風濕溫病，無名高燒及久熱等症。

處方 牛筋草根4兩 瓦松根3兩 眞藕粉4兩 生甘草2兩 羚羊角3錢 薄荷霜7錢

制法 以上五種藥，研細過羅，再研至無聲，裝瓶中待用，每兩救焚丹，加入薄荷霜五分研一處用。用完后臨時再摻再研，恐多配出用不完，則薄荷霜揮發無氣(替代藥：如羚羊角缺貨，可用香文草穗2兩代之，香文草即土名星星草，與本草藥典之星星草同名異物，尤當記之)。

服法 每服5厘至1分，每日三服至六服，重者十二次即愈。

疖 腮

成都市中學院附屬醫院

處方 1.內服：羌活1錢 荊芥2錢 防風2錢 連翹3錢 大力3錢 薄荷2錢 桔梗2錢 銀花2錢 元參3錢 板藍根3錢 黃連1錢 黃芩3錢 僵蚕2錢 姜黃2錢 花粉3錢 甘草1錢

煎取濃汁，成人一日分3次服完，小孩分4至6次服完，每隔4小時，晝夜服更好。

2.外敷：金黃散(花粉10兩 白芷2兩 姜黃5兩 黃柏5兩 大黃5兩 蒼朮2兩 南星2兩 厚朴2兩 甘草3兩)

用法 共為細末，蜂蜜調敷，略加溫開水每日一次。

疗效 2—3天即可全愈, 51例, 100%治愈。

腮 腺 炎

天津药物研究所传染病医院

处方 板蓝根片, 每片含生药1.5—2克, 每次吃5—6片, 成人剂量小兒減半(約十克合4—5錢), 每4小时吃一次, 每日吃4—6次。

疗效 一千多例全部治愈。吃3—4天就好。

乙 型 腦 炎

成都市第一人民医院

主治 乙型腦炎后遗症双目失明。

处方 杭菊3錢 枸杞1錢半 炒淮药3錢 炒熟地1錢半 沙参2錢 白芍1錢半 谷精草3錢 炒丹参3錢 云神3錢 石斛3錢 女贞2錢 炙甘草1錢 潼蒺藜3錢 磁硃片3片

有好轉后, 因食慾不振, 大便帶瀉, 用前方加減增入和中之品。

傳染性肝炎

中医研究院

治法

1. 急性黃疸期: 茵陳蒿湯, 梔子柏皮湯, 茵陳五苓散, 胃苓湯等。有高热加甘露消毒丹。
2. 肝脾腫大者: 化堅丸, 青蒿鱉甲湯, 柴胡桂枝湯為主。
3. 消化功能障礙者: 八正散, 溫胆湯, 胃苓湯。
4. 肝功能不良者: 化堅丸, 溫胆湯加健胃藥。

傳染性肝炎

廣西南寧工人醫院

方名 雞骨草。

處方 雞骨草每日量為2—4兩與等量之瘦豬肉或豬肝，同放於沙鍋內，煮沸後用微火煎2—3小時，然後將肉湯分三次服，草不服，小兒量減半。

傳染性肝炎

安徽省蕪湖專署醫院中醫師 張必烈

方名 茵陳苡米湯。

處方 茵陳佛手各3錢 廣皮2錢 豬茯苓各2錢 苡米6錢 紅棗5個 冰糖一兩

加減法 嘔吐加蔻壳、藿香，腹部膨加厚朴，大腹皮，發熱加連翹、黃芩，腹瀉加車前子，澤瀉，咳嗽加竹茹、貝母、荊芥，肝大久不消，加何首烏、當歸、白芍、青皮、鼈甲、柴胡。

用法 小兒分2次服，不滿週歲小兒減去一半劑量，成人加三分之一。

傳染性肝炎

廣西南寧市工人醫院

配方 將干燥雞骨草(根、莖、葉)每日量2—4兩加等量瘦豬肉和適量水共煎，水沸後小火煎2—3小時，分3次內服。(成人量)小兒量減半。

療效 於1956年5月開始用此草治療傳染性肝炎，經病例觀察，治愈率達95%以上，自覺症狀消失迅速，最快3天，最慢14天，

平均 7 天, 黄疸消失平均为 15 天, 肝功能恢复平均 21 天。

狂 犬 病

安徽省阜陽專署醫院

处方 馬前子 1 个 当归 3 錢 荆芥 2 錢 滑石 3 錢 王不留 3 錢 地骨皮 2 錢 甘草 1 錢 木通 2 錢 丹皮 2 錢 防風 2 錢 車前子 3 錢 灶心土 5 錢 用河水共煎。

用法 服藥前用生杏仁 1 兩研末, 开水冲服, 再續服前藥 1—2 剂。后期發狂者, 可先服生杏仁 2 兩, 續服前藥 3—4 剂即癒。癒后百物不忌。

功效 本院用治初期 2 例, 后期發狂者 1 例, 均癒。

白 喉

常州市中醫院 趙新华

方名 飞仙遙。

处方 薄荷 西瓜霜 煅月石 西黃 甘遂 蒲西黃 濂珠 大梅。

用法 上藥共研細末至無声为度, 每隔 2 小时向喉部吹一次。

疗效 本品使用后, 在 2—3 天内假膜完全消失。

白 喉

陝西省西安市傳染病院

方名 白喉散。

处方 牛黃 2 分 珍珠 琥珀 梅片 硃砂各 3 分 血竭 象皮 龙骨 兒茶 乳香 沒藥各一錢 五倍子 1 兩

制法 首將珍珠微煨，五倍子焙黃。其餘均為原生藥分別研為細末，過細篩，稱量混勻，裝入瓷瓶備用。

用法 用吹粉器將“白喉散”噴撒于咽及扁桃腺有假膜處約5—15分鐘，令患者漱口。一日噴撒2—3次。每次用藥2—3回。每次劑量視假膜大小而增減。至症狀消失細菌陰性為止。

急性扁桃體炎

重慶市第二中醫院

方名 鐵板吹喉丹。

治療原則 辛涼解表，驅風化痰，消炎鎮痛，清熱解毒，局部吹鐵板吹喉丹為主，輔以內服中藥。

處方 鵝管石 飛雄黃 山慈菇 百草霜 西牛黃 上麝香 白馬勃 燈心灰 銀珠 梅片 掃粉 青黛

療效 318例，治癒率達85.87%。

流行性腦脊髓膜炎

安徽省蕪湖市第一人民醫院

方名 清溫安腦湯。

處方 生石膏、干地黃各4錢—1兩 天麥冬 4錢 生甘草 1錢 京元參、金銀花各4錢 淡豆豉、連翹殼各3錢 粉丹皮 1錢半 京赤芍、生梔子各二錢 至寶丹一粒先化服。

服法 每日一劑，煎兩次分服。

加減法 1. 得微汗後，除淡豆豉。神志清醒後，除至寶丹。神志清醒，如體溫稽留不降，可考慮再服至寶丹。

2. 角弓反張，能側臥不能仰臥者加粉葛根3錢。

療效 治癒率達95.9%。

預防痢疾

云南双柏县法脰区中医联合診所

处方 大拔毒散 3 錢 菖蒲 2 錢 方白叶 3 錢 黃龍尾 3 錢
大薊 2 錢(即紅蘭花牛口刺) 梗米 2 錢

用法 即用根開水煮熟(成人量)孕婦勿服。

預防痢疾

云南双柏县委甸法脰区中医联合診所

处方 松樹皮 3 錢 楊梅樹皮 3 錢 橄欖樹皮 3 錢

用法 三味去外粗皮開水煮熟(成人用量)。

細菌性痢疾

西安軍醫大學

方名 茶葉。

处方 10% 茶葉煎劑服 15 毫升，一日四次；2% 茶葉煎劑，保留灌腸 200 毫升，一日一次。

療效 共治療 26 例(慢性者 20 例)，24 例治癒。

說明 以瓜片茶最好，紅、青、碧綠茶亦有效。

急性細菌性痢疾

駐××部隊總醫院

方名 茶葉煎劑。

处方 以茶葉煎劑 2 毫升，每六小時服一次。

制法 用茶叶 100 克置煎器中(最好是陶器)加蒸馏水, 約 7 倍, 煮沸 20 分鐘, 用精制棉過濾, 趁热將濾液濃縮至 75 毫升, 放冷加醇, 使全量成 100 毫升即成。(以茶叶与黃連对比, 抑菌效价, 杀菌效价, 以及症狀消失情况, 均比黃連优越。)

疗程 以 7—10 天为一疗程。

疗效 共治疗 20 例全部治愈, 無副作用。

急性細菌性痢疾

重庆市第一工人医院 李中才

疗法 針刺。

穴位 天樞(双)、关元。時間 10—15 分鐘, 每日一次, 只針不灸。

疗程 平均六天。

疗效 計 37 例, 治疗率达 100%。

急性阿米巴痢、急性細菌性痢

上海提籃桥区中心医院

方名 白头翁湯片。

处方 白头翁 黃柏 黃連 秦皮。

制法 上药等量磨粉混合, 以 70% 乙醇为溶媒, 用重滲漉(法做成流浸膏, 經低温收回乙醇, 然后在水浴上濃縮成浸膏, 加淀粉及阿拉伯膠压成片剂, 每 3 片中含每种生药各 2.5 克。

疗效 病例 123, 疗效 100%。

預防瘧疾

云南双柏县法脰区中医联合診所

处方 鏽球草 3 錢 挖耳草根 3 錢 虎掌草根 3 錢

用法 挖耳草根米泔水洗淨土炒，虎掌草用根，鏽球草用莖根。開水煮服（成人用量），孕婦忌服。

男性原發性高血壓

上海中醫學院附屬第十一人民醫院

方名 臭梧桐。

處方 用開花前鮮臭梧桐葉及莖陰干磨粉軋片。

服法 日量10—16克，分3、4次服完。

療效 一般服藥5週血壓顯著下降。血壓下降後，每日服維持量4—8克。在430例中，療效達72.6%。

高血壓（肝陽）

安徽省淮南礦工醫院

方名 桑葉膏。

主治 頭目眩暈，血壓升高，甚至面熱如醉，引起手足麻木。

處方 鮮桑葉2斤（干桑葉亦可）

制法 加水4斤，煎取十分之七的水去渣，微火濃縮成膏約2斤。

服法 每服1兩，日服3次。或和白糖矯味，亦不影响療效。

療效 試治5例，3例基本獲癒，2例症狀改善。

高 血 壓

處方 將蚯蚓洗滌，置蒸籠內蒸熟，烘乾（溫度以60—70℃為宜）後，研成粉末，過篩，制成粉劑，丸劑，或膠囊。

用法 每日3次，每次10粒，丸劑或膠囊含量。

高 血 压

中医研究院

疗法 針灸。

穴位 曲池、足三里、合谷、三陰交、風池、丰隆、血海、湧泉。

手法 开闔补瀉或呼吸补瀉，强而短的刺激。

高 血 压

安徽省安庆市人民医院中医师 赵松年

方名 稀龙丸。

处方 藕蕒草 10 兩 夏枯草 10 兩 龙胆草 1 兩 5 錢。

制法 以上三味，共研細末，煉蜜为丸如柏子大。

服法 每服 3 錢，一日二至三次。

疗效 40 余例高血压患者服后有效，除自觉症狀減輕外，血压亦逐漸下降。

高 血 压

上海市第三人民医院

方名 牡丹皮。

处方 牡丹皮 1 兩 5 錢，用水煎成溶液口服。

疗效 81.5%，一般服藥一週血压显著下降。

高 血 压

湖南常德护士学校 李偉成

处方 龙胆草 6 錢 黄芩 6 錢 夏枯草 5 錢 杜仲 6 錢。制

流浸膏者加菊花2錢。

制法 先將藥物洗淨晒干，切碎(菊花、夏枯草不需切)，各置于瓷盆內，用60%酒精(比例是1:3)浸24小时或48小时，去渣后，用蒸餾法收回酒精，再將以上五味浸出液体分別過濾，各煎成需要濃度(杜仲煎液煎至10—20分鐘后，放入固体石蜡，使之溶解、冷却后取出石蜡使之除去杜仲膠質后，再煎至一定濃度)，然后混合即成高血压合剂流浸膏。所需要量：即一市斤中药获流浸膏160毫升(等于每錢一毫升)。

用法 每日二次，每次20毫升，每10天为1疗程。

疗效 治高血压13例疗效显著，不但使血压逐步下降，相应的各种症狀，如头暈、目眩等亦随之消失。

高 血 压

黑龙江省祖国医药研究所

处方 1. 生赭5錢 生龙骨4錢 生牡蠣4錢 怀牛膝4錢 大生地6錢 生石决4錢 寒水石4錢 生石膏5錢 紫石英5錢 菊花3錢 鈎藤3錢 甘草2錢

2. 龙胆3錢 黄芩3錢 山枝3錢 大黃1錢半 川羌3錢 防風2錢 川芎2錢 西归3錢 荆子3錢 薄荷2錢 甘草2錢

3. 当归3錢 生地5錢 桃仁3錢 枳壳2錢 紅花2錢 赤芍3錢 柴胡3錢 川芎2錢 桔梗2錢 怀牛膝3錢 甘草2錢

4. 安神丸 每日三次，每次服一丸。

高 血 压

方名 血得平。

处方 西瓜350斤 紫桑椹50斤 生杜仲50斤 槲寄生