


实用中草药 彩色图集

第二册

罗献瑞 主编
广东科技出版社



102258

实用中草药彩色图集
第二册

主编 罗献瑞
编写 罗献瑞 黄淑美 吴德邻
程用谦 林有润 卫兆芬
陈邦余 阮云珍 刘 明
绘图 邓盈丰 余汉平 邓晶发
余 峰

广东科技出版社

C0187779



粤新登字 04 号

2014/25

实用中草药彩色图集
第二册

主 编：罗献瑞

责任编辑：陈 岩

出版发行：广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

排 版：广东科电有限公司

经 销：广东省新华书店

印 刷：广州彩色印务有限公司

规 格：787×1092 1/3 16.125 印张 455 千字数

版 次：1993 年 12 月 第 1 版

1996 年 4 月 第 5 次印刷

印 数：75 501—95 600 册

ISBN 7-5359-1105-6/R · 202

定 价：38.00 元

内容简介

本图集以实用为宗旨，故植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，并取图文对照形式编排。全书共收载中草药 720 余种，彩图 730 余幅，分三册出版。第一册收录 207 种，以华南地区常用中药为主，其中相当部分为该地区习惯用药，故有一定的地区特色。第二册收录 230 种，全为植物药，主要是我国南部、东部和中部疗效较确切的民间草药和部分中药，故该册对热心研究民间草药的人士特别有用。第三册收录 280 种，其中动物药约 80 种，矿物药约 40 种，并于植物药中选收我国产名贵中药近 20 种以及部分进口药材。这些内容在通常所见普及性中草药书籍中尚不多见，故可补其不足。

编 写 说 明

1. 本册编写体例和第一册相同。
2. 本册中的《药典》系指一九九〇年版《中华人民共和国药典》一部。

目 录

一、全草类	1	石上柏	46
一枝黄花	2	石见穿	48
丁葵草	4	石仙桃	50
九层塔	6	田基黄	52
九节茶	8	白花丹	54
九里明	10	白眉草	56
九头狮子草	12	半边旗	58
三白草	14	半枝莲	60
土茵陈	16	半边莲	62
广东土荆芥	18	甘茶蔓	64
马鞭草	20	仙鹤草	66
马齿苋	22	塘葛菜	68
大飞扬草	24	羊蹄草	70
大金牛草	26	自扣草	72
大驳骨丹	28	血见愁	74
小飞扬草	30	防风草	76
山薄荷	32	红水葵	78
火炭母	34	红丝线	80
天香炉	36	过天网	82
凤尾草	38	声色草	84
水蜈蚣	40	荠菜	86
六耳铃	42	泽兰	88
毛麝香	44	佩兰	90
		狗肝菜	92

败酱草	94	入地金牛	152
金钱草	98	三颗针	154
金丝草	100	川芎	158
青香薷	102	干姜	160
鱼腥草	104	山白芷	162
虎耳草	106	山海螺	164
茵陈	108	山豆根	166
香薷	112	山芝麻	168
浮萍	114	大茶药	170
珍珠菜	116	土党参	172
倒扣草	118	土茯苓	174
荷莲豆	120	土地骨	176
铃茵陈	122	土萆薢	178
透骨消	124	广东狼毒	180
崩大碗	126	广东土牛膝	182
萹蓄	128	木香	184
葫芦茶	130	牛膝	186
鹅不食草	132	天麻	188
辣蓼	134	天南星	190
锦地罗	136	天葵子	192
矮地茶	138	五加皮	194
墨旱莲	140	风沙藤	196
磨盘草	142	毛冬青	198
瞿麦	144	五指毛桃	200
二、根和根状茎类		仙茅	202
	147	玉竹	204
了哥王	148	白芍	206
八角枫	150	白蔹	208

白薇	210	商陆	270
白芷	212	常山	272
白毛蛇	214	章表皮	274
白药子	216	蛇泡勒	276
白背叶根	218	黄马胎	278
百合	220	黄花倒水莲	280
当归	222	猕猴桃根	282
华山矾	224	紫菀	284
地蒼根	226	藁本	286
硃砂根	228	糯稻根	288
竹节参	230	露兜根	290
红大戟	232	三、茎、枝和树皮类	
附子	234		293
鸡骨香	236	七叶莲	294
岗稔根	238	九里香	296
岗梅根	240	飞天蟠螭	298
走马胎	242	小通草	300
走马箭	244	小驳骨丹	302
牡丹皮	246	三丫苦	304
虎杖	248	方梗宽筋藤	306
金锁匙	250	古山龙	308
姜黄	252	丢了棒	310
独活	254	合欢皮	312
重楼	256	过岗龙	314
柴胡	260	血风藤	316
莪术	262	杜仲	318
穿破石	264	苦木	320
铁包金	268	苦棟皮	322

垂丝柳	324	水翁花	376
青风藤	326	辛夷花	378
胆木	328	闹羊花	380
络石藤	330	茉莉花	382
通草	332	剑花	384
海桐皮	334	扁豆花	386
宽筋藤	336	蚌花	388
圆过岗龙	338	凌霄花	390
救必应	340	密蒙花	392
猴耳环	342	旋覆花	394
紫花杜鹃	344	蒲黄	396
椿皮	346	六、果实和种子类	
漆大姑	348		399 ~
藤杜仲	350	八角茴香	400
四、叶类	353	土花椒	402
小野鸡尾	354	山橙	404
竹卷心	356	小茴香	406
江南柏	358	马钱子	408
芙蓉叶	360	马兜铃	410
苦灯茶	362	水红花子	412
青蒟叶	364	水杨梅	414
枇杷叶	366	石榴皮	416
胡颓子叶	368	龙眼肉	418
假蒟叶	370	光皮木瓜	420
五、花类	373	芡实	422
千日红	374	豆蔻	424
		赤小豆	428
		青葙子	430

胡椒	432	蒺藜	462
荜茇	434	鹤虱	464
桂木干	436	荜澄茄	466
枳椇子	438	七、树脂和其它类
鸦胆子	440		469
牵牛子	442	儿茶	470
急性子	444	天竺黄	472
决明子	446	安息香	474
预知子	448	虫白蜡	476
莱菔子	450	八、藻类和菌类	479
菟丝子	452	马勃	480
梔子	454	石耳	482
猪仔笠	456	肉海藻	484
蛇床子	458	银耳	486
番石榴干	460		

一. 全草类



一枝黃花

来源 本品为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的干燥全草。

原植物 一枝黄花(图1)为多年生草本，高达60厘米或过之，通常约35~45厘米；茎单一，不分枝或少分枝，紫红色。叶互生，下部叶常椭圆形或披针形，长4~7.5厘米，基部渐狭，边缘有锯齿，具长柄，上部叶无柄或具短柄，全缘或近全缘。头状花序鲜黄色，直径5~8毫米，常1~4个聚于一腋生短的总梗上或多数结成带叶的顶生圆锥花序式；总苞片狭，数层；花秋冬至翌春开放，舌状花一层，雌性，管状花多数，两性；花托无毛。瘦果长约2毫米，冠毛白色。

生于路边、草地或林中空地上。分布我国中部、东部、南部和西南部。

采收加工 秋季花果期采挖全草，除去泥沙，晒干。

药材性状 本品全长30~100厘米。茎圆柱形，直径0.2~0.5厘米，黄绿色、灰棕色或暗紫红色，有直线纹，上部被毛，基部簇生根须；质脆，易折断，断面纤维质，有髓。叶多皱缩或破碎，完整叶片展平后呈椭圆形或披针形，长4~7厘米，基部骤狭下延，全缘或有不规则疏锯齿。头状花序直径约0.7厘米；总苞片数层，卵状披针形；舌状花为黄色，但常脱落，多皱卷扭曲。瘦果细小，冠毛黄白色。气微香，味微苦、辛。以叶多、色绿者为佳。

性味和功用 微苦、辛，平。疏风清热，抗菌消炎。用于感冒，急性咽喉炎，扁桃体炎，疮疖肿毒。用量9~15克。



图 1 一枝黄花

丁 葵 草

别名 人字草。

来源 本品为蝶形花科植物丁葵草 *Zornia diphyllea* (Linn.) Pers. 的干燥全草。

原植物 丁葵草(图2)为一年生矮小草本；茎纤细，由基部分枝，披散或直立，高15~40厘米。叶为具1对小叶的复叶；小叶卵状长圆形或披针形，长8~15毫米，顶端渐尖，基部歪斜，两面无毛；托叶狭披针形。春末开花。总状花序长2~6厘米，有花2~10朵；苞片卵形；萼5裂，上2裂片下部合生，2侧裂片较小；花冠黄色，长8~10毫米，旗瓣近圆形，翼瓣倒卵形或长圆形，龙骨瓣内弯；雄蕊1组，花药2型，5枚为基着药，5枚为背着药。蒴果具2~6稜节；稜节近圆形，径约2毫米，有小针刺。

生于旷野或田间。分布广东、海南、广西、浙江、江西、福建、四川和云南等省区。广布于全世界各热带地区。

采收加工 夏、秋季采收。拔取全株，抖净泥沙，晒干。

药材性状 全草长约10~30厘米。茎丛生，纤细，黄绿色，无毛。小叶2片，生于叶柄顶端，人字形，小叶片长圆形至披针形，灰绿色，厚纸质，长0.5~1厘米，宽0.2~0.4厘米，顶端有一小刺尖，全缘，下面疏被毛或无毛，具黑色腺点；托叶卵状披针形。气微，味淡。以叶多，色绿者为佳。

性味和功用 甘，凉。清热解毒，祛瘀消肿，用于感冒高热，急性肠胃炎，黄疸，痢疾，小儿疳积，咽喉炎，眼结膜炎，乳腺炎，跌打肿痛，疔疮肿毒，毒蛇咬伤。用量10~30克。外用适量，煎水熏洗或捣敷患处。




图 2 丁葵草

九 层 塔

来源 本品为唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* Linn. 的干燥带果穗全草。

原植物 罗勒(图3)为一年生直立草本，高通常30~80厘米；主根圆锥状；茎方柱状，上部被倒生微柔毛，绿色或染紫色。叶对生，纸质，卵形至卵状长圆形，长2.5~5厘米，宽1~2.5厘米，顶端钝或短尖，基部渐狭或楔尖，边缘有不规则牙齿或近全缘，两面无毛；叶柄长约1.5厘米，上部常有狭翅。花夏季开放，紫色或白色，排成顶生总状花序；苞片小，常有颜色；花梗在结果时明显下弯；花萼阔钟状，长约4毫米，萼管短，檐部上唇中裂阔大，近圆形，内凹，边缘下延至萼管，下唇裂片披针形，具刺状尖头；花冠长约6毫米，唇片外面被微柔毛，上唇近相等的4裂，下唇长圆形，全缘，下倾；雄蕊4，后雄蕊花丝基部有齿状附属体，花药汇合成1室。果萼长达8毫米，脉纹显著，下倾；小坚果卵珠状，长2.5毫米，黑褐色，种脐白色。

野生于村边、路旁和旷野，亦有栽培。我国除西藏、甘肃、青海、宁夏等少数省、区外几乎各地均有分布。亚洲、非洲和美洲温暖地带均有。

采收加工 夏、秋季形成果穗时采收全株，抖净泥沙，晒干，扎成小把。

药材性状 本品全长40~80厘米。茎方柱形，直径0.3~0.5厘米，老茎达1厘米，紫色或黄紫色，有倒生柔毛；折断面纤维状，有白色的髓。叶片多已脱落。花数朵簇生于茎枝上部节上，宿萼黄棕色，间断排列成5~9层，故称九层塔。气芳香，有清凉感。以茎细、果穗长、气芳香者为佳。

性味和功用 辛、温。归肺、脾、大肠、胃经。疏风解表，祛风消肿，散瘀止痛，活血通经。用于外感头痛，食胀气滞，胃脘痛，跌打损伤，蛇虫咬伤，湿疹瘙痒。常用量5~10克；外用适量，煎浓汤熏洗患处，或用鲜草捣汁外敷。

附注 疏毛罗勒 var. *pilosum* (Willd.) Benth. 和巨罗勒 Var. *majus* Benth. 均为罗勒的栽培变种，广东等部分省区作香料植物栽培，能否入药，未见记载。



图3 罗勒