

怡 堂 散 记

清·许豫和著

项长生 点校

怡堂散记 序言

曹序

《橡村痘诀》一书，予既读而序之矣。橡村先生以医名吾乡，固不特善治小儿，更不特痘症。予颇疑橡村胡不尽出所学为寿世资，而仅使蒙其庥者在小儿也？今橡村又出书一册，曰《怡堂散记》，分上、下二卷，又《痘诀余义》一卷，予受而读之。其书列病症，详医方，以已所临治有验者，悉书其原委曲折，各加论辩，以与古相发明。盖进而上焉，不独使幼孤得遂长矣。予不知医，窃怪岐黄以降，其书几汗牛充栋，学者习焉而守其法足矣，胡为作者代兴，必各矜创获，迭擅神奇，乃以成救世之效？以是知理之无穷，而其法亦随时有异也。夫《灵》、《素》经书，千古不易。而天地气化，人生稟赋，随时为厚薄。且南北异宜，山川间隔，一郡一乡气感各别，即一乡之中又随世变转，而寒热水旱之不齐，错出乎其中。吾见今之疾不必同古之疾也，又况药物之产随地气变迁，或同一名而古今迥殊，或犹是一物而前人审验未真，久而益辨者而谓第执成言，遂可自足也哉！橡村博览古书，相时症之变，融会变通而出之。其于药物皆细加考验，谓“必使吾之精神与药之气味，两相融洽而后药为我用”。其用力也勤，其用心也诚矣！今不敢自秘，将出以广其传。吾不知此书果尽今之病症及治法与否，传之后来又有因时而变更者与否，要其有益于时者固已多也。又况杂采群书，俾知人物之生与天地阴阳相消息，推气化之原，以正性命之养，尤邃然通道术之要，而士君子所当深致体验者哉！板焉而试其功用，吾见较前刻之大而远也，于是乎言。

嘉庆二年岁次丁巳秋九月竹溪曹文埴拜手①

①署名下有“清宫太保大司农”印及“曹文埴”印。

怡堂散记 目录

序 言

卷 上

卷上序目：

散者，无头无绪不整不齐之谓。老医临症数十年，终日应酬不暇，得心应手之处，思欲记之，有时研砚而客至，有时执笔而饭熟，于是失者十之七。心之所向，欲舍不能，随时记忆，存于腹稿，大概不在途中则在枕上，此诊治之散记也。讲习古方，节录名言，蒐罗于寒夜，是涉猎之散记也。记虽不多，类而推之，其理不外是矣。

风痰七条	1
惊风发搐六条	2
春杪夏初多见发热不退之症治之屡验因记之	3
论暑月吐泻初起须用黄连香薷饮七条	4
甲辰秋时痢甚计其所见复论症记之二十六条	5
杂治得心随录可为法者二十二症	8
方脉治验随录十五症	15
病可治病家不知信任者录四	20
见而不能治者录四	21
见闻事实录四	22
妇人病	23
看虎口	24
小儿常有之病	24
幼科少见二症	25
华先生《中藏经》论治	26
喻嘉言先生议病式	27

与门人定仪病式	27
医家必读全《经》始知治法	28
诊治杂言	29
又论治体	30

卷 下

卷下序目：

读古人书全在得解，咽咏读过虽多何益？临病制方要从古法，不由规矩何以为工？医之为道，实万世岐黄之道，所言者天下之公言，非一家之私论。偏执之流，不以人命为重，各私其学于家，气候不分，寒热不辨，执守一方，终身行之而不悟，受其害者，何可胜纪？予欲唤转迷途，不辞苦口，将古人未畅之旨，醒出一二，启悟后来。愿学者，临症推详，以求合乎先贤之治，计其效验，归之大公，由是而深造逢原，私心自涤矣！

“肾者主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛乃能泻”解	32
脾主长夏说	32
秋伤于湿辨	33
肝藏魂肺藏魄	34
肝沉而肺浮	34
邪之所凑其气必虚	34
三阳结谓之隔	34
伤寒小解十条	35
阳常有余阴常不足	37
大家论治八条	38
又录名言六条	39
制方之难	40
七方之制	40
千金参麦汤	41
桂附八味丸	42

阴八味.....	42
六味丸.....	42
逍遙散.....	42
滋腎丸.....	43
玉屏風散.....	43
五苓散.....	44
地黃飲子.....	44
清燥湯.....	44
補中益氣湯.....	45
清暑益氣湯.....	46
葛花解醒湯.....	47
枳术丸.....	47
六一散.....	48
青蒿丸.....	48
火花膏.....	49
舉卿古拜散.....	49
因病制方.....	49
藥性解.....	50
人参	51
地黃.....	53
肉桂.....	54
附子	54
炮姜	54
白附子.....	55
款冬花.....	55
大黃	56
陳皮	57
厚朴	57
天麻	57

桑寄生	57
龙骨	58
黄土	58
盐	58
姜 枣	58
辰砂 琥珀	59
饭膏	59
甘草	59
节录名言医者当识	59
续刻落成喜而占此	60

怡堂散记 卷上^①

风 痰 七条

风痰一症，乳儿最多，四时皆有。大概冬春之交宜温散，荆、防、甘、桔、橘、半、生姜、杏仁、苏子之类；夏令宜清散，杏仁、牛蒡、栀子之类；秋令宜清润，枳壳、瓜蒌之类；冬令严寒，有用麻黄汤而解者。肺为娇嫩之脏，总宜疏解，不得妄投丸散。

肺虽喜润，胃中湿痰宜燥。小儿乳腻生痰，外症有鼻水，多涕泪。二陈为治痰总剂，合之前胡、桔梗、荆、防、苏子、枳壳、麦芽、杏仁之类，或加生姜、葱白，结者散之，保赤之善也。

肺喜润，润之中亦有分辨，如杏仁、苏子温而润者也，宜于冬春；杏仁、牛蒡散而润者也，宜于夏；杏仁、瓜蒌则清而润者矣，宜于秋燥，能知此等界限则用药不杂。

瓜蒌一味能发呕，易滑泄，乳儿无用瓜蒌之理。谷食之儿，燥火伤肺，嗽久不止乃可用之。

半夏毒轻，姜汁制而陈者性平，故可入君子汤；南星毒烈，实非良药，制以牛胆之苦寒，病久胶结或可少投，时行感冒无可用之理。竹沥、姜汁之润下，海石之咸能软坚，尤非风痰可轻试者。

书云：蚕与马并属午火，在卦为离，主心。又云：蚕食而不饮，性燥，得湿则腐，得风则僵，故能宣风化痰，辛温之药也，

①下署“古歌许豫和宣治氏著同侄培根树人侄孙震桂执之校”。
男培矿铸人

风寒闭结者宜之，痰热结聚非所宜也。

肺为贮痰之器，只有开提一法为化解之用。世俗之化痰丸徒伤胃气耳。至若王隐君之礞石滚痰丸，为治顽痰怪症而设，于小儿有何干涉！

风痰乳滞，小儿轻病，不从疏解，而事丸散，杀儿实多，目睹心伤，为之苦口。

惊风发搐六条

辛亥首春，婴幼多惊风之患，此天行之病，气候使然。经曰：己亥之岁，上见厥阴，厥阴司天，其化为风。

小儿纯阳之体，冬月伏阳在内，生痰生热，乘春气而病发，惊风作矣。医家视其色脉，察其虚实，当为之清痰热，平肝风，则风熄而热平。粗工昧此，但持通套之方，予见用荆防柴葛者，病不能除而加甚，用羌活者一服而惊厥不回。因制对症之方，取效甚多，示以为法：

连翘 赤芍 炒山梔 天麻 钩藤勾 橘红 半夏 代赭石
茯苓 甘草

加灯心、金器同煎。

肝以散为补。荆、防、柴、葛皆疏散肝风之药，肝家有郁热，宜用以疏达肝木。病逢春旺，若再达之，是助纣为虐矣，故一概疏肝之品，皆叱不用。连翘、赤芍、山梔、灯心泻心肝之蕴热，所谓实则泻其子也；天麻、钩藤所以平肝，代赭、金器所以镇肝，肝木既平，惊风自熄；再加二陈以开痰结而保脾土，盖风木旺则脾土自亏，泻其太过，补其不及。药虽平淡无奇而功用切当，未可移植他时者。医贵变通，必先岁气，举此可为法也。

凌氏子，患惊风，大便下青黄沫，日五六次，本方加白术、车前、冬瓜仁去灯心，二剂愈；仰氏子，惊作，日夜十余次，加辰砂、琥珀二分，二剂愈；毕氏子，摇头目窜，战栗不宁，加菊

花、桑寄生，二剂愈；茶园孙氏子，手足反张，面青咬牙，加羚羊角、川芎，二剂平，去灯心、山梔，再加当归、白芍，二剂愈；王氏子，食入作呕，除梔子、灯心、赤芍，加白术、藿香，二剂愈。此皆春二三月病也。

风木之旺冬至，后甲子日为始。经曰：“巳亥之岁，上见厥阴，厥阴司天，其化为风。”风令最早，小儿得春气之先，风胜则动，其病为搐。

岁气之病，各有所主。此专言巳亥之岁。如子午之岁，上见少阴，少阴司天，其化为火，火则旺于夏，钱氏泻心、导赤为对症之方；丑未之岁，上见太阴，太阴司天，其化为湿，民病吐泻、风痉、胃风，胃苓、羌活胜湿之类，甚则加黄连，又为对症之药也。

春杪夏初多见发热不退 之症治之屡验因记之 七条

小儿纯阳之体，四月为纯阳之月，若乾之上九，六阳皆魂，小儿时感，多有发热不退之病。幼科用药，无非发散消食，甚致乱投丸散，胃气为药所伤，病不能去，食减人困，累成慢惊者有之。凡病已得汗，表既开而热不退，二便皆利，里无阻滞而热又不退，再发什么表？消什么食？予遵钱氏诀，制救阴煎，从时令上用药，经所谓“必先岁气，毋伐天和”者是也。八九月秋燥亦宜之。

生地 丹皮 麦冬 陈皮 茯苓 甘草

此方止六味，而归重救阴。外见有风症再加柴胡、防风，惊惕加钩藤勾，嗽加桔梗、杏仁，有痰或呕加半夏、苏子，吐乳加麦芽，泄加神曲、泽泻，大便不出加梨汁，小便不利加山梔、木通，唇红舌疮加连翘、山梔、贝母，午后夜间热甚加青蒿、地骨。

论暑月吐泻初起须用黄连香薷饮 七条

长夏暑湿当令，脾土受病，暴感时行之气，多有发热吐泻者。吐泻里症也，发热汗出表症也，口渴心烦，表里俱病，黄连香薷饮为对症之药，一服可平，再服可愈。庸俗不明此理，例用疏散消食通便之方，药病不合，徒伤正气，吐泻不止，精神已困，额热指冷，目陷神脱，虽名暑风，实与慢惊同类。病家恐骇，每每更医。医有见其额热、口渴，暑症犹在而用黄连者，有见其发热、指冷，表症犹在而用香薷者。不知吐泻大作，胃气暴伤，故目眶陷而四肢冷；暑邪内陷，故内热、口渴、心烦。其治法与初病不同。初病正气未伤，可服黄连香薷饮，故一服而效；及待胃气既伤而始用，是用于不可用之时也。一见目眶陷、四肢冷、长虫出，虽有额热、口渴、心烦等症，总以六君扶正为主；体素实者，少加土炒黄连于剂内；若囱门陷、面㿠白，体素虚者，虽有热症，六君子只加扁豆花、黄土水甘寒之品，以清脾胃之暑。一切金石等丸摒弃不用，庶几十救三三。若汤丸乱投，十不救一矣！长夏秋初，小儿患此者，岁岁皆然。予前有参连饮之论，又有黄土稻花汤之论，皆属后起之功，点破机关，莫若黄连香薷饮劈头一服之为愈也。

新定黄连香薷饮

香薷 黄连 厚朴 麦芽 生扁豆 木瓜 陈皮 半夏 茯苓 甘草
分两量儿大小。

暑伤脾胃，解暑为急。故用香薷从外一升，黄连从里一降，药之扭力，二味为主，剂之偶者也；厚朴、麦芽以平胃气，扁豆、木瓜以和脾气，二陈和胃以行痰，水湿伤脾之症，何患不除？临症虽有加减，亦宜斟酌，不可轻易变乱，万万！

未至盛暑，霉月湿甚，多有风湿夹食之症，发热吐泻，又宜

香砂平胃、藿香正气等方。黄连香薷是暑热之药，风湿非所宜也。

暑邪初感，病气方盛，虽体质素虚，亦宜劈头一服，盖清急于补也。病经多日，目陷肢冷，虽有热症未除，亦宜六君扶正，盖补重于清也。

四肢冷不得用黄连，泻痢皆然。尤当视唇舌，唇舌绎红干渴，四肢虽冷亦有用黄连者，是用黄连又当以唇舌为准。壮热烦渴，吐泻初作，黄连生用。吐甚者姜汁炒，泻甚陈土炒，皆有分辨。

单吐而不泻者最恶，宜加代赭以镇逆。泻而不吐无热症，六君不能止者，钱氏益黄散是为对症之药。凡止泻，丸散优于汤剂，宜备用。

加减钱氏益黄散

青皮(醋拌炒)三钱 白术(土炒)五钱 木香(面裹煨)三钱

诃子肉(同左)四钱 炙甘草三钱

共为细末，磁瓶收好，或用六君调下，或炒米水调下。

甲辰秋时痢甚计其所见

复论症记之 二十六条

河间云：下痢红白，俗谓赤热白寒者，非通作湿热处治。又云：寒则不能消谷，何由反化为脓也？又云：俗言寒热相兼，其说尤误。寒热异气，岂能俱甚于肠胃而同为病乎？通作湿热处治，此定论也。

问：下痢之本，必由夏伤于暑，常见时气传染，感而病作何也？

予曰：是人肠胃中本有伏暑兼有停滞，时气相引则病作。我无伏暑，何患时气？

问：下痢脓垢，白如豕膏，此何物也？

予曰：是肠胃中脂膏也。俗名刮肠痢，热逼肠胃，如刀刮而

下也。肠胃脂膏以厚为贵，刮则腹痛，腹痛则作努，而所下无多，非糟粕是脂膏也。刮多则肠薄。洁古云：宣黄连厚肠胃而止痢。玩“厚”字之义，自知刮肠之病也。

问：河间言“通作湿热处治”，古名家治案亦有用姜附而愈者何也？

予曰：此伤于瓜果生冷，或食烧炙之后饮冷贪凉而成，故其初起以温药佐之效。若屡进，必加甚矣。

凡痢疾身热脉大者不治。予重用芩、连一二服，热渐减，脉渐平者，续用调中之剂亦愈。

唇红口渴者不治。有用黄连、乌梅者，有用人参白虎者，但得应药，即有转机。

见食即呕不治。《名医类案》云：方荫山治一小儿，八岁患时痢，日夜百度，食入即呕。以面作饼炙熟，分二片，以一片中空之，用木鳖子三个去壳捣烂，加麝少许，填入饼中，贴脐下，软帛系定，外用热鞋底熨之。待腹中作响，喉中有香气，即思食，食少进。是夜痢减半，三日后渐愈。予用此法治噤口痢多验，胜于用田螺多矣！

渴而思酒者不治。渴之甚，茶水不能解，故思酒。呕甚作哕声者不治。呕之声短，哕则其声重大而长。胃中空则邪热干之，实作呕作哕。呕出长虫者亦不治，皆验。

目陷神脱者不治。额汗指冷者不治。若欲救之，急用四君加木香、干姜，此芩连之过剂也。

长虫下多者不治。胃气败，虫不得安也。

粪门如竹筒者不治。茎头起白点者不治。

痢多曰肠胃热甚。有口角鼻门疮烂者，有腮肿牙疳臭烂者，有身发紫斑者，有肛门湿烂作痒者。此等见症，皆由初起不善治而得，或误服辛热药亦有之，与伤寒狐惑胃烂发癧同类，不治之症也。若欲救疗，急须白虎汤加黄连。

下痢脱肛，有虚有实。虚者略努便脱，色淡而不甚肿，宜补中

益气汤，陷者举之。肛门痈肿，努甚脱出，色如紫李，身热脉大，此为湿热下逼，芩、连、山栀佐以理气升提之味。

肛门脱出不宜见风、洗冷水，犯之则难收。有痢止而肛不收者，湿水频洗，软帛托入，再用石榴皮煎水洗之，或用热醋沃新布折坐亦好。

用药有三法：霉令长夏湿胜于热，治宜从湿；入秋则热胜于湿，宜清热；秋深久亢则湿气尽消，燥气方胜，用药不宜燥利，盖痢甚津液既伤，燥与利皆损液之药也。

霉令湿胜，用平胃散加防风、葛根以升清气，少佐芩、连以清热，山楂、神曲行滞。一二剂后，再加赤芩、泽泻、车前以渗之。

入秋热胜，初宜柴、葛以升清，芩、连以泄热，厚朴、槟榔、木香以通肠胃之壅闭，车前、木通以导其湿热；食滞不行，神曲、山楂、麦芽以化之；腹痛甚，芍药、甘草以和之。热势稍平，然后芩、连可退，再加和胃之品。

发于秋深久亢，口渴唇燥，舌起黑煤者有之。津液大伤，贫士无力服参，予尝用沙参、麦冬、生地、甘草以生津液，少加芩、连以泄热，白芍、木香以和血行滞，变燥为润，因乎时也。痢有噤口刮肠之辨：噤口者，治在胃；刮肠者，治在肠。噤口者，得食便定；刮肠者热不除，虽能食亦死。盖脓垢从肠中刮下，始而肠薄，渐致肠化，湿热蕴于肠中，如痈脓之腐烂而化出也。

肠刮而腐化者多属小肠，故红痢，腹痛甚，痛甚则肠断而死，以大肠肥厚而小肠薄嫩也。

小儿夏月暑湿之热客于营卫，结成痒疖。入于肠胃则为泻痢。痢之红白如疖之脓血，脓血不尽则疖必不收，红白不尽，痢必不止。

其时疮疖并作者数人，皆用和解行滞之剂。疖先止，痢亦渐减。惟惊与痢并作者竟不能救。

溪南吴氏子，六岁，园中随赏桂花，其夜发热腹痛，天明下痢，上午惊作，连下数行。延予至已二更矣，急入诊视，额汗指冷，脉息已绝。后数日又一三岁子，亦于夜间发热腹痛，天明惊作，旋下白冻。延予至，见其病难救，不忍坐视，勉与平肝风、扶脾土之剂，六君加柴胡、钩藤、山梔、白芍、木香、车前，一服而惊稍定，二服而食稍进，但腹痛下痢不减，第三日清晨连下数行而脱。予所见惊与痢齐作者竟不能救。有惊定热退而后痢作者，又在可治之例。

有痢后作惊者，脾土亏败，肝木生风，亦不治之症。

痢后多有浮肿肚胀之患，大概服芩连之后，热症既除，寒症续起，四肢冷，皮色白而光亮者是也，总以补脾去湿为主，不得用辛热药。

有痢止未久而复作者，腹痛后重，粪后有脓血，名休息痢。此湿热伏于曲肠之中，最难速止。予用补中益气汤加白芍、木香、茯苓、车前子之类，多愈。

杂治得心随录可为法者二十二症

家虞部奕皇侄之孙，周岁，盛暑时病壮热烦呕有汗，是暑邪为患。初与香薷饮一剂，热不退，烦渴加甚。予曰：“时逢酷暑，热甚，宜加黄连。”服药后热稍平而症不减，呕渴人困，头抬不起，此热伤正气也。热甚务在必清，正气为热所伤，亦须急固。方用人参、麦冬、陈皮、半夏、茯苓、甘草、黄连、梔子、竹叶心煎服。次日精神起而热犹不退。予曰：“精神起则人参可除，热不退者清凉之力薄，当以生水之味佐之乃克有济”方用生地、丹皮、麦冬、黄连、山梔、石膏加以二陈和胃，连进二服，热退神安，烦渴皆定。小儿纯阳之体，暑为阳邪，最伤心脾二脏，热而烦者心受之，热而呕渴脾胃又之也。心受之则黄连、山梔，胃受之则石膏、竹叶。纯阳之体，无阴以制则热不能退，

故用生地、丹皮、麦冬生水以济阳，黄连得其滋助而功始倍，更加二陈以和胃而胃气不伤，病因以愈。此症热经七日，认症的确，药有次第，故得以收功。使病家少有纷更，则变生不测矣。

风暑合病为暑风。暑喜伤心，风喜伤肝，此但有暑而无风，故虽热而惊不作，予故不用风药。

儿体本不虚，忽而神困者，是正气为热邪所伤，只宜泻热。人参只用一剂后即徐之，且大便二三日一次，里气不虚，若再用人参，必助邪为患矣。用药当见机者此也。

热退旬日，忽然又发呕渴如前，以俗情言，必曰复感。予曰：“此胃家余热未尽，天气过亢，余热复聚。”用养阴和胃稍加石膏。二剂而平。

奕皇侄之孙女，九岁，风湿发丹，遍身瘙痒三日，丹发未透，热未退，大便多日不解，腹痛，此寻常小病也。与疏托利湿消食之剂。其夜忽发惊风，目直大叫，手足搐搦，唇口连掣，少停又搐，一夜十余次，举家惊愕。延予至，初视之不解其故，再四推求，外无新感之风邪，内有未泄之湿热。据侍者云，因高处猫跳而受骇惊，由是而作。予曰：“脾经湿热断无作惊之理，因于惊则脾家所蕴之热乘惊而入于肝胆，是脾移热于肝病之变者也。此病在脾为湿，入肝则为风，肝得惊，风病斯作矣。其治法当疏肝胆之风，泄脾土之湿，表里一通，庶几骤解，稍迟病深则难救矣！为处一方：羌活、防风、天麻、钩藤、姜虫、全蝎、当归、赤芍、枳壳、大黄、山梔、木通、甘草，共十三味，其法盖合泻青丸、牵正散、四顺清凉三法，以成疏肝泄闭之方。一服而表里双解，其病如失。

义呈朱嗣琦兄孙，病春温，五朝大热不退，头痛烦渴，脉大，恶人与火，阳明邪热甚也。与小剂白虎汤。初用石膏三钱不效，加至五钱，又不效，病亦不加，但人倦耳。其家请易方，予曰：“药对症故病不加，药力轻故病不减，据症而论，无可易也。”用熟石膏一两、知母二钱、甘草五分、粳米二钱，再一剂

而热退。治麻痘石膏宜生用，《伤寒》方中石膏宜煅用。

胡旭如兄孙女，六岁，春中患发热头痛，呕吐，脉大，唇红如硃。予曰：“此胃热呕吐也。”用陈皮、半夏、茯苓、甘草、知母、石膏、粳米、煎一剂，愈。此病初作而用对症之药也。

汪利宾兄孙，发热呕吐，食少出多，长虫出自目眶陷，必烦不宁。方春木气旺，上冲于胃，宜泻肝和胃。用橘红、半夏、茯苓、甘草，加代赭二钱、水芦根五钱、黄连三分，一剂愈。泻肝热而用黄连，实则泻其子也。

岩镇潘氏子，十岁，壮热五日不退，目窜反张，头额红肿。医作惊风治，用牛黄抱龙等丸不效。请予治，诊其脉大。予曰：“此太阳风症，无汗为刚痉，今额上红肿，兼湿毒上攻，当从太阳处方。”用羌活五分，秦艽一钱。连翘、赤芍、苍术各八分，荆、防、蝉退、木通各六分，酒炒桑枝一钱。一剂病减十之三，二剂病减十之七。除去羌活、苍术，加入钩藤、菊花、炒栀子、马料豆，又二剂而痊。

岩镇方氏子，周岁，深秋无外症，夜间忽然吐乳一口，随发惊搐二次。初服表药一剂，搐不作，无热症，但夜间烦吵。又服广东抱龙、牛黄等丸，乳食如常，六日不大便。六日后又复发搐抽，出大便青黄色，微有痰，一连三日，抽掣无时。搐定时安卧能乳，不发热。请予治，予曰：“惊搐不由外感，无寒热痰食之患，此病从内发也。发时吐乳一口者，时方食乳，冲涌而出，非吐乳也。外症面色青，肝病也，手掣头摇，肝木生风之象。颐肿筋现，目生脂，唇口红，皆火象也。小儿纯阳之体，先天不足，不能制火，加之秋燥，衣棉早，郁遏太过，热从内生，上冲肝胆而作搐。病自内生，当从内治，用平肝养阴之剂。”生地、丹皮、麦冬、炒栀子、陈皮、茯苓、泽泻、钩藤、代赭，一剂。服药后胸中嗳气，微有痰声。食乳后涌出痰二口，此隔间有阻滞。次日用分治之法：早用橘红、半夏、茯苓、石膏、石菖蒲，少加生姜，先服半杯以开其痰；午后用六味加参、麦，陆续夜服，搐虽