

傷寒貫珠集

(清) 尤在涇 註

**伤寒贯珠集**

清 尤在泾 注

(原大东、上卫版)

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所发行 上海日历印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6 字数 109,000

1937 年 2 月第 1 版 1959 年 9 月新 1 版 1978 年 2 月第 3 次印刷

统一书号: 14119·110 定价: 0.58 元

# 目錄

## 卷一 太陽篇上

辨列太陽條例大意	一
太陽正治法第一計三十三條	二
太陽病脈證三條	二
桂枝湯脈證七條	四
桂枝湯方	四
桂枝湯禁三條	八
麻黃湯脈證七條	九
麻黃湯方	九
合病證治六條	一
葛根湯方	三
葛根加半夏湯方	三

黃芩湯方	三
黃芩加半夏生薑湯方	三
白虎湯方	四
辨傷寒受病陰陽不同一條	四
太陽病愈時日及欲解之候與傳經之證六條	四
太陽權變法第二計二十三條	六
不可發汗例十條	六
桂枝二越婢一湯脈證一條	九
桂枝二越婢一湯方	九
桂枝麻黃各半湯脈證一條	九
桂枝麻黃各半湯方	九
合論桂枝麻黃各半湯桂枝二麻黃一湯桂枝二越婢一湯三方	一
大青龍湯脈證二條	二

大青龍湯方	三
小青龍湯脈證二條	三
小青龍湯方	四
十棗湯證治一條	五
十棗湯方	六
五苓散證治一條	六
五苓散方	七
表實裏虛四逆湯先救裏一條	七
四逆湯方	七
陽微先汗陰微先下隨脈施治一條	七
調胃承氣湯方	八
傷寒裏虛法先補裏二條	八
小建中湯方	九
炙甘草湯方	九
結陰代陰脈法一條	〇

太陽幹施法第三計三十一條	〇
服桂枝湯後證治六條	〇
桂枝二麻黃一湯方	一
白虎加人參湯方	三
桂枝去桂加茯苓白朮湯方	三
甘草乾薑湯方	三
芍藥甘草湯方	三
發汗後脈證治法十五條	四
桂枝加附子湯方	四
桂枝加芍藥生薑人參新加湯方	四
桂枝甘草湯方	五
真武湯方	六
茯苓桂枝甘草大棗湯方	七
厚朴生薑甘草半夏人參湯方	七
芍藥甘草附子湯方	八

麻黃杏仁甘草石膏湯方·····	三九
發汗吐下解後病脈證治三條·····	四〇
旋覆代赭石湯方·····	四〇
茯苓桂枝白朮甘草湯方·····	四一
太陽傳本證治七條·····	四二
茯苓甘草湯方·····	四三
桃核承氣湯方·····	四三
抵當湯方·····	四四
抵當丸方·····	四五

卷二 太陽篇下

太陽救逆法第四計六十三條·····	四六
論結胸臟結之異三條·····	四七
論結胸及痞之源一條·····	四七
論結胸證治十條·····	四七

大陷胸湯方·····	四八
大陷胸丸方·····	五〇
小陷胸湯方·····	五一
文蛤散方·····	五一
三物白散方·····	五一
痞證七條·····	五三
大黃黃連瀉心湯方·····	五四
附子瀉心湯方·····	五四
半夏瀉心湯方·····	五五
生薑瀉心湯方·····	五五
甘草瀉心湯方·····	五七
懊憹煩滿證治六條·····	五八
梔子豉湯方·····	五八
梔子甘草豉湯方·····	五八
梔子生薑豉湯方·····	五九

梔子厚朴湯方	五
梔子乾薑湯方	六〇
下利脈證五條	六〇
葛根黃連黃芩湯方	六二
桂枝人參湯方	六二
赤石脂禹餘糧湯方	六三
下後諸變證治八條	六三
桂枝去芍藥湯方	六四
桂枝去芍藥加附子湯方	六四
桂枝加厚朴杏仁湯方	六四
柴胡加龍骨牡蠣湯方	六五
誤汗下及吐後諸變脈證十三條	六七
乾薑附子湯方	六九
茯苓四逆湯方	六九
黃連湯方	七〇

火逆十條	七三
桂枝甘草龍骨牡蠣湯方	七五
桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯方	七五
桂枝加桂湯方	七六
太陽類病法第五計三十三條	七六
溫病一條	七六
風溫一條	七六
瘧病七條	七六
桂枝加葛根湯方	七九
濕病五條	八〇
風濕四條	八二
桂枝附子湯方	八三
甘草附子湯方	八三
喝病三條	八四

霍亂十一條……………九五

四逆加人參湯方……………六六

理中九方……………六七

四逆加豬膽汁湯方……………六九

飲證一條……………九〇

瓜蒂散方……………九〇

卷三 陽明篇上

辨列陽明條例大意……………九

陽明正治法第一計四十九條……………九

陽明府病證十二條……………九

調胃承氣湯證四條……………九

小承氣湯證二條……………九

小承氣湯方……………九

大承氣湯證九條……………九

大承氣湯方……………九

合論三承氣湯方……………一〇〇

白虎加人參湯證三條……………一〇一

陽明經病脈因證治十一條……………一〇三

陽明病風寒不同證治八條……………一〇五

吳茱萸湯方……………一〇六

卷四 陽明篇下

陽明明辨法第二計二十四條……………一〇九

表裏虛實生死之辨九條……………一〇九

豬苓湯方……………一一〇

陽明可下不可下之辨十五條……………一一三

蜜煎導方……………一一七

豬膽汁方……………一一八

麻仁丸方……………一一八

陽明雜治法第三計九條……………一二八

發黃證治七條……………一二八

茵陳蒿湯方……………一二九

梔子檉皮湯方……………一三〇

麻黃連軹赤小豆湯方……………一三一

蓄血證治二條……………一三三

### 卷五 少陽篇

辨列少陽條例大意……………一三三

少陽正治法第一計十六條……………一三三

少陽證一條……………一三三

小柴胡湯證九條……………一三四

小柴胡湯方……………一三四

少陽汗吐下之禁二條……………一三六

辨少陽邪氣進退之機四條……………一三九

少陽權變法第二計四條……………一三〇

柴胡桂枝湯證一條……………一三〇

柴胡桂枝湯方……………一三〇

柴胡桂枝乾薑湯證一條……………一三一

柴胡桂枝乾薑湯方……………一三一

柴胡加芒硝湯證一條……………一三一

柴胡加芒硝湯方……………一三一

大柴胡湯證一條……………一三三

大柴胡湯方……………一三三

少陽刺法第三計四條……………一三三

刺法四條……………一三三

### 卷六 太陰篇

辨列太陰條例大意……………一三五

太陰諸法計十條……………一三五



太陰藏病脈證治六條……………一三五

桂枝加芍藥湯方……………一三六

桂枝加大黃湯方……………一三七

太陰經病證治二條……………一三八

太陰經藏俱病一條……………一三九

太陰病愈期一條……………一四〇

### 卷七 少陰篇

辨列少陰條例大意……………一四〇

少陰諸法計四十五條……………一四〇

少陰脈證四條……………一四〇

少陰清法七條……………一四三

黃連阿膠湯方……………一四三

四逆散方……………一四三

豬膚湯方……………一四五

苦酒湯方……………一四五

甘草湯方……………一四五

桔梗湯方……………一四六

半夏散及湯方……………一四六

少陰下法三條……………一四六

少陰溫法十五條……………一四七

麻黃附子細辛湯方……………一四八

麻黃附子甘草湯方……………一四八

附子湯方……………一四九

通脈四逆湯方……………一五一

白通湯方……………一五一

白通加豬膽汁湯方……………一五一

桃花湯方……………一五二

少陰生死法十二條……………一五五

少陰病禁四條……………一五七

卷八 厥陰篇

辨列厥陰條例大意……………一五九

厥陰諸法計六十二條……………一五九

厥陰病脈證五條……………一五九

厥陰進退之機九條……………一六二

厥陰生死微甚之辨十五條……………一六九

厥陰清法五條……………一六九

白頭翁湯方……………一六九

麻黃升麻湯方……………一七〇

厥陰溫法十條……………一七〇

烏梅丸方……………一七一

當歸四逆湯方……………一七二

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方……………一七三

乾薑黃連黃芩人參湯方……………一七四

厥陰病禁二條……………一七四

簡誤九條……………一七五

差後諸病七條……………一七六

燒棍散方……………一七六

枳實梔子豉湯方……………一七六

牡蠣澤瀉散方……………一七九

竹葉石膏湯方……………一八〇

# 傷寒貫珠集

清 飢鶴山人尤怡在涇註

## 卷一 太陽篇上

### 辨列太陽條例大意

傷寒一證。古稱大病。而太陽一經。其頭緒之繁多。方法之龐雜。又甚于他經。是以辨之非易。然非不可辨也。蓋太陽之經。其原出之病。與正治之法。不過二十餘條而已。其他則皆權變法、斡旋法、救逆法、類病法也。假使治傷寒者。審其脈之或緩或急。辨其證之有汗無汗。則從而汗之解之。如桂枝、麻黃等法。則邪却而病解矣。其或合陽明。或合少陽。或兼三陽者。則從而解之清之。如葛根、黃芩、白虎等法。亦邪分而病解矣。此爲正治之法。顧人氣體有虛實之殊。藏府有陰陽之異。或素有痰飲痞氣。以及咽燥淋瘡汗衄之疾。或適當房室金刃產後亡血之餘。是雖同爲傷寒之候。不得竟從麻桂之法矣。于是乎有小建中、炙甘草、大小青龍及桂枝二麻黃一等湯也。是爲權變之法。而用桂枝、麻黃等法。又不能必其無過與不及之弊。

或汗出不徹。而邪不外散。則有傳變他經。及發黃蓄血之病。或汗出過多。而并傷陽氣。則有振振擗地。肉  
膈筋惕等證。于是乎有可更發汗。更藥發汗。及真武。四逆等法也。是爲斡旋之法。且也醫學久蕪。方法罕  
熟。或當汗而反下。或既下而復汗。以及溫鍼。艾灼。水瀝。種種混施。以致結胸痞滿。挾熱下利。或煩躁不得  
眠。或內煩飢不欲食。或驚狂不安。或肉上粟起。於是乎有大小陷胸。諸瀉心湯。文蛤散等方也。此爲救逆  
之法。至於天之邪氣。共有六淫。太陽受邪。亦非一種。是以傷寒之外。又有風溫。溫病。風濕。中濕。濕溫。中喝。  
霍亂等證。其形與傷寒相似。其治與傷寒不同。于是乎有桂附。朮附。麻黃。白朮。瓜蒂。人參。白虎等方。此爲  
傷寒類病法也。夫振裘者必挈其領。整網者必提其綱。不知出此。而徒事區別。縱極清楚。亦何適于用哉。  
茲略引大端于前。分列綱目于後。而仲景之方與法。罔不備舉。然後太陽一經。千頭萬緒。總歸一貫。比于  
百八輪珠。箇箇在手矣。六經倣此。詳見各篇。

## 太陽正治法第一

### 太陽病脈證三條

太陽之爲病。脈浮。頭項強痛而惡寒。

人身十二經絡。本相聯貫。而各有畔界。是以邪氣之中。必各有所見之證。與可據之脈。仲景首定太陽  
脈證曰。脈浮。頭項強痛。惡寒。蓋太陽居三陽之表。而其脈上額交巔。入絡腦。還出別下項。故其初病。無

論中風傷寒。其脈證皆如是也。後陽明篇云。陽明之爲病。胃家實也。少陽篇云。少陽之爲病。口苦咽乾目眩也。三陰篇云。太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。少陰之爲病。脈微細。但欲寐。厥陰之爲病。消渴。氣上衝心。心中疼熱。飢而不欲食。食即吐衄。暨本文共六條。遞舉六經受病之脈證。故柯氏目爲六經之綱領。而此則爲太陽之綱領也。然陽明條下無口乾惡熱之文。少陽證中無往來寒熱之目。少陰欲寐。僅舉一端。太陰厥陰。多言藏病。學者當參合他條。毋徒執一可也。

太陽病發熱。汗出惡風。脈緩者。名爲中風。

此太陽中風之的脈的證也。太陽篇中。原有傷寒、中風、風溫、溫病、中濕、風濕、濕溫、瘧喝等證。仲景蓋以諸病皆有發熱。皆能傳變。與傷寒同。其實所受之邪則不同。故特列而辨之。所以清傷寒之源也。王叔和氏分出瘧、濕、喝、三種。以爲與傷寒相似。宜應別論。其中風、風溫等病。仍彙太陽篇中。要之中風、風溫、溫病。雖並得稱傷寒。而其病發之狀。與治之之法。實與傷寒不同。叔和彙列于此者。又以正中風、風溫、溫病之始也。然詳仲景篇中。每多風寒互舉之處。似有不容分別而出之者。豈非以風寒之氣恆相兼。與陰陽之致可互參耶。余故以中風傷寒。並列于此。而風溫、溫病則隸于類病法下。遵先聖之旨也。至于汗出脈緩之理。成氏暨諸賢所謂風性解緩。而衛不外固者。肆矣。茲不復贅。

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。

此太陽傷寒之的脈的證也。與前中風條參之自別。蓋風爲陽邪。寒爲陰邪。陽氣疾。陰氣徐。故中風身

熱而傷寒不即熱也。風性解緩。寒性勁切。故中風汗出脈緩。而傷寒無汗脈緊也。惡寒者。傷於寒則惡寒。猶傷于風則惡風。傷於食則惡食也。體痛嘔逆者。寒傷于形則痛。胃氣得寒則逆也。然竊嘗考諸條。中濕風濕。並兼體痛。中風中喝。俱有惡寒。風邪上壅。多作乾嘔。濕家下早。亦成噦逆。故論太陽傷寒者。當以脈緊無汗。身不即熱爲主。猶中風以脈緩多汗。身熱爲主也。其惡寒體痛嘔逆。則以之合證焉可耳。不言無汗者。以脈緊該之也。此二條乃太陽病之條目也。

### 桂枝湯脈證七條

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。齋齋惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。

太陽中風者。陽受風氣而未及乎陰也。故其脈陽浮而陰弱。陽浮者。不待閉鬱而熱自發。陰弱者。不必攻發而汗自出。所以然者。風爲陽邪而上行。衛爲陽氣而主外。以陽從陽。其氣必浮。故熱自發。陽得風而自強。陰無邪而反弱。以弱從強。其氣必餒。故汗自出。齋齋惡寒。淅淅惡風者。肌腠疎緩。衛氣不諧。雖無寒而若不能禦。雖無風而常覺洒淅也。翕。越也。動也。盛也。言其熱時動而盛。不似傷寒之一熱至極也。鼻鳴乾嘔。不特風氣上壅。亦邪氣暴加。裏氣上爭之象。是宜桂枝湯助正以逐邪。抑攘外以安內也。

### 桂枝湯方

桂枝三兩去皮 甘草二兩炙 芍藥三兩 生薑三兩切 大枣十二枚擘

右五味咬咀。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已須臾。啜熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。遍身熱。微似有汗者。益佳。不可令如水淋漓。病必不除。若一服汗出病差。停後服。不必盡劑。若不汗。重服。依前法。又不汗。後服小促。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。禁生冷、粘滑、肉麵、五辛、酒酪、臭惡等物。

按風之爲氣。能動陽氣而泄津液。所以發熱汗自出。與傷寒之發熱無汗不同。此方用桂枝發散邪氣。即以芍藥攝養津氣。炙甘草合桂枝之辛。足以攘外。合芍藥之酸。足以安內。生薑、大枣、甘草相合。補益營衛。亦助正氣去邪氣之用也。蓋以其汗出而邪不出。故不用麻黃之發表。而以桂枝助陽以爲表。以其表病而裏無熱。故不用石膏之清裏。而用芍藥斂陰以爲裏。此桂枝湯之所以異於麻黃、大青龍也。服已須臾。啜稀粥一升餘。所以助胃氣。即所以助藥力。蓋藥力必藉胃氣以行也。溫覆令微汗。不使淋漓如水者。所謂汗出少者爲自和。汗出多者爲太過也。一服汗出病差。停後服者。中病即止。不使過之。以傷其正也。若不汗。後服小促。及服至二三劑者。期在必克。以汗出爲和而止也。仲景示人以法中之法如此。

太陽病。頭痛發熱。汗出惡風者。桂枝湯主之。

太陽受邪。無論中風傷寒。俱有頭痛。俱有發熱。但傷於寒。則表實無汗。傷於風。則表疎自汗。是頭痛發熱者。傷寒所同。而汗出惡風者。中風所獨也。中風必以風劑治之。云桂枝湯主之者。見非他藥所得而更者耳。

太陽病。外證未解。脈浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。

太陽外證。謂頭痛發熱惡風寒之屬。外證未解。宜從汗解。然必審其脈之強弱而施治。若脈浮弱。則是中風。陽浮陰弱之候。治宜桂枝湯。助正以逐邪。

太陽病。外證未解者。不可下也。下之爲逆。欲解外者。宜桂枝湯主之。

傷寒在表者宜汗。在裏者宜下。此大法也。是以外證未解者不可下。下之是病在表而攻其裏也。故曰逆。本論云。本發汗而復下之。此爲逆也。若先發汗。治不爲逆。此之謂也。而欲解外。則桂枝成法。不可易矣。仲景于當汗之證。隨示不可下之戒如此。

病常自汗出者。此爲營氣和。營氣和者外不諧。以衛氣不共營氣和諧故耳。以營行脈中。衛行脈外。復發其汗。營衛和則愈。宜桂枝湯。

此即前條陰弱者汗自出之意而發明之。謂營未病而和。則汗液自通。衛中風而不諧。則陰氣失護。宜其汗常自出也。夫營與衛。常相和諧者也。營行脈中。爲衛之守。衛行脈外。爲營之護。何有發熱惡寒之證哉。惟衛得風而自強。營無邪而反弱。邪正不同。強弱異等。雖欲和諧。不可得矣。故曰營氣和者外不



諸。不諧則豈特衛病而已哉。故欲營之安。必和其衛。欲衛之和。必逐其風。是宜桂枝湯助陽取汗。汗出則邪去而衛和。衛和則營不受擾而愈。

病人藏無他病。時發熱。自汗出。而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗則愈。宜桂枝湯主之。

人之一身。經絡網維於外。藏府傳化于中。而其爲病。從外之內者有之。從內之外者有之。藏無他病。裏無病也。時發熱自汗。則有時不發熱無汗可知。而不愈者。是其病不在裏而在表。不在營而在衛矣。先其時發汗則愈者。於不熱無汗之時。而先用藥取汗。則邪去衛和而愈。不然。汗液方泄而復發之。寧無如水淋漓之患耶。

太陽病。發熱汗出者。此爲營弱衛強。故使汗出。欲救邪風者。宜桂枝湯。

此即前條衛不諧營自和之意。而申其說。救邪風者。救衛氣之爲風邪所擾也。然仲景營弱衛強之說。不過發明所以發熱汗出之故。後人不察。遂有風并於衛。衛實而營虛。寒中於營。營實而衛虛之說。不知邪氣之來。自皮毛而入肌肉。無論中風傷寒。未有不及於衛者。其甚者。乃并傷于營耳。郭白雲所謂涉衛中營者是也。是以寒之淺者。僅傷于衛。風而甚者。并及于營。衛之實者。風亦難泄。衛而虛者。寒猶不固。無汗必發其汗。麻黃湯所以去表實而發邪氣。有汗不可更發汗。桂枝湯所以助表氣而逐邪氣。學者但當分病證之有汗無汗。以嚴麻黃桂枝之辨。不必執營衛之孰虛孰實。以證傷寒中風之殊。且無汗爲表實。何云衛虛。麻黃之去實。寧獨遺衛。能不膠于俗說者。斯爲豪傑之士。