

校編仁存陳

書叢學醫漢皇

平井編

古
方
分
量
考

上海中醫學院出版社

EV45/3827 0807

古 方 分 量 攷 要

方藥用量之輕重。攸關病機之安危。方劑之大小。於是平分焉。若不精

方藥用量。雖中窳亦鮮效。且將何以處方。何以益於病乎。此平井氏之所

以有古方分量考之作也。書由貞菴氏所校。全書共列一百九十四方。凡

仲景之經方。方藥之用量。與一七一合一升一釐及銖兩之類。莫不詳考

註明也。

古方分量考凡例

一平井氏分量考曰。夫物各有極本。劑者。藥方之極者也。其然故東洞氏分劑本劑。而考其宜定之銖兩。而記之以國秤。於此乎仲景氏之定方。始可行之於今日。甚便于醫。然韞匱而不沽。余患傳寫之久。其泯焉。故校讐遂上木云。

一壹錢。蓋漢一升也。今之一合弱也。何以言之。行葦詩云。洗爵奠舜。注云。舜爵也。夏曰醕。殷曰爵。周曰爵。馬融曰。一升曰爵。可以知考字書蓋瓊醕同。

一壹方寸匕。平井氏分量考曰。壹方寸匕之散爲蜜丸。梧桐子之以得拾丸爲律也。

一壹錢匕。又曰壹錢匕之散以蜜丸之。梧桐子大。以得伍丸爲律也。後世稱壹錢匕者。今之壹錢。

一平井氏醫衡曰。大烏頭煎。烏頭湯。烏頭桂枝湯。三方如法。不可日再服。惟經驗之言。宜書諸紳。

寬政五年癸丑孟春

貞庵山人識

目錄

桂枝湯	一	桂枝加龍骨牡蠣湯	四
桂枝加桂湯	一	桂枝加芍藥生姜人參湯	四
桂枝加芍藥湯	一	桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯	四
桂枝去芍藥湯	一	桂枝二麻黃一湯	四
桂枝加葛根湯	一	桂枝二越婢一湯	四
桂枝加黃耆湯	一	桂枝麻黃各半湯	五
栝蒌桂枝湯	二	小建中湯	五
桂枝加厚朴杏子湯	二	黃耆建中湯	五
烏頭桂枝湯	二	黃耆桂枝五物湯	五
桂枝加附子湯	二	黃耆桂枝苦酒湯	五
桂枝去芍藥加附子湯	三	桂枝甘草湯	五
桂枝附子湯	三	半夏散及湯	六
桂枝附子去桂加朮湯	三	桂枝甘草附子湯	六
桂枝去桂加苓朮湯	三	桂枝甘草龍骨牡蠣湯	六
桂枝芍藥黃辛附湯	三	桂枝人參湯	六
桂枝去芍藥加皂莢湯	三	茯苓甘草湯	六

茯苓杏仁甘草湯	七	栝蒌瞿麥丸	一〇
茯苓戎鹽湯	七	麻黃湯	一〇
葵子茯苓散	七	麻黃加朮湯	一〇
苓姜朮甘草湯	七	麻黃甘草湯	〇
苓桂朮甘草湯	七	麻黃附子甘草湯	一
苓桂甘棗湯	七	麻黃杏仁甘草石膏湯	一
苓桂五味甘草湯	八	麻黃附子細辛湯	一
苓甘五味姜辛湯	八	麻黃杏仁薏苡甘草湯	一
苓甘姜味辛夏仁湯	八	牡蠣湯	一
苓甘姜味辛夏仁黃湯	八	麻黃醇酒湯	一
茯苓澤瀉湯	八	半夏麻黃丸	二
澤瀉湯	九	小青龍湯	二
五苓散	九	文蛤湯	二
茵陳五苓散	九	越婢湯	二
猪苓湯	九	越婢加朮湯	三
猪苓散	九	越婢加半夏湯	三
牡蠣澤瀉散	九	葛根湯	三
八味丸	一〇	葛根加半夏湯	三

葛根黃連黃芩湯	三	大黃附子湯	一七
小柴胡湯	三	大黃甘遂湯	一七
柴胡加芒硝湯	四	抵當湯	一七
柴胡去半夏加栝蒌湯	四	抵當丸	一七
柴胡加桂枝湯	四	橘皮大黃朴硝湯	一八
柴胡姜桂湯	四	大黃牡石湯	一八
柴胡加龍骨牡蠣湯	四	大黃牡丹湯	一八
大柴胡湯	五	大黃甘草湯	一八
白虎湯	五	調胃承氣湯	一八
白虎加人參湯	五	桃核承氣湯	一八
白虎加桂枝湯	五	下瘀血湯	一八
小承氣湯	五	土瓜根散	一九
厚朴三物湯	六	甘草湯	一九
厚朴大黃湯	六	桔梗湯	一九
厚朴七物湯	六	排膿湯	一九
大承氣湯	六	芍藥甘草湯	一九
大黃黃連瀉心湯	六	甘遂半夏湯	一九
瀉心湯	六	甘麥大棗湯	二〇
附子瀉心湯	七	芍藥甘草附子湯	二〇

甘草粉蜜湯	二〇	梔子生薑豉湯	二三
生薑甘草湯	二〇	枳實梔子豉湯	二三
甘草乾姜湯	二〇	梔子大黃湯	二三
四逆湯	二〇	茵陳蒿湯	二四
通脈四逆湯	二一	梔子蘗皮湯	二四
四逆加人參湯	二一	梔子厚朴湯	二四
茯苓四逆湯	二一	梔子乾姜湯	二四
通脈四逆加豬膽汁湯	二一	大陷胸湯	二四
附子粳米湯	二一	大陷胸丸	二四
蔥豉附子散	二一	小陷胸湯	二五
蔥豉附子散	二一	枳實薤白白酒湯	二五
大烏頭煎	二二	小半夏湯	二五
烏頭湯	二二	生薑半夏湯	二五
赤丸	二二	小半夏加茯苓湯	二五
真武湯	二二	半夏苦酒湯	二六
附子湯	二二	半夏厚朴湯	二六
天雄散	二三	半夏乾姜散	二六
梔子豉湯	二三	乾姜人參半夏丸	二六
梔子甘草豉湯	二三	半夏瀉心湯	二六

甘草瀉心湯	二七	枳朮湯	二〇
生薑瀉心湯	二七	排膿散	二〇
吳茱萸湯	二七	桂枝枳實生薑湯	二〇
厚朴生薑半夏甘草人參湯	二七	枳實薤白桂枝湯	二〇
黃連湯	二七	橘皮枳實生薑湯	二〇
乾姜黃連黃芩人參湯	二七	茯苓飲	三一
大建中湯	二八	橘皮竹茹湯	三一
黃連阿膠湯	二八	橘皮湯	三一
黃芩湯	二八	桂枝茯苓丸	三一
黃芩加半夏生薑湯	二八	芎歸膠艾湯	三一
六物黃芩湯	二八	旋覆花代赭石湯	三一
三物黃芩湯	二八	赤石脂禹餘糧湯	三一
白頭翁湯	二九	桃花湯	三一
白頭翁加甘草阿膠湯	二九	酸棗仁湯	三一
木防己湯	二九	葶歷大棗瀉肺湯	三一
木防己去石膏加茯苓芒硝湯	二九	蜜煎導	三一
防己茯苓湯	二九	麻仁丸	三一
防己黃耆湯	二九	己椒歷黃丸	三一
枳實芍藥散	三〇	蜀漆散	三一

十寶湯	三三
桔梗白散	三三
走馬湯	三三
備急圓	三四
礬石湯	三四
滑礬散	三四
礬石丸	三四
蛇床子散	三四

古方分量考

平井氏編

立花貞庵校

桂枝湯 治上衝頭痛發熱汗出惡風者。

桂枝

芍藥

大棗

生薑各七分半

甘草五分

右五味以水一盞四分煮取六分。

桂枝加桂湯 治本方證而上衝劇者。

於本方加桂五分。

右煮法同前。

桂枝加芍藥湯 治本方證而腹拘攣甚者。

桂枝

大棗各六分

芍藥二錢二分

甘草四分

生薑六分

右煮法同前。

桂枝去芍藥湯 治本方證而不拘攣者。

桂枝

大棗各九分

甘草六分

生薑九分

右煮法同前。

桂枝加葛根湯 治本方證而項背強急者。

桂枝

芍藥各六分

甘草四分

葛根八分

大棗

右六味以水二盞煮取六分。

桂枝加黃耆湯 治本方證而黃汗若自汗盜汗者。

桂枝

芍藥

生薑

大棗各六分

甘草

黃耆各四分

右六味以水一盞六分煮取六分

栝蒌桂枝湯 治本方證而渴

栝蒌根四分 桂枝

芍藥

大棗

生薑各六分

甘草四分

右六味以水一盞八分煮取六分

桂枝加芍藥大黃湯 治桂枝加芍藥湯證而有停滯者

桂枝

生薑各六分

大黃二分

大棗六分

芍藥二錢

甘草四分

右六味以水一盞四分煮取六分

桂枝加厚朴杏子湯 治本方證而胸滿微喘者

桂枝

芍藥

大棗

生薑各六分

甘草

厚朴

杏仁各四分

右七味以水一盞四分煮取六分

烏頭桂枝湯 治腹中絞痛手足逆冷或不仁或身疼痛者

烏頭一錢五分

右一味以水六勺煮取二勺去滓內蜜四勺煮取二勺作桂枝湯二勺

合服之

桂枝加附子湯 治本方證而惡寒或支節微痛者

桂枝

芍藥

大棗

生薑各七分

甘草五分

附子三分

右六味以水一盞四分煮取六分

桂枝去芍藥加附子湯 治桂枝去芍藥湯證而惡寒者。

桂枝 大棗各九分 甘草六分 生薑九分 附子四分半

右煮法同前。

桂枝附子湯 治桂枝去芍藥湯證而身體疼煩不能自轉側者。

桂枝錢一 附子一分半 大棗 生薑各七分半 甘草五分

右五味以水一盞八分煮取六分。

桂枝附子去桂加朮湯 治本方證而大便硬小便自利不上衝者。

朮八分 附子九分 甘草四分 大棗 生薑各六分

右煮法同前。

桂枝去桂加苓朮湯 治桂枝湯證而悸小便不利不上衝者。

芍藥 大棗 茯苓 朮 生薑各六分 甘草四分

右六味以水一盞四分煮取六分。

桂枝芍藥黃辛附湯 治桂枝去芍藥湯麻黃附子細辛湯二方證相合者。

桂枝 生薑 大棗各六分 甘草 麻黃 細辛各四分

附子三分

右七味以水二盞煮取六分。

桂枝去芍藥加皂莢湯 治桂枝去芍藥湯證而吐瀉噦涎沫者。

桂枝 生薑 大棗各七分半 甘草 皂莢各五分

古方分量考

右五味以水一盞四分。煮取六分。

桂枝加龍骨牡蠣湯 治桂枝湯證而胸腹有動者。

桂枝

芍藥

生姜

大棗

龍骨

牡蠣

各六分

甘草四分

右七味以水一盞四分煮取六分。

桂枝加芍藥生薑人參湯

治桂枝湯證而心下痞硬或拘攣及嘔者。

桂枝

大棗

人參各六分

生薑

芍藥各八分

甘草四分

右六味以水二盞四分煮取六分。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 治桂枝去芍藥湯證而胸腹動劇者。

桂枝

大棗

生薑

蜀漆各六分

牡蠣錢一

龍骨八分

甘草四分

右煮法同前。

桂枝二麻黃一湯

治桂枝湯證多麻黃湯證少者。

桂枝八分

芍藥

大棗

生薑各六分

麻黃三分

甘草五分

杏仁三分

右七味以水一盞半煮取六分。

桂枝二越婢一湯

治桂枝湯證多越婢湯證少者。

桂枝

芍藥

甘草

麻黃各四分

大棗

石膏

各六分

生薑七分

右煮法同前。

桂枝麻黃各半湯 治桂枝湯麻黃湯二方證相半者。

桂枝分五

芍藥

生姜

甘草

麻黃

大棗各三分

杏仁分三

右七味以水一盞六分煮取六分。

小建中湯 治裏急腹皮拘急及急痛者。

芍藥分二錢

桂枝

甘草

大棗

生姜各六分

膠飴三錢二分

右六味上五味以水一盞四分煮取六分去滓內膠飴更上微火消解。

黃薷建中湯 治本方証而盜汗或自汗者。

於本方加黃薷三分。

右煮法同前。

黃薷桂枝五物湯 治桂枝湯證而嘔身體麻痺不急迫者。

黃薷

芍藥

桂枝

大棗各七分半

生姜一錢半

右五味以水一盞八分煮取六分。

黃薷桂枝苦酒湯 治身體腫發熱汗出汗沾衣色正黃如藥汁者。

黃薷一錢二分半

芍藥

桂枝各七分半

右三味以苦酒二分水一盞四分煮取六分。

桂枝甘草湯 治上衝急迫者。

桂枝二錢

甘草一錢

右二味。以水一盞八分。煮取六分。

半夏散及湯。治咽喉痛。上衝急迫者。

半夏

桂枝

甘草各一錢

右三味。搗篩。以水一盞。煎七沸。內散更煮三沸。少少飲之。

桂枝甘草附子湯

治桂枝甘草湯證。而骨節煩疼。小便不利者。

甘草

朮各六分

附子九分

桂枝二錢

右四味。以水一盞二分。煮取六分。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

治胸腹有動急迫者。

桂枝四分

甘草

龍骨

牡蠣各八分

右四味。以水一盞二分。煮取六分。

桂枝人參湯。治人參湯證。而上衝急迫劇者。

桂枝

甘草七分

人參

朮

乾姜各六分

右四味。以水一盞八分。煮取一盞。內桂枝煮取六分。

人參湯。治心下痞硬。小便不利。或急痛。或胸中痺者。

人參

朮

甘草

乾姜各七分

右四味。以水一盞六分。煮取六分。

茯苓甘草湯。治心下悸。上衝而嘔者。

茯苓

桂枝各一錢

生姜一錢

甘草五分

右四味。以水一盞二分。煮取六分。

茯苓杏仁甘草湯 治悸而胸中痺者。

茯苓半錢 杏仁一錢 甘草五分

右三味。以水一盞二分。煮取六分。

茯苓戎鹽湯 治心下悸。小便不利者。

茯苓二錢四分 朮六分 鹽一分

右三味。以水一盞二分。煮取六分。去滓內鹽令消。私曰。平井氏分量

考曰。戎鹽一名青鹽。漢渡只一種。今不易得。無已。則可以食鹽代用。又曰。食鹽可用。出于播州赤穗者。

葵子茯苓散 治小便不利。心下悸。腫滿者。

葵子一斤 茯苓三兩 今之九錢弱

右二味。爲散。飲服方寸匕。日三服。

苓姜朮甘湯 治心下悸。小便自利。腰中冷如坐水中。若痛重形如水狀者。

朮 甘草各四分 乾姜 茯苓各八分

右四味。以水一盞。煮取六分。

苓桂朮甘湯 治心下悸。上衝起則頭眩。小水不利者。

茯苓一錢 桂枝七分 朮 甘草各五分

右四味。以水一盞二分。煮取六分。

苓桂甘棗湯 治臍下悸。而躄急上衝者。

扶苓一錢二分 甘草四分 大棗五分 桂枝六分

右四味以水二盞煮取六分。

苓桂五味甘草湯 治心下悸。上衝咳而急迫者。

桂枝扶苓各八分 甘草六分 五味子一錢二分

右四味以水一盞六分煮取六分。

苓甘五味姜辛湯 治前方證而不上衝。痰飲滿者。

扶苓六分 甘草 乾姜 細辛各四分 五味子九分

右五味以水一盞六分煮取六分。

苓甘姜味辛夏湯 治前方證而嘔者。

扶苓六分 甘草 細辛 乾姜各三分 五味子 半夏各九分

右六味以水一盞六分煮取六分。

苓甘姜味辛夏仁湯 治前方證而微浮腫者。

甘草 乾姜 細辛各三分 杏仁 半夏 五味子各六分

扶苓四分

右七味以水二盞煮取六分。

苓甘姜味辛夏仁黃湯 治前方證而腹中微結者。

於前方加大黃三分。

右煮法同前。

扶苓澤瀉湯 治心下悸。小便不利。上衝及嘔吐。渴欲飲水者。