

近世內科國藥處方集

西田甲南書

近世內科國藥處方集

PDG

嘗閱東西各國研究中西醫士後衆而重
行入口者其感藥摘衆先生以風有之
經驗改其質之優良分纂類集探本索
原著成近世內科國醫靈方集已及六冊
海內名公鑒贊美似宜家置一為隨時
瀏覽雅不知醫者亦可得後其途徑焉

庚辰桂秋八月金鍾山裴沈聯芳



近世內科國藥處方集

第五集神經系統病篇

目 錄

(一) 腦貧血 舊稱暈厥、失神、類中等	一——二〇
(二) 腦充血 舊稱肝火上升、類中、大厥等	二一——三七
(三) 腦出血 舊稱真中風、中臟、中腑等	三八——六〇
(四) 腦梅毒	六一——七八
(五) 腦性痙攣性小兒麻痺(小兒偏癱)	七九——九一
(六) 腦水腫 舊稱小兒解顛	九二——一〇三
(七) 麻痺狂(麻痺性癡呆)	一〇四——一二一
(八) 慢性進行性球麻痺——慢性進行性下部腦灰白質(舌唇咽頭麻痺)——延髓性癱瘓(舌咽喉癱瘓) 舊稱中風、中經絡、中血脈、風癱等	一二二——一三五

(九)急性延髓球麻痺 舊稱中風.....	一三六——一三七
(十)脊髓出血(脊髓卒中・脊髓血腫・跌打損傷性類中).....	一三八——一五二
(十一)脊髓炎.....	一五三——一七四
(十二)脊髓癆.....	一七五——一九七
(十三)進行性肌萎縮(甲)脊髓性進行性肌萎縮(乙)肌病性進行性肌萎縮(丙)神經性 進行性肌萎縮.....	一九八——二二一
(十四)神經痛 舊稱風氣痛等.....	二二二——二三一
(十五)神經炎.....	二三一——二四九
(十六)偏頭痛.....	二五〇——二六〇
(十七)癲癇.....	二六一——二八〇
(十八)神經衰弱.....	二八一——三〇三
(十九)希司忒利阿 舊稱癡躁、心風等.....	三〇四——三二四

近世內科國藥處方集 第五集

神經系統病篇

(一) 腦貧血

舊稱暈厥失神類中等

病原 本病之病原不止一端。如下例各點皆可引起本症。(一)急劇之多量失血。例如外傷。手術時出血。齒齦。胃腸。子宮出血等。(二)亡液。例如胸腔腹腔之液體穿利後。或下利劇甚時。(三)內臟神經麻痺則腹腔內臟血管擴張。血壓減少。多量血液充盈其間。故腦減血。或受糞塊壓迫之腸管一旦排便後。而血管擴張則容多量之血液。(四)慢性貧血。如十二指腸蟲病。萎黃病。惡性貧血。白血病。化膿。亡液等。(五)心臟衰弱。于脂肪心。大動脈孔狹窄。熱性病及衰

弱時見之。蓋心臟不能輸送適量之血液于腦髓。故往往于起立時發此障害。
(五)腦血管之壓迫。如腫瘍則由外方壓迫。腦室內水腫則由內方壓迫。(六)
頸動脈之變化或壓迫。(七)精神感動。如喜悅驚愕。畏怖時則血管運動神經
痙攣。而腦貧血。

病理 本病之解剖的徵狀甚奇特。諸腦膜之色淡而白。僅大動脈之血管充
滿。腦回上小血管空。而腦脊髓液大增。切視之則灰白二質皆色淡。切面濕潤。
症狀 因疾病發生之狀態及經過。可區別爲急性與慢性二者。(一)急性
腦貧血 急劇腦貧血。多由血管痙攣所致。其初心臟部有苦悶之感。心悸亢
進。繼則顏面蒼白。四肢厥冷。重聽。冷汗。耳鳴。視力障害。眩暈。惡心嘔吐。至于卒
倒。此名失神 Ohnmacht 持續約數秒或數分時後徐徐覺醒。或竟至于死。(神
經性卒中 Apoplexianervosa) 失神中。反射機能消失。瞳孔散大。脈搏細數不

正呼吸淺表。蓋失神之原因于精神感動及疼痛者。以腦血行之急受障害故也。(腦血管收縮。或心臟機能障害)(二)慢性腦貧血。于各種貧血及反復之出血後發生。其症狀與急性症相似。而發生較緩。如頭痛。眩暈。耳鳴。重聽。眼花。閃發。弱視。不眠。記憶力減退等症。有時于急劇起立時失神卒倒。此外如小兒久患腹瀉後。貧血。及身體虛弱之際。有時顯一羣奇特之症狀。卽所謂腦積水樣病 *hydrocephaloid* 者。病兒作半昏迷狀。眼開而瞳縮。腦門場陷。早期或顯驚厥。繼則昏迷或加重。瞳孔展大。更有顯眼之斜視。及頭仰縮者。此等症狀與腦底性腦膜炎酷似也。

治法 (一)失神時命患者平臥。頭部低位。冷水灌注面部。嗅入阿莫尼亞或醋。(二)心臟衰弱。宜速注射樟腦。(三)精神安靜。注意營養。(四)西藥內服可與亞砒酸劑。或鐵劑。其他藥劑療法。用葡萄酒 *Brandy* 濃厚之茶。及咖啡。或用

樟腦麝香內服及注射。因出血過多而貧血者。則用生理食鹽水。皮下注射。緊縛四肢。使血液循環于腦髓。慢性腦貧血者。須警戒急劇之起立。而多與以營養物。鐵。砒石等補血劑。

中藥治法 因急劇失血而起之急性腦貧血。用醋炭熏法。酒韭熏法等急救。內服麝香人參附子等。

因精神感動血管運動神經痙攣而失神時。用葱激劑。搐鼻取嚏。並內服川芎當歸芍藥地黃等。

慢性腦貧血。頭痛。眩暈。耳鳴。重聽。眼花閃發。弱視不眠。記憶力減退等。用當歸黃芪。人參。山萸肉。龍眼肉。杞子。滁菊等。

小兒腦積水樣昏迷用乾蟾。全蠍。黃芪。附子等。

其他一般藥物。如天麻。胡麻。山藥。羚羊角。銀杏。鷹頭。五味子。菴蓉。桂枝等。皆可。

選用。

要藥略釋

醋爲米麥類澱粉或酒類加醋母使發酵變酸而釀成者。入藥須用米醋。陳者更良。本品古稱苦酒。其主要成分爲醋酸。是酸味收斂藥。內服少量能助胃消化。入腸後能刺激腸粘膜。使腸之斂性增加。由腸壁吸入血中。能令血管收縮。汗液減少。外用塗癰腫。有收斂消炎作用。本草衍義用爲產婦房中。以火炭沃醋氣。令產婦嗅之。以防治血量者。蓋卽防救出血過多之急性腦貧血也。用量內服一〇・〇——二〇・〇西西（一小匙至二小匙）外用不拘分量。

韭爲菜蔬類植物。入藥用其根及葉。古稱散瘀活血。用于大腸炎之下利。與噎膈反胃。及諸種出血等症。有興奮及強壯作用。食醫心鏡方治卒然中惡（失神）。用汁灌鼻中便醒。丹溪方治產後血量。用韭菜切搗放瓶中。沃以熱醋或

熱酒令氣熏入鼻中即醒。用量內服一〇・〇——二〇・〇（三錢至六錢）外用不拘分量。

麝香爲雌性麝鹿臍中之分泌物。色棕黑而狀如沙泥之細粒。中央之顆粒較粗者名當門子。入藥爲尤佳。味苦辣而有可憎強烈之香竄臭氣。古來用作回蘇藥。主治中風。中氣。中惡。驚癇。謂能辟惡魅。殺鬼精。開達關竅。通諸經絡者。蓋以其具有芳香竄透性與奮強心激腦回蘇等作用故也。考卒中狀昏倒諸症之原因不一。如腦部充血或出血之卒中。則本品當在禁忌之例。而腦貧血之卒然昏仆。顏面蒼白。手足厥冷等。虛性症狀。則本品可謂恰合。即藥效以推斷。於以知古人所謂中惡中氣等病者。其爲急性腦貧血之卒倒無疑也。至謂通關竅利經絡等。則無非認識本品之激腦強心與奮血行等功用故也。用量

〇・二——〇・五（半分至一分半）吞服或配入丸藥中服（不入煎劑）

人參用作興奮性強心強壯藥。與附子伍用。能救急性虛脫之顏面蒼白。四肢厥冷。脈搏微弱等症。與黃芪當歸等伍用。於大失血後之急性貧血。能補血提神。使血液恢復迅速。用量一〇・〇——二〇・〇（二錢至六錢）

附子爲興奮強心藥。能鼓舞全身細胞。興奮神經。古稱治中風中寒。痰厥氣厥。小兒慢驚。風濕麻痺。頭痛腳氣等者。其對於全身衰弱性之腦貧血及小兒腦積水樣昏迷等。均可用之。用量三・〇——一〇・〇（九分至三錢）

川芎原名芎藭。爲繖形科植物之根。名醫別錄云。「主治腦中冷動。面上遊風去來。目淚出。多涕唾。忽忽如醉。諸寒冷氣中惡。」何間宣明方治首風旋暈。用川芎一斤。天麻四兩。爲末。蜜丸服。似均係貧血性腦症狀疾患耳。本品能使血液循環增速。與其他滋養性強壯藥伍用。治腦貧血之眩暈頗效。用量三・

〇——七・〇（九分至二錢）

當歸古稱調氣養血。使氣血各有所歸。故又有引血歸經之語。蓋本品能弛緩神經。促進血運。使血液氧化迅速。血壓增高。以增進貧血部分之充血。用量一〇・〇——一五・〇（二錢至四錢半）

芍藥與川芎當歸地黃伍用。爲四味湯。對於血液不足。及貧血衰弱諸症。有調整循環。營養神經之功。蓋芍藥通經。地黃補血。芍藥則鎮痙。而弛緩局部貧血性神經之拘攣。用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

地黃入藥用有生熟之分。四物湯內以乾地黃爲相宜。生地黃卽鮮地黃。多汁。有清涼清血之功。熟地黃則多入滋補藥中。乾地黃藥肆名稱乾生地。大生地。有滋養強壯性補血作用。用量一五・〇——二〇・〇（四錢半至六錢）黃芪爲緩和性滋養強壯藥。能強壯肌細胞。增進新陳代謝。加速血液產生。與當歸人參等伍用。于貧血衰弱諸症甚佳。用量一〇・〇——二〇・〇（

三錢至六錢)

山萸肉爲滋養強壯藥。有收斂作用。用于貧血性頭暈目眩等症有特效。用量一〇・〇——一五・〇(二錢至四錢五)

龍眼肉爲滋養性鎮靜藥。用于貧血神經衰弱。失眠。耳鳴。頭暈等症。用量六枚至十枚

枸杞子爲滋養強壯藥。唐甄權曰補精氣諸不足。易顏色變白明目安神。據此可知本品于貧血性神經衰弱有良效。用量七・〇——一五・〇(二錢至四錢半)

滁菊爲腦鎮靜藥。賞用于頭暈。目眩。耳鳴等症。與枸杞子伍用。對于腦貧血之眩暈頗佳。用量五・〇——一〇・〇(錢半至二錢)

乾蟾卽蟾蜍之乾者。其皮中含有蟾酥。有強心及解毒作用。賞用于小兒疳積。

而呈心臟衰弱時有良效。 用量三・〇——七・〇（九分至二錢）

全蠟爲鎮痙藥。用於小兒諸腦病。如昏迷、痙攣、搐搦、驚癇等症。有平腦鎮痙之功。 用量二・〇——三・〇（六分至九分）

天麻爲蘭科植物赤箭之根。有鎮痙鎮痛作用。古人用于風痺眩暈。並稱利腰膝、強筋骨、通血脈。似于鎮痙之外。兼其滋養強壯作用。 用量三・〇——七・〇（九分至二錢）

胡麻屬胡麻科植物之種子。取其黑色者。入藥爲良。本品俗名黑芝麻。近時藥肆胡麻有數種。所謂三角胡麻者。卽茺蔚子。又有大胡麻。一名巨勝子。又有所謂壁蝨胡麻者。不知係何科屬。恐俱非胡麻之正路貨。蓋真正胡麻當屬黑芝麻也。其有效成分爲胡麻油。有滋養作用。古稱主治傷中虛羸補五內益氣力。長肌肉填腦髓。明耳目云云。蓋爲神經系統之滋養藥也。 用量五・〇——

一〇・〇（錢半至三錢）

山藥一名薯蕷，爲薯蕷科纏繞植物之地下塊根，有滋養強壯及收斂作用，主補神經，用于衰弱性頭暈目眩、耳鳴盜汗、遺精等症。用量一〇・〇——二〇・〇（二錢至六錢）

羚羊角爲強壯性鎮痙鎮靜藥，對於神經性痙攣頭暈、抽搐、癲癇等症，得賞用之。用量二・〇——三・〇（六分至九分）

銀杏爲公孫樹科銀杏之果仁，有收斂性滋養強壯作用，可用于衰弱性眩暈、耳鳴、喘息、咳逆、遺精帶濁等症。用量一〇・〇——二〇・〇（三錢至六錢）

鷹頭係猛禽類鵠鷹鳥之頭腦，此爲民間藥，治頭風眩暈，用本品焙燥沖酒服極驗，此亦爲臟器療法之一種，蓋因此鳥常盤旋於高空，而腦髓獨健，取以補

腦亦是合理耳。用量一具至二具

五味子爲強有力之收斂藥。且有滋養強壯作用。取其斂攝神經。制止分泌。故於衰弱患者之眩暈心悸盜汗自汗喘息咳逆等症。得實用之。用量一・〇

——二・〇（二分至六分）

從蓉屬列當科之寄生植物。多寄生於榛木之根。高約六七寸至尺餘。爲肉質柱狀。葉鱗集如松球。本品爲興奮性強壯藥。能強壯性神經。古稱滋腎補精血。益髓悅顏色。大補壯陽云云。腦貧血之因性腺衰弱而來者得實用之。用量七・〇——一〇・〇（二錢一至三錢）

桂枝氣味芳香。中含揮發油。古稱溫經通脈。蓋本品能使血液循環亢進。故對於末梢貧血諸症。頗實用之。用量二・〇——四・〇（六錢至一錢二）

處方一 當歸四逆湯（仲景） 當歸一〇・〇（三錢） 桂枝四・〇（一錢二）

白芍七・〇(二錢二) 細辛二・〇(六分) 甘草三・〇(九分)

木通四・〇(一錢二) 大棗四枚

右六味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服

適應症 手足厥寒脈細陽虛血弱能益血脈云(四肢末梢性貧血)

處方二 黃芪桂枝五物湯(仲景) 黃芪七・〇(二錢二) 白芍五・〇(錢

半) 桂枝三・〇(九分) 生薑五・〇(錢半) 大棗四枚

右五味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次服

適應症 血痺脈微身體不仁麻木者(貧血性神經麻痺)

處方三 鍼砂湯(南陽) 鍼砂一〇・〇(三錢) 牡蠣二〇・〇(六錢) 茯

苓一〇・〇(三錢) 桂枝二・〇(六分) 人參四・〇(一錢二) 甘

草二・〇(六分) 蒼朮五・〇(錢半)