

眼科药物纂要

高健生 陆绵绵 高培质 潘开明

丁淑华 王连义 韦企平 冯俊

刘孝书 刘雅 周维梧 高卫平 巢国俊





目 录

第一章 发散风寒药	(11)
防风	(11)
荆芥	(12)
羌活	(13)
白芷	(14)
紫苏	(15)
藁本	(16)
细辛	(17)
桂枝	(18)
麻黄	(19)
第二章 祛风清热药	(21)
木贼草	(21)
薄荷	(22)
牛蒡子	(23)
蝉蜕	(23)
桑叶	(24)
菊花	(25)
蔓荆子	(26)
柴胡	(27)
葛根	(29)
升麻	(30)
第三章 清热泻火药	(32)
石膏	(32)
知母	(33)
天花粉	(34)
梔子	(34)
夏枯草	(35)
决明子	(37)
谷精草	(38)
密蒙花	(38)
青葙子	(39)
千里光	(40)
第四章 清热燥湿药	(42)

黄芩	(42)
黄连	(43)
黄柏	(45)
龙胆草	(46)
第五章 淸热解毒药	(47)
金银花	(47)
连翘	(48)
蒲公英	(49)
紫花地丁	(50)
败酱草	(50)
野菊花	(51)
大青叶	(52)
板蓝根	(53)
秦皮	(53)
第六章 淸热凉血药	(55)
生地黄	(55)
玄参	(56)
牡丹皮	(57)
赤芍	(57)
紫草	(58)
第七章 淸虚热药	(60)
青蒿	(60)
白薇	(61)
地骨皮	(61)
银柴胡	(62)
胡黄连	(63)
第八章 泻下药	(65)
大黄	(65)
芒硝	(66)
芦荟	(67)
火麻仁	(68)
郁李仁	(69)
牵牛子	(69)
第九章 祛风湿药	(71)
独活	(71)
秦艽	(72)
乌梢蛇	(73)
蛇蜕	(73)
防己	(74)

蚕沙	(75)
第十章 芳香化湿药	(76)
藿香	(76)
佩兰	(77)
苍术	(77)
砂仁	(79)
白豆蔻	(79)
第十一章 利水渗湿药	(81)
茯苓	(81)
猪苓	(82)
泽泻	(83)
薏苡仁	(84)
车前子	(85)
滑石	(86)
木通	(87)
地肤子	(88)
赤小豆	(88)
冬瓜皮	(89)
萹蓄	(90)
瞿麦	(90)
石韦	(91)
海金沙	(92)
冬葵子	(92)
萆薢	(93)
茵陈蒿	(94)
金钱草	(95)
虎杖	(95)
豆卷	(96)
第十二章 溫里药	(97)
附子	(97)
乌头	(98)
干姜	(99)
肉桂	(100)
吴茱萸	(101)
丁香	(102)
小茴香	(103)
第十三章 理气药	(104)
陈皮	(104)
枳实	(105)

枳壳	(106)
木香	(107)
香附	(108)
厚朴	(109)
檀香	(110)
第十四章 消导药	(111)
山楂	(111)
鸡内金	(112)
麦芽	(113)
谷芽	(113)
第十五章 驱虫药	(115)
槟榔	(115)
使君子	(116)
鹤虱	(117)
芫菁	(118)
乌梅	(118)
贯众	(119)
百部	(120)
芦荟	(121)
白鲜皮	(122)
第十六章 止血药	(123)
大蓟	(123)
槐花	(124)
三七	(124)
茜草	(125)
蒲黄	(126)
仙鹤草	(126)
白茅根	(127)
藕节	(128)
血余	(128)
第十七章 活血祛瘀药	(130)
川芎	(130)
丹参	(131)
泽兰	(132)
牛膝	(133)
红花	(134)
桃仁	(135)
苏木	(135)
血竭	(136)

鸡血藤	(137)
郁金	(138)
乳香	(139)
没药	(139)
五灵脂	(140)
蓬莪术	(140)
茺蔚子	(141)
第十八章 化痰止咳药	(142)
半夏	(142)
天南星	(143)
白附子	(144)
桔梗	(145)
桑白皮	(146)
贝母	(147)
前胡	(148)
瓜蒌	(149)
竹茹	(150)
竹沥	(151)
枇杷叶	(151)
瓦楞子	(152)
海藻	(153)
昆布	(153)
葶苈	(154)
第十九章 止咳平喘药	(156)
马兜铃	(156)
葶苈子	(157)
紫苏子	(158)
杏仁	(159)
紫菀	(160)
款冬花	(161)
第二十章 平肝息风药	(162)
羚羊角	(162)
全蝎	(163)
钩藤	(164)
天麻	(165)
白僵蚕	(166)
蜈蚣	(167)
石决明	(168)
珍珠母	(169)

磁石	(170)
紫贝	(171)
龙骨	(171)
白蒺藜	(172)
第二十一章 开窍药	(174)
麝香	(174)
牛黄	(175)
石菖蒲	(176)
远志	(177)
第二十二章 补气药	(179)
人参	(179)
党参(附:太子参)	(180)
黄芪	(181)
白术	(182)
山药	(183)
大枣	(184)
甘草	(185)
第二十三章 补阳药	(187)
鹿茸	(187)
鹿角胶(附:鹿角霜)	(188)
补骨脂	(189)
肉苁蓉	(190)
巴戟天	(191)
淫羊藿	(192)
山茱萸	(193)
菟丝子	(194)
紫河车	(195)
骨碎补	(196)
杜仲	(197)
锁阳	(198)
沙苑蒺藜	(199)
第二十四章 补血药	(200)
当归	(200)
熟地黄	(202)
何首乌	(203)
白芍药	(204)
阿胶	(205)
第二十五章 补阴药	(207)
沙参	(207)

麦门冬	(208)
天门冬	(209)
石斛	(210)
玉竹	(211)
黄精	(212)
女贞子	(212)
龟版	(213)
鳖甲	(214)
枸杞子	(215)
楮实子	(215)
桑椹子	(216)
第二十六章 收涩药	(218)
五味子	(218)
诃子	(219)
五倍子	(220)
山茱萸	(220)
覆盆子	(221)
金樱子	(222)
第二十七章 退翳药	(224)
空青	(224)
绿豆皮	(224)
海蛤壳	(225)
望月砂	(226)
海螵蛸	(226)
第二十八章 外用药	(228)
冰片	(228)
朱砂	(229)
珍珠	(230)
明矾	(231)
炉甘石	(232)
木芙蓉叶	(233)
蕤仁	(233)
硇砂	(234)
琥珀	(235)
雄黄	(236)
轻粉	(237)
熊胆	(238)
石燕	(238)
石蟹	(239)

白丁香	(240)
硼砂	(240)
铜绿	(241)
鹤不食草	(242)
黄丹	(243)
珊瑚	(243)
胆矾	(244)
鲤鱼胆	(245)
猪胆	(246)
密陀僧	(246)
西瓜霜	(247)
人乳汁	(248)
鸡子黄	(248)

第一章 发散风寒药

用于发散肌表风寒的药物称发散风寒药。适用于风寒之邪客于肌表，寒重热轻，身痛无汗等。眼科主要用于风寒侵凌目窍，血凝色紫，疼痛羞明，肿胀，冷泪等。另外还应用于止痛、升阳、胜湿等方面。因此在眼科用药中发散风寒应用范围较广，出现的频次比较多。发散风寒药性味辛温，发散力强，有较大发汗作用，对表虚有汗之人当禁用。

防 风

【处方用名】 防风、防风炭。

【性味】 辛甘，微温。

【归经】 入膀胱、肺、脾、肝、胃五经。

【功用】 发表祛风，胜湿止痛，升阳明目。

【用法用量】 内服：汤剂3~10克，或入酒剂、丸、散用。

【眼科临床应用】

1. 用于疏风发散，常与荆芥、羌活等配伍，治感冒风寒，风邪袭于头目，目赤，羞明，流泪，泪多眵少而清稀，黑睛生翳等。

2. 用于祛风胜湿，常与羌活、独活、藁本、当归、川芎等合用，散风寒湿痹，周身关节痠痛，四肢挛急，目痛羞明，抱轮红赤，视物昏矇。

3. 用于祛风止痛，常与羌活、川芎、白芷、细辛相佐。治风邪上壅头目，头痛眼胀，视物不明，或偏正头风，痛不可忍者，如青空膏(《兰室秘藏》：川芎、柴胡、黄连、防风、羌活、炙甘草、黄芩)。

4. 祛风止痒，常与荆芥、蝉衣、川芎、苦参、白蒺藜等同用，治眼部睑弦湿痒，或眼痒若虫行，如乌蛇汤(《秘传眼科龙木论》：藁本、乌蛇、防风、羌活、白芍、川芎、细辛)。

5. 用于痈疽疮疡，常与白芷、当归、川芎等配伍。治胞睑痈疽疮毒引脓外达。不管新旧，或久不收口者均可用，如防风汤(《外科十法》：防风、白芷、甘草、赤芍、川芎、归尾)。

6. 用于升阳明目，常以羌活、蔓荆子、柴胡、升麻等相助，与黄芪、人参、甘草相配，治疗脾虚清阳不升，阴火上乘，邪害空窍之目痛红赤，睛珠疼痛应太阳，眼睫无力，常欲垂闭，不能久视，久视则疲痛，黑睛生翳，皆成下陷，日久难愈者，如助阳和血汤(《兰室秘藏》：炙甘草、黄芪、当归、防风、蔓荆子、白芷、柴胡、升麻)。

7. 用于引药入目，常佐于熟地、山萸肉等补益肝肾剂中，治疗视瞻昏渺，青盲，视瞻有色，视物变形等内障眼病，如明目地黄丸(《局方》：牛膝、石斛、枳壳、杏仁、防风、生熟地黄)。

【按语】

防风温而力微，辛而轻散，为风药中之润剂，能通治上下一切风邪。伍寒凉之品，清风热，配温热之剂祛风寒。

在眼科中防风为治内外障眼病之要药。其性辛温轻散，能发邪从毛窍而出，故可治

风邪侵淫于胞睑之痈疮肿毒，风赤疱痍等，以引邪外达。

防风为泄风之上剂，有走窜宣散之力，故可治风邪入络之上胞下垂，目珠偏视，口眼歪斜，或湿痰凝滞于经络肌腠之间痰核肿块，或眼部跌打损伤，手术后气血不得宣流之肿胀，瘀血凝滞之结块等。

防风有祛风升阳之功，故可治风邪外淫，遏抑清阳，不得宣布所致诸疾，如在上可疗头目诸窍不利，在下可止肠风下血崩漏等症。

防风善能祛风退翳明目，可治黑暗生翳，不论新老翳障，皆可服用之。新翳实证配清热祛风之品，久翳虚证翳面凹陷者配益气养血之剂，老翳已成者配退翳之药。

防风可入肝肾二经，引阴精上承，滋润目窍。内障眼病多因肝肾阴精亏虚，不能上承，目失所养而成。因而在补益肝肾剂中常用防风为引经药，对增强药剂作用，提高治疗效果，有所助益。故李东垣谓：“肝肾之病同一治，为俱在下焦，非凡药行经不可也。”（《脾胃论》卷上）。

防风炒黑有助止血之功。但防风系属辛温之品，有泄风走窜之力，故属血虚痉急，或头目疼痛不因风邪者忌服。

【文献参考】

《神农本草经》：“主大风头眩痛，恶风，风邪，目盲无所见，风行周身，骨节疼痛，烦满。”

《日华子本草》：“治三十六般风，男子一切劳劣，补中益神，风赤眼，止泪及瘫缓……。”

《药类法象》：“治风通用。泻肺实，散头目中滞气，除上焦风邪。”

李杲：“防风，治一身尽痛，随所引而至，乃风药中润剂也。若补脾胃，非此引用不行。”

《本草汇言》：“与芎、芷上行，治头目之风；与羌、独下行，治腰膝之风；与当归治血风；与白术治脾风；与苏麻治寒风；与芩、连治热风；与荆、柏治肠风；与乳、桂治痛风，及大人中风，小儿惊风，防风尽能去之。”

《银海精微》：“味甘辛，性热，入膀胱经，以体用通疗诸风，以气味能泻肺经。”

《原机启微》：“防风散滞祛风”，“以防风升发生意”，“主疗风升阳为主。”

《古今医统》：“防风，散风邪明目。”

《审视瑶函》：“痒甚者加防风、荆芥穗。”

【现代实验研究】

防风含挥发油、甘露醇，苦味甙等，具有解热，镇痛作用，对大鼠实验性关节炎有抑制作用。大剂量多次灌胃能对抗小鼠的电休克，提示本品可能有抗癫痫作用。对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、痢疾杆菌有一定的抗菌作用。

荆 芥

【处方用名】 荆芥、荆芥穗、荆芥炭。

【性味】 辛，微温。

【归经】 入肺、肝经。

【功用】 发表，祛风，理血。

【用法用量】 内服：汤剂3~10克，不宜久煎。或入丸、散。外用：捣敷，研末调敷，或煎

水洗。

1. 用于疏风发散，常与防风、苏叶等配伍，治感冒风寒，风邪袭于头目，目赤，羞明，流泪，泪多眵少之风寒证。
2. 用于祛风止痒，常与蝉衣、川芎、防风等同用，治眼部睑弦湿痒，或眼痒若虫行。
3. 用于疮毒瘰疬，赤肿痛硬，常与白芷、当归、牛蒡子等相配，治眼睑肿胀如杯，睑硬睛疼，眼丹，瘰疬等症。
4. 用于止血瘀，常与防风、生地、赤芍、丹皮、当归等为伍，治疗眼部外伤，术后瘀血滞留，或眼内出血等。

【按语】

荆芥辛温之力弱，与热药同用可治寒证，与凉药相伍可治热证。临床常与防风配合，用于疏风解表，祛风止痒，疮疡肿毒及清利头目诸风，退翳明目等。但与防风又不尽同，如《本草备要》：“荆芥，功本治风，又兼治血者，以其入风木之脏，即是藏血之地也。李士材曰，风在皮里膜外，荆芥主之，非若祛风能入骨肉也。”荆芥穗其性轻扬疏散，更适用于散头部风邪。炒黑入血分，止血尤良。用于轻宣疏利，祛风止痒，又常以酒调服，助其轻扬升散之性，用于止血散瘀可以童便调服，以助其力。外治肿毒，以醋调敷为宜。但表虚自汗，阴虚头痛者忌服。

【文献参考】

《滇南本草》：“治跌打损伤，并散毒疮。”“荆芥穗，上清头目诸风，止头痛，明目，解肺、肝、咽喉热痛，消肿，除诸毒，发散疮痈。治便血，止女子暴崩，消风热，通肺气鼻窍塞闭。”

《银海精微》：“荆芥，去皮风邪发。”

《古今医统》：“荆芥，散风热，止太阳头痛，明目。”

【现代实验研究】

荆芥全草含有挥发油，其中右旋薄荷酮和3-甲基环己酮具有镇痛作用，左旋胡薄荷酮具抗炎作用。挥发油有轻度健胃、驱风、解痉作用。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌和白喉杆菌有较强的抗菌作用；对炭疽杆菌、乙型链球菌，伤寒杆菌，痢疾杆菌，绿脓杆菌和人型结核菌也有一定的抑菌作用。

羌 活

【处方用名】羌活。

【性味】辛苦，温。

【归经】入膀胱、肾经。

【功用】散表寒，祛风湿、利关节。

【用法用量】内服：汤剂3~10克。

【眼科临床应用】

1. 用于发散表寒，常与防风、荆芥等同用，治感冒风寒；眼目赤疼，眵泪羞明，黑睛生翳，退新老翳障，如羌活汤（《医级》：羌活、独活、防风、甘草、荆芥、陈皮）。
2. 用于祛风止痛，常与防风、独活、川芎、黄芩等配合，治太阳头痛，少阴头痛，眼目胀痛，偏正头风。

3. 用于祛风胜湿，常与独活、藁本等相伍。治关节风寒湿痹，目痛羞明，抱轮红赤，肿痛难开，如羌活胜湿汤(《内外伤辨惑》：羌活、独活、藁本、防风、甘草、川芎、蔓荆子)。

4. 用于疮疡肿毒，常与紫地丁、蒲公英、白芷、荆芥同用，治眼部丹毒，眼睑肿胀如杯，眼痛等，以排脓托毒。

5. 用于升阳明目，常与升麻、柴胡、防风等，配以补益之剂，治疗因脾虚气弱，体内清阳之气不能上升目窍，失于濡润之眼疾，如视物昏花，不能久视，久视则疼痛等。

6. 用以引经上行头目，配生熟地、当归等，治精血不足之目昏涩，如加减地黄丸(《审视瑶函》：生地、熟地、枳壳、牛膝、当归、羌活、杏仁、防风)。

【按语】

羌活体轻而不重，气清而不浊，味辛而能散，性行而不止，上行于头目，下走于腰膝，遍达于肢体，以清气分之邪，为治内外障眼病常用之品。外障眼病，眵泪羞明，目赤肿痛，黑睛生翳，属寒证者，与温药相配；属热证者，与凉药相伍。内障眼病，属气虚清阳不能上达者，助益气药之升运头目；属阴虚精亏者，配益精养阴之品以引药上行。但其性究属辛温，血虚者又非所宜。

【文献参考】

《奇疾方》：“人睛忽垂至鼻，如黑角塞，痒不可忍，或时时大便出血，痛，名曰肝胀。用羌活煎汁服数盏自愈。”

《原机启微》：“羌活升发阳气。”

《古今医统》：“羌活味辛性温，发散三阳客邪，利头目，止头痛。”

《证治准绳》：“白眼痛，……多有赤朦，视其从上而下者，太阳病也，羌活为使。”

【现代实验研究】

羌活含有挥发油，能对抗垂体后叶素引起的大鼠急性心肌缺血所致的心电图改变，并能增加心肌营养性血流，减慢心率。

白芷

【处方用名】 白芷。

【性味】 辛，温。

【归经】 入肺、脾、胃经。

【功用】 祛风，止痛，燥湿，排脓。

【用法用量】 内服：汤剂，3~6克。或入丸、散。外用：研末撒或调敷。

【眼科临床应用】

1. 用于发表散风，常与荆芥、防风、藁本等同用，治疗感冒风寒，三阳头痛，目睛疼痛等，配羌活治太阳头痛，伍柴胡治少阳头痛，合升麻治阳明头痛，连及齿颊。

2. 用于祛风止痛，与黄芩相配治风热与痰互结之眉框骨痛，如驱风上清散(《审视瑶函》：酒黄芩、白芷、羌活、防风、柴胡梢、川芎、荆芥、甘草)。

3. 用于通窍止泪，与细辛、菊花同用，治头风冷泪，如川芎丸(《银海精微》：白芷、川芎、细辛、白术、甘菊)。

4. 用于消肿止痛，排脓生肌，治眼生疖肿、眼丹，肿胀如杯，脓未成者配蒲公英、银花、

大黄、赤芍等，有消肿止痛之功。脓已成者，配皂角刺、穿山甲有排脓拔毒之效，已溃破者，配当归、白芍有和营生肌之力。

5. 用于散风升阳，常与羌活、防风同用治疗白睛红赤，多眵泪而无疼痛，隐涩难开，视物不明等，清阳之气不能升运清窍，如助阳和血汤，《兰室秘藏》：柴胡、白芷、升麻、当归、黄芪、防风、蔓荆子、甘草）。

6. 用于祛翳明目，与黄芩、菊花、炉甘石等配伍治胬肉攀睛，如硝炉散（《经验眼科秘书》：羌活、防风、黄芩、菊花、蔓荆子、川芎、白芷、火硝、炉甘石）。

【按语】

白芷辛温，芳香燥烈，疏风散寒，上可行头目清窍，亦能燥湿升阳，内提清气，外达肌肤，为治头、目、眉、齿诸疾，胞睑肿毒，胬肉风泪之要药。上可通鼻窍治鼻渊，下可燥湿治带下。若因风热所患，须与辛凉清热药同用。如属热盛之候，则宜配清泄之剂，引药上行，于气虚血少，阳气不能升运者，配补益之剂，疗风升阳。白芷辛香气烈，不但能内服，而且可局部外敷，治红肿疮毒，更能研末噙鼻，治头目诸痛，虽然《本草经百种录》谓：“白芷极香，能驱风燥湿，其质又极滑润，能和利血脉，而不枯耗，用之则有利无害者也。”但其性辛燥而散，如属阴虚血热之证，又非可概治。

【文献参考】

李杲：“白芷，疗风通用，其气芳香，能通九窍，表汗不可缺也。”

《普济方》：“一切眼疾，白芷为末，炼蜜丸，龙眼大，朱砂为衣，每服一丸，食后茶清下，日二服，名还睛丸。”

《原机启微》：“白芷、蔓荆子、防风，主疗风升阳。”

【现代实验研究】

白芷根含多种呋喃香豆素：白当归素、白当归脑、氧化前胡素、欧前胡内酯、珊瑚菜素。白芷对大肠杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、绿脓杆菌、变形杆菌、霍乱弧菌等有一定抑制作用。对致病真菌也有一定的抑制作用。白当归素有扩张冠状血管作用。小量白芷毒对动物延髓血管中枢、呼吸中枢、迷走神经及脊髓都有兴奋作用，能使血压上升，脉搏变慢，呼吸加深，并能引起流涎呕吐，大量使用能引起强直性间歇性痉挛，继以全身麻痹。

紫 苏

【处方用名】 紫苏、紫苏叶。

【性味】 辛，温。

【归经】 入肺、脾经。

【功用】 发表，散寒，理气，和营。

【用法用量】 内服：汤剂3~9克，不宜久煎。外用：捣敷或煎水洗。

【眼科临床应用】

1. 用于发表散寒，常与荆芥、防风等同用，治感冒风寒目病，白睛红赤，刺痒紧涩等。
2. 用于理气止呕，常与黄连配伍，治热郁气机阻滞之泛恶呕吐。
3. 用于散风止痛，常与木瓜、防风同用，治偏正头风，如偏正头风方（《韦文贵眼科临床经验选编》：防风、荆芥穗、木瓜、苏叶、蝉衣、甘草）。

【按语】

紫苏气味芳香，有发汗解表散寒之功，能理气和中，辟秽化浊，故亦用于安胎止呕，解暑化浊，并解鱼蟹诸毒。苏叶以解表散寒为主，苏梗以理气宽中为良，苏子善降气消痰。

【文献参考】

《滇南本草》：“发汗，解伤风头痛，消痰，定吼喘。”

《药品化义》：“紫苏叶，……丹溪治春分后湿热病，头痛身热，脊强目痛，鼻干口渴，每以此同葛根、白芷，入六神通解散，助其威风，发汗解肌，其病如扫。”

《本草正义》：“紫苏芳香气烈。外开皮毛，泄肺气而通腠理；上则通鼻塞，清头目，为风寒外感灵药；中则开胸膈，醒脾胃。宣化痰饮，解郁结而利气机。”

【现代实验研究】

紫苏全草含挥发油约0.5%，内含紫苏醛55%，左旋柠檬烯20%~30%及蒎烯少量。紫苏煎剂及浸剂能扩张皮肤血管，刺激汗腺分泌，有解热作用，水浸液能抑制葡萄球菌和痢疾杆菌的生长。并能促进消化液的分泌和增加胃肠蠕动。紫苏油及紫苏醛能引起饥饿家兔之血糖上升。紫苏醛有强烈的防腐作用。

藁 本**【处方用名】** 藁本。

【性味】 辛，温。

【归经】 入膀胱经。

【功用】 祛风燥湿，散寒止痛。

【用法用量】 内服：汤剂3~9克。外用：煎水洗，或研末调涂。

【眼科临床应用】

1. 用于祛风散寒，常与川芎、细辛、白芷等同用，治风寒之邪，郁于太阳、督脉二经，偏正头痛，巅顶疼痛，头目胀痛等，如羌活芎藁汤（《审视瑶函》：半夏、杏仁、川羌活、藁本、川芎、防风、白茯苓、甘草、白芷、麻黄、陈皮、桂枝）。

2. 用于发散升阳，常与柴胡、羌活、川芎、桔梗等相伍，治眼目红赤羞明，泪多眵少脑巅沉重，眼珠痛应太阳，眼睑无力，黑睛生翳下陷等，如柴胡复生汤（《原机启微》：柴胡、苍术、白茯苓、黄芩、白芍、甘草、苏薄荷、桔梗、羌活、独活、蔓荆子、藁本、川芎、白芷、五味子）。

3. 用于祛风止痒，常与防风、乌蛇同用，治眼目遇风痒极者，如乌蛇汤（《秘传眼科龙木论》：藁本、乌蛇、防风、羌活、白芍药、川芎、细辛）。

【按语】

藁本主于太阳，兼行督脉，上能直通巅顶故善治头目疼痛，尤以祛巅顶头痛为良，下能解厥阴郁滞，达于肠胃，可治脘腹疼痛，妇人腹中急痛，疝瘕淋漓等。又有升阳发散之功，故能引药上行，升发黑睛陷翳，本品除内服外，还可外用煎洗，或研末调敷，以治痈疽疮疡等外证。但其性味辛温，对阴虚血少之人又当慎用。

【文献参考】

《原机启微》谓：“柴胡复生汤，……以藁本、蔓荆子为君，升发阳气也。”

《银海精微》谓：“藁本味辛，入膀胱经，去巅头痛，引药上行。”