

Colour Illustrated Materia Medica

彩色图解中药学

沈连生 主编



华夏出版社

113136

彩色图解中药学

沈连生 主编

华夏出版社

解放军医学图书馆(书)



00211162

图书在版编目(CIP)数据

彩色图解中药学/沈连生主编. - 北京:华夏出版社,2000.4

ISBN 7-5080-2078-2

I. 彩… II. 沈… III. 中草药-图解 IV. R28-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 74006 号

出版发行: 华夏出版社

社 址: 北京东直门外香河园北里 4 号(100028)

经 销: 新华书店

印 刷: **中国科学院印刷厂**

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 17.5

版 次: 2000 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2000 年 4 月北京第 1 次

印 数: 6000 册

定 价: 128.00 元

本馆图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

编写人员

主 编	沈连生		
副主 编	张 静	卢 颖	杜海燕
编 委	王海祥	苏子仁	曾蔚欣
	曾惠芳	何锦钧	张镐京
	方 翔	闫永红	
参 编	马泽新	梅 娜	梁楚力
	吴玲燕		

编写说明

一、本书收载的中药种类,主要依据高等中医药院校规划教材《中药学》及《中药鉴定学》所收载的品种,以及《中华人民共和国药典(一部)》(2000年版)的药材品种,共收载中药628种(包括附药)。有些中药有数种药材来源的,也依据《药典》作了收载。如柴胡收载了北柴胡、南柴胡,黄连收载了味连、雅连、云连,川贝母收载了松贝、芦贝、青贝,土鳖虫收载了地鳖、冀地鳖等等。有些中药有数种中药饮片的,也依据《药典》作了收载,或作了文字说明。如半夏收载了生半夏、姜半夏、清半夏、法半夏,附子收载了黑附片、白附片,龟甲收载了龟甲、醋龟甲、龟甲胶等等。因此,实际收载的中药与中药饮片远远超出628种。各中药店、中药房、中药场库所流通营销的中药材与中药饮片品种,基本上包容在本书中。此外,还收载和附收了部分地区性用药及部分中药的混伪品约计70种,以利于在营销与应用中药时辨别真伪。

二、本书包括文字与彩色图照两部分。文字内容重点介绍中药材与中药饮片的特征和功能主治,力求简明实用,言无虚发。其名称包括了中文名称、拉丁文名称、英文名称、日文名称;基原除名称外,仅说明主要分布地区与药用部位;彩色图照包括了基原(原植物、原动物、原矿物)及药材与中药饮片两部分,突出药材与中药饮片的彩照,对少数教极细小的子实类药材适当进行了放大。收载彩色图照共计1403幅。彩色图照均为作者亲自拍摄,定名正确,图形清晰,色泽真实,利于辨认。

三、为便于中药与中医两方面人员使用,本书采用《中药学》(高等中医药院校规划教材)按功能分类的方式,药序也基本与《中药学》对应,共分21类。

四、本书除全面收载常用中药外,还收载了部分地区性用药及部分中药的混伪品,文简意明,图文并茂,是一部信息量大、知识密度高的实用图解中药工具书。适用于:

1. 各中药店、中药房、中药场库的执业药师、药剂师及有关人员参考使用。

2. 中医药院校教授《中药学》参考,是学生学习中药与中药饮片形态特征的合适教材。也可作为学生学习《中药鉴定学》参考。

3. 广大中医师临床用药时参考。中药来源及加工均较复杂,一种中药多种来源,一种中药多种中药加工品,以及混伪品等等,均需要中医师识别常用中药与常用中药饮片的特征。古代的中医名家大多是能辨药认药的。中医师熟读本书不仅能辨认常用中药,同时也能提高用药精度与临床效果。

4.《药典》中的中药材品种本书基本作了收载,所以也可作为应用、学习《药典》时参考。

目 录

1. 解表药

麻黄	1
桂枝	1
紫苏叶(附药:紫 苏梗)	2
生姜(附药:生姜 皮)	2
香薷	3
荆芥	3
防风(附:川防风、 云防风)	3
羌活	4
白芷	5
细辛(附:杜衡)	5
藁本	6
苍耳子	7
辛夷	7
葱白(附药:葱子)	8
胡荽	8
怪柳	9
鹅不食草	9
薄荷	9
牛蒡子	10
蝉蜕	10
桑叶	10
菊花	11
蔓荆子	11
柴胡	12
升麻(附:红升麻)	13
葛根(附药:葛花)	14
豆豉	14
大豆黄卷	15
浮萍	15
木贼	15

2. 清热药

杜荆	16
苦丁茶	16
桉叶	17
石膏	17
寒水石	17
知母	18
芦根	18
天花粉	18
竹叶	19
淡竹叶	19
鸭跖草	19
栀子(附:水栀子)	20
夏枯草	20
决明子	21
谷精草	21
密蒙花	21
青箱子(附:鸡冠 花子)	22
黄芩	22
黄连	23
马尾连	23
黄柏	23
龙胆	24
秦皮	25
苦参	25
苦木	25
白鲜皮	26
椿皮	26
凤尾草	26
功劳木	27
金银花(附药:忍 冬藤)	27
连翘	28

蒲公英	28
紫花地丁	28
苦地丁	29
甜地丁	29
野菊花	29
穿心莲	30
大青叶(菘蓝叶)	30
蓼蓝叶	30
马蓝叶	31
路边青叶	31
板蓝根	31
南板蓝根(马蓝 根)	32
青黛	32
绵马贯众	32
紫萁贯众	33
狗脊贯众	33
鱼腥草	33
金荞麦	34
红藤	34
败酱草(附药:墓 头回)	35
北败酱	35
射干	36
广豆根	36
北豆根	36
锦灯笼	37
马勃	37
白头翁	37
翻白草	38
委陵菜	38
马齿苋	38
鸦胆子	39
猪胆粉	39

地锦草	39
重楼	40
拳参	40
半边莲	41
半枝莲	41
白花蛇舌草	41
山慈姑	42
光慈姑	42
土伏苓(附:菝葜 根茎)	43
熊胆(附:牛胆)	43
马宝	44
猴枣	44
狗宝	45
祁州漏芦	45
禹州漏芦	45
白敛	46
四季青	46
绿豆	46
白毛夏枯草	47
鸡骨草	47
草珊瑚	47
无花果	48
木鳖子	48
金果榄	48
金莲花	49
天葵子	49
生地黄	49
玄参	50
牡丹皮	50
赤芍	50
紫草	51
水牛角	51
青蒿	52

白薇	52
地骨皮	52
银柴胡(附:山银 柴胡)	53
胡黄连	54
余甘子	54
3. 泻下药	
大黄	55
芒硝(附药:玄明 粉)	55
番泻汁	56
芦荟	56
火麻仁	56
郁李仁	57
亚麻子	57
甘遂	58
京大戟	58
红大戟	58
羌花	59
牵牛子	59
商陆	60
巴豆(附药:巴豆 霜)	60
千金子(附药:千 金子霜)	61
乌柏子	61
油桐子、果	62
油茶子	62
蓖麻子	62
4. 祛风湿药	
独活	63
威灵仙	63
川乌	64

草乌(附药:草乌叶)	64	闹羊花	79	地肤子	94	洋地黄叶	110	苦楝皮	123
雪上一支蒿	65	两面针	80	海金沙	95	8. 理气药		槟榔	124
蕲蛇	65	丁公藤	80	石韦	95	橘皮(附药:橘核、橘络、橘叶、橘红)	110	南瓜子	124
金钱白花蛇	65	5. 化湿药		冬葵子	96	化橘红	111	鹤草芽	124
金环蛇	66	藿香	81	苘麻子	96	青皮	111	雷丸	125
赤链蛇	66	广藿香	81	灯心草	96	枳实、枳壳	111	鹤虱	125
乌梢蛇	66	佩兰	81	粉草薜	97	木香	112	南鹤虱	125
蛇蜕	67	苍术	82	绵草薜	97	川木香	112	榧子	126
雷公藤	67	厚朴(附药:厚朴花、大叶木兰皮)	83	茵陈蒿	97	土木香	112	羌活	126
木瓜	67	砂仁	84	金钱草(附:聚花近路黄、天胡荽)	98	沉香	113	阿魏	126
光皮木瓜	68	海南砂	84	连钱草	99	檀香	113	11. 止血药	
蚕沙	68	白豆蔻	84	广金钱草	99	香附	113	大蓟	127
伸筋草	68	草豆蔻	85	虎杖	99	川楝子	114	小蓟	127
寻骨风	69	草果	85	地耳草	100	乌药	114	地榆	127
海风藤	69	红豆蔻	85	垂盆草	100	荔枝核	114	槐角、槐花	128
老鹳草	70	6. 利水渗湿药		积雪草	100	佛手	115	侧柏叶	128
路路通(附药:枫香脂)	70	茯苓(附药:茯苓皮、茯神)	86	菊苣	101	香橼	115	白茅根	128
秦艽	71	薏苡仁	86	白屈菜	101	枸橘	115	苘麻根	129
防己	71	猪苓	87	紫杉	101	玫瑰花	116	羊蹄	129
广防己	72	泽泻	87	枳椇子	102	绿萼梅	116	铁苋菜	129
桑枝	72	冬瓜皮(附药:冬瓜子)	88	三白草	102	薤白	116	三七	130
豨莶草	72	玉米须	88	青叶胆	102	青木香	117	景天三七(土三七)	130
臭梧桐	73	葫芦	88	7. 温里药		大腹皮	117	菊三七(见肿消)	130
海桐皮	73	香加皮	89	附子	103	柿蒂(附药:柿霜)	117	藤三七	131
络石藤(附:薜荔络石藤)	73	淫漆	89	干姜	103	刀豆	118	茜草	131
穿山龙	74	蜈蚣	89	肉桂(附:土肉桂)	103	甘松	118	蒲黄	131
丝瓜络	74	荠菜	90	肉桂子	104	九香虫	119	花蕊石	132
徐长卿	75	赤小豆	90	吴茱萸(附:臭辣树果)	105	婆罗子	119	降香	132
白花菜	75	水红花子	90	小茴香	105	预知子	119	槿花、槿叶	132
石南叶	75	车前子(附药:车前草)	91	八角茴香(附:莽草果、红茴香)	106	广枣	120	白及	133
夏天无	76	滑石	91	高良姜	107	9. 消食药		仙鹤草	133
地枫皮	76	关木通	92	花椒(附药:椒目)	107	山楂	120	紫珠	133
两头尖	76	川木通	92	丁香(附药:母丁香)	108	神曲	121	棕榈炭	134
鹿衔草	77	白木通	92	草薹	108	麦芽	121	血余炭	134
五加皮	77	通草	93	荜澄茄	108	谷芽(粟芽)	121	藕节	134
桑寄生	77	小通草	93	胡椒	109	稻芽	122	鸡冠花	135
槲寄生	78	蒺藜	93	山奈	109	莱菔子	122	刺猬皮	135
狗脊	78	瞿麦	94			鸡内金	122	松花粉	135
千年健	79					鸡矢藤	123	炮姜	136
青风藤	79					10. 驱虫药		艾叶	136
						使君子	123	灶心土	136
								断血流	136

虫白蜡	137	穿山甲	152	金礞石、青礞石	168	15. 平肝息风药	红芪	202	
亚乎奴	137	干漆	152	钟乳石	169	石决明	185	白术	202
12. 活血化瘀药		喜树	153	胖大海	169	珍珠(附药:珍珠母)	186	山药	203
川芎	137	急性子	153	苦杏仁(附药:甜杏仁)	170	牡蛎	187	白扁豆(附药:扁豆衣、扁豆花)	203
延胡索	138	鬼箭羽	153	紫苏子(附:白苏子)	171	紫贝齿	187	甘草	204
郁金	138	鼠妇虫	154	百部	172	代赭石	188	大枣	204
姜黄(附药:片姜黄)	139	马鞭草	154	紫菀(附:山紫菀)	173	白蒺藜	188	饴糖	204
乳香	139	九里香	154	款冬花	173	罗布麻叶	188	蜂蜜	205
没药	140	小叶莲	155	马兜铃	174	羚羊角	189	灵芝	205
五灵脂	140	13. 化痰止咳平喘药		枇杷叶	174	钩藤	189	绞股蓝	205
丹参	140	半夏(附:水半夏)	155	桑白皮	174	天麻(附:羊角天麻、紫茉莉根、大理菊根)	190	刺五加	206
红花	141	天南星(附药:胆南星)	156	葶苈子	175	地龙	191	珠子参	206
番红花	141	白附子(附:关白附)	157	白果(附药:银杏叶)	175	全蝎	191	竹节参	206
桃仁	141	芥子	158	矮地茶	176	蜈蚣	192	鹿茸(附药:鹿角、鹿角霜、鹿角胶)	207
黄杨宁	142	皂荚(附药:皂角刺)	159	洋金花	176	僵蚕(附药:僵蛹)	192	巴戟天(附:虎刺根、羊角藤根)	208
益母草(附药:茺蔚子)	142	旋覆花(附药:金沸草)	159	焯菜	177	玳瑁	192	淫羊藿	209
泽兰	142	白前	160	猫爪草	177	稀豆衣	193	仙茅	209
牛膝	143	前胡	161	松萝	178	大仙子	193	补骨脂	210
川牛膝	143	桔梗	161	木蝴蝶	178	16. 开窍药		益智	210
鸡血藤(附:山鸡血藤、昆明鸡血藤)	143	川贝母(附:一轮贝母、丽江山慈姑)	162	华山参	178	麝香(附:伪香囊)	194	海狗肾	210
王不留行	144	浙贝母	163	明党参	179	冰片	195	狗肾	211
月季花	145	伊贝母	163	颠茄草	179	苏合香	195	海马	211
凌霄花(附:泡桐花)	145	湖北贝母	163	青果	180	石膏蒲(附:水菖蒲、九节菖蒲)	196	海龙	212
卷柏	146	平贝母	164	罗汉果	180	蟾酥(附药:干蟾)	197	肉苁蓉(附药:草苁蓉)	212
土鳖虫(虻虫)	146	土贝母	164	罗汉果	180	樟脑	198	锁阳	213
金边土鳖虫	147	瓜蒌	164	满山红	180	安息香	198	菟丝子(附:大粒菟丝子)	213
自然铜	147	竹茹	164	沙棘	181	17. 补虚药		沙苑子(附:华黄芪子、紫云英子、猪屎豆)	214
苏木	147	大竹黄(附:真菌竹黄)	165	14. 安神药		人参(附:人参叶、商陆根、伪制人参)	199	杜仲	215
骨碎补	147	海藻	166	朱砂	181	西洋参(附:小人参伪制洋参)	200	续断	215
马钱子	148	昆布	166	磁石	181	党参	201	韭菜子	215
血竭	148	黄药子	167	龙骨、龙齿	182	太子参	201	阳起石	216
儿茶	149	海蛤壳	167	琥珀	182	黄芪	202	葫芦巴	216
刘寄奴(附:北刘寄奴)	149	海浮石	168	酸枣仁	182			核桃仁	216
莪术	150	瓦楞子	168	柏子仁	183			蛤蚧	217
三棱	150			远志(附药:小草)	183				
荆三棱	151			合欢皮、合欢花(附:夜合花)	184				
水蛭	151			夜交藤	184				
虻虫	152			紫石英	185				

冬虫夏草(附:伪 制冬虫夏草) 217	枸杞子 226	石榴皮 234	藜芦 240	轻粉 245
紫河车(附药:脐 带) 218	墨旱莲 226	诃子(附药:藏青 果) 234	20. 解毒杀 虫燥湿 止痒药	白降丹 246
蛤土蟆油 218	女贞子 227	肉豆蔻 235	雄黄 240	砒石 246
当归 218	桑椹 227	赤石脂 235	硫黄 241	铅丹 246
熟地黄 219	黑芝麻 228	禹余粮 235	白矾 241	炉甘石 246
白芍 219	龟甲(附药:龟甲 胶、杂龟甲) 228	山茱萸(附:滇枣 皮) 235	蛇床子 242	硼砂 246
何首乌 220	鳖甲 229	覆盆子 236	大风子 242	硫砂 247
阿胶 220	楮实子 229	桑螵蛸 236	土槿皮 242	斑蝥 247
龙眼肉(附:荔枝 肉、龙眼) 221	枸骨叶 229	海螵蛸 237	川槿皮 243	守宫 248
北沙参 221	黑种草子 230	金樱子(附:山刺 玫) 237	蜂房 243	蜂蜡 248
南沙参 222	蕤仁 230	莲子(附药:莲子 心、莲须、莲房、 荷叶、荷梗) 238	大蒜 244	中文名称索引 249~253
百合 222	18. 收涩药	芡实 239	皂矾 244	拉丁文名称索引 254~259
麦冬 223	浮小麦 230	19. 涌吐药	毛茛 244	英文名称索引 260~265
山麦冬 223	麻黄根 231	常山 239	密陀僧 244	日文名称索引 266~269
天冬 223	糯稻根须 231	瓜蒂 239	木芙蓉叶 245	
石斛 224	五味子 231	胆矾 240	松香 245	
玉竹 225	乌梅(附:烘干山 杏、山桃) 232		21. 拔毒化腐 生肌药	
黄精 225	五倍子 233		升药 245	
	罌粟壳 233			

1. 解 表 药

麻 黄 マオウ *Ephedra*



草麻黄(麻黄科) *Ephedra sinica* Stapf 主产东北、华北等地区。生长干燥高地、山岗。药用茎。秋季采收。



木贼麻黄(麻黄科) *Ephedra equisetina* Ege. 药用茎。



药材 细长圆柱形,直径1~2mm,有时带少量木质茎,淡绿色至黄绿色,有细纵棱线,粗糙。节明显,节间

长2~6cm,节上有膜质鳞片2,先端反曲,基部筒状。气微香,味微苦涩。

饮片 横切段,黄绿色,断面略呈纤维性,外圈绿黄色,中央髓部暗红棕色。蜜炙麻黄,深黄色。

功能主治 发汗,平喘,利水。用于风寒感冒,胸闷喘咳,风水浮肿,哮喘。3~10g。

桂 枝 ケイシ *Cinnamomum Twig*



肉桂(樟科) *Cinnamomum cassia* Presl 主产广东、广西,云南、福建亦产。嫩枝入药。3~7月剪下嫩枝。



药材 长圆柱形,有分枝,细枝略呈四棱形,表面红棕或紫棕色,可见叶痕、芽痕及细点状皮孔,较粗枝条皮部作环状横裂,细枝皮部易剥落露出红棕色木部,质硬,脆,易折断。微有清香气,味甜、微辛。

饮片 厚片 横断面皮部薄,褐棕色,木质部黄白色或灰黄色,髓部略呈方形。皮部味较浓。

功能主治 发汗解表,温经通阳。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸。3~10g。

紫苏叶 (附药:紫苏梗) シソ Purple Perilla leaf



紫苏(唇形科) *Perilla frutescens* (Britt.) Britt. 主产江苏、浙江等省,叶、茎、果均药用。夏季采收茎、叶,秋季采果。



紫苏梗 方柱形,四棱钝圆,直径0.5~1.5cm。表面带棕色或暗紫色,节稍膨大,有对生叶痕或枝痕。体轻,质硬,难折断,断面裂片状。

紫苏梗咀 横切片,斜长方形。皮部易剥落,木部黄白色,有细密的放射状纹理,髓部白色,疏松或脱落。气微香,味淡。

功能主治 宽胸利膈,行气安胎。用于胸腹胀满,痞闷作胀及胎动不安,腹肋胀痛等。3~10g。



紫苏叶 多皱缩卷曲,破碎。湿润展平后,为卵圆形,两面紫色,或上面绿色,下面紫色。质脆,气清香,味微辛。

功能主治 解表散寒,行气宽中,解鱼蟹毒。用于风寒感冒,咳嗽吐逆,妊娠呕吐,鱼蟹中毒。3~10g。

生姜 ショウキョウ Fresh Ginger



姜(姜科) *Zingiber officinale* Rosc. 大部分地区有栽培。药用根茎,冬季采挖,鲜用。



药材 扁平块状,具指状分枝。表面灰黄色或淡灰棕色,有纵皱纹及明显的环节,分枝顶端有茎痕或芽。气香,特异,味辛辣。

饮片 药材趁鲜切片为生姜片。生姜块或片用草纸包煨至半熟为煨姜,边缘稍内卷,切面黄色,边缘偶见焦斑。

功能主治 解表散寒,温中止呕,化痰止咳。用于风寒感冒,胃寒呕吐,寒湿咳嗽。3~10g。

香薷 コウジュ *Elscholtzia Mosla*



石香薷(唇形科) *Mosla chinensis* Maxim. 主产江西、河北、河南、安徽。药用地上部分。夏秋采收。



药材 基部紫红色,上部黄绿色或淡黄色,全体密被白色柔毛。茎方柱形,节明显。质脆,易折断。叶多皱缩或脱落,叶片展平后卵状三角形或披针形,可见背面凹下的腺点。茎顶有果穗,宿萼钟状,先端5裂,密被茸毛。气浓清香,味凉微辛。

饮片 为长约5mm的段。茎切面方形,中央有白色的髓。

功能主治 发汗解表,和中利湿。用于暑湿感冒,恶寒发热,头痛无汗,腹痛吐泻,小便不利。3~10g。

荆芥 ケイガイ *Schizonepeta*



荆芥(唇形科) *Schizonepeta tenuifolia* Briq. 主产江苏、浙江、河南、河北、山东。多为栽培。地上部分入药。夏、秋花开到顶,穗绿时采制。



药材 茎方柱形,上部有分枝。表面淡黄绿色或淡紫红色,被短柔毛,体轻,质脆,断面类白色。叶对生,多已脱落,叶片3~5羽状分裂。穗状花序顶生。小坚果棕黑色。气芳香,味微涩而辛凉。

饮片 花穗为荆芥穗,淡棕色或黄绿色。炒炭后呈褐色,称芥穗炭。

切横段称荆芥咀,长约1cm。切面纤维状,黄白色,中间有海绵状中心。

功能主治 解表散风,透疹。用于感冒,头痛,麻疹,风疹,疮疡初起。炒炭止血。3~10g。

防风 (附:川防风、云防风) ホウフウ *Ledebouria Root*(センボフウ、ウンボフウ *Brachylobus Ligusticum Root*, *Seseli Root*)



防风(伞形科) *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 主产东北及内蒙古东部。野生丘陵山坡草丛中。药用根。春秋采挖。



药材 长圆柱形,下部渐细。根头部有明显密集的环纹,习称“蚯蚓头”,环纹上有棕褐色毛状残存叶基。表面灰棕色,粗糙,有纵皱纹,横长皮孔及点状突起的细根痕。体轻,质松。气特异,味微甘。

饮片 厚片,厚2~4mm。横切面有裂隙,皮部浅棕色,散布黄棕色油点;木质部浅黄色,形成层环棕色。

功能主治 解表祛风,胜湿止痉。用于感冒头痛,风湿痹痛,风疹瘙痒,破伤风。3~10g。



川防风(伞形科) *Ligusticum sinense* Franch. 的根在西南地区作防风入药,是防风的混乱品种



竹叶防风(伞形科) *Seseli delavayi* Franch. 的根在西南地区也作防风入药,叫云防风,是防风混乱品种



川防风 长10~15cm,表面棕黄或浅褐色,有侧根或根痕,有的纵皱明显,顶端1至数个茎基,无纤维状物,质坚实,断面淡黄白色,皮部约占三分之一强,形成层环明显,棕色,味甘,气微。



云防风 根细长,表面红棕色至红褐色,侧根及根痕少,纵皱明显,扭曲。顶端一般具1个茎基,黑褐色纤维状物极少。质坚实,断面类白色,皮部广,约占三分之二,形成层明显,黄棕色。气香,味微辛而涩。

羌活 キョウカツ *Notopterygium* Root



羌活(伞形科) *Notopterygium incisum* Ting ex H. F. Chang. 主产青海、四川、甘肃。生长高山向阳山坡草丛及灌丛中。药用根及根茎。春秋采收。尚有宽叶羌活的根及根茎入药。



药材 略弯曲的根茎,环节紧密似蚕,称“蚕羌”,表面棕褐色至棕黑色,有点状或瘤状根痕及棕色破碎鳞片,外皮脱落处呈棕黄色。根茎环节疏生似竹节者称“竹节羌”,根茎粗大,呈不规则环节状而多分枝者称“大头羌”。类圆形根及根茎,称“条羌”。大头羌及条羌均来自宽叶羌活。气香,味微苦而辛,条羌气味较淡。

饮片 横切片为类圆形及不规则片状,厚2~4mm。皮部棕黄色,有黄色分泌腺,称“朱砂点”。木质部黄白色,放射状,呈菊花样纹理,髓黄色至黄棕色。纵切片为长条形,皮部及髓为黄棕色,之间为白色条状的木质部。

功能主治 散寒祛风,除湿止痛。用于风寒感冒头痛,风湿痹痛,肩背酸痛。3~10g。

白芷 ヒヤグシ Dahurian Angelica Root



杭白芷 (伞形科) *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) 主产于浙江, 福建, 河北等省, 现多栽培。药用部位为根, 夏秋间叶黄时采收。



白芷 (伞形科) *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan. 主产于东北地区及山东, 河北等省。多生于河岸, 溪边, 现多栽培。



杭白芷药材 与白芷近似, 主要不同点为横向皮孔样突起成四纵列排列, 根具四纵棱, 即方头圆身。


杭白芷片 椭圆形及圆形切片, 形成层环, 木质部略呈方形, 木质部约占断面的 1/2。



白芷药材 长圆锥形, 表面灰黄色至黄棕色, 有多数纵皱纹及支根痕, 有皮孔样的横向突起。顶端有凹陷的茎痕。质硬, 断面灰白色, 粉性。气芳香, 味辛, 微苦。
白芷片 圆形横切片或纵切片, 厚 2~3mm。切面类白色或灰白色, 形成层环纹棕色, 明显。圆形, 木质部约占断面的 1/3, 具放射状纹理, 皮部有多数棕色油点, 周边灰棕或黄棕色。

功能主治 散风祛湿, 通窍止痛, 消肿排脓。用于感冒头痛, 眉棱骨痛, 鼻塞, 牙痛, 白带, 疮疡肿毒。3~10g。

细辛 (附: 杜衡) サイシシ *Asarum Herb* (トコウ Forbes Wildginger Herb)



北细辛 (马兜铃科) *Asarum heterotropoides* Fr. var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag. 主产东北各省。多生林下及山沟阴湿处。以带根全草入药, 于 6~7 月间连根挖取。



华细辛 (马兜铃科) *Asarum sieboldii* Miq. 主产陕西, 河南, 山东。分布于山谷溪边, 林下, 岩石旁等阴湿处。以带根全草入药。6~7 月间采收。




药材 根茎呈不规则圆柱形, 表面灰棕色, 粗糙有环形的节。根细长, 密生节上。质脆, 易折断, 断面黄白色。根茎上生有 1~3 叶, 叶具长柄, 完整叶片心形至肾状心形, 表面淡绿色。有时可见花或果实, 花多已皱缩, 暗紫色, 钟形, 蒴果半球形。气辛香, 味辛辣麻舌。

饮片 切成 1cm 咀入煎剂。

功能主治 祛风散寒, 通窍止痛, 温肺化饮。用于风寒感冒, 鼻渊头痛, 寒痰咳嗽。1~3g。



杜衡(马兜铃科) *Asarum forbesii* Maxim. 主产华东, 生林间下较潮湿处。全草称土细辛, 是细辛的混乱品种。



藁本(伞形科) *Ligusticum sinense* Oliv. 根茎和根入药。



杜衡(土细辛)药材 根茎为不规则圆柱形, 微棕至淡黄棕色, 下部生多数须根, 根细圆柱形, 长约7cm, 直径1~2mm, 表面灰白至淡棕色, 具细纵皱。质脆, 断面类白色, 叶基生, 柄长, 叶片宽心形至肾形, 先端圆钝, 形似马蹄。干品叶缘卷缩, 质硬而脆。气芳香, 叶辛辣。



藁本药材 不规则结节状圆柱形, 有分枝, 表面棕褐色或暗棕色, 粗糙, 有纵皱纹, 上侧残留数个凹陷的圆形茎基。体轻, 质硬, 易折断。气浓香, 味辛苦, 微麻。

藁本片 不规则形横切片, 厚2~4mm。切面黄白色或黄色, 纤维状, 形成层环明显, 土棕色。皮部有棕红色“朱砂点”, 本部有裂隙, 纤维成丝状束, 髓宽大。

藁本 コウホン *Ligusticum Rhizome*



辽藁本(伞形科) *Ligusticum jeholense* Nakai et Kitag. 主产辽宁、河北。野生林缘和林下。药用根及根茎。早春或秋末采收。



辽藁本、辽藁本片 较小, 呈不规则团块或柱状, 有多数细长弯曲的根。

功能主治 祛风散寒, 除湿止痛。用于风寒感冒, 头痛, 风湿关节疼痛。3~10g。

苍耳子 ソウジシ Xanthium



苍耳(菊科) *Xanthium sibiricum* Patr. 全国均有。生荒坡草地或路旁。带总苞的果实(苍耳子)药用。秋季成熟后采收。



苍耳子 纺锤形,两头尖,形似枣核。灰绿色或黄绿色,全体有钩刺,顶端有两枚较粗的刺,基部有果柄痕。质硬而韧,体轻。气微,叶微苦。饮片需碾去刺,或再炒黄。

功能主治 散风湿,通鼻窍。用于风寒头痛,鼻渊流涕,风疹瘙痒,湿痹拘挛。3~10g。

辛夷 シンイ Magnolia Flower



望春花(木兰科) *Magnolia bicolor* Pamp. 主产河南、安徽、湖北、四川。野生山坡、林内或路边。药用花蕾,称辛夷。冬末春初花未开时采收。



玉兰(木兰科) *Magnolia denudata* Desc. 广为栽培。花蕾是辛夷主要来源之一。此外,还有武当玉兰花蕾作辛夷入药。



辛夷(望春花) 长卵形,似毛笔头,长1.2~2.5cm,直径0.8~1.5cm,基部具短梗而较细。苞片2~3层,外表密被灰白或灰绿色茸毛。花被3轮,外轮约为内2轮长的1/4,呈萼片状。味辛凉而微苦。



辛夷(玉兰) 较望春花辛夷长,长约1.5~3cm。基部枝梗较粗壮。苞片表面茸毛灰白黄或灰绿色,花被3层,内外轮大小相似。



辛夷(武当玉兰) 较长大,长2~4cm,直径1~2cm。基部枝梗粗壮。苞片外表茸毛淡黄或淡黄绿色,外层苞片茸毛已脱落而呈黑褐色。花被片较多,内外轮大小相似。

功能主治 散风寒,通鼻窍。用于外感风寒,头痛鼻塞,鼻渊头痛。3~9g。