

陳存仁編校

皇漢醫學叢書

田中榮信編

長沙證彙

上海中醫學院出版社

WY5 | 2305

長沙證要提要

治國醫學者莫不宗張長沙爲醫中之聖。而傷寒金匱兩書亦爲必讀之經。故注疏是兩書者。奚啻百數十輩。要皆爲讀者謀便利計焉。然吾人嘗主張須用科學法整理古醫書。俾一覽瞭然。無望洋生嘆之感。是書爲東洋傳本。將長沙書中各證因類而彙之。某證用某方。一考即得。若有能仿其式而編各書則研究古醫書自易入手也。

長沙證彙序

夫物之爲物也。有本乎天者也。有成乎人者也。本乎天者爲性能之用。而成乎人者致性外之用也。水雖清冷。火蒸則爲熱。金雖堅剛。鑄竊則如泥。是合和之妙用。而人功之所以並於天地也。蓋醫之於藥。制之於方。則人巧既加。而功用自異。雖知其一藥之能。不審方法之道。得其功也難矣。世之庸醫。曾不留意於茲。預寫病證。漫投藥劑。其驗不見。則爲方之咎。屢移其治。譬於射者。射而不中。反修於招也。何功之有哉。夫欲爲良醫者。不可不先達方法之道。熟視病證之變。凡病有內同而外異。亦有內異而外同。同不同。異不異。皆證之相似也。故玉人患石之似玉。相劍者患劍之似刀。相似之物。愚者之所大惑。而智者之所加慮也。頃者播之田。愿仲作一冊子。名曰長沙證彙。蓋此著也。集長沙論中其病狀之相似者。建門分類。各載其主方。欲使無疑惑之患。是田氏之所篤於醫。而飲之所以好其志也。

書以題此卷首。

寃政二年庚戌之春平安吉益飲修夫題

長沙正經證彙序

夫仲景氏方論。悉古之遺訓。而對證奏效焉。後之業醫者。亦莫不講焉。然其文高古。往往意在文外。得其旨趣最難矣。且雜之以陰陽傳經脈說。或曰補。曰能。曰寒。熱。相協成說。是皆古疾。醫所不論。大失經義矣。遂使後人不知古之方方各有妙。而存者一千有餘年矣。舉世莫能覺悟焉。方今國

運隆盛。醫亦益造其道。然多拘因名而隨證案方者特鈔矣。間有知之者。亦不察依證之淺深緩急。而方亦異焉。余深以爲憂。於是就仲景氏書輯其方證相對者。分門聚類。始能爲編藏之家久矣。近濱天祐奧元純二生。請梓以公之世。使一時醫者。知治術妙用。唯在證方相的當。而無復餘論也已。余深好其志。再加釐正以授之。雖未能盡得方意。庶幾乎免舍本求末之譏云爾。

日本寛政庚戌春二月田中榮信撰

長沙證彙序

方法醫本也。古今無有異議焉。但唐宋以還。名家方論。方彙。陸續鄭重。奚翹千百云也乎。從平由漢以前。周秦疾醫之道。史傳不載。廬廬乎其方甚深。後世安得廣施之人邪。纔有仲景氏遺論。傷寒。金匱二書而見之而已。今閱此冊。則分證立病門。參照彼二書。錄各方於其下。錯綜銓次。深造其理。因命曰長沙證彙。誠前人所以悉後。今人所以識古。乃本立道生。是作者微旨也。作者則播州暉浦老醫田中。願仲矣。予素不解方伎。然唯喜此人有好古之名。而獎就四方之士。敢附一辭云。

寛政三年辛亥十月穀旦浪華後學播州奥田元繼識

凡例

一此編摭長沙氏正經，彙括諸章，去煩歸簡，欲易見也。如其傷寒論辨別，有逢原撰，不贅於此。

一世有傷寒類證者，其書本陰陽六經主脈狀，其杜撰謬妄不可勝計，且與仲景氏之意大有逕庭也，不必取。一編中有證同方異者，蓋依有病毒之淺深緩急也。又不立發熱門者，熱之於病十八九，仲景氏依熱之大小有無耳，別無可處之方，無可加減之藥，病愈熱從之。一此編傷寒金匱中或有證無方，或有方無證者，其他可疑者皆不載之，以俟識者耳。

男田中榮恆謹識

目次

嘔吐門(附唾涎沫噦嘔)	一	喘門(附咳嗽)	一
大便不通門(附鞭難)	四	諸黃門	一
小便不利門(附難自利自調)	五	下利門(附便濃血)	一
上衝門(附上氣氣逆)	七	水腫門(附身重)	一
腹痛門(附滿脹少腹滿痛)	八	短氣門	三〇
結胸門(附胸痹)	一〇	咽痛門(附咽喉不利)	三一
心下痞鞕門(附痞心中痞堅滿)	一一	血證門(附經水不調)	三一
胸脴苦滿門(附痛)	一二	不仁門	三二
心下悸門(附膽下悸)	一二	心中悞悞門	三三
惡寒門(附惡風往來寒熱振寒)	三四	身瞶門	三三
厥冷門(附厥逆)	一六	不得眠門(附臥起不安)	三三
煩門	一七	識語門	三四
汗出門(附黃汗盜汗)	一九	發狂門	三四
身瘡痛門(附骨節痛)	一一	癰膿門(附肺癰)	三五
頭痛門	一一	蛇蟲門	三五
頸項強門	一一	陰疾門	三六
渴門(附口乾舌燥)	一三	留飲門	三六
頭眩門(附冒眩)	一五	宿食門	三六
裏急門(附拘攣痛)	一五	雜門	三六

諸方目次

小半夏湯	三九	桂枝加厚朴杏子湯	四〇
小半夏加茯苓湯	三九	桂枝去芍藥加皂莢湯	四〇
大半夏湯	三九	桂枝加芍藥大黃湯	四〇
吳茱萸湯	三九	桂枝加龍骨牡蠣湯	四〇
大黃甘草湯	三九	桂枝加芍藥生薑人參湯	四〇
小茈胡湯	三九	桂枝去桂加茯苓朮朮湯	四〇
乾薑人參半夏丸	三九	桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯	四〇
乾薑黃連黃芩人參湯	三九	半夏瀉心湯	四〇
葛根湯	三九	甘草瀉心湯	四〇
葛根加半夏湯	三九	生薑瀉心湯	四〇
桂枝湯	三九	十棗湯	四一
桂枝加桂湯	四〇	大茈胡湯	四一
桂枝加芍藥湯	四〇	黃芩人參湯	四一
桂枝去芍藥湯	四〇	黃芩湯	四一
桂枝加葛根湯	四〇	黃芩加半夏生薑湯	四一
桂枝加黃芪湯	四〇	桂枝加芍藥湯	四一
桂枝加附子湯	四〇	桂枝加芍藥加附子湯	四一
桂枝去芍藥加附子湯	四〇	通脈四逆湯	四一
	四〇	茯苓四逆湯	四一

通脈四逆加猪膽汁湯	四	生薑甘草湯	四三
白通加猪膽汁湯	四	桔梗湯	四三
附子粳米湯	四一	桔梗白散	四三
黃連湯	四	梔子生薑豉湯	四三
茯苓澤瀉湯	四二	半夏厚朴湯	四三
文蛤散	四二	橘皮大黃朴硝湯	四三
猪苓湯	四二	茯苓飲	四三
猪苓散	四二	橘皮竹茹湯	四三
五苓散	四二	調胃承氣湯	四三
茈胡加芒硝湯	四二	旋覆花代赭石湯	四三
真武湯	四二	生薑半夏湯	四三
白虎加桂枝湯	四二	橘皮湯	四四
茈胡加桂枝湯	四二	橘皮竹茹湯	四四
竹葉石膏湯	四二	小承氣湯	四四
甘草乾薑湯	四一	大承氣湯	四四
小青龍湯	四一	桂枝附子湯	四四
半夏乾薑散	四一	桂枝附子去桂加朮湯	四四
皂莢丸	四一	蜜煎導	四四
芩甘蠶味辛夏湯	四三	豬膽汁方	四四
甘草粉蜜湯	四三	麻仁丸	四四
人參湯(一名理中丸)	四三	厚朴三物湯	四四
抵當湯	四三	抵當湯	四四

茯苓戎鹽湯	四五	大黃牡丹湯	四六
蒲灰散	四五	抵當丸	四六
滑石白魚散	四五	苓桂朮甘湯	四六
桃花湯	四五	大建中湯	四六
八味丸	四五	瓜蒂散	四六
桂枝甘草附子湯	四五	麥門冬湯	四七
葵子茯苓散	四五	葶苈大棗湯	四七
越婢湯	四五	桂枝枳實生薑湯	四七
越婢加朮湯	四五	枳實薤白桂枝湯	四七
越婢加半夏湯	四五	三物備急圓	四七
大黃硝石湯	四五	走馬湯	四七
茵陳蒿湯	四五	當歸芍藥散	四七
小建中湯	四五	芎歸膠艾湯	四七
茈胡桂枝乾薑湯	四五	枳實芍藥散	四七
茈胡加龍骨牡蠣湯	四五	下瘀血湯	四七
括蔥瞿麥丸	四六	烏頭桂枝湯	四七
苓桂五味甘草湯	四六	大烏頭煎	四七
歸母苦參丸	四六	烏頭湯	四八
大黃甘遂湯	四六	當歸生薑羊肉湯	四八
苓薑朮甘湯	四六	當歸建中湯	四八
芍藥甘草湯			

厚朴七物湯	附子瀉心湯
厚朴生薑甘草半夏人參湯	四八
己椒麌黃丸	四八
木防己去石膏加茯苓芒硝湯	四九
梔子厚朴湯	四八
梔子豉湯	四八
枳朮湯	五〇
桂薑棗草黃辛附湯	五〇
硝蠅散	四八
桃核承氣湯	四八
天雄散	四八
大陷胸湯	四八
土瓜根散	四八
大陷胸丸	四九
小陷胸湯	四九
茯苓杏仁甘草湯	四九
橘皮枳實生薑湯	四九
薏苡附子散	四九
括薑薤白半夏湯	四九
括薑薤白白酒湯	四九
桂枝人參湯	四五
赤石脂禹餘糧湯	四五
大黃黃連瀉心湯	四五
瀉心湯	四五
附子湯	五
附子瀉心湯	四九
木防己湯	四九
桂枝二越婢一湯	五〇
桂枝麻黃各半湯	五〇
大青龍湯	五〇
芍藥甘草附子湯	五〇

防己黃芪湯	五	頭風靡散	五三
白虎加人參湯	五	茈胡去半夏加括蕷湯	五三
蜀漆散	一	白頭翁湯	五三
牡蠣湯	五	文蛤湯	五三
白通湯	一	澤瀉湯	五三
白虎湯	五	雞屎白散	五三
當歸四逆湯	一	葛根黃連黃芩湯	五三
當歸四逆加吳茱萸生薑湯	五	一物瓜蒂湯	五三
烏梅圓	二	麻黃醇酒湯	五三
桂枝甘草龍骨牡蠣湯	二	猪膏髮煎	五三
酸棗仁湯	一	梔子蘖皮湯	五三
乾薑附子湯	二	麻黃連翹赤小豆湯	五三
黃連阿膠湯	二	梔子大黃豉湯	五四
猪膚湯	二	麻黃甘草湯	五四
麻黃加朮湯	二	防己茯苓湯	五四
三物黃芩湯	二	麻黃附子甘草湯	五四
梔子乾薑湯	二	黃芪建中湯	五四
桂枝二麻黃一湯	二	芩甘薑味辛夏仁湯	五四
麻黃杏仁甘草石膏湯	二	牡蠣澤瀉散	五四
黃芪桂枝苦酒湯	三	梔子甘草豉湯	五四
麻黃杏仁薏苡甘草湯	三		五四

半夏散及湯	甘草湯	苦酒湯	柏葉湯	黃土湯	赤小豆當歸散	桂枝茯苓丸	鑿石丸	黃芪桂枝五物湯	雄黃薑	鈍齒方	蛇牀子散
	五	四	五	五	五	四	五	五	五	五	五
	四	五	五	五	四	五	五	五	五	五	五
	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五

狼牙湯

蜘蛛散

枳實梔子豉湯

甘麥大棗湯

鑿石湯

苦參湯

薏苡附子敗醬散

排膿湯

茵陳五苓散

杏子湯

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

長沙證彙

播磨 田中榮信 愿仲編撰

南部 村尾茂喬維遷
越後 奧田邦憲祐菴
播磨 营原成美專輔
播磨 河野敬明淳治

同校

嘔吐門（附睡涎沫、噫噦）

諸嘔吐穀不得下者。小半夏湯。嘔家本渴。渴者爲欲解。今反不渴。心下有支飲故也。同方胃反嘔吐者。大半夏湯。食穀欲嘔者。吳茱萸湯。食已即吐者。大黃甘草湯。嘔而發熱者。小茈胡湯。傷寒五六日。嘔而發熱者。同方。妊娠嘔吐不止。乾薑人參半夏丸。傷寒本自寒下。醫復吐下之。寒格更逆。吐下。若食入口即吐。乾薑黃連黃芩人參湯。太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯。太陽中風。汗自出。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯。產後中風續得之。數十日不解。頭微痛惡寒。時時有熱。心下悶。乾嘔。汗出者。同方。

右十二法嘔吐不得食或發熱證

嘔心下痞鞕者。大半夏湯。嘔而腸鳴心下痞者。半夏瀉心湯。傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹下雪鳴。心下痞鞕而滿。乾嘔心煩不得安。甘草瀉心湯。太陽中風。下利嘔逆。表解者。乃可攻之。其人繁熱汗出。發作有時。頭痛。心下痞鞕。滿引脇下痛。乾嘔。短氣。汗出。不惡寒者。十棗湯。傷寒發熱。汗出不解。心下痞鞕。嘔吐而下利者。大茈胡湯。太陽病過經十餘日。反二三下之。後四五日。茈胡證仍在者。先與小茈胡湯。嘔不止。心下急。渺渺微煩者。大茈胡湯。卒嘔吐。心下痞。膈間有水眩悸者。小半夏加茯苓湯。乾嘔下利者。黃芩人參湯。乾嘔而利者。黃芩加半夏生薑湯。

右九法嘔吐心下痞鞕下利證

少陰病吐利。三足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯。嘔而脈弱。小便復利。身有微熱見厥者。四逆湯。既吐且利。小便復

利而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脈微欲絕者。同方。吐利。汗出發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷者。同方。少陰病飲食入口則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。若膈上有寒飲乾嘔者。不可吐也。急溫之。同方。少陰病下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。或乾嘔。或咽痛。通脈四逆湯。少陰病下利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加猪膽汁湯。

右七法嘔吐下利厥逆證

腹中寒氣雷鳴切痛。胸脇逆滿。嘔吐者。附子粳米湯。傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛欲嘔吐者。黃連湯。諸黃

腹痛而嘔者。小茈胡湯。

右三法腹痛嘔吐證

胃反吐而渴欲飲水者。茯苓澤瀉湯。吐後渴欲得水而貪飲者。文蛤散。少陰病下利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠者。猪苓湯。嘔吐而病在膈上。後思水者。猪苓散。先渴後嘔。爲水停心下。小半夏加茯苓湯。中風發熱六七日不解。而煩有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散。

右六法嘔吐渴證

傷寒六七日。中風往來寒熱。胸脇苦滿。默不欲飲食。心煩喜嘔。小茈胡湯。陽明病脇下鞭滿。不大便而嘔。舌上

胎者。同方。本（按本字玉函無）太陽病不解。脇下鞭滿。乾嘔不能食。往來寒熱。同方。產婦云云。大便堅。嘔不能食者。同方。傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。茈胡加芒硝湯。嘔而胸滿者。吳茱萸湯。

右六法胸脇苦痛嘔證

少陰病腹痛小便不利。四肢沉重疼痛。自下利或嘔者。真武湯。溫瘧者身無寒但熱。骨節疼痛。時嘔者。白虎加桂枝湯。傷寒六七日熱。熱微惡寒。支節疼痛。微嘔。心下支結者。茈胡加桂枝湯。

右三法支節疼痛嘔證

傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐者。竹葉石膏湯。傷寒云云。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。甘草乾薑湯。

右二法吐逆證

乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯。婦人吐涎沫。小青龍湯。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬或喘者。同方。乾

嘔吐逆吐涎沫者。半夏乾薑散。欬逆上氣。時時唾濁。但坐不得眠者。皂莢丸。欬逆倚息不得臥。小青龍湯。時復圓者。蒼桂五味甘草湯。反更欬。胸滿者。蒼甘五味薑辛湯。冒者必嘔。嘔者復內。半夏蒼甘薑味辛夏湯。假令瘦人肺下悸。吐涎沫而癲眩。此水也。五蒼散。虻蟲之爲病。令人吐涎沫。心痛發作有時。甘草粉蜜湯。大病差後喜睡。久了者。理中丸。

右九法乾嘔咳吐涎沫證

肺痿吐涎沫者。桂枝去芍藥加皂莢湯。肺痿欬唾。涎沫不止。咽燥而渴者。生薑甘草湯。肺痿吐涎沫而不咳者。甘草乾薑湯。欬而胸滿振寒。咽乾不渴。時出濁唾。腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。桔梗湯。同證。桔梗白散。

右五法肺痿肺癰涎沫渴證

發汗吐下後。虛煩不得眠。心中懊惱。若嘔者。梔子生薑豉湯。胸滿心下堅。咽中帖帖。如有炙肉。吐之不出。呑之不下者。半夏厚朴湯。心胸中有停痰宿水。自吐出後。心胸間虛氣滿不能食。茯苓飲。諭食之在心胸間不化。吐復不出。速下除之。橘皮大黃朴硝湯。病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。微心中懊惱然無奈。生薑半夏湯。太陽病過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩者。調胃承氣湯。陽明病不吐不下。心煩者。同方。

右七法病在心胸中欲嘔吐不出證

傷寒發汗。若吐若下。解後心下痞鞕。噫氣不除者。旋覆代赭石湯。傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞕。乾（按乾字下脫嘔字。）噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑導心湯。

右二法心下痞鞕噯證

乾嘔噯若手足厥者。橘皮湯。噯逆者。橘皮竹茹湯。黃疸病。小便色不變。欲自利。腹滿而喘噯者。小半夏湯。大便不通。暖數語者。小承氣湯。

右四法嘔逆證

大便不通門（附便難）

中惡心痛腹脹。大便不通者。走馬湯。少陰病六七日。腹脹不大便者。急下之。大承氣湯。大下後六七日。不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎也。同方。陽明病脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘有潮熱者。可攻裏。大承氣湯。發熱惡寒。若腹大滿不通者。小承氣湯。

右四法大便不通腹脹滿證

傷寒若吐若下後。不解。不大便五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。但發熱譏語者。大承氣湯。陽明病譏語有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎也。同方。二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足熱。熱汗出。大便難。而譏語者。下之則愈。同方。產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩躁發熱者。不食則譏語。同方。傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏（按裏字衍）。證。大便難。身微熱者。同方。病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。同方。得病二三日云云。須小便利。屎定輒乃可攻之。同方。陽明病潮熱。大便微硬者。可與大承氣湯。不輒者。不與之。陽明病其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必硬。硬則譏語。小承氣湯。大便不通。數譏語者。同方。太陽病若吐若下若發汗。微煩。小便數。大便因硬者。同方。傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。同方。

右十二法不大便譏語有燥屎證

傷寒八九日。風濕相搏。身體痠煩。不能自轉側。不嘔不渴。若其人大便硬。小便自利者。桂枝附子去桂加朮湯。陽明病自汗出。若發汗。小便自利者。此爲津液內竭。雖硬不可攻之。當須自利大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根及與大猪膽汁。皆可爲導。太陽病云云。小便數者。大便必硬。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水者。五苓散。大便則難。其脾爲約。麻仁丸。痛而閉者。厚朴三物湯。

右五法不大便硬難證
陽明病脇下鞕滿。不大便。而嘔。舌上白胎者。小茈胡湯。產婦云云。大便堅嘔不能食者。同方。

右二法不大便嘔證

陽明證。其人喜忘者必有畜血。屎雖硬。大便反易。其色必黑。抵當湯。病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者可下之。不大便者。有瘀血同方。

右二法大便硬有瘀血證

小便不利門（附難自利自調）

小便不利者。茯苓戎鹽湯。小便不利者。蒲灰散。小便不利者。滑石白魚散。服桂枝湯或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利者。桂枝去桂加苓朮湯。病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。大承氣湯。少陰病二三日至四五日。腹痛。小便不利。下利便腹血者。桃花湯。虛勞腰痛。小腹拘急。小便不利者。八味丸。

右七法小便不利或腹痛證
傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。或小便不利。少腹滿或喘者。小青龍湯。風濕相搏。骨節煩疼。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。桂枝甘草附子湯。妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩者。葵子茯苓散。少陰病二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重。疼痛自下利者。真武湯。

右四法小便不利有水氣證

黃疸腹滿。小便不利而赤。自汗出。大黃硝石湯。裏水者一身面目黃腫。其脈沈。小便不利。故令病水。越婢加朮湯。黃汗之病。兩脛自冷。又從腰以上必汗出。下無汗。腰髀弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。小便不利。桂枝加黃芪湯。傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。茵陳蒿湯。陽明病發熱汗出。此爲熱越不能發黃也。但頭汗出身無汗。剝頭而還。小便不利。渴引水漿者。此爲瘀熱在裏。身必發黃。同方。太陽病身黃脈沈結。少腹鞭。小便不利者。爲無血也。小便自利。其人如狂者。血經歸也。抵當湯。男子黃。小便自利。小建中湯。黃疸病。小