

宋本傷寒論校注

朱 佑 武 校 注
湖南科学技术出版社

2.22
54

朱佑武校注

宋本傷寒論校注

湖南科学技术出版社

宋本伤寒论校注

朱佑武校注
责任编辑：张碧金

*

湖南科学技术出版社出版
(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1982年4月第1版第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：6.125 字数：155,000

印数：1—13,200

统一书号：14204·58 定价：0.80元

校注者序

仲景之书，逻辑严谨，文词古奥，义理精深。苟非熟读深思，细心体察，实难得其要领。且后世解《伤寒论》者数百家，仁智各见，议论纷纭，初学者多有莫衷一是之慨叹！余每感于斯，遂于诵读之余，寻求诸家之释，择其善者而取之，牵强附会者舍之，暂不可解者存之。析疑提要，理解原文，此乃编撰《宋本伤寒论校注》之宗旨也。诚有删繁就简之心，实无标新立异之意。至于正本清源，辨析疑似，校注经典，则不敢言。承先泽，启后贤，心存奋发，愿竭愚诚，以就正于医苑先进。特为之序。

朱佑武

一九八〇年五月十七日

于湖南省中医药研究所

编写说明

- 一、本书是以新辑宋本《伤寒论》（一九五六年重庆市中医学会编注，重庆人民出版社出版）为蓝本，参考诸家注释，为适应当前学习中医经典著作的需要而编撰的。
- 二、本书分原文、提要、校注，对重要节段加写了按语，旨在帮助读者理解原著。
- 三、本书三九七法，一一三方，其中缺禹余粮丸一方，合为一一二方。根据仲景本论二二三条云：“若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导”之原意，将土瓜根方（佚）、大猪胆汁方列为附方。
- 四、本书度量衡均系汉制，未作变更。考汉时以六铢为一分，四分为一两，即二十四铢为一两。凡本书中云一两者，折今约一钱（3克）；云一升者，按重量折今六钱至一两（18~30克），按容量可折18~30毫升；云一方寸匕，折今二~三钱（6~9克）；云一钱匕，折今五~六分（1.5~2克）；云厚朴一尺，约折今一两（30克）；云如鸡子大，折今一两五钱（45克）；以个（枚）数计算者，应结合实际情况，灵活掌握。
- 五、本书在编撰过程中承我所副研究员刘炳凡校阅，朱德湘医师协助缮正，一并致以热切之谢忱！

总 目

宋刻《伤寒论》序·····	(1)
张仲景原序·····	(2)
辨太阳病脉证并治 _上 (一条至三十条)·····	(4)
辨太阳病脉证并治 _中 (三一条至一二七条)·····	(21)
辨太阳病脉证并治 _下 (一二八条至一七八条)·····	(65)
辨阳明病脉证并治(一七九条至二六二条)·····	(93)
辨少阳病脉证并治(二六三条至二七二条)·····	(126)
辨太阴病脉证并治(二七三条至二八〇条)·····	(130)
辨少阴病脉证并治(二八一条至三二五条)·····	(134)
辨厥阴病脉证并治(三二六条至三八〇条)·····	(155)
辨霍乱病脉证并治(三八一条至三九〇条)·····	(177)
辨阴阳易差后劳复病脉证并治(三九一条至 三九七条)·····	(182)

方药目次

辨太阳病脉证并治(上)

桂枝汤方	8
桂枝加葛根汤方	9
桂枝加附子汤方	12
桂枝去芍药汤方	13
桂枝去芍药加附子汤方	13
桂枝麻黄各半汤方	14
桂枝二麻黄一汤方	15
白虎加人参汤方	16
桂枝二越婢一汤方	17
桂枝去桂加茯苓白术汤方	18
甘草干姜汤方	19
芍药甘草汤方	19
调胃承气汤方	19
四逆汤方	19

辨太阳病脉证并治(中)

葛根汤方	21
葛根加半夏汤方	22
葛根黄芩黄连汤方	23
麻黄汤方	23

大青龙汤方	24
小青龙汤方	25
桂枝加厚朴杏子汤方	27
干姜附子汤方	33
桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方	33
麻黄杏仁甘草石膏汤方	34
桂枝甘草汤方	34
茯苓桂枝甘草大枣汤方	35
厚朴生姜半夏甘草人参汤方	36
茯苓桂枝白术甘草汤方	36
芍药甘草附子汤方	37
茯苓四逆汤方	37
五苓散方	38
茯苓甘草汤方	39
栀子豉汤方	41
栀子甘草豉汤方	41
栀子生姜豉汤方	41
栀子厚朴汤方	42
栀子干姜汤方	43

真武汤方	43
禹余粮丸方(方佚)	45
小柴胡汤方	48
小建中汤方	51
大柴胡汤方	52
柴胡加芒硝汤方	53
桃核承气汤方	54
柴胡加龙骨牡蛎汤方	54
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎 龙骨救逆汤方	57
桂枝加桂汤方	59
桂枝甘草龙骨牡蛎汤方	60
抵当汤方	63
抵当丸方	64
辨太阳病脉证并治(下)	
大陷胸丸方	66
大陷胸汤方	68
小陷胸汤方	70
文蛤散方	72
三物小白散方	72
柴胡桂枝汤方	74
柴胡桂枝干姜汤方	75
半夏泻心汤方	76
十枣汤方	77
大黄黄连泻心汤方	79
附子泻心汤方	79
生姜泻心汤方	80
甘草泻心汤方	81

赤石脂禹余粮汤方	82
旋覆代赭汤方	83
桂枝人参汤方	84
瓜蒂散方	85
黄芩汤方	87
黄芩加半夏生姜汤方	88
黄连汤方	88
桂枝附子汤方	89
去桂加白术汤方	89
甘草附子汤方	90
白虎汤方	91
炙甘草汤方	91

辨阳明病脉证并治

大承气汤方	103
小承气汤方	103
猪苓汤方	109
蜜煎导方	113
土瓜根方(附方佚)	113
猪胆汁方(附方)	113
茵陈蒿汤方	114
吴茱萸汤方	117
麻子仁丸方	119
栀子桀皮汤方	124
麻黄连轺赤小豆汤方	125

辨少阳病脉证并治

辨太阴病脉证并治

桂枝加芍药汤方	132
---------	-----

桂枝加大黄汤方…… 133

辨少阴病脉证并治

麻黄细辛附子汤方… 141

麻黄附子甘草汤方… 141

黄连阿胶汤方…… 142

附子汤方…… 143

桃花汤方…… 143

猪肤汤方…… 145

甘草汤方…… 146

桔梗汤方…… 146

苦酒汤方…… 147

半夏散及汤方…… 147

白通汤方…… 148

白通加猪胆汁汤方… 149

真武汤方(附加减法) 150

通脉四逆汤方…… 150

四逆散方…… 151

辨厥阴病脉证并治

乌梅丸方…… 160

当归四逆汤方…… 165

当归四逆加吴茱萸生

姜汤方…… 165

麻黄升麻汤方…… 167

干姜黄芩黄连人参汤

方…… 168

白头翁汤方…… 173

辨霍乱病脉证并治

四逆加人参汤方…… 179

理中丸方…… 179

通脉四逆加猪胆汁汤

方…… 181

辨阴阳易差后劳复病

脉证并治

烧裯散方…… 182

枳实栀子豉汤方…… 183

牡蛎泽泻散方…… 184

竹叶石膏汤方…… 184

宋刻《伤寒论》序

夫伤寒论，盖祖述大圣人之意，诸家莫其伦拟。故晋·皇甫谧序《甲乙针经》云：伊尹以元圣之才，撰用《神农本草》，以为汤液；汉·张仲景论广汤液，为数十卷，用之多验。近世太医令王叔和，撰次仲景遗论甚精，皆可施用，是仲景本伊尹之法，伊尹本神农之经，得不谓祖述大圣人之意乎！

张仲景，《汉书》无传，见《名医录》云：南阳人，名机，仲景乃其字也。举孝廉，官至长沙太守。始受术于同郡张伯祖，时人言，识用精微过其师。所著论，其言精而奥，其法简而详，非浅闻寡见者所能及。自仲景于今八百余年，惟王叔和能学之，其间如葛洪、陶(弘)景、胡洽、徐之才、孙思邈辈，非不才也，但各自名家，而不能修明之。开宝中，节度使高继冲，曾编录进上，其文理舛错，未尝考正。历代虽藏之书府，亦阙于雠校，是使治病之流，举天下无或知者。国家诏孺臣，校正医书，臣奇续被其选，以为百病之急，无急于伤寒。

今先校定张仲景《伤寒论》十卷，总二十二篇，证外合三百九十七法，除复重，定有一百一十二方。今请颁行。

太子右赞善大夫臣 高保衡
尚书屯田员外郎臣 孙 奇
尚书司封郎中秘阁校理臣 林 亿等谨上

张仲景原序

论曰：余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也！怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生。但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务；崇饰其末，忽弃其本，华其外而悴其内。皮之不存，毛将安附焉？卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震栗；降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。赉百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼！厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉？而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地；蒙蒙昧昧，蠢若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于

是也。

余宗族素多，向余二百。建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横夭之莫救，乃勤求古训，博采众方，撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎产药录》，并《平脉辨证》，为《伤寒杂病论》合十六卷，虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源，若能寻余所集，思过半矣。

夫天布五行，以运万类，人禀五常，以有五藏，经络府俞，阴阳会通，玄冥幽微，变化难极，自非才高识妙，

岂能探其理致哉！上古有神农、黄帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少师、仲文，中世有长桑、扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公，下此以往，未之闻也。

观今之医，不念思求经旨，以演其所知，各承家技，始终顺旧。省疾问病，务在口给，相对斯须，便处汤药；按寸不及尺，握手不及足，人迎、趺阳，三部不参，动数发息，不满五十，短期未知决诊，九候曾无彷彿；明堂阙庭，尽不见察，所谓窥管而已。夫欲视死别生，实为难矣。孔子云，生而知之者上，学则亚之。多闻博识，知之次也。余宿尚方术，请事斯语。

辨太阳病脉证并治上

一、太阳^①之为病，脉浮，头项强^②痛而恶^③寒。

提要 太阳证之提纲。

校注

①太阳：伤寒六经分证之首，太阳主人身之表。

②强(qiǎng僵)：硬的意思。

③恶(wù误，下同)：憎恶。恶寒，即憎寒怕冷。

二、太阳病^①，发热汗出，恶风，脉缓者，名为中^②风。

提要 太阳中风之脉证。

校注

①太阳病：这里系代表脉浮，头项强痛而恶寒的一组症状(下同)。并有发热汗出，恶风，脉缓的，叫中风。

②中(zhòng仲)：伤也。

三、太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛^①，呕逆^②，脉阴阳俱紧^③者，名为伤寒。

提要 太阳伤寒之脉证。

校注

①体痛：寒邪外束，遍身疼痛。

②呕逆：寒邪内侵，胃气不顺而上逆。

③脉阴阳俱紧：阴阳即尺寸，紧：脉紧，按之有力(下同)。

按语 以上三条，条分缕析。第一条为太阳病之提纲证，第

二条为太阳中风之脉证，第三条为太阳伤寒之脉证。言简意赅。三条合参，伤风、伤寒之脉证，井然有序。

四、伤寒一日，太阳受之，脉若静^①者，为不传^②；颇欲吐^③，若躁烦^④脉数急^⑤者，为传也。

提要 凭脉辨伤寒阴阳表里相传。

校注

①脉若静：若，作假如解；静，脉和缓不数的意思，与脉数急相对应。

②不传：为邪不传少阴，此表里相传。

③颇欲吐：颇欲，很想。重在欲吐二字，欲吐不吐，即少阴之见证。

④若躁烦：假若兼见足少阴之躁，手少阴之烦。

⑤脉数(shuò朔)急：急与疾同，脉快。数脉，一息六至。此句与①脉若静相对应，为辨别传与不传之辨证要点。

五、伤寒二、三日，阳明^①少阳^②证不见者，为不传也。

提要 辨六经之气相传。

校注

①阳明证——身热自汗，不恶寒，反恶热。

②少阳证——口苦、咽干、目眩。

按语 四、五两条概述伤寒之传变。如临床有阳明、少阳见证，则须从阳明、少阳论治。读此二条应注意与论中合病、并病之条文互参，始不致谬。

六、太阳病，发热而渴，不恶寒者为温病^①。若发汗已^②，身灼热者，名风湿^③。风湿为病^④，脉阴阳

俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾^⑤，语言难出。若被下者^⑥，小便不利，直视失溲；若被火者^⑦，微发黄色，剧则如惊痫，时瘦痲^⑧；若火熏之，一逆^⑨尚引日，再逆^⑩促命期。

提要 辨温病与伤寒之区别。论述温病误下、误灸之变证。

校注

①发热口渴，不恶寒，为温病之主症。此与伤寒恶寒、中风恶风，且均不见口渴是其鉴别要点。

②“若发汗已”句以下，成无己本(以下简称成本)析为别条。

③伤寒发热，汗出热解。此言温病误汗，身反灼热，乃汗出重伤其阴之故。此处所指风温，与后世温病学家所论之风温不同。

④“风温为病”至“语言难出”一段，指风温脉证。

⑤鼾(hān酣)：熟睡时的鼻息声。成本“息”字上无“鼻”字。

⑥言误下致变。

⑦言艾灸、烧针致变。

⑧时瘦痲(chè zòng掣纵)：时有抽搐发作。

⑨⑩一逆、再逆：一误、再误。

按语 纵观一至六条，仲景已提出风、寒、温三证之纲领。

七、病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳^①，七日愈；发于阴^②，六日愈。以阳数七阴数六故也。

提要 辨阴阳寒热。

校注

①阳：太阳。成本“阳”字下有者字。

②阴：少阴。成本“阴”字下有者字。

按语 七日愈、六日愈，恐非一般热性病之机转。阳数七阴数六，以阳为奇数，阴为偶数。均有待进一步研究。

八、太阳病.头痛至七日以上自愈^①者,以行其经尽^②故也。若欲作再经^③者,针足阳明^④,使经不传则愈。

提要 辨太阳病经尽自愈与预防传经之针刺法。

校注

①自愈:自然痊愈。所谓七日者,乃承上文应奇数。

②其经尽:太阳病自行其本经已尽七日。

③欲作再经:有传阳明之势。

④足阳明:足三里穴。

九、太阳病.欲解^①时,从巳至未^②上。

提要 从经脉流注的规律预测太阳病欲解的时间。

校注

①欲解:指病将愈。

②从巳至未:从巳(9~11)时到未(1~3)时。

按语 此条似符合生物钟的学说,可从子午流注的循经时刻进行临床研究。

一〇、风家^①,表解而不了了^②者,十二日愈。

提要 辨风家表解,正气复则自愈。

校注

①风家:素易患太阳中(伤)风之人。

②不了了:表邪已解,余邪尚存,身体不舒。

按语 十二日愈,恐非一般规律,此处存疑。

一一、病人身大热,反欲得衣^①者,热在皮肤^②,寒在骨髓^③也;身大寒,反欲不近衣者,寒在皮肤,热在骨髓也。

提要 辨真寒假热,真热假寒证。

校注

①“得”字下，成本有“近”字。

②皮肤：表也。

③骨髓：里也。

一二、太阳中风，阳浮而阴弱。阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出。啬啬^①恶寒，淅淅^②恶风，翕翕^③发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

提要 太阳中风证治。

校注

①啬啬(sè塞)：艰涩欲闭之状。

②淅淅(xī析)：“淅淅”如风声，形容如冷雨寒风侵人的感觉。

③翕翕(xī息)开合和顺之状，表示发热较轻浅。

桂枝汤方

桂枝三两(去皮) 芍药三两 甘草二两(炙) 生姜三两
(切) 大枣十二枚(擘)

上五味，㕮咀^①三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已须臾^②，歔^③热稀粥一升余，以助药力。温覆^④令一时许，遍身粟^⑤微似有汗者益佳，不可令如水流离，病必不除。若一服汗出病差^⑥，停后服，不必尽剂。若不汗，更服依前法；又不汗，后服小促其间，半日许，令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之，服一剂尽，病证犹在者，更作服。若不汗出，乃服至二、三剂。禁生冷、粘滑、肉面^⑦、五辛酒酪^⑧、臭恶等物。