

现代数学基础丛书

# 多元统计分析引论

●张尧庭 方开泰 著



科学出版社

0212.4  
228

497460

现代数学基础丛书

# 多元统计分析引论

张尧庭 方开泰 著



科学出版社

1997

EA02/14

## 内 容 简 介

本书系统论述多元统计分析的基本理论和方法，力求理论与实际应用并重。只要具有一元统计的知识就可阅读本书。

本书主要内容是：多元正态分布、方差分析、回归分析、因子分析与线性模型、聚类分析和统计量的分布。附录中列出了常用的多元分布表。

读者对象是高等学校数学系教师、高年级学生，应用多元统计的科技工作者。

现代数学基础丛书

## 多元统计分析引论

张尧庭 方开泰 著

责任编辑 刘嘉善

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1982年6月第 一 版 开本：850×1168 1/32

1997年8月第三次印刷 印张：18 1/2

印数：10 251—13 270 字数：487,000

ISBN 7-03-005988-3/O · 923

定价：29.00 元

## 序 言

多元统计分析是数理统计学中近二十多年来迅速发展的一个分支。由于电子计算机使用日益广泛,多元分析的方法也很快地应用到各个领域。在国外,从自然科学到社会科学的许多方面,都已证实了多元分析方法是一种很有用的数据处理方法;在我国,多元分析对于地质、气象、水文、国家标准和误差分析等许多方面的研究工作都取得了很大的成绩,引起了广泛的注意。

但是,目前非常缺少系统介绍多元分析的书,现有的书或者过于偏重理论,或者过于偏重单纯地介绍方法。而迫切需要的则是这样一本书,它使得搞数学的人可以从中看到多元分析方法的实际应用,使得搞实际工作的人可以从中看到相应的一些理论。我们正是朝着这个目标来努力的,并希望本书能作为高等学校高年级学生和研究生入门书,也可以作为实际工作者的参考书。我们假定读者已具备一元统计分析的知识。

全书共分九章,第一章系统介绍多元分析中常用的矩阵知识。本章内容大多只阐述结论,而不给出证明。第二章到第五章,介绍多元正态分布以及常用的方差分析、回归分析和判别分析等方法。第六章、第七章采用比较一般的形式来介绍因子分析和线性模型的内容,读者在熟悉第二章到第五章内容的基础上能更好地理解第六、七两章比较概括抽象的结果。第八章介绍聚类分析的各种典型的方法。第九章专门讨论统计量的分布。最后,为了实际工作的需要,我们在附录里选了六个重要的多元统计表。

本书收集了我国数学工作者的成果,特别是许宝騄先生在多元分析方面的奠基性的成果。

最后,我们感谢参加多元分析讨论班的同志们,他们在讨论中给了我们许多帮助,特别要感谢陈希孺同志,他对本书初稿提出了

许多宝贵的意见。

由于水平有限，书中肯定有很多缺点和错误，请读者批评指正。

武汉大学 张尧庭  
应用数学研究所 方开泰  
1979年3月

# 目 录

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 第一章 矩阵                                   | 1   |
| § 1. 线性空间                                | 1   |
| § 2. 内积和投影                               | 3   |
| § 3. 矩阵的基本性质                             | 7   |
| § 4. 分块矩阵的代数运算                           | 15  |
| § 5. 特征根及特征向量                            | 20  |
| § 6. 对称阵                                 | 26  |
| § 7. 非负定阵                                | 30  |
| § 8. 广义逆                                 | 35  |
| § 9. 计算方法                                | 45  |
| § 10. 矩阵微商                               | 53  |
| § 11. 矩阵的标准型                             | 57  |
| § 12. 矩阵内积空间                             | 60  |
| 第二章 多元正态分布                               | 65  |
| § 1. 定义                                  | 65  |
| § 2. 正态分布的矩                              | 70  |
| § 3. 条件分布和独立性                            | 72  |
| § 4. 多元正态分布的参数估计                         | 79  |
| § 5. $\mu$ 和 $V$ 的极大似然估计的性质              | 85  |
| § 6. 多维正态分布的特征                           | 98  |
| § 7. 多维正态分布函数的计算                         | 103 |
| § 8. 例                                   | 114 |
| 第三章 样本分布的性质和均值与协差阵的检验                    | 119 |
| § 1. 二次型分布                               | 119 |
| § 2. 维希特 (Wishart) 分布                    | 134 |
| § 3. 与样本协差阵有关的统计量; $T^2$ 和 $\Lambda$ 统计量 | 139 |
| § 4. 均值的检验                               | 148 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| § 5. $T^2$ 统计量的优良性 .....    | 157 |
| § 6. 多母体均值的检验 .....         | 163 |
| § 7. 协方差不等时均值的检验 .....      | 172 |
| § 8. 协差阵的检验 .....           | 175 |
| § 9. 独立性检验 .....            | 186 |
| 第四章 判别分析 .....              | 194 |
| § 1. 距离判别 .....             | 194 |
| § 2. 贝叶斯(Bayes) 判别 .....    | 208 |
| § 3. 费歇(Fisher) 的判别准则 ..... | 215 |
| § 4. 误判概率 .....             | 224 |
| § 5. 附加信息检验 .....           | 231 |
| § 6. 逐步判别 .....             | 237 |
| § 7. 序贯判别 .....             | 249 |
| 第五章 回归分析 .....              | 254 |
| § 1. 问题及模型 .....            | 254 |
| § 2. 最小二乘估计 .....           | 259 |
| § 3. 假设检验 .....             | 267 |
| § 4. 逐步回归 .....             | 275 |
| § 5. 双重筛选逐步回归 .....         | 288 |
| § 6. 回归分析与判别分析的关系 .....     | 298 |
| 第六章 相关 .....                | 302 |
| § 1. 投影 .....               | 302 |
| § 2. 典型相关变量 .....           | 305 |
| § 3. 广义相关系数 .....           | 315 |
| § 4. 主成分分析及主分量分析 .....      | 322 |
| § 5. 因子分析 .....             | 328 |
| 第七章 线性模型 .....              | 340 |
| § 1. 模型 .....               | 340 |
| § 2. 估值 .....               | 342 |
| § 3. 广义线性模型 .....           | 349 |
| § 4. 递推公式 .....             | 359 |
| § 5. 正态线性模型的假设检验 .....      | 366 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| § 6. 试验设计                     | 379 |
| 第八章 聚类分析                      | 393 |
| § 1. 相似系数和距离                  | 393 |
| § 2. 系统聚类法                    | 401 |
| § 3. 系统聚类法的性质                 | 414 |
| § 4. 动态聚类法                    | 426 |
| § 5. 分解法                      | 440 |
| § 6. 有序样品的聚类与预报               | 444 |
| 第九章 统计量的分布                    | 458 |
| § 1. 预备知识                     | 458 |
| § 2. $I_m(f r_1, \dots, r_m)$ | 463 |
| § 3. 一元非中心分布                  | 468 |
| § 4. Wishart 分布               | 473 |
| § 5. 广义方差的分布                  | 480 |
| § 6. 非中心 $T^2$ 分布             | 485 |
| § 7. 样本相关系数的分布                | 488 |
| § 8. $S_1 S_1^{-1}$ 特征根的联合分布  | 494 |
| § 9. 结束语                      | 509 |
| 参考文献                          | 513 |
| 附录                            | 516 |
| 附表的使用说明                       | 516 |
| 表 1 $\Lambda_n(m, n_1, n_2)$  | 520 |
| 表 2 $\theta_{\max}$           | 552 |
| 表 3 $T^2(m, n)$               | 558 |
| 表 4 $L(m, \nu)$               | 570 |
| 表 5 $W(m, n)$                 | 571 |
| 表 6 $M(m, \nu_0, k)$          | 580 |



# 第一章 矩 阵

在这章中我们把矩阵和向量空间中有关多元分析的一些结果介绍给读者,凡是一般教材中有的材料,我们只是罗列一下大都不给出证明。熟悉这些内容的人可以从第二章看起,想看第一章的读者最好把正文中未给证明的结果作为练习,这将为以后各章的阅读带来很多方便。

## §1. 线性空间

今后我们限定在实数域  $R$  上讨论。用  $R_n$  表示实数域  $R$  上的全部  $n$  维向量,  $R_n$  中的一个向量(有时称为元素)  $a$  有  $n$  个坐标,写成

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ 或 } a = (a_1, \dots, a_n)'.$$

**1.1 向量的运算** 对  $R_n$  中的向量定义了两种运算:

(i) 加法 设  $a = (a_1, \dots, a_n)'$ ,  $b = (b_1, \dots, b_n)'$ , 则

$$a + b \triangleq (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)'.$$

(ii) 数乘 设  $c$  是一个数,  $a = (a_1, \dots, a_n)'$ , 则

$$ca \triangleq (ca_1, \dots, ca_n)'.$$

为了方便,我们用  $0$  表示坐标全为  $0$  的向量,这不会引起混淆,从上下文可以判断它是向量还是数。容易证明,对上述定义的加法和数乘,下列关系成立:

(A) 当  $a, b, c$  均  $\in R_n$  时,则

---

1) 表示该符号左边的内容由右边的符号表示,也可以理解为定义。

$$a + b = b + a, (a + b) + c = a + (b + c),$$

$$a + 0 = a, \quad a + (-a) = 0.$$

(B) 当  $a, b$  均  $\in R_n$ ,  $c, c_1, c_2$  均为实数时, 则

$$c(a + b) = ca + cb, (c_1 + c_2)a = c_1a + c_2a,$$

$$c_1(c_2a) = c_1c_2a, \quad 1 \cdot a = a.$$

我们称  $R_n$  是实数域  $R$  上的线性空间或向量空间。如果  $R_n$  中的子集  $L$ , 对加法和数乘这两种运算是封闭的 (即运算的结果仍在  $L$  中), 且  $L$  不是空集, 则称  $L$  是  $R_n$  中的一个子空间。例如

$$L = \{(a, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-1 \uparrow}) : a \in R\}$$

就是  $R_n$  的一个子空间。

**1.2 线性相关** 线性空间最重要的概念就是线性相关与线性无关。

如有不全为 0 的一组数  $c_1, \dots, c_k$  使  $c_1a_1 + \dots + c_k a_k = 0$ , 则称向量  $a_1, \dots, a_k$  是线性相关的; 否则, 就称  $a_1, \dots, a_k$  是线性无关的。从这个定义可以看出:

(i) 任何含有 0 向量的向量集总是线性相关的;

(ii)  $a_1, \dots, a_k$  线性无关的充要条件是: 如果一组数  $c_1, \dots, c_k$  使  $c_1a_1 + \dots + c_k a_k = 0$ , 则  $c_1 = \dots = c_k = 0$ ;

(iii) 设  $a_1, \dots, a_k$  是非零向量, 它们线性相关的充要条件是: 存在  $i$  使  $a_i = b_1a_1 + b_2a_2 + \dots + b_{i-1}a_{i-1} + b_{i+1}a_{i+1} + \dots + b_k a_k$ , 其中  $b_1, \dots, b_k$  是一组实数。也即存在  $i$  使  $a_i$  是其他向量  $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_k$  的线性组合。

给定了  $R_n$  中某些向量  $a_1, \dots, a_k$ , 考虑由这些向量所有可能的线性组合  $\sum_{i=1}^k c_i a_i$  组成的集合:

$$\mathcal{L}(a_1, \dots, a_k) = \left\{ \sum_{i=1}^k c_i a_i : c_1, \dots, c_k \text{ 均为实数} \right\},$$

它显然对加法和数乘这两种运算是封闭的, 它是一个子空间, 称它是由向量  $a_1, \dots, a_k$  生成的子空间。

**1.3 基** 设  $\mathcal{L}$  是  $R_n$  中的一个子空间, 如果存在  $a_1, \dots, a_k$  使  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(a_1, \dots, a_k)$ , 且  $a_1, \dots, a_k$  线性无关, 则称  $a_1, \dots, a_k$  是  $\mathcal{L}$  的一组基.

可以证明子空间  $\mathcal{L}$  中如有两组基, 那么这两组基中向量的个数一定相同, 因此我们把子空间  $\mathcal{L}$  中一组基所含的向量的个数称为  $\mathcal{L}$  的维数. 例如

$$e_i = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{i-1 \uparrow}, \underbrace{1, 0, \dots, 0}_{n-i \uparrow})', \quad i = 1, 2, \dots, n$$

显然是线性无关的, 并且  $R_n = \mathcal{L}(e_1, \dots, e_n)$ , 因此线性空间  $R_n$  的维数是  $n$ . 有时就称  $R_n$  为  $n$  维线性空间. 很显然,  $\mathcal{L}(e_1), \dots, \mathcal{L}(e_n)$  都是一维的子空间;  $\mathcal{L}(e_1, e_2), \dots, \mathcal{L}(e_{n-1}, e_n)$  等都是二维的子空间;  $\dots$ .

从基的定义立即可知, 如果  $a_1, \dots, a_k$  是子空间  $\mathcal{L}$  的一组基, 那么  $\mathcal{L}$  中任一向量  $a$  都可被  $a_1, \dots, a_k$  的线性组合来表示, 而且这种表示法是一致的.

**1.4 直接和** 设  $\mathcal{L}$  是一个子空间, 如果有  $k$  个子空间  $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_k$  使得对每一  $a \in \mathcal{L}$ , 能唯一地表示为  $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ , 其中  $a_i \in \mathcal{L}_i, i = 1, \dots, k$ , 则称  $\mathcal{L}$  是  $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_k$  的直接和, 记为  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + \dots + \mathcal{L}_k$ . 沿用 1.3 中  $e_i$  的定义, 可以看出

$$R_n = \mathcal{L}(e_1) + \dots + \mathcal{L}(e_n).$$

## §2. 内积和投影

$R_n$  中任给两个向量  $a = (a_1, \dots, a_n)', b = (b_1, \dots, b_n)'$ , 定义  $a, b$  的内积  $(a, b) \triangleq \sum_{i=1}^n a_i b_i$ . 易见内积  $(a, b)$  满足下列性质:

- (i)  $(a, b) = (b, a)$ ;
- (ii)  $(a, a) \geq 0$ ;  $(a, a) = 0 \iff a = 0$ ;
- (iii)  $(ca, b) = (a, cb) = c(a, b)$  对一切  $c \in R$  成立;

$$(iv) (a, h+g) = (a, h) + (a, g),$$

$$(h+g, b) = (h, b) + (g, b).$$

我们把  $(a, a)$  的算术平方根称为  $a$  的长度, 记作  $\|a\|$ . 容易验证

$$|(a, b)|^2 \leq \|a\|^2 \|b\|^2 \quad (\text{Schwarz 不等式}), \quad (2.1)$$

$$\|a+b\| \leq \|a\| + \|b\| \quad (\text{三角不等式}). \quad (2.2)$$

**2.1 标准正交基** 如果  $R_n$  中的子空间  $\mathcal{L}$  的基  $a_1, \dots, a_k$  具有性质:

$$(a_i, a_i) = 1, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

$$(a_i, a_j) = 0, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, k,$$

则称  $a_1, \dots, a_k$  是  $\mathcal{L}$  的一组标准正交基, 因为我们把  $\|a\| = 1$  的向量称为标准化的向量, 有时也称为单位向量 (指它的长度是 1, 以它作单位). 当  $(a, b) = 0$  时, 我们就称  $a$  与  $b$  正交,  $(a_i, a_j) = 0$  表示  $a_i$  与  $a_j$  正交. 引入克劳涅克尔的  $\delta$  符号:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases}$$

则  $a_1, \dots, a_k$  是  $\mathcal{L}$  的一组标准正交基  $\Leftrightarrow a_1, \dots, a_k$  均属于  $\mathcal{L}$ , 且  $(a_i, a_j) = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, k$ .

**2.2 投影** 在  $R_n$  中, 给定一个向量  $a$  及子空间  $\mathcal{L}$ , 就可考虑  $a$  在  $\mathcal{L}$  中的投影. 如果在  $\mathcal{L}$  中存在  $b$  使  $\|a - b\| = \inf_{x \in \mathcal{L}} \|a - x\|$ , 则称  $b$  是  $a$  在  $\mathcal{L}$  中的投影. 可以证明投影是存在而且唯一的. 下面先证明一条关于投影的重要性质:

$b$  是  $a$  在  $\mathcal{L}$  中的投影  $\Leftrightarrow (a - b, x) = 0$  对一切  $x \in \mathcal{L}$  成立.

证明 “ $\Rightarrow$ ”, 若有  $x \in \mathcal{L}$  使  $(a - b, x) \neq 0$ , 由于对一切  $\lambda$  有  $(a - b, a - b) \leq (a - b + \lambda x, a - b + \lambda x)$

$$= (a - b, a - b) + 2\lambda(a - b, x) + \lambda^2(x, x),$$

只要选  $\lambda = -\varepsilon(a - b, x), \varepsilon > 0$ , 上式就可写成

$$(a - b, x)^2 (\varepsilon^2 \|x\|^2 - 2\varepsilon) \geq 0$$

对一切  $\varepsilon > 0$  成立, 而这是不可能的, 因而  $(a - b, x) = 0$ .

$$\begin{aligned} \text{“}\Leftarrow\text{”, 由于 } (a-x, a-x) &= (a-b+b-x, a-b+b-x) \\ &= (a-b, a-b) + 2(a-b, b-x) + (b-x, \\ &\quad b-x), \end{aligned}$$

注意  $b \in \mathcal{L}$ ,  $x \in \mathcal{L}$ , 就有  $b-x \in \mathcal{L}$ , 因而  $(a-b, b-x) = 0$ , 于是由

$$(a-x, a-x) = (a-b, a-b) + (b-x, b-x)$$

看出  $x=b$  时使  $\|a-x\|$  达到最小值.

从这个证明就可看出投影存在时, 只有一个, 投影的存在性在 2.4 中给出.

**2.3 格兰姆-施密特正交化方法** 一组向量  $a_1, \dots, a_k$  是线性无关的, 则可依照下述方法求出子空间  $\mathcal{L}(a_1, \dots, a_k)$  的一组标准正交基.

先取  $b_1 = a_1$ , 因为  $a_1, \dots, a_k$  线性无关, 因此  $a_1 \neq 0$ , 即  $(a_1, a_1) \neq 0$ ; 然后选  $b_2 = a_2 - h_{21}b_1$  使  $(b_2, b_1) = 0$ , 即选  $h_{21}$  使  $(a_2 - h_{21}b_1, b_1) = 0$ , 即  $h_{21} = \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)} = \frac{(a_2, a_1)}{(a_1, a_1)}$ ; 再选  $b_3 = a_3 - h_{32}b_2 - h_{31}b_1$  使  $(b_3, b_2) = (b_3, b_1) = 0$ , 定出系数  $h_{32}, h_{31}; \dots$ ; 一般地, 选

$$b_i = a_i - h_{ii-1}b_{i-1} - \dots - h_{i1}b_1$$

使  $(b_i, b_{i-1}) = (b_i, b_{i-2}) = \dots = (b_i, b_1) = 0$ , 定出系数  $h_{ii-1}, \dots, h_{i1}; \dots$ , 这样就求出一组向量  $b_1, \dots, b_k$ . 容易看出, 如此求得的  $b_1, \dots, b_k$  是两两正交的, 令

$$\beta_i = \frac{1}{\|b_i\|} b_i, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

则  $\beta_1, \dots, \beta_k$  就是标准正交的向量组. 只要证明一组不含零向量的两两正交的向量一定是线性无关的, 那么由  $\beta_1, \dots, \beta_k$  是标准正交的就可知它们确实是一组基. 若不然,  $\beta_1, \dots, \beta_k$  线性相关,

存在  $c_1, \dots, c_k$  不全为 0, 使  $\sum_{i=1}^k c_i \beta_i = 0$ , 因此

$$0 = \left( \sum_i c_i \beta_i, \sum_i c_i \beta_i \right) = \sum_i \sum_j c_i c_j (\beta_i, \beta_j) = \sum_{i=1}^k c_i^2,$$

这就导出  $c_1 = \cdots = c_k = 0$ , 矛盾.

格兰姆-施密特正交化方法是一种典型的方法, 今后我们将不止一次地引用它.

**2.4 正交和** 设  $\mathcal{L}$  是一个子空间,  $\mathcal{L}_1, \cdots, \mathcal{L}_k$  也是一些子空间,  $\mathcal{L}$  是  $\mathcal{L}_1, \cdots, \mathcal{L}_k$  的直接和, 并且当  $i \neq j$  时, 只要  $a_i \in \mathcal{L}_i$ ,  $a_j \in \mathcal{L}_j$ , 则  $(a_i, a_j) = 0$ , 那么我们就说  $\mathcal{L}$  是  $\mathcal{L}_1, \cdots, \mathcal{L}_k$  的正交和, 记为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \dot{+} \mathcal{L}_2 \dot{+} \cdots \dot{+} \mathcal{L}_k.$$

一般说来, 如果  $\beta_1, \cdots, \beta_n$  是  $R_n$  中的一组基, 那就一定有  $R_n = \mathcal{L}(\beta_1) + \cdots + \mathcal{L}(\beta_n)$ , 但是  $\beta_1, \cdots, \beta_n$  不一定是彼此正交的, 因此  $R_n$  不一定是  $\mathcal{L}(\beta_1), \cdots, \mathcal{L}(\beta_n)$  的正交和, 只有当  $\beta_1, \cdots, \beta_n$  是正交基时,  $R_n = \mathcal{L}(\beta_1) \dot{+} \cdots \dot{+} \mathcal{L}(\beta_n)$ . 取  $e_i = (0, 0, \cdots, 0, \underbrace{1}_{i-1 \uparrow}, 0, \cdots, 0)'$ ,  $i = 1, 2, \cdots, n$  后, 显然有

$$R_n = \mathcal{L}(e_1) \dot{+} \mathcal{L}(e_2) \dot{+} \cdots \dot{+} \mathcal{L}(e_n).$$

特别地, 如果  $R_n = \mathcal{L}_1 \dot{+} \mathcal{L}_2$ , 则称  $\mathcal{L}_1$  是  $\mathcal{L}_2$  的正交补空间, 或者称  $\mathcal{L}_2$  是  $\mathcal{L}_1$  的正交补空间. 子空间  $\mathcal{L}$  的正交补空间用  $\mathcal{L}^\perp$  表示, 因此总有

$$\mathcal{L} \dot{+} \mathcal{L}^\perp = R_n.$$

正交补空间和投影有密切的关系. 因为  $R = \mathcal{L} \dot{+} \mathcal{L}^\perp$ , 因此每一个  $R$  中的向量  $x$  总可以写成  $u_x + v_x$ , 其  $u_x \in \mathcal{L}$ ,  $v_x \in \mathcal{L}^\perp$ . 由于  $x - a = x - u_x + u_x - a$ , 因而就有

$$\begin{aligned} (x - a, x - a) &= (x - u_x, x - u_x) + (u_x - a, u_x - a) \\ &\quad + 2(x - u_x, u_x - a). \end{aligned}$$

注意到  $x - u_x = v_x \in \mathcal{L}^\perp$ , 如果  $a \in \mathcal{L}$  时, 就有  $u_x - a \in \mathcal{L}$ , 因此  $(x - u_x, u_x - a) = 0$ . 这就告诉我们

$$(x - a, x - a) \geq (x - u_x, x - u_x)$$

对一切  $a \in \mathcal{L}$  成立, 且等号成立的充要条件是  $u_x - a = 0$ , 也即  $a = u_x$ . 这就告诉我们对给定的子空间  $\mathcal{L}$ ,  $R_n$  中任一向量  $x$  在  $\mathcal{L}$  中的投影是存在的.

### § 3. 矩阵的基本性质

将  $mn$  个实数按一定顺序排成的阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为大小是  $m \times n$  的矩阵, 它有  $m$  行、 $n$  列. 当  $m = n$  时就称为方阵. 今后用大写的拉丁字母表示矩阵, 相应的小写字母附有双重足标的就表示矩阵中的元素, 例如  $a_{ij}$  就是矩阵  $A$  中第  $i$  行第  $j$  列的元素, 因此有时也写成  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ , 或简写为  $A = (a_{ij})$ .

**3.1 代数运算** 对矩阵定义如下的运算:

**加法** 设  $A, B$  都是  $m \times n$  的阵, 则

$$A + B \triangleq (a_{ij} + b_{ij}), \text{ 称为 } A, B \text{ 的和.}$$

**数乘**  $cA \triangleq (ca_{ij})$ .

**乘法** 设  $A$  是  $m \times n$  的阵,  $B$  是  $n \times p$  的阵, 则

$$AB \triangleq \left( \sum_{a=1}^n a_{ia} b_{aj} \right) \text{ 是 } m \times p \text{ 的阵, 称为 } A, B \text{ 的乘积.}$$

容易证明这些运算具有下列性质:

$$A + B = B + A, \quad (A + B) + C = A + (B + C),$$

$$(c + d)A = cA + dA, \quad c(A + B) = cA + cB,$$

$$(AB)C = A(BC), \quad A(B + C) = AB + AC,$$

$$(A + B)C = AC + BC.$$

注意, 矩阵相加时, 大小一定要相同; 矩阵  $A, B$  相乘时,  $A$  的列数必须和  $B$  的行数相同, 即  $A$  是  $m \times n$  阵时,  $B$  一定是  $n \times p$  的阵

才可相乘。\$AB\$ 有意义时，\$BA\$ 不一定有意义，即使 \$AB\$ 与 \$BA\$ 都有意义，但大小还不相同，即使大小相同，也不一定有等式 \$AB = BA\$，这些都是需要注意的。

向量可以看成只有一列的矩阵，矩阵 \$A\$ 也可看成是 \$m\$ 个 \$n\$ 维的向量按一定顺序排成的阵，记 \$A = (a\_1 \cdots a\_m)\$，则 \$a\_i\$ 就是 \$A\$ 中第 \$i\$ 列组成的向量。这一种向量和矩阵的联系今后是经常要用的。今后把 \$A'\$ 中的列向量称为 \$A\$ 的行向量。

元素全为 0 的矩阵记作 \$O\$，元素全为 1 的矩阵记作 \$J\$，元素全为 1 的向量记作 \$\mathbf{1}\$，它们的大小视上下文而定。矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

是 \$n \times n\$ 的阵，它的主对角元素全为 1，其余全为 0，称它为单位阵，记作 \$I\$。实际上 \$I = (\delta\_{ij})\$。\$I\$ 的大小不表明时由上下文来定。易见

$$A + O = A, \quad A I_m = I_n A = A.$$

**3.2 转置和逆** 在矩阵运算中还有两种运算是常见的：

**转置：**把 \$A\$ 的行改成列，列改成行后得到的矩阵，记作 \$A'\$。例

如 \$a = \begin{pmatrix} a\_1 \\ \vdots \\ a\_n \end{pmatrix}\$，则 \$a' = (a\_1 \cdots a\_n)\$。如果

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

则

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{n \times m}$$



注意到向量  $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$  是  $n \times 1$  的阵, 则向量  $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$  也是

$n \times 1$  的阵, 于是按矩阵乘法的定义就得:

$$a'b = (a_1 \cdots a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_i b_i, \quad (\text{就是 } a, b \text{ 的内积}) \quad (3.1)$$

$$ab' = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1 \cdots b_n) = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

它是一个  $n \times n$  的矩阵。

如果  $A$  是  $m \times n$  的阵, 将  $A$  写成  $\begin{pmatrix} a'_1 \\ \vdots \\ a'_m \end{pmatrix}$ , 则  $a'_1, \cdots, a'_m$  是  $m$  个  $n$  维的向量,  $a'_i = (a_{i1} a_{i2} \cdots a_{in})$ ; 如果  $B$  是  $n \times p$  的阵, 将  $B$  写成  $(b_1 \cdots b_p)$ , 则  $b_i$  都是  $n$  维向量,  $b_i = \begin{pmatrix} b_{1i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{pmatrix}$ . 于是

$$AB = \begin{pmatrix} a'_1 \\ \vdots \\ a'_m \end{pmatrix} (b_1 \cdots b_p) = \begin{pmatrix} a'_1 b_1 & \cdots & a'_1 b_p \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_m b_1 & \cdots & a'_m b_p \end{pmatrix},$$

也即乘积矩阵  $AB$  中  $(i, j)$  位置的元素  $\sum_{\alpha=1}^n a_{i\alpha} b_{\alpha j}$  是  $A$  中第  $i$  行向量  $a_i$  与  $B$  中第  $j$  列向量  $b_j$  的内积。

逆: 如果  $A$  是方阵, 且有  $B$  使

$$AB = BA = I,$$

则称  $B$  是  $A$  的逆, 记作  $A^{-1}$ . 给定了方阵  $A$ ,  $A^{-1}$  可能不存在, 但它存在时一定唯一. 我们称存在逆阵的  $A$  为非奇异阵, 不存在逆