

中草药制剂新产品展品简介

石化系统中草药科技情报协作组

中草药制剂新产品展品简介

湖南医药工业研究所

R283

HY

湖南医药工业研究所技术情报研究室编

一九七七年十一月

说 明

本资料是一九七七年九月在北京石油化学工业部科学技术情报研究所举办的“中草药制剂新产品”展览会上展出的品种介绍。展品是近几年石化系统中草药科技情报协作组的成员单位（包括中、西药厂和科研单位）生产和试制的中草药制剂新产品，共约四百种（滋补药类未收入）。每个产品的说明根据提供单位的样品说明书摘编，其中的“用法用量”仅供参考，使用时，请遵医嘱。

因编写时间仓促，不妥之处，请批评指正。

湖南医药工业研究所技术情报研究室

一九七七年十一月

目 录

第 一 部分：抗肿瘤中草药.....	(1)
第 二 部分：防治心血管疾病中草药.....	(5)
第 三 部分：防治慢性气管炎中草药.....	(19)
第 四 部分：抗菌消炎中草药.....	(33)
第 五 部分：防治肝胆疾病中草药.....	(43)
第 六 部分：抗风湿病中草药.....	(53)
第 七 部分：防治感冒中草药.....	(58)
第 八 部分：安神镇静及镇痛中草药.....	(62)
第 九 部分：治疗肠胃疾病中草药.....	(68)
第 十 部分：抗结核病中草药.....	(73)
第十一部分：止血用中草药.....	(75)
第十二部分：其他.....	(78)

第一部分：抗肿瘤中草药

喜 树 碱 注 射 液

主要成份 喜树碱

功能主治 对胃癌、结肠癌、直肠癌有较好疗效，对恶性葡萄胎、绒毛膜上皮癌、慢性粒细胞性白血病及急性白血病也有一定疗效。

用法用量 常用量：静脉注射一日 5~10 毫克，用生理盐水 20 毫升稀释后缓慢注射。10~14 日为一疗程。维持量为每三天注射一次。

规 格 每 2 毫升内含喜树碱 5 毫克。

生产单位 上海第十制药厂、上海南昌制药厂

斑 螫 素 片

主要成份 斑螫素

功能主治 本品可抑制蛋白质和核酸的合成。对原发性肝癌有效，可使病情稳定，生存时间延长，部分病例能使肝脏肿块缩小。对肺癌、食管癌、结肠癌及乳腺癌也有一定疗效。

用法用量 常用量，口服一次 1~2 片，一日 2~3 次；饭后服用。开始服用时应从小剂量逐渐递升。

生产单位 上海黄河制药厂

长 春 新 碱 注 射 液

主要成份 本品为夹竹桃科长春花植物提取的一种生物碱硫酸盐冻干粉末。

功能主治 本品为一生物碱。其作用机理主要干扰增殖细胞纺锤体的形成，使有丝分裂停止于中期，是一种细胞周期特异性药物。本品广泛应用于联合化疗中。单独应用时对急性白血病有效，尤以急性淋巴细胞性白血病效果更好；对何杰金氏病、淋巴肉瘤、网状细胞肉瘤及乳腺癌也有效。

用法用量 常用量静脉注射。成人每周 1~2 次，每次 1~2 毫克。小儿每周 1 次，每次

0.05~0.125毫克/公斤。一般用量每次不超过1毫克。

规格 每支含长春新碱1毫克。

生产单位 广州第三制药厂、杭州制药厂。

秋裂碱胺注射液

主要成份 秋裂碱胺

功能主治 对乳腺癌有较好疗效，对子宫颈癌、鼻咽癌、皮肤癌及慢性粒细胞性白血病也有一定疗效。

用法用量 用葡萄糖注射液或氯化钠注射液稀释后静脉注射或滴注。一次10~20毫克，每日一次或间日一次。一个疗程总量为0.2~0.3克。

规格 每支1毫升含秋裂碱胺10毫克。

生产单位 昆明制药厂

农吉利片

主要成份 农吉利。

功能主治 清热解毒。此药对肿瘤具有缓解症状、止痛消炎、增进食欲、缩小瘤体之作用。适用于多种肿瘤，尤以皮肤癌效果更好。

用法用量 每日服三次，每次口服4~6片。

生产单位 济南人民制药厂。

AT-7 3 2 片

主要成份 冰凌草。

功能主治 清热解毒。用于各种癌症和克服放疗副反应。

用法用量 口服，每日二次，每次5~10片。

规格 每片含冰凌草相当生药3克。

生产单位 安阳第三制药厂。

西豆根甲砒注射液

主要成份 西豆根甲砒（槐果砒）盐酸盐

功能主治 适用于治疗绒毛膜上皮细胞癌和恶性葡萄胎等癌症。

用法用量 （一）静脉点滴：每日一次，每次1~3支（含甲砒100~300mg）加入5%葡萄

糖盐水500ml中，4~6小时滴完。10天为一疗程。疗程间隔5天。

(二)肌肉注射：每次1~2支，每天2~4次，疗程同上。

(三)局部注射：用于转移病灶，取甲砒针2~4支（含甲砒200~400mg）从肿瘤结节与健康组织交界处进针，在结节底部作放射状注射，每日或隔日一次，

20天左右结节干枯脱落。

规格 每支含西豆根甲砒100毫克。

生产单位 江西中医学院红旗制药厂、江西国药厂

三 品 栓

主要成份 用数种中药提炼配制的一种宫颈癌锥切专用药物。

功能主治 用于宫颈癌Ⅰ期A。

用法用量 先用呋喃西林清洗宫颈、阴道，用双氧水、酒精分别擦宫颈管、阴道后部。再用三品（饼或杆）敷贴患处。用凡士林纱布保护阴道穹窿同时固定药物位置，防止药物移动及阴道壁受腐蚀，再用双紫粉棉球压紧，每日更换双紫粉棉球。五~七天癌组织凝固坏死，自行脱落或从颈管钳出。

生产单位 江西中医学院红旗制药厂

新 癢 片

主要成份 九节茶、田七、牛癢、肖梵天花、珍珠层粉和消炎痛等。

功能主治 适用于食道癌、贲门癌、胃癌、直肠癌和子宫癌等。

用法用量 每日服三次，每次二~四片。

生产单位 厦门中药厂

肿节风干浸膏片(草珊瑚片)

主要成份 肿节风（又名九节茶）。

功能主治 祛风通络、活血散瘀。对胰腺癌、胃癌、直肠癌、肝癌和食管癌等有一定疗效。

用法用量 常用量每次3片，每日3次。或遵医嘱。

规格 每片含肿节风浸膏0.25克，约相当生药2.5克。

生产单位 上海第七制药厂

癌 炎 宁 (片)

主要成份 苦草

功能主治 清热解毒、软坚散结、消肿镇痛。用于食道癌、肺癌、鼻咽癌、肠癌等多种癌症。

用法用量 日服10片，分2~3次用温开水送服。癌症病者可酌情增大剂量。外用适量，根据病症加水调和洗敷患处或滴入鼻道、咽喉处。

生产单位 广西梧州市中药厂

山 油 柑 碱

主要成份 山油柑碱是一种澳大利亚植物芸香科 *Acronychia baueri* 中所含的吡啶酮类生物碱。本品是人工合成品。

功能主治 据报道其特点是动物试验中抗癌谱广，对17种动物模型中有12种有效。无论口服或皮下注射途径均有效。它不仅能抑制肿瘤生长，而且能延长动物生命。

临床试用情况 初步看到在口服每日150毫克时对淋巴肉瘤、何杰金氏病有显著疗效，对食管癌有缓解梗阻现象，对胃癌有止痛作用。目前正在进一步扩大临床。

研制单位 湖南医药工业研究所

4 0 7 4 片

主要成份 核桃树枝、益母草、板兰根、紫草根。

功能主治 适用于胃癌、宫颈癌、乳腺癌。对子宫肌瘤、白血病等亦有良好疗效。

用法用量 日服3次，每次4~6片，儿童酌减。

生产单位 邯郸市制药厂

P 2 3 5 片

主要成份 中药复方制剂

功能主治 肺癌、骨癌、食道癌等恶性肿瘤。

用法用量 口服，每次4~8片，每日2~3次。

生产单位 西安国药制药厂

7 0 1 2 片

主要成份 秦艽、莪术、当归等。

功能主治 用于肝癌、胃癌、牛皮癣等。

用法用量 每日3次，每次15~25片或遵医嘱，饭后温开水服。

生产单位 西安国药制药厂

癌 痛 宁 (片)

功能主治 解热消炎、散结止痛。

主治癌症在放射治疗期间所出现咽干喉痛、头痛、不思饮食等或因癌症发生上列症状的亦有疗效。

用法用量 以十天为一个疗程。第一天第一次服八片，第二次服六片，第三次服四片，第二天开始每日服三次，每次服五片，开水送服。用于一般炎症，每日服三次，每次服四片，儿童减半。用于疮疖可将药片以开水溶化后涂擦于患部，每日数次。

生产单位 佛山市制药二厂

三尖杉酯碱注射液

主要成份 本品为从三尖杉属三尖杉中分离提取的有效成份。

功能主治 对急性、非淋巴性白血病疗效较好。

用法用量 遵医嘱。

研制单位 福建省医药研究所

高三尖杉酯碱注射液

主要成份 本品为从三尖杉属三尖杉中分离提取的抗癌有效成份。

功能主治 对急性单核细胞性白血病，急性粒细胞性白血病有较好疗效，对恶性淋巴瘤等亦有效。

用法用量 遵医嘱。

规格 每毫升内含高三尖杉酯碱1毫克。

研制单位 福建省医药研究所

第二部分：防治心血管疾病中草药

泽泻降脂片

主要成份 泽泻。

功能主治 本品为治疗高脂蛋白血症药物。降低高脂血清胆固醇和甘油三脂，防止动脉粥样硬化以及抗脂肪肝也有一定的作用。

用法用量 每日三次，每次三片。

规格 每片含泽泻醇提取物0.2克。

生产单位 杭州第一中药厂

脉安冲剂

主要成份 山楂、麦芽

功能主治 本品为治疗高脂蛋白血症药物。用于降低高脂血清胆固醇，防止动脉粥样硬化，对降低甘油三脂、 β -脂蛋白也有一定的作用。

用法用量 每日二次，每次一包，用开水冲服。

规格 每包内含山楂、麦芽各7钱。

生产单位 开封市中药厂、杭州第一中药厂、宁波中药制药厂

脉安蜜浆

主要成份 山楂、柠檬酸、麦芽、蜂蜜、苯甲酸、蔗糖、尼泊金乙酯。

功能主治 为治疗高脂蛋白血症药物，用于降低血清胆固醇，防止动脉粥样硬化，对降低甘油三酯， β 脂蛋白也有一定作用。

用法用量 口服，常用量一次15毫升，早晚各一次。

规格 每1000毫升内含山楂、麦芽各500克。

生产单位 杭州第二中药厂

脉 通 (胶 囊)

主要成份 亚油酸乙酯、烟酸、维生素C、肌醇、橙皮甙、维生素B₆、维生素E。

功能主治 其功能为调整机体内脂质的新陈代谢,并使血中胆固醇逐渐降低而正常化,防止胆固醇在动脉壁上的沉积,增强血管壁的坚韧性,扩张血管,达到治疗和预防动脉硬化的效果。

用法用量 每天三次,每次1~2粒,饭后服用。

规 格 每粒胶囊内含亚油酸乙酯300毫克、烟酸25毫克、维生素C25毫克、肌醇10毫克、橙皮甙7毫克、维生素B₆5毫克、维生素E2毫克。

生产单位 杭州第二中药厂

虎 杖 片

主要成份 虎杖

功能主治 清热利湿,通便解毒,散瘀活血。用于降低血胆固醇和甘油三脂。

用法用量 常用量,口服一次三片,每日三次,或遵医嘱。

规 格 每片含虎杖干浸膏0.3克。

生产单位 上海第七制药厂

脉 康 片

主要成份 对氯苯氧异丁酸钙盐、名贵中药提取物

功能主治

- 1.各种类型高血脂症—三酸甘油酯增高症,胆固醇增高症等。
- 2.动脉粥样硬化—冠状动脉性心脏病(胸闷、心肌梗塞、心绞痛)。
- 3.各种类型高血压症。

用法用量 每日三次,每次二片,饭后服用或遵医嘱。

规 格 每片含对氯苯氧异丁酸钙盐90毫克。

生产单位 上海医药工业公司

脉 柔 片

主要成份 桑寄生、生首乌、决明子、茵陈、维生素C、维生素B₂、烟酸。

功能主治 有祛脂作用,对降低血胆固醇有良好的疗效。用于动脉硬化,迁慢性肝炎,脂肪肝等。

用法用量 每次8片，每日3~4次。

生产单位 武汉健民制药厂

灵 芝 片

主要成份 灵芝

功能主治 滋补强壮。用于神经衰弱，亦用于冠心病。

用法用量 口服，一日三次，每次三片。

规 格 每片含灵芝浸膏粉50毫克。

生产单位 广州第七制药厂、江西共大七三〇药厂、广东海南制药厂。

灵 芝 舒 心 片

主要成份 灵芝总碱

功能主治 本品系灵芝菌有效部分，能增强机体缺氧耐力，增加冠脉流量，改善心肌代谢。用于预防急性高原适应不全症，冠心病。

用法用量 口服，每日二次，每次三片或遵医嘱。

规 格 每片约相当50毫升灵芝发酵液。

研制单位 湖南医药工业研究所

四 逆 汤 口 服 液

主要成份 附子、干姜、炙甘草

功能主治 本品有回阳救逆之功，用于治疗阴寒内盛，阳气衰微，四肢厥冷，脉沉无力等症。

用法用量 一日三次，每次服10毫升（壹支）或遵医嘱。

生产单位 杭州第二中药厂

灵 芝 片

主要成份 灵芝提取物与橙皮甙

功能主治 能降低血脂、推迟动脉粥样硬化及其并发症。可用于高脂血症及预防冠心病。

用法用量 口服，每次2~3片，一日6~9片。

生产单位 天津市第三中药厂

复方橙皮甙胶囊

主要成份 橙皮甙、维生素C

功能主治 本品特点为直接作用于血管壁，增强动脉血管的坚韧性，提高血管弹性，从而达到治疗和预防动脉硬化脆变性疾病的效果。用于高血压及血管硬化所引起的视网膜出血、眩晕、头痛、头胀、眼花，高血压性脑病、脑软化症、脑溢血等。

用法用量 每天三次，每次2粒。

规格 每粒含橙皮甙100毫克、维生素C100毫克。

生产单位 杭州第二中药厂

复方山楂糖浆

主要成份 山楂、丹参。

功能主治 增加冠流、扩张冠脉、舒张血管、降血压、血脂、强心、镇静、安神等作用。
主治冠心病、心绞痛、降胆固醇、心肌梗塞等症。

用法用量 日服三次，每服10毫克。

生产单位 黑龙江省肇东制药厂

复方丹参首乌片

主要成份 丹参、首乌等。

功能主治 补血滋阴、活血通脉。主治冠心病，高血脂病，动脉硬化症。

用法用量 每次7片，每日4次或遵医嘱。

生产单位 江西中医学院红旗制药厂

冠心灵(酏水剂)

主要成份 山楂、川芎、丹参。

功能主治 冠心病、心绞痛、高血压、高血脂、心肌梗塞等症。

用法用量 日服三次，每服5毫升。

生产单位 黑龙江省肇东制药厂

冠 心 乐 糖 衣 片

功能主治 益气养阴、宁心安神、活血化瘀，通络止疼。主治高血压、冠心病。

用法用量 饭后服，日服三次，每次6~8片。

生产单位 山东淄博人民制药厂

冠 心 宁 (片)

主要成份 丹参、赤芍、葛根、何首乌、珍珠母、川芎、红花、降香等。

功能主治 活血化瘀、理气止痛。主治冠状动脉硬化性心脏病。可用于因冠状动脉硬化而引起的心绞痛、心血管供血不足、食欲差、失眠、心悸、胸闷、气短等。

用法用量 每日服四次，每次服5~6片，30天为一疗程，一般可连续应用3~5个疗程。

生产单位 洛阳制药厂、武汉市健民制药厂。

愈 风 宁 心 片

主要成份 葛根总黄酮

功能主治 增加冠状动脉血流量，改善冠状动脉循环和脑循环。用于：1)消除高血压病人的颈项强痛和头痛。2)冠心病心绞痛。3)早期耳蜗性耳聋。

用法用量 常用量，口服一次3~5片，一日1~3次或遵医嘱。

规 格 每片含葛根总黄酮100毫克。

生产单位 济南人民制药厂

心 脉 通 (片)

主要成份 菊花总黄酮

功能主治 治疗和预防冠心病、心绞痛、冠状动脉机能不全及其它心血管疾病。

用法用量 口服，每日三次，每次三片。

规 格 每片含菊花总黄酮32毫克。

生产单位 杭州第一中药厂

6 9 1 1 片

主要成份 银杏叶总黄酮

功能主治 血管扩张药。用于动脉硬化及高血压病所致冠状动脉供血不全，心绞痛、心肌梗死。

用法用量 口服，每日三次，每次二片。

规格 每片含银杏总黄酮1.8~2.2毫克。

生产单位 杭州第一中药厂

脉 软 宁 片

主要成份 向荆

功能主治 动脉粥样硬化，降血压，高脂血症。降转氨酶，治疗各型糖尿病等。

用法用量 每日2次，每次2片，饭后服或遵医嘱。

生产单位 陕西省渭南地区制药厂

复 方 丹 参 注 射 液

主要成份 丹参、降香。

功能主治 丹参有活血、祛瘀、通经、止痛功效，降香有行瘀、止血、定痛功效。本品有扩张血管与增进冠状动脉血流量的作用。主要用于心绞痛、亦用于心肌梗塞等。

用法用量 肌肉注射一次1~2毫升，一日2~4毫升，2~4周为一疗程。静脉注射一次4毫升，用5%葡萄糖注射液250~500毫升稀释后使用，2~3周为一疗程。

规格 每毫升内含丹参、降香各1克。

生产单位 广州第三制药厂、海南制药厂、上海中药制药一厂、上海第九制药厂、杭州第二中药厂、无锡第五制药厂、湖南医学院附二院药厂

舒 冠 通 糖 浆

主要成份 盐肤木

功能主治 活血散瘀、行气止痛。临床试用于治疗冠心病，总有效率为88.7%。

用法用量 口服，每日三次，每次10毫升，疗程1~2个月。

研制单位 福建省医药研究所

毛冬青(胶囊、片剂，注射液)

主要成份 本品是采用毛冬青的地下根经提炼、精制而成。

功能主治 凉血、活血、通脉、消炎。用于冠状动脉粥样硬化性心脏病，血栓闭塞性脉管炎，中心视网膜炎，心绞痛等。

用法用量 每日三次，每次三粒，连服一星期为一个疗程。或遵医嘱服。肌肉注射，每日1~2次，每次2毫升。

规格 每粒胶囊内含毛冬青浸膏500毫克。

生产单位 广州中药六厂、广州第三制药厂、广州中药总厂、长沙中药一厂、信阳地区中药制药厂、佛山市制药二厂

瓜 蒌 (片, 注射液)

主要成份 栝楼

功能主治 宽中、利气、宣痹、散结、清热化痰。主治胸痹。

用法用量 每日三次，每次4片，或遵医嘱。常用量肌肉注射，每次4毫升，每日1~2次。

规格 每2毫升相当生药10克。

生产单位 上海第十八制药厂、上海第一制药厂。

冠 心 苏 合 (丸、胶囊)

主要成份 檀香、青木香、冰片、乳香、苏合香。

功能主治 芳香开窍，理气止痛。适用于心绞痛，胸闷，心肌梗塞等症。

用法用量 含服或嚼碎后咽服。每次一丸，每日服三次，也可于临睡前或发病时服用。

规格 每丸含药0.68克。

生产单位 广州中药一厂、广州中药六厂、上海中药制药一厂、杭州第一中药厂

冠 心 片 (B)

主要成份 三七、槐花、赤芍、丹参、川芎、降香、红花等。

功能主治 理气、活血、化瘀、通络、止痛。主治冠心病、心绞痛。

用法用量 口服每日三次或遵医嘱，每服6~8片。

生产单位 长春市人民制药厂

健 心 片

主要成份 毛冬青、参三七、丹参、豨签草、红花、降香、冰片。

功能主治 具有活血化瘀、安神、理气、止痛的功效。对心肌劳损，动脉硬化具有较好的疗效。对心绞痛患者，服用后，可使症状缓解。

用法用量 一日三次，每次口服4~6片，开水送下。

规格 每片含黄酮甙20毫克。

生产单位 洛阳制药厂

冠 心 宁 注 射 液

主要成份 原儿茶醛

功能主治 用于治疗心绞痛、早搏，并有降血脂作用。

用法用量 静脉滴注，每天二次，每次一支。

生产单位 江苏南通制药厂

心 肌 安 注 射 液

功能主治 具有改善心肌新陈代谢和心肌缺氧的功能。用于病毒性心肌炎，风湿性心肌炎等。

用法用量 肌内注射，每日1~2次，每次4毫升，一个疗程为1~2月。

生产单位 洛阳制药厂

心 脉 宁 糖 衣 片

主要成份 毛冬青、安妥明、卵磷脂、抗坏血酸、盐酸吡多辛、烟酸、肌醇等。

功能主治 有降低血中胆固醇、甘油三酯、 β -脂蛋白及扩张冠脉之作用。适用于冠状动脉硬化性心脏病如心绞痛、心肌梗塞、心力衰竭、头晕、头痛、气促、心悸、高血压以及胆固醇过高所引起之各种疾病。

用法用量 每日服3次，每次2~3片或遵医嘱，饭后服用。

生产单位 广州第三制药厂

心 脉 宁 (片)

主要成份 毛冬青、烟酸、盐酸吡多辛、肌醇、抗坏血酸、磷脂。

功能主治 适用于冠状动脉硬化性心脏病，如心绞痛、心肌梗塞、心力衰竭、头晕、头痛、心悸、气促、高血压以及胆固醇过高所引起之各种疾病。

用法用量 每日三次，每次2~3片。

规格 每片含毛冬青50毫克、烟酸20毫克、盐酸吡多辛4毫克、肌醇16毫克、抗坏血酸30毫克、磷脂10毫克。

生产单位 广州第三制药厂

舒 心 宁 (片)

主要成份 [丹参、当归、川芎、红花、降真香、志肉(炙)、甘草(炙)、太子参、瓜蒌皮、石菖蒲、薤白、赤芍]

功能主治 本品具有活血、消瘀、行气、止痛、改善冠状动脉血液循环作用。兼有降低血压和降胆固醇的作用。用于冠心病及心绞痛。

用法用量 常用量，成人口服，每日三次，每次5~6片或遵医嘱。服10瓶为一疗程，可连续服用。

生产单位 常德地区制药厂

心 舒 平 片

功能主治 梅毒性心脏病，风湿性心脏病以及各种心脏病的轻度心力衰弱。

用法用量 每日三次，每次3~5片或遵医嘱。

生产单位 集宁生物化学制药厂

钩 藤 降 压 片

主要成份 钩藤总生物碱

功能主治 清热、平肝、熄风、止痛。主要用于治疗高血压病。

用法用量 常用量，口服一次10毫克~20毫克，一日30毫克~60毫克。一般一个月为一疗程，可重复使用。

规 格 每片含钩藤总生物碱5毫克或10毫克。

生产单位 成都制药一厂

复方罗布麻片(原名：复方降压宁)

主要成份 罗布麻、野菊花、汉防己、硫酸胍生、胍苯哒嗪、双氢克尿塞、异丙嗪、利眠宁、维生素B₁、维生素B₆、泛酸钙、三矽酸镁等。

功能主治 清热、平肝、熄风。具有良好的降压作用和改善高血压症状的作用。能使头痛、头晕、肢麻等症状消失，患者服后较舒适。

用法用量 每日3次，每次2片，降压后维持量：一日3片或遵医嘱。

生产单位 上海南昌制药厂