

现代数学译丛

多复变函数

〔美〕R. 纳拉西姆汉 著

科学出版社

5226

72

现代数学译丛

多复变函数

[美] R. 纳拉西姆汉 著

陈志华 殷慰萍 译

科学出版社

1985

内 容 简 介

本书是多复变函数方面的基本理论的人门读物，但与当前的研究主流配合甚切。主要内容有多复变函数的基本理论，Hartogs 理论，全纯域和有界域的解析自同构等。

读者对象是从事数学专业的大学高年级学生、研究生、教师以及其它有关的科技工作者。

R. Narasimhan

SEVERAL COMPLEX VARIABLES

The University of Chicago Press
Chicago and London, 1971

现代数学译丛

多 复 变 函 数

〔美〕R. 纳拉西姆汉 著

陈志华 殷慰萍 译

责任编辑 张启男 张鸿林

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1985 年 1 月第 一 版 开本：850×1168 1/32
1985 年 1 月第一次印刷 印张：4 5/8
印数：0001—8,100 字数：118,000

统一书号：15031·2781

本社书号：3854·13—1

定价：1.35 元

序

多复变函数的理论中至少有三部分对于数学的其他分支是重要的。它们是：

(1) 基本理论：包括 Hartogs 理论，全纯域和有界域的自同构；

(2) 解析集和复空间的局部研究与整体研究；

(3) 整体理想理论；Stein 流形，凝聚解析层。

其中，第三部分已经在 Hörmander 的书，Gunning 和 Rossi 的书以及 Cartan [10]，Malgrange [23]，J. Frenkel [15] 和其他几个讲义集中得到整理。M. Herve 的书 [20]，Gunning 和 Rossi 的书 [16] 以及 Cartan 的讲义 [11]，[12] 和 Narasimhan 的讲义 [24] 也已整理了第二部分。

而基本理论部分虽然在很多书和讲义 (Hörmander [21]，Gunning 和 Rossi [16]，Cartan [10]，malgrange [23]) 中都有提及，我仍觉得缺少一个比较完全的陈述，我希望这个讲义将提供一个入门，去了解这方面理论的某些最重要部分。

这个讲义的内容，1969 年秋季在芝加哥 (Chicago) 大学讲授过。其中的大部分，我在 1967 年和 1968 年在日内瓦 (Geneva) 大学亦讲授过。在日内瓦时，Pierre Siegfried 所作的笔记使得准备本书的任务变得容易得多。

本书所需的预备知识如下：单复变函数论初步；测度论初步和点集拓扑初步；隐函数定理和秩定理，在最后一章需要常微分方程理论中的局部存在性定理和唯一性定理。

R. 纳拉西姆汉

目 录

第1章. 多复变函数的基本性质..... 1

符号(1). 全纯函数(2). Cauchy 公式与某些推论(3).
开映照定理(5). Weierstrass 定理和 Montel 定理(6).

第2章. 解析开拓: 初等理论..... 9

全纯函数从多圆柱边界的开拓(9). Reinhardt 域(10).

第3章. 次调和函数与 Hartogs 定理.....23

调和函数和次调和函数的定义与基本性质(23). 一些例子和应用(30). 对每个变量分别解析的 Hartogs 定理(35). 次调和函数的例外集(38).

第4章. 全纯函数奇点的 Hartogs 定理.....41

解析集(41). Riemann 开拓定理(42). Radó 定理(43).
Hartogs 连续性定理(45). Hartogs 半径的性质(46). 某些奇异点集的解析性(51).

第5章. 有界域的自同构.....54

Cartan 唯一性定理(54). 圆形域的自同构(55). 多圆柱和球不解析等价的 Poincaré 定理(57). 正常全纯映照(58). Remmert-Stein 定理和这个定理的若干推广(59). 自同构的极限: Cartan 定理 Aut(D) 在 D 上的作用, 某些离散群的有限生成(64). 一个从 $D \subset \mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^n$ 内的单全纯映照是一个同构(70).

第6章. 解析开拓: 全纯包.....73

一个 $\mathbb{C}^n$ 上的域的 S -扩充(73). 全纯包: 基本性质(75). 例子: 一个 $\mathbb{C}^n$ 内的域的全纯包不再在 $\mathbb{C}^n$ 内; 一个不在 $\mathbb{C}^n$ 内的域的全纯包可以在 $\mathbb{C}^n$ 内(79).

第7章. 全纯域: 凸性理论.....83

全纯凸(84). 到边界的距离的性质(85). Cartan-Thullen 的第一基本定理(87). Cartan-Thullen 的第二基本定理(89). 应用和例

子(94).

第8章. 全纯域: Oka 定理104

Hadamard 三域定理和 Schwarz 引理 (104). 规范多项式的性态 (106). Oka 定理的 Bishop 证明(111).

第9章. 有界域的自同构: Cartan 定理115

向量场与 Lie 定理(116). Cartan 定理(125). 伴随于 $\text{Aut}(D)$ 的向量场的存在性(128). Cartan 定理的证明(132).

参考文献139

第 1 章

多复变函数的基本性质

符号 我们用 $\mathbf{C}, \mathbf{R}, \mathbf{Z}, \mathbf{N}$ 分别表示复数域, 实数域, 整数环和所有非负整数的集合. $\mathbf{C}^n, \mathbf{R}^n$ 将分别表示域 $\mathbf{C}$ 上和域 $\mathbf{R}$ 上的 n 维向量空间, 且分别用 $(z_1, \dots, z_n), z_j \in \mathbf{C}$ 和 $(x_1, \dots, x_n), x_j \in \mathbf{R}$ 表示它们的点. 我们看待 $\mathbf{C}^n$ 与 $\mathbf{R}^n$ 时, 都认为已赋于它们自然拓扑.

对 $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbf{C}^n$, 令 $\|z\| = \sqrt{(|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2)}$,

$$|z| = \max_{j=1, \dots, n} |z_j|,$$

对于 $\mathbf{R}^n$ 内的点亦用类似的符号.

一般用 $\alpha, \beta, \dots$ 表示 $\mathbf{N}$ 的元素组成的 n -元组; 即 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \alpha_j \in \mathbf{N}$. 令

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!.$$

$\alpha \leq \beta$ 表示 $\alpha_j \leq \beta_j, j = 1, \dots, n$ 和 $\alpha < \beta$ 表示 $\alpha \leq \beta$ 且 $\alpha \neq \beta$.

如果 $a \in \mathbf{C}^n$ 和 $\rho = (\rho_1, \dots, \rho_n)$, 则以 a 为中心, 以 ρ 为(多元)半径的多圆柱是指集合.

$$P(a, \rho) = \{z \in \mathbf{C}^n \mid |z_1 - a_1| < \rho_1, \dots, |z_n - a_n| < \rho_n\}.$$

$\bar{P}(a, \rho)$ 表示 $P(a, \rho)$ 在 $\mathbf{C}^n$ 中的闭包. 最后, 如果 $z \in \mathbf{C}^n, \alpha \in \mathbf{N}^n$, 令

$$z^\alpha = z_1^{\alpha_1} \cdots z_n^{\alpha_n}.$$

有时要将 $\mathbf{C}$ 等同于 $\mathbf{R}^2$ 和 $\mathbf{C}^n$ 等同于 $\mathbf{R}^{2n}$, 则表示

$$z = x + iy, \quad z_j = x_j + iy_j, \quad x, y \in \mathbf{R}^n, \quad x_j, y_j \in \mathbf{R},$$

$$i = \sqrt{-1}, j = 1, \dots, n.$$

对于开集 $\Omega \subset \mathbf{C}^n$ 上的一个连续可微分复值函数 g , 令

$$\frac{\partial g}{\partial z_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g}{\partial x_j} - i \frac{\partial g}{\partial y_j} \right), \quad \frac{\partial g}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g}{\partial x_j} + i \frac{\partial g}{\partial y_j} \right),$$

$$(D^\alpha g)(z) = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial z_1^{\alpha_1} \cdots \partial z_n^{\alpha_n}} g(z).$$

如果 A, B 是一个(Hausdorff)拓扑空间 X 的两个子集, $A \subseteq B$ 表示 A 是在 B 内相对紧致的. 通常 $\overset{\circ}{A}$ 表示 A 的内点所成之集, $\bar{A}$ 是 A 的闭包, $\partial A = \bar{A} - \overset{\circ}{A}$ 表示 A 的边界.

一个开集 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 上的无穷次可微分函数所成的类, 记之为 $C^\infty(Q)$. 我们也称 $C^\infty(Q)$ 的每个元素是 C^∞ 函数.

全纯函数

定义 1 设 Q 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个开集, f 是 Q 上的一个复值函数, 则称 f 是在 Q 上全纯的. 如果对 $\forall a \in Q$ 都有一个邻域 U 和一个幂级数

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha (z - a)^\alpha \equiv \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n \geq 0} c_{\alpha_1 \dots \alpha_n} (z_1 - a_1)^{\alpha_1} \cdots (z_n - a_n)^{\alpha_n},$$

对 $\forall z \in U$, 则此级数收敛于 $f(z)$. 今后我们用 $\mathcal{H}(Q)$ 表示 Q 上的全纯函数的集合.

引理 1 (Abel) 假设 $\{c_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{N}^n}$ 是一个复数集, 且对 $\rho_1, \dots, \rho_n > 0$ 存在 $M > 0$ 使得

$$|c_\alpha| \rho_1^{\alpha_1} \cdots \rho_n^{\alpha_n} \leq M \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}^n,$$

则级数

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha (z - a)^\alpha$$

对 $|z_j - a_j| \leq \theta \rho_j, 0 \leq \theta < 1$ 是一致收敛的. 而且, 导数级数

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha D^\beta (z - a)^\alpha, \quad \beta \in \mathbb{N}^n,$$

亦对 $|z_j - a_j| \leq \theta \rho_j$ 是一致收敛的.

系 全纯函数都是无穷可微的. 而且, 当 $f(z) = \sum c_\alpha (z - a)^\alpha$ 时, 有 $c_\alpha = \frac{1}{\alpha!} (D^\alpha f)(a)$.

引理 2 如果 f 在 $\mathcal{Q} \subset \mathbb{C}^n$ 上全纯, 有 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = 0, j = 1, \dots, n$.

这个引理的逆也成立, 将在第 3 章证明此事实.

命题 1 (解析开拓原理) 设 $\mathcal{Q} \subset \mathbb{C}^n$ 是一个连通开集, f 是在 $\mathcal{Q}$ 上全纯. 如果 f 在 $\mathcal{Q}$ 的一个非空开集上恒为零, 则 $f \equiv 0$ 在 $\mathcal{Q}$ 上成立.

证 设 $E = \{z \in \mathcal{Q} \mid D^\alpha f(z) = 0, \forall \alpha \in \mathbb{N}^n\}$. 如果令 $E_\alpha = \{z \in \mathcal{Q} \mid D^\alpha f(z) = 0\}$, 因为 $D^\alpha f$ 是连续的, 故 E_α 是一个闭集, 所以 $E = \bigcap E_\alpha$ 是闭的.

设 $a \in E$, 则有一个 a 的开邻域 U 和一个幂级数 $\sum c_\alpha (z-a)^\alpha$, 对 $\forall z \in U$ 它收敛于 $f(z)$. 由引理 1 的系与 $a \in E$, 故 $c_\alpha = \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(a) = 0$. 因此对 $\forall z \in U$, 有 $f(z) = 0$. 所以对 $z \in U$ 和 $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$, 有 $D^\alpha f(z) = 0$. 于是 $U \subset E$, 这就得出 E 是开集.

由于 $\mathcal{Q}$ 是连通的, $E \neq \emptyset$, 故 $E = \mathcal{Q}$.

注 如果存在某个 $a \in \mathcal{Q}$, $D^\alpha f(a) = 0$ 对所有 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 成立, 则 $f \equiv 0$.

定义 2 设 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 内之开集和 f 是一个 $\mathcal{Q}$ 上的 (实值或复值) 函数, 我们称 f 是实解析的. 如果对每个 $a \in \mathcal{Q}$ 对应有一个 a 的邻域 U 和一个幂级数 $\sum c_\alpha (x-a)^\alpha$, 则对 $\forall x \in U$, 它收敛于 $f(x)$.

注 (1) 如前所述, 实解析函数是 C^∞ 的.

(2) 解析开拓原理对实解析函数亦成立: 证明是同样的.

下面的二个命题是单复变数函数的 Cauchy 公式的直接结果.

Cauchy 公式与某些推论

命题 2 (Cauchy 公式) 设 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 内的一个开集, f 是 $\mathcal{Q}$ 上的一个全纯函数, $a \in \mathcal{Q}$ 和 $\rho = (\rho_1, \dots, \rho_n)$, $\rho_j > 0$ 是使得 $\bar{P}(a, \rho) \subset \mathcal{Q}$, 则对 $z \in P(a, \rho)$, 有

$$f(z) = (2\pi i)^{-n} \int_{|\zeta_1 - a_1| = \rho_1} \cdots \int_{|\zeta_n - a_n| = \rho_n} f(\zeta_1, \dots, \zeta_n) \\ \cdot \prod_{j=1}^n (\zeta_j - z_j)^{-1} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n.$$

系 1 在上面的假设下,

$$D^{\alpha}f(z) = \alpha!(2\pi i)^n \int_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j} f(\zeta) \prod_{j=1}^n (\zeta_j - z_j)^{-\alpha_j - 1} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n.$$

这里用符号 $\int_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j}$ 代表 $\int_{|\zeta_1 - a_1| = \rho_1} \cdots \int_{|\zeta_n - a_n| = \rho_n}$,

这在后面将常用到.

系 2 如果 f 是在多圆柱 $P(a, \rho)$ 内的一个全纯函数, 则级数

$$\sum \frac{1}{\alpha!} D^{\alpha}f(a)(z - a)^{\alpha}$$

对 $z \in P(a, \rho)$, 收敛到 $f(z)$.

注意 如果 φ 在集合 $|\zeta_j - a_j| = \rho_j, j=1, \cdots, n$ 上是连续函数,

$$f(z) = \int_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j} \varphi(\zeta) \prod_{j=1}^n (\zeta_j - z_j)^{-1} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n$$

是在 $P(a, \rho)$ 内全纯且等于

$$\sum c_{\alpha}(z - a)^{\alpha}.$$

这里

$$c_{\alpha} = \int_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j} \varphi(\zeta) \prod_{j=1}^n (\zeta_j - a_j)^{-\alpha_j - 1} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n.$$

这个等式由下面的公式直接得之

$$\prod_{j=1}^n (\zeta_j - z_j)^{-1} = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} \prod_{j=1}^n \frac{(z_j - a_j)^{\alpha_j}}{(\zeta_j - a_j)^{\alpha_j + 1}};$$

这个级数对 z 在 $P(a, \rho)$ 的一个紧致集上与 $|\zeta_j - a_j| = \rho_j$ 时, 是一致收敛的.

命题 3 (Cauchy 不等式) 如果 f 是在 $\mathcal{Q}$ 上的全纯函数和 $\bar{P}(a, \rho) \subset \mathcal{Q}$, 则有

$$|D^{\alpha}f(a)| \leq M \alpha! \rho^{-\alpha}.$$

这里 $M = \sup_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j} |f(\zeta)|$.

如果写 $\zeta_j - a_j = \rho_j e^{i\theta_j}$, 则由命题 2 立刻推得此命题.

开映照定理

命题 4 (开映照定理) 设 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中之一连通开集并且 f 是在 $\mathcal{Q}$ 上的一全纯函数. 假设 f 不是常数, 则 $f: \mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{C}$ 是开的; 亦即 f 将 $\mathcal{Q}$ 中之开集映为 $\mathbb{C}$ 中之开集.

证. (a) $n = 1$ 时可以假设 $0 \in \mathcal{Q}$ 与 $f(0) = 0$. 只要证明 $f(\mathcal{Q})$ 是 0 的邻域就够了. 设 $\rho > 0$ 这样选取, 使得 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq \rho\} \subset \mathcal{Q}$ 且对 $|z| = \rho$, 有 $f(z) \neq 0$. 设 $\delta = \inf_{|z|=\rho} |f(z)|$, 则

$\delta > 0$. 设 $W \in \mathbb{C}$, $W \notin f(\mathcal{Q})$ 和 $|W| < \delta$, 则

$$\varphi(z) = (f(z) - W)^{-1}$$

是在 $\mathcal{Q}$ 上全纯. 由命题 3

$$\frac{1}{|W|} = |\varphi(0)| \leq \sup_{|z|=\rho} |\varphi(z)| \leq \frac{1}{\delta - |W|},$$

所以 $|W| \geq \frac{1}{2} \delta$. 因此 $\{W \in \mathbb{C} \mid |W| < \frac{1}{2} \delta\} \subset f(\mathcal{Q})$.

(b) **一般情况** 设 $a \in \mathcal{Q}$ 和 U 是 a 的一个凸邻域, 且 $U \subset \mathcal{Q}$, 由命题 1, $f|_U \cong f(a)$. 设 $b \in U$, $f(b) \neq f(a)$, 考虑

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid a + z(b - a) \in U\}.$$

设 $g(z) = f(a + z(b - a))$, $z \in D$, 则 D 是一个包含 0, 1 的凸集, 并且 $g(0) = f(a) \neq f(b) = g(1)$. 因此, 由 (a) 推出, $g(D)$ 是 $f(a)$ 的一个邻域. 从 $F(U) \supset g(D)$ 推出命题

系 1 (极大模原理) 设 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 内有界连通开集, 且 f 是 $\mathcal{Q}$ 上的全纯函数, 令 $M = \sup_{\zeta \in \partial \mathcal{Q}} \overline{\lim}_{z \rightarrow \zeta, z \in \mathcal{Q}} |f(\zeta)|$, 如果 f 不是常数, 则有 $|f(z)| < M \quad \forall z \in \mathcal{Q}$.

证 可以假设 $M < \infty$. 在 $\bar{\mathcal{Q}}$ 上定义函数 φ 为

$$\varphi(z) = |f(z)|, \quad z \in \mathcal{Q}, \quad \varphi(\zeta) = \overline{\lim}_{z \rightarrow \zeta, z \in \mathcal{Q}} |f(z)|.$$

$\varphi(z)$ 在紧致集 $\bar{\mathcal{Q}}$ 上是上半连续, 因此是在 $\bar{\mathcal{Q}}$ 上有界. 所以由命题 4 $f(\mathcal{Q}) = U$ 是一个有界开集 (假定 f 不是常数). 进一步, 因为 f 是开的, $\forall W \in \partial U$ 具有 $W = \lim f(z_\nu)$, 这里 $\{z_\nu\}$ 是收敛于 $\partial \mathcal{Q}$ 的某点的 $\mathcal{Q}$ 内的点列. 因此 $\partial U \subset \{W \in \mathbb{C} \mid |W| \leq M\}$. 由

于 U 是有界而且开的, 故 $U \subset \{w \in \mathbb{C} \mid |w| < M\}$. 证毕.

系 2 如果 f 在 $\mathbb{C}^n$ 内的连通开集 $\mathcal{Q}$ 上全纯并有 $a \in \mathcal{Q}$ 使 $|f(z)| \leq |f(a)|$ 对 $\forall z \in \mathcal{Q}$ 成立, 则 f 是一个常数.

证 如果 f 不是常数, $f(\mathcal{Q})$ 将是包含在 $\{w \in \mathbb{C} \mid |w| \leq |f(a)|\}$ 中之开集, 因此将包含在 $\{w \in \mathbb{C} \mid |w| < |f(a)|\}$ 中, 这是荒谬的.

Weierstrass 定理和 Montel 定理

命题 5 (Weierstrass 定理) 设 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 内一个开集, 设 $\{f_\nu\}$ 是 $\mathcal{Q}$ 上的全纯函数列, 它们在 $\mathcal{Q}$ 的每个紧致子集上是 $\rightarrow$ 一致收敛的, 则 $f = \lim f_\nu$ 是在 $\mathcal{Q}$ 上全纯, 对 $\alpha \in \mathbb{N}^n$, $\{D^\alpha f_\nu\}$ 在 $\mathcal{Q}$ 的每个紧子集上收敛于 $D^\alpha f$.

证 设 $a \in \mathcal{Q}$, $\rho = (\rho_1, \dots, \rho_n)$ 使 $\bar{P}(a, \rho) \subset \mathcal{Q}$ 并且设

$$|z_j - a_j| < \frac{1}{2} \rho_j,$$

则

$$\begin{aligned} f(z) &= \lim f_\nu(z) \\ &= \lim (2\pi i)^{-n} \int_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j} f_\nu(\zeta) \prod (\zeta_j - z_j)^{-1} \alpha \zeta_1 \cdots d\zeta_n \\ &= (2\pi i)^{-n} \int_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j} f(\zeta) \prod (\zeta_j - z_j)^{-1} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n. \end{aligned}$$

由命题 2 的系 2, f 是在 a 的邻域内全纯. 而且当

$$|z_j - a_j| \leq \frac{1}{2} \rho_j$$

时, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(z) &= (2\pi i)^{-n} \int_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j} f(\zeta) \prod (\zeta_j - z_j)^{-\alpha_j - 1} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n \\ &= \lim (2\pi i)^{-n} \int_{|\zeta_j - a_j| = \rho_j} f_\nu(\zeta) \prod (\zeta_j - z_j)^{-\alpha_j - 1} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n \\ &= \lim \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f_\nu(z). \end{aligned}$$

命题 6 (Montel 定理) 设 $\mathcal{F} = \{f\}$ 是 $\mathcal{Q}$ 上的一个全纯函数族, 且对任一紧致集 $K \subset \mathcal{Q}$, 存在 $M = M_K > 0$, 使

$$|f(z)| < M \quad \text{对 } \forall z \in K, \forall f \in \mathcal{F},$$

则任一序列 $\{f_\nu\}$, $f_\nu \in \mathcal{F}$ 包含有一个子序列, 它们在 $\mathcal{Q}$ 的紧致子集上一致收敛.

证 对 $a \in \mathcal{Q}$ 和 $f \in \mathcal{F}$, 设 $\sum c_\alpha(f, a)(z-a)^\alpha = f(z)$ 在 a 的一个邻域内成立. 由命题 2 的系 2, 这个级数在一个与 f 无关的多圆柱 $P(a, \rho)$ 内收敛. 进一步, 由命题 3 和对 $\mathcal{F}$ 的假设, 有 $c > 0$ 使得

$$|c_\alpha(f, a)| \leq cr^{-\alpha}.$$

$r = (r_1, \dots, r_n)$ 适合 $0 < r_j < \rho_j$. 因此, 如果 $\{f_\nu\}$ 是 $\mathcal{F}$ 的元素所成的序列, 我们能用对角线方法, 找到一个子序列 $\{f_{\nu_k}\}$, 使当 $k \rightarrow \infty$ 时, 对 $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$ $c_\alpha(f_{\nu_k}, a)$ 收敛. 这就得到 $\{f_{\nu_k}\}$ 在 a 的一个邻域中一致收敛. 事实上, 设 $U = P(a, r')$, 使 $0 < r'_j < r_j < \rho_j$, 则对 $\forall z \in U$,

$$|f_{\nu_k}(z) - f_{\nu_l}(z)| \leq \sum_{|\alpha| \leq N} |c_\alpha(f_{\nu_k} - f_{\nu_l}, a)| + 2C \sum_{|\alpha| > N} r'^\alpha r^{-\alpha}.$$

从 $r'_j < r_j$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 上式右边最后一项 $\rightarrow 0$ (关于 k, l 一致的). 进一步对每个 α , 当 $k, l \rightarrow \infty$ 时, 有 $c_\alpha(f_{\nu_k} - f_{\nu_l}, a) \rightarrow 0$. 这样得到

$$\sup_{z \in U} |f_{\nu_k}(z) - f_{\nu_l}(z)| \rightarrow 0 \quad \text{当 } k, l \rightarrow \infty.$$

如果 $\{U_p\}_{p=1, 2, \dots}$ 是覆盖 $\mathcal{Q}$ 的开集序列, $\mathcal{F}$ 的元素所组成的任一序列, 对每个 p 都有一个子序列在 U_p 上一致收敛. 因此对任一序列 $\{f_\nu\}$, $f_\nu \in \mathcal{F}$, 再用对角线法, 可找出一个子序列在每个 U_p 上都是一致收敛的. 这个序列显然在 $\mathcal{Q}$ 的每个紧致子集上一致收敛.

定义 3 一个在连通开集 $\mathcal{Q} \subset \mathbb{C}^n$ 中的子集 A 称为是一个唯一性集, 如果任何 $\mathcal{Q}$ 上的全纯函数 f 在 A 上为 0, 则 $f \equiv 0$ 在 $\mathcal{Q}$ 上成立.

例 集合 A 如果有 $\bar{A} \neq \emptyset$, 则是唯一性集.

命题 7 (Vitali) 设 $\{f_\nu\}$ 是在连通开集 $\mathcal{Q}$ 上的全纯函数序列和 A 是 $\mathcal{Q}$ 内的唯一性集. 假设 $\{f_\nu\}$ 是在 $\mathcal{Q}$ 上一致有界 ($|f_\nu(z)| < M$ 对所有 $z \in \mathcal{Q}$, 所有 ν 成立), 且对 $\forall a \in A$ 有 $\{f_\nu(a)\}$ 收敛, 则

$\{f_\nu\}$ 是在 $\mathcal{Q}$ 的紧致子集上一致收敛的。

证 如果 $\{f_\nu\}$ 不在 $\mathcal{Q}$ 的紧致子集上一致收敛, 则能找到紧致子集 $K \subset \mathcal{Q}$ 和 $\{\nu\}$ 的子序列 $\{\nu_k\}$, $\{\mu_k\}$ 以及一个 $\delta > 0$, $\{z_k\} \subset K$ 使得

$$|f_{\nu_k}(z_k) - f_{\mu_k}(z_k)| \geq \delta.$$

由命题 6, 如果有必要可用 $\{\nu_k\}$ 和 $\{\mu_k\}$ 的子序列代替 $\{\nu_k\}$ 和 $\{\mu_k\}$, 则可假定 $\{f_{\nu_k}\}$ 和 $\{f_{\mu_k}\}$ 是在 $\mathcal{Q}$ 的紧致子集上一致收敛的 (分别收敛于全纯函数 f 和 g) 并且 $z_k \rightarrow z_0 \in K$, 则

$$|f(z_0) - g(z_0)| \geq \delta > 0.$$

另一方面, 对 $\forall a \in A$, 由 $\{f_\nu(a)\}$ 收敛, 所以

$$f(a) - g(a) = \lim \{f_{\nu_k}(a) - f_{\mu_k}(a)\} = 0.$$

由于 A 是唯一性集, 故 $f - g = 0$, 这是矛盾的。

命题 8 设 B 是平面 $\mathbb{C}$ 上的半带形 $a < \operatorname{Re} z < b$, $\operatorname{Im} z > 0$, 设 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中的一个连通开集, $\mathcal{Q} = B \times \mathcal{Q}'$ 和 f 是在 $\mathcal{Q}$ 上的一个有界全纯函数。假设对某个 $c (a < c < b)$, 有

$$\lim_{y \rightarrow \infty} f(c + iy, z') = g(z')$$

存在, 而且对 $\mathcal{Q}'$ 的任一紧致子集内的 z' 是一致的, 则对 $\forall \varepsilon > 0$ 的区间 $a + \varepsilon \leq x \leq b - \varepsilon$ 和 $\mathcal{Q}'$ 上的任一紧致子集, 当 $y \rightarrow \infty$ 时 $f(x + iy, z') \rightarrow g(z')$ 是一致的。

证 设 f_ν 是 $\mathcal{Q}$ 上的全纯函数, 它的定义是

$$f_\nu(z, z') = f(z + i\nu, z'),$$

则 $\{f_\nu\}$ 是一致有界的。由假设条件

$$\lim_{y \rightarrow \infty} f(c + iy, z') = g(z'),$$

表明

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} f_\nu(z, z') = g(z')$$

在集合 $A = \{(z, z') \in \mathcal{Q} \mid \operatorname{Re} z = c, 0 < \operatorname{Im} z < 1\}$ 上成立。由于 A 是一个唯一性集, 故由命题 7 推得本命题。

第 2 章

解析开拓: 初等理论

全纯函数从多圆柱边界的开拓

显然, 如果 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的一个连通开集, $a \in \mathbb{C} - \mathcal{Q}$, 则有一个 $\mathcal{Q}$ 上的全纯函数 f 不能解析开拓到 a 点 (例如 $f(z) = (z-a)^{-1}$). 但这一事实在 $\mathbb{C}^n (n > 1)$ 内不再成立.

定理 1 (Hartogs) 设 $P = \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z_j| < 1\}$, $n > 1$, 设 V 是 ∂P 的一个邻域使得 $V \cap P$ 是连通的 (∂P 有一个如此的邻域所成的基本系), 则每个在 V 上全纯的函数 f , 有一个在 $P \cup V$ 上的全纯函数 F , 使 $F|_V = f$.

证 设 $\varepsilon > 0$, 它使如下之集 $A \subset V$

$$A = \{z \in \mathbb{C}^n \mid 1 - \varepsilon < |z_1| < 1, |z_j| < 1 \text{ } j \geq 2\} \cup \{z \in \mathbb{C}^n \mid 1 - \varepsilon < |z_2| < 1, |z_j| < 1 \text{ } j \neq 2\},$$

设 $z' = (z_2, \dots, z_n)$, 当 $|z'| < 1$, 函数 $z_1 \mapsto f(z_1, z')$ 是在环 $\{z_1 \in \mathbb{C} \mid 1 - \varepsilon < |z_1| < 1\}$ 上的一个全纯函数, 所以有

$$f(z_1, z') = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} a_\nu(z') z_1^\nu.$$

对 $\forall \nu \in \mathbb{Z}$, $a_\nu(z')$ 是在 $P' = \{|z_2| < 1, \dots, |z_n| < 1\}$ 全纯. 而现在当 $1 - \varepsilon < |z_2| < 1, |z_3| < 1, \dots, |z_n| < 1$ 时, 函数 $z_1 \mapsto f(z_1, z')$ 是在圆盘 $|z_1| < 1$ 内全纯, 所以它的 Laurent 级数不含有 z_1 的负幂次项; 即 $a_\nu(z') = 0$, 对 $\nu < 0$ 和 $1 - \varepsilon < |z_2| < 1$ 成立. 由第 1 章命题 1, 对 $\nu < 0, z' \in P'$ 有 $a_\nu(z') = 0$. 现在定义

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in V \\ \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu(z') z_1^\nu, & z \in P, \end{cases}$$

$\sum_{v=0}^{\infty} a_v(z')z_1^v$ 是在 P 的紧致子集上一致收敛的幂级数, 所以是全纯的, 而且在 $V \cap P$ 的一个非空开子集上等于 f , 因 $V \cap P$ 是连通的, 所以在整个 $V \cap P$ 上等于 f .

Reinhardt 域

设 Q 是 $\mathbb{C}^n$ 内的一个区域(连通开集). 我们称 Q 是一个 Reinhardt 域, 如果 $z = (z_1, \dots, z_n) \in Q$ 和 $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}$, 则有 $(e^{i\theta_1}z_1, \dots, e^{i\theta_n}z_n) \in Q$.

定理 2 设 Q 是 $\mathbb{C}^n$ 内的一个 Reinhardt 域, 则对 Q 上任一全纯函数 f , 有一个 “Laurant 级数”

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} a_{\alpha} z^{\alpha},$$

它是在 Q 的紧致子集上一致收敛于 f , 而且 a_{α} 是由 f 唯一确定的.

证 先证唯一性. 设 $w \in Q$ 是 Q 中的一点, 而且它的坐标为 $(w_1, \dots, w_n)$, $w_j \neq 0$, 则从级数 $\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} a_{\alpha} z^{\alpha}$ 在 Q 的紧致子集上一致收敛, 可以令 $z_j = w_j e^{i\theta_j}$, 然后乘上 $e^{-i(\alpha_1\theta_1 + \dots + \alpha_n\theta_n)}$ 进行逐项积分(沿 $-\pi \leq \theta_j < \pi$). 对 $\forall \alpha \in \mathbb{Z}^n$, 得到

$$a_{\alpha} = w^{-\alpha} (2\pi)^{-n} \int_{-\pi}^{\pi} \dots \int_{-\pi}^{\pi} f(w_1 e^{i\theta_1}, \dots, w_n e^{i\theta_n}) e^{-i(\alpha_1\theta_1 + \dots + \alpha_n\theta_n)} d\theta_1 \dots d\theta_n.$$

为了证明上面定理中所讲的展开式的存在性, 首先注意到如果 $D = \{z \in \mathbb{C}^n \mid r_j < |z_j| < R_j, 0 < r_j < R_j, j = 1, \dots, n\}$ 和 f 是在 D 上全纯, 则由单复变函数的 Laurent 展开的迭代, 得到 f 的一个 Laurent 级数的展式.

设 $w \in Q$, 取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 因 Q 是一个 Reinhardt 域, 故集合

$$D(w, \varepsilon) = \{z \in \mathbb{C}^n \mid |w_j| - \varepsilon < |z_j| < |w_j| + \varepsilon\}$$

包含在 Q 内. 由于 $D(w, \varepsilon)$ 是具有上述 D 的形式的一个集合, 故有一个 Laurent 展开

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} a_{\alpha}(w) z^{\alpha} = f(z), \quad z \in D(w, \varepsilon),$$

它是在 u 的一个邻域内一致收敛于 f 的. 现在如果有 $w' \in D(w, \varepsilon)$ 和 $\sum a_\alpha(w')z^\alpha$ 是对应于 w' 在集合 $D(w', \varepsilon) \subset Q$ 中的展开, 则前面的唯一性论断说明 $a_\alpha(w) = a_\alpha(w')$.

因此对 $\forall \alpha \in \mathbb{Z}^n$, 函数 $w \mapsto a_\alpha(w)$ 在 Q 上是局部常值的. 由于 Q 是连通的, 故 $a_\alpha(w) = a_\alpha$ 是与 w 无关的. 因此级数

$$\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} a_\alpha z^\alpha$$

在 Q 的任一点的邻域内一致收敛于 $f(z)$, 因此当 z 在 Q 的任一紧致子集时, 它一致收敛于 $f(z)$.

系 1 设 Q 是一个 Reinhardt 域, 使得对每个 $j, 1 \leq j \leq n$, 有一个点 $z \in Q$, 它的第 j 个坐标是 0, 则 Q 内的任一全纯函数 f 允许有一个展开

$$f(z) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} a_\alpha z^\alpha,$$

它在 Q 的紧致子集上一致收敛.

系 2 设 Q 是一个 Reinhardt 域, 使得对每个 $j, 1 \leq j \leq n$, 有一点 $z \in Q$, 它的第 j 个坐标是 0, 则 Q 上的任一全纯函数 f , 有一个在集合

$$\tilde{Q} = \{(\rho_1 z_1, \dots, \rho_n z_n) \mid 0 \leq \rho_j \leq 1, (z_1, \dots, z_n) \in Q\}$$

上的全纯扩充 F (即有一个在 $\tilde{Q}$ 上唯一的全纯的函数 F , 使 $F|_Q = f$).

系 3 设 f 全纯于

$$r < |z_1|^2 + \dots + |z_n|^2 < R, \quad \text{这里 } 0 < r < R,$$

则 f 能全纯扩充(开拓)到 $|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2 < R$.

引起的问题是是否能构造一个全纯函数或多个全纯函数的“存在区域”. 在本章将给出一个全纯函数的存在区域的构造, 在后面的章中将给出对一族全纯函数的存在区域的构造.

设 $a \in \mathbb{C}^n$. 考虑对子集 (U, f) , 这里 U 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个开集, $a \in U$, f 是在 U 上全纯的函数. 两个这样的对子 (U, f) (V, g) 称之为等价, 如果存在 a 的一个邻域 W , $W \subset V \cap U$ 使 $f|_W =$