

晋江地区中藥炮炙
正紅地圖中藥炮炙

晋江地区医药研究所
晋江地区医药分公司 编

前　　言

中药加工炮制是祖国医学宝库的组成部分，它有悠久的历史和丰富的内容，对于提高临床疗效起着重要的作用。

历来中药炮制技术多是“师徒相传”，故经验较为分散，炮制方法亦不尽相同。为此我区于一九六五年曾邀请有关单位的老药工、老中医共同编写了本书的初稿。同年在“晋江地区中医药学术会议”上又作过重点讨论，并由地区卫生局规定各县（市）医药公司实行统一炮制。实行以来各地炮制品种不断增加，加工炮制技术设备不断改进。因此，于一九七四年又以泉州市经验为主，做了修改补充，印发给全区各县征求意见。于一九七八年又再次召开审稿会议，对本书做了详细修改。虽经多次讨论，但仍难免有错误和缺点，请指正。

本书在编写过程中，承泉州市医药公司张庭华药师提供材料，地区医药公司薛俊声同志详加校阅，并此致谢。

目 次

第一节 根及根茎类

三 棱	(1)	甘 草	(14)
土茯苓	(1)	甘 遂	(15)
大 黄	(2)	龙 胆	(16)
大 莪	(3)	北 沙 参	(16)
山豆根	(3)	仙 茅	(17)
山 药	(4)	白 术	(17)
川牛膝	(4)	白 芍	(18)
川 莪	(5)	白 芍	(19)
川 乌	(6)	白 及	(19)
千年健	(6)	白 蕺	(20)
天南星	(7)	白 头 翁	(20)
天花粉	(8)	白 前	(21)
天葵子	(8)	白 附 子	(21)
天 麻	(9)	玄 参	(22)
木 香	(9)	半 夏	(23)
元 胡	(10)	百 部	(24)
丹 参	(10)	关 白 附	(24)
升 麻	(11)	地 黄	(25)
牛 膝	(12)	地 榆	(26)
乌 药	(12)	当 归	(27)
巴戟天	(13)	肉 茄 蓉	(28)
玉 竹	(14)	筋 风	(28)

防 已	(29)	桔 梗	(43)
红大戟	(29)	柴 胡	(44)
赤 荀	(30)	党 参	(44)
苦 木	(30)	骨碎补	(45)
远 志	(31)	射 干	(46)
附 子	(31)	狼 毒	(46)
羌 活	(32)	高良姜	(47)
板蓝根	(33)	黄 苓	(47)
苦 参	(33)	黄 茜	(48)
郁 金	(34)	黄 连	(49)
知 母	(34)	黄 精	(50)
狗 脊	(35)	常 山	(50)
泽 润	(35)	银柴胡	(51)
茜 草	(36)	续 断	(51)
草 乌	(36)	商 陆	(52)
胡 黄 连	(37)	麻 黄 根	(52)
威 灵 仙	(38)	棕榈皮	(53)
香 附	(38)	荳 草 根	(53)
独 活	(39)	葛 根	(54)
姜	(39)	紫 菰	(54)
前 胡	(40)	锁 阳	(55)
首 乌	(41)	漏 芦	(55)
秦 芫	(42)	藁 本	(56)
莪 术	(42)	藕 节	(56)

第二节 果实及种子类

八角茴香	(57)	大 枫 子	(58)
大豆黄卷	(57)	大 腹 皮	(58)

小茴香	(59)	吴 菜	(75)
山茱萸	(59)	皂 角	(76)
山 檀	(60)	沙苑子	(76)
川棟子	(61)	诃 子	(77)
千金子	(61)	补骨脂	(77)
女贞子	(62)	陈 皮	(78)
马钱子	(62)	青 皮	(79)
马兜铃	(63)	苦杏仁	(80)
木 瓜	(64)	郁李仁	(80)
王不留	(64)	金樱子	(81)
五味子	(64)	草豆蔻	(81)
车前子	(65)	草 果	(82)
牛蒡子	(65)	荔枝核	(82)
火麻仁	(66)	枳 实	(83)
巴 豆	(66)	枳 壳	(84)
乌 梅	(67)	荞 麦	(84)
石榴皮	(68)	梔 子	(85)
白 果	(68)	柿 蒂	(85)
白扁豆	(69)	砂 仁	(86)
丝瓜络	(69)	牵牛子	(87)
地肤子	(70)	胡芦巴	(87)
肉豆蔻	(70)	韭菜子	(88)
瓜蒌子	(71)	复盆子	(88)
决明子	(72)	核桃仁	(89)
红豆蔻	(72)	桃 仁	(89)
花 椒	(72)	菜菔子	(90)
苍耳子	(73)	莲 子	(90)
芥 子	(74)	益 智	(90)
麦 芽	(74)	甜杏仁	(91)

螺农	(91)	榧子	(97)
淡豆豉	(92)	槟榔	(97)
菟丝子	(93)	槐角	(98)
葶苈子	(93)	罂粟壳	(98)
棕榈子	(94)	葵仁	(99)
楮实子	(94)	稻芽	(99)
紫苏子	(95)	鹤虱	(100)
蒺藜	(95)	薏苡仁	(101)
蔓荆子	(96)	橘红	(101)
酸枣仁	(96)	橘核	(102)

第三节 草类

千里光	(103)	金钱草	(110)
马齿苋	(103)	鱼腥草	(111)
马鞭草	(104)	卷柏	(111)
木贼草	(104)	细辛	(112)
车前草	(105)	茵陈	(112)
凤尾草	(105)	芥菜	(113)
石韦	(105)	荆芥	(113)
石斛	(106)	香薷	(114)
仙鹤草	(107)	益母草	(114)
白花蛇舌草	(107)	鹿衔草	(115)
半支莲	(108)	麻黄	(115)
半边莲	(108)	扁蓄	(116)
刘寄奴	(109)	紫苏	(117)
青蒿	(109)	蒲公英	(117)
败酱草	(110)	豨莶草	(117)
佩兰	(110)	墨旱莲	(118)

- 薄 荷………(119) 薤 香………(120)
瞿 麦………(119)

第四节 叶类

- 大青叶………(120) 侧柏叶………(122)
艾 叶………(121) 桑 叶………(123)
枇杷叶………(121) 淫羊藿………(123)

第五节 花类

- 芫 花………(124) 款冬花………(126)
辛夷花………(125) 蒲 黄………(127)
枇杷花………(125) 槐 花………(128)
旋覆花………(126)

第六节 皮类

- 白 苎 皮………(128) 秦 皮………(132)
地 骨 皮………(129) 钻 地 风………(132)
合 欢 皮………(129) 海 桐 皮………(133)
杜 仲………(130) 桑 白 皮………(133)
牡 丹 皮………(130) 黄 柏………(134)
苦 棉 根 皮………(131) 椿 皮………(134)
厚 朴………(131)

第七节 藤本类

- 天仙藤………(137) 忍 冬 藤………(139)
木 通………(137) 鸡 血 藤………(139)
竹 茜………(138) 青 风 藤………(140)
苏 本………(138) 夜 来 藤………(140)

南 蕨	(140)	桑寄生	(143)
络石藤	(141)	榕 须	(143)
钩 藤	(141)	樟 木	(144)
海风藤	(142)	檀 香	(144)
桑 枝	(142)		

第八节 树 脂 类

干 漆	(145)	芦 莪	(147)
没 药	(145)	乳 香	(147)
阿 魏	(146)		

第九节 菌 藻 类

昆 布	(149)	猪 莺	(150)
海 藻	(149)	雷 丸	(150)

第十节 动 物 类

土鳖虫	(151)	鸡内金	(159)
瓦楞子	(151)	虎 骨	(159)
五倍子	(152)	夜明砂	(160)
五灵脂	(153)	穿山甲	(160)
水 蜈	(153)	海 螺 蜍	(161)
凤凰衣	(154)	海 蛇	(162)
石决明	(154)	桑 螺 蜘	(162)
地 龙	(155)	蛇 蜈	(163)
全 蝉	(155)	刺 猪 皮	(163)
血余炭	(156)	鹿 角 霜	(164)
龟 板	(157)	望 月 砂	(164)
牡 蛮	(157)	斑 蚊	(165)
阿 胶	(158)	蛴 蛴	(165)

紫河车	(166)	蕲 蛇	(169)
蛤 蛤	(166)	蝼 虫	(170)
蛤 壳	(167)	僵 蚕	(170)
蜈 蚣	(168)	蟾 蜍	(171)
蜂 房	(168)	蟾 酥	(172)
蜣 蟒	(169)	鳖 甲	(172)

第十一节 矿石类

无名异	(174)	针 砂	(183)
龙 骨	(174)	金 磺 石	(184)
龙 齿	(175)	炉 甘 石	(184)
代赭石	(176)	禹 余 粮	(185)
白 研	(176)	钟 乳 石	(186)
石 膏	(177)	砒 霜	(186)
石 燕	(178)	密 陀 僧	(187)
石 蟹	(178)	绿 研	(187)
玄明粉	(179)	硫 黄	(188)
自然铜	(180)	紫 石 英	(189)
阳起石	(181)	雄 黄	(189)
朱 砂	(181)	滑 石	(190)
赤石脂	(182)	硼 砂	(190)
花蕊石	(183)	磁 石	(191)

第十二节 其 他

人中白	(192)	竹 沥	(194)
人中黄	(192)	米 醋	(195)
牛胆星	(193)	芫 菓 仁	(196)
半夏曲	(194)	没 食 子	(196)

第一节 根及根茎类

三棱(京三棱)

药物来源：本品为黑三棱科植物黑三棱的干燥块茎，本地区货源多来自广东、广西两省。冬季至次春采挖，洗净，削去外皮晒干。

炮制备料：原药每100公斤用米醋12.5公斤。

炮制方法：

1. 三棱片：原药用水浸透，切成2毫米厚圆形片，晒干；

2. 醋三棱：把三棱片用文火炒至微黄色，洒醋炒干，摊凉。

药物性味：苦，平。

功能主治：破血，行气，消积，止痛。用于腹中胀痛，腹部肿块，肝脾肿大。醋炒可增强行气、消瘀、止痛作用。

用法用量：4.5—9克。

药物贮藏：置通风干燥处，防蛀。

注意事项：1. 处方写三棱，要付醋三棱。2. 孕妇忌服。

土 茯 苓

药物来源：本品为百合科植物光叶菝葜的干燥根茎。系本省地产药材。夏秋二季挖采，除去须根，洗净，干燥，或

趁鲜切成薄片干燥。

炮制方法：原药拣去杂质，清水浸泡后捞出闷透，切片晒干即成。

药物性味：甘、淡，平。

功能主治：清热，除湿，解毒。用于钩端螺旋体病，关节酸痛，尿路感染，白带，疮疡。

用法用量：15—60克，用于钩端螺旋体病可达250克。

药物贮藏：置通风干燥处。

大黄(将军、川军、锦纹)

药物来源：本品为蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的干燥根及根茎。本地区货源多来自四川、甘肃、青海等省。秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖，除去细根，刮去外皮，切瓣或段，绳穿成串干燥或直接干燥。

炮制备料：原药每100公斤用黄酒12公斤。

炮制方法：

1. 大黄片：原药大小分档，筛去灰尘，用清水洗净，捞起放缸中闷润透心，切成3厘米长3毫米厚片，晒干。

2. 酒大黄：把大黄片放入缸内，喷黄酒闷透，取出凉干即得。成品棕黄色较原药深。

3. 黑大黄：把大黄片放入锅内，文火炒至黑焦色为度，喷洒清水取出凉干即得。

药物性味：苦，寒。

功能主治：泻实热，下积滞，行瘀血。用于实热便秘，积滞腹痛，湿热黄疸，急性阑尾炎，不完全性肠梗阻，血瘀经闭，痈疖疔疮，化脓性皮肤病，烧烫伤等。生大黄泻下力

强；酒制缓泻，且可引药上行，清头目风热；制黑止血，可治热痢。外科常生用。

用法用量：3—12克。用于泻下不宜久煎，外用适量研末，油调敷患处。

药物贮藏：置通风干燥处，防蛀。

注意事项：1. 处方写大黄者，给生大黄；写酒大黄或黑大黄者，方给酒大黄或黑大黄。2. 孕妇慎服。

大 薊

药物来源：本品为菊科植物薊的干燥地上部分或根。系本省地产药材。夏、秋二季花开时刈取地上部分，或秋末挖根，除去杂质，晒干。本地区多用根。

炮制方法：原药拣去杂质，洗净，闷透，切片，晒干。

药物性味：甘、苦，凉。

功能主治：凉血止血，祛瘀消肿。用于衄血，吐血，便血，尿血，崩漏，痈肿疮疖。

用法用量：9—15g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

药物贮藏：置通风干燥处。

山 豆 根

药物来源：本品为豆科植物柔枝槐的干燥根及根茎。本地区货源多来自广西。秋季采挖，除去杂质，洗净，干燥。

炮制方法：原药洗净，浸润，切片，晒干即成。

药物性味：苦，寒。

功能主治：清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，肺热

咳嗽，齿龈肿痛，痈疮，肿瘤。

用法用量： 3—9克。

药物贮藏： 置干燥处。

山 药(淮山、薯蓣)

药物来源： 本品为薯蓣科植物薯蓣的干燥根茎。本地区货源多来自河南省，本省亦产。冬季茎叶枯萎后采挖，切去芦头，洗净，除去外皮及须根，用硫黄熏后，干燥；也有选择肥大顺直的干燥山药，置清水中，浸至无干心，闷透，用硫黄熏后，用木板搓成圆柱状，切齐两端，晒干，打光，习称“光山药”。

炮制备料： 原药每100公斤用黄土20公斤。

炮制方法：

1. 生淮山：原药浸水，春冬季浸七小时，夏秋季浸五小时，捞出摊在竹箕内凉至身软，切成1毫米圆形片，晒干即得。浸淮山须择晴天，用磁器浸忌用木桶、铁桶。

2. 炒淮山：待黄土炒热，投入淮山片拌炒至黄色为度，取出，筛去黄土摊凉。

药物性味： 甘，平。

功能主治： 补脾胃，益肺肾。用于脾虚腹泻，肺虚咳嗽，糖尿病，小便频数，遗精，白带。

用法用量： 9—18克。

药物贮藏： 置通风干燥处，防蛀。

注意事项： 处方写淮山，应配炒淮山。

川 牛 膝

药物来源： 本品为苋科植物川牛膝的干燥根。本地区货源多来自四川、河南。秋、冬二季采挖，除去芦头，须根及

泥沙，炕或晒至半干，堆放回润，再炕或晒干。

炮制备料：原药每100公斤用米酒20公斤。

炮制方法：原药浸水约2小时，渍润，切薄片，晒干，然后放入锅中拌砂炒（砂先炒热才放药下去），炒至变微赤色为度。筛去砂，喷酒拌匀，摊凉。

药物性味：甘、微苦，平。

功能主治：活血祛瘀，通利关节。用于经闭，尿血，关节酸痛，跌扑损伤。

用法用量：4.5—9克。

药物贮藏：置阴凉干燥处，防潮。

注意事项：孕妇忌服。

川 莎

药物来源：本品为伞形科植物川芎的干燥根茎。原产于四川，现本省亦有种植。夏季当茎上的节盘显著突出，并略带紫色时采挖，除去泥沙，晒后炕干，再去须根。

炮制备料：原药每100公斤用黄酒12公斤。

炮制方法：原药大小分档，洗净，闷润，放蒸笼内蒸透，取出切成2毫米厚的圆形片晒干。再放入锅内炒至微黄色，喷洒黄酒拌匀，取出放凉即成。炒制时应防止过焦。成品呈微黄色，有浓厚香味。

药物性味：辛、微苦，温。

功能主治：活血行气，祛风止痛。用于头痛，胸闷痛，经闭腹痛，风湿痛，跌打损伤。

用法用量：3—9克。

药物贮藏：置通风干燥处，防蛀。

注意事项：处方写川芎，应付酒川芎。

川 乌

药物来源：本品为毛茛科植物乌头的干燥母根。本地区货源多来自四川、陕西、安徽等省。6月下旬至8月上旬采挖，除去子根、须根及泥沙，晒干。

炮制备料：原药每100公斤用黑豆10公斤，甘草10公斤。

炮制方法：原药拣去杂质，洗净灰屑，用清水浸泡，春季冬季浸泡7天，每天换水2次，夏秋季浸泡5天，浸时应置阴凉通风之处，每天换水2~3次，泡至口尝稍有麻辣感为度，捞出放凉。另用黑豆、甘草煎汤去渣，再把川乌投入汤内煮透，至内无白心为度。取出凉七成干，切成2毫米厚圆型薄片，晒干即成。

药物性味：辛、苦，热；有大毒。

功能主治：祛风湿，散寒，止痛。用于风寒湿痹，肢体内关节冷痛，坐骨神经痛，腹中寒痛，跌扑剧痛。

用法用量：3—9克。一般炮炙后用，宜先煎，久煎，外用适量，多生用。

药物贮藏：置通风干燥处，防蛀。

注意事项：1. 内服处方写川乌，应给制川乌；2. 孕妇忌服；3. 生品内服宜慎；4. 不宜与川贝母、浙贝母、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌、犀角同用。

千 年 健

药物来源：本品为天南星科植物千年健的干燥根茎。本

地区货源多来自广西、云南等省。春秋二季采挖，洗净，除去外皮，晒干。

炮制方法：原药洗净，渍润，切片，晒干即成。

药物性味：苦、辛，温。

功能主治：祛风湿，健筋骨。用于风寒湿痹，腰膝冷痛，下肢拘挛麻木。

用法用量：4.5—9克。

药物贮藏：置阴凉干燥处。

天 南 星

药物来源：本品为天南星科植物天南星、异叶天南星或东北天南星的干燥块茎。本地区货源多来自安徽，本省亦产。秋、冬二季茎叶枯萎时采挖，除去须根及外皮，干燥。

炮制备料：原药每100公斤用生姜25公斤，甘草10公斤，白矾12公斤半。

炮制方法：原药拣去杂质，洗净灰屑，用清水浸泡，春冬浸泡8天，每天换水2次，夏秋浸泡6天，每天换水2—3次（浸泡时如起白沫，每100公斤须加白矾粉2公斤同浸泡一天后再行换水），泡至口尝稍存麻辣感为度。取出后稍微凉干，再拌白矾粉，并与生姜片均匀相间，层层铺入缸内，然后以甘草煎汤去渣，缓缓倒入缸中，至淹没为度。五天后捞出，放入蒸笼内蒸至无白心。取出后拣去生姜片，凉至七成干切成3毫米厚的圆形薄片，晒干。

药物性味：苦、辛，温；有毒。

功能主治：祛风定惊，化痰，散结。用于中风，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，破伤风；生用外治痈肿。

用法用量：一般炮制后用，3—9克；外用生品适量。

药物贮藏：置通风干燥处，防霉，防蛀。

注意事项：1. 内服处方开南星，应配煮南星；2. 孕妇慎服。

天花粉（瓜萎根）

药物来源：本品为葫芦科植物栝楼或日本栝楼的干燥根。本地区货源多来自河南、四川，本省亦产。秋、冬二季采挖，洗净，除去外皮，切段或纵剖成瓣，干燥。

炮制方法：原药筛净，大小分档，用清水浸泡2—3小时，捞起淘透，切成3毫米厚薄片，晒干即得。

药物性味：甘、微苦，微寒。

功能主治：生津止渴，排脓消肿。用于热病口渴，消渴，痈肿。

用法用量：9—12克。

药物贮藏：置干燥处，防蛀。

天 葵 子

药物来源：本品为毛茛科植物天葵的干燥块根。本地区货源多来自浙江、江苏、安徽等省。夏初采挖，洗净，干燥，除去须根。

炮制方法：除去杂质，洗净，干燥。

药物性味：甘、苦，寒。

功能主治：散结消肿，解毒。用于痈肿，乳腺炎，淋巴结核，毒蛇咬伤。