

清 郭右陶 著述

痧
脹
玉
衡

科技卫生出版社

R
1




数据加载失败，请稍后重试！

样 本 库

清 郭右陶 著述

痧
脹
玉
衡



科技卫生出版社

52512

內 容 提 要

痧是疫癘之氣所致，發病甚暴，變化甚速，醫者每以風、寒、暑、濕之法治之，往往有誤。其症始見於明末，而無專書，至清康熙時，作者郭氏始謂痧之重者，脈塞腸胃，壅阻經絡，名曰痧脹，立說定義，明列治驗，自創一格，而成本書。

全書共四卷。上卷為痧脹發蒙論、痧脹要語、痧脹脈法。中卷列各痧症狀。下卷列各痧備用要方。後卷列痧脹看法，痧脹兼證及變證等類。搜集豐富，說理明晰，後出痧書，皆祖述本書而增損者。茲特重校印行，以供中西醫師學習與參考之需。

痧 脹 玉 衡
清 郭右陶 著述

科技衛生出版社出版

(上海南京西路2004號)

上海市書刊出版業營業許可證出093號

上海市印刷六廠印刷 新华書店上海發行所總經售

開本787×1092 純1/32 印張6 字數79,000

(原大東、上卫版印1,500冊)

1959年1月新1版 1959年1月新1版第1次印刷

印數1—2,500

統一書號：14119·340

定價：(十)0.58元

自敘

嘗論一元運化。升而爲天。凝而爲地。人生其中。道配三才。惟其克佐天地之所不及也。所以大之兵農禮樂。小之屠釣工商。缺一不可。而況炎帝肇創。嘗藥療病。尤斯人生死所係者乎。歷代相沿。神醫迭出。載籍紛紛。惟救疾苦。孰意痧脹一症。時有懸命須臾。兆變頃刻者。竟置不論。如雲林龔先生。所誌諸書。歷有年矣。迄今誦法不衰。時多宗之。然云青筋所謂痧也。惜自古以來。從未論及。是以其疾往往不治。余竊以爲生死甚大。望醫如望拯溺。詎可聽人之有是疾。而不爲之生全乎。余高曾以經術起家。篋裘累葉。余少列宮牆。讀古惠鮮懷保。慨然有惻恤生民之志。嘗願爲愁者解困。危者甦命。因徧閱仲景、東垣、丹溪諸先生論。而帖括所拘。有懷未展。鼎革以後。播遷不一。或羈留武水。或跋涉秦溪。每憶昔年尋章摘句。不過淹塞一身。毫無裨益於世。旣而旅食江淮。浪遊吳越。所在時行痧脹。被禍不少。余心惻然。思得一術以濟之。竊恐世人犯而不識。多有坐視其死者。故凡遇杏林先輩。未嘗不造而問焉。見松隱異人。未嘗不就而請焉。即冊籍所載。鮮不於指對之間。互相參考。然於痧也。究不得一要旨。已後返棹揚子。搜求高曾所遺前賢諸秘草。有其傳變難治異症。或定於藤洛太儒。或議諸楚粵高士。雖篇頁零星。各有同異。皆透參靈。素甲乙諸經。以推廣仲景先生之意。惜專籍無傳。沉埋日久。而古人精秘。尙未出也。余日夕究心。始悟痧脹變

端。總其大綱。撮其要領。遂得歷歷措施。無不響驗。余特慮斯疾勿辨。貽禍無窮。故爲之推原其始。詳究其終。深憫斯疾之爲害。不忍不有斯集也。雖然。醫者治疾。猶百工治事。此握一規。彼挾一矩。有一定之法。無一定之用。故余雖獲遺言。猶必酌量於累黍之度。而神明其治法焉。此非昔人無是疾。今人始有是疾也。抑非昔人之病可略。今人之病當獨詳也。余所以念茲在茲。日孜孜焉。從事筆墨間。惟此救人。是論要不外夫推己之心。俾天下咸慰及人之願。斯已耳。昔人有言。道之真以治身。其緒餘以爲天下。余獨不敢云治身。與爲天下有二也。蓋醫之爲道。惟視人如己者。乃可施。至於風氣之強弱。年歲之多寡。精力之厚薄。必須以己爲斷。然後原疾量藥。貫徹微幽。度節氣而候溫涼。參脈理而合輕重。始乃取應如神。捷於桴鼓。不然。鹵莽從事。是猶南轅而返北轍也。烏可得哉。時

大清康熙十四年歲次乙卯燈月。構李郭志遠。右陶氏自序於裕賢堂。

續敘

嘗稽古今醫學。備悉萬病。獨不明痧。因而人鮮其傳。無奈世之患者比比也。既有此病。不可不求有以治之。余因以治之所驗。悉其症之所由。於甲寅歲。著玉衡一書。偕同人互相參訂。急而行之。亦濟生之念。所不得已也。書中凡敘痧說。似已具詳。而年來痧之變幻。更有隱伏於別病中者。傷人最多。非惟世所罕識。猶余前書之所未及。因又有痧刻之續。凡以因時所犯。略採異驗爲集。夫亦謀諸同人。非敢以自矜也。幸天下不以多贅而忽諸。

大清康熙十七年戊午歲季秋吉旦郭志遠右陶父載識

凡例

- 一、言有不實。治有不效者。一句不載。
- 一、藥有不當。用有不明者。一味不入。
- 一、據症用治。立方制宜。非痧不錄。
- 一、按脈閱筋。恐人有誤。詳之有據。
- 一、砭刺痧筋。必須紫黑毒血。據爲實見。
- 一、載雜症。僅取兼痧。諸病虛實。悉在所略。
- 一、心腹痧痛。刮放即愈。不煩醫藥者。不多載入。
- 一、治驗不過一二三四。惟略見治法爲準。餘不多贅。
- 一、余近地氣稟柔弱。故方中分兩。從乎減少。便能取效。此雖傳示四方。不敢多加。
- 一、製方分兩甚少。若遇西北風高土燥之地。剛強勇壯之人。其分兩必須加倍。或加二倍三倍。方能有效。
- 一、飲湯規則。云稍冷者。九分冷。一分溫也。云微冷者。八分冷。二分溫也。云微溫者。冷者四分之三。溫者四分之二也。

目錄

卷上

痧症發蒙論	一
玉衡要語	四
痧分表裏辨	四
治痧宜看涼熱	五
唇舌辨	五
大小便宜通	六
咽喉治法	六
治痧當絕其根	六
痧原論	七
治痧當分經絡	七
痧與雜症輕重不同	八

痧脹玉衡目錄

治痧三法	八
痧前禁忌	九
痧後禁忌	九
痧脹凶症	九
痧爲百病變症	一〇
醫家當識痧筋	一〇
放痧有十	一〇
放痧須放盡	一一
痧有放刮不盡辨	一二
用藥不效	一二
用藥必效	一三
用藥大法	一四
痧有實而無虛辨	一四
怪病之謂痧	一五

痧筋不同辨	一六
寒痧辨	一七
放痧不出治法	一八
放痧數次不愈	一九
數犯痧症	二〇
痧脹昏迷與雜症不同	二〇
痧筋原於血中之毒	二一
慢痧必須速治	二二
痧症治要宜明	二二
治痧須先明百病	二三
刺腿彎痧筋法	二四
刮痧法	二五
用針說	二五
痧脹用藥不厭多	二六

痧脹玉衡 目錄

痧脹宜下辨	二六
痧後治雜症宜知	二七
當知不信之誤	二七
玉衡脈法	二七
痧脈十二經辨	二八
痧脈外感內傷辨	二八
痧脈要訣	二九
痧脈有似陰症辨	三一
痧脈似氣血有餘辨	三二
方書脈句宜參	三二
脈貴審於幾先	三四
痧脈決生死法	三四
暗痧辨	三五
傷寒兼痧	三六

卷 中

各痧證狀	
偏身腫脹痧	一
悶痧	三
落弓痧	四
噤口痧	四
角弓痧	五
撲鵝痧	五
傷風咳嗽痧	六
痘前痧脹	七
痧症類傷寒	三八
痧類瘧疾	四一
瘧疾兼痧	四二

二

痘後痧脹	八
胎前產後痧	九
胎前痧痛論	一〇
產後痧痛論	一一
倒經痧	一三
痧熱頭汗痧在	一四
痧煩痧睡	一五
老弱兼痧	一六
瘡症兼痧	一七
弱症兼痧	一八
痧變勞瘵	一九
厥脹兼痧	二〇
痧變厥脹	二一
半身不遂痧	二二

內傷兼痧……………	二三
紫疱痧……………	二四
痰喘氣急痧……………	二五
痧瘋……………	二六
痧重……………	二七
眼目痧……………	二八
瘟痧……………	二九
頭眩偏痛痧……………	三〇
流火流痰痧……………	三一
咳嗽嘔噦痧……………	三二
霍亂痧……………	三三
絞痛痧……………	三四
脇痛痧……………	三六
痧痢……………	三七

蛔結痧……………	三九
頭痛痧……………	三九
心痛痧……………	四〇
腰痛痧……………	四一
小腹痛痧……………	四二
痧塊……………	四三
痧變吐血鼻衄便紅……………	四四
吐蛔瀉蛔痧……………	四五
痧變腫毒……………	四六

卷下

玉衡備用要方……………	一
防風散痧湯……………	一
荊芥湯……………	二

陳皮厚朴湯……………	二
後朮湯……………	三
藿香湯……………	三
薄荷湯……………	三
紫蘇厚朴湯……………	四
防風勝金湯……………	四
必勝湯……………	四
紫朴湯……………	五
獨活紅花湯……………	五
射干兜苓湯……………	五
當歸枳殼湯……………	六
荊芥銀花湯……………	六
桃仁紅花湯……………	六
清涼至寶飲……………	七

痧脹玉衡 目錄

紅花湯	七
如聖散	七
寶花散	八
沉香鬱金散	八
圓紅散	八
化毒丹	九
三香散	九
三香丸	九
救苦丹	九
冰硼散	一〇
牛黃丸	一〇
細辛大黃丸	一〇
和脾宣化飲	一〇
消疳解毒散	一一

牛黃八寶丹	一一
活絡透毒飲	一二
忍冬解毒湯	一二
撥雲散	一二
賽金化毒散	一三
加味活命飲	一三
參歸化毒湯	一四
奏凱和解飲	一四
參苓歸朮散	一五
沉香丸	一五
沉香阿魏丸	一五
丁香阿魏丸	一六
阿魏丸	一六
蘇木散	一七

四

萊菔散	一七
探吐法	一八
當歸枳殼湯	一八
清氣化痰飲	一八
蒲黃飲	一八
烏藥順氣湯	一九
降香桃花散	一九
木通湯	一九
枳實大黃湯	二〇
荊芥薄荷湯	二〇
連翹薄荷飲	二〇
失笑散	二一
便用七方	二一
絕痧方	二二

藥性便覽	二二
痧方餘議	二八
評半夏藿香止吐	二九
評荊芥細辛防風獨活	三〇

卷後

痧脹看法	一
痧脹看症法	一
放痧辨	二
痧脹癰疹不同辨	二
痧脹治猶癰疹論	三
痘癰穢觸相同	三
兼痧傷寒不同辨	四
諸痛類痧辨	四

諸症不類痧辨	五
論脹	六
凝壅聚結辨	六
治痧救人脈論	八
痧筋統說	一
傷風痧脈辨	一
眩暈痧脈辨	一
辨脹舌胎論	一五
痧脹兼證及變證	一七
癰疹兼痧脹	一七
痧脹兼癰疹	一八
痧脹類癰疹	二〇
癰疹後復痧脹	二二
癰疹夾痧脹咽結	二三

傷寒黃癰兼痧	二五
痧類陰症	二七
呃逆痧	二八
盤腸痧	二九
自汗盜汗驚惶痧	三〇
痧類三瘧	三二
咽喉諸症兼痧	三二
口舌兼痧	三四
類瘋痧	三五
黃氣病兼痧	三五
翻胃噎膈痧	三六
筋骨疼痛痧	三七
鬼箭痧	三八
久瀉肉瘦痧	三九

痧脹玉衡目錄

婦人隱疾痧·····	四〇
脚氣痧·····	四〇
耳痛痧·····	四一
手臂痛痧·····	四二
腫毒夾痧辨·····	四二
刺螫瘟痧·····	四四

地葡瘟痧·····	四四
痧變發顛·····	四四
急救逆痘要法·····	四五
痢症兼痧·····	四七
麻木酸痺痧·····	四八
頭虛足腫痧·····	四九

六

黃疸痧·····	五〇
小兒夜啼痧·····	五一
驚風痰熱痧·····	五二
死症痧·····	五三
羊毛瘟痧·····	五四
痧脹破迷論·····	五四

痧脹玉衡

清 構李 志遠 右陶著述

卷上

痧症發蒙論

夫君子生於斯世。不屑爲天下無所用之人。則必求爲天下所必需之人。故君子不爲良相。則爲良醫。蓋良相濟世。良醫濟生。其所以行我心之不忍者。事有相符。而道有相類也。余於傷寒痘疹。驚風癰痢。與夫胎前產後等症。俱所潛心。姑不具贅。獨是痧之一症。緩者或可遲延。急者命懸頃刻。在病家必當誠心請救。在醫者必當急爲赴援。匪若他症之可以遷延時日。姑且慢爲調治也。邇來四方疫氣時行。卽今丑寅年間。痧因而發。鄉邨城市之中。俱見有此等症。或爲暗痧。或爲悶痧。或爲痧痛。或爲落弓痧。噤口痧。撲鵝痧。角弓痧。盤腸痧。或又因傷寒痘痢。與夫胎



前產後等症。而痧兼發。甚至闔門被禍。隣里相傳。可不重悼。余嘗遇此等症。臨危急救。難以屢指。其治之大略。有三法焉。如痧在肌膚者。刮之而愈。痧在血肉者。放之而愈。此二者皆其痧之淺焉者也。雖重亦輕。若夫痧之深而重者。脹塞腸胃。壅阻經絡。直攻乎少陰心君。非懸命於斯須。即將危於旦夕。扶之不起。呼之不應。卽欲刮之放之。而痧脹之極。已難於刮放矣。嗚呼。病隣於死。誰不傷心。痧症至此。信乎非藥不能救醒。非藥莫能回生。則刮放之外。又必用藥以濟之。然後三法兼備。救生而生全。庶乎斯人之得有其命也。其如世有刮痧放痧之人。僅有刮放之能而已。餘俱非所長也。故痧有放之不出。刮之不起。便云凶。而且放痧數次不愈。刮痧數次不痊。便聽命於天。而垂斃者。往往皆然。若夫業醫諸友。責在救人。推其心豈非當世之所謂君子與。然其間或有云。諸書不載痧名。滿洲因而謂非藥可療。不知載籍之內。原有云。絞腸痧者。有云。乾霍亂者。有云。青筋者。有云。白虎症者。有云中惡者。此皆痧之見於諸書。但略而不詳。未有專家。然不見有云。是宜絕藥。誠彰明較著而可親也。况痧有爲真頭痛。朝發夕死。夕發旦死。寄於頭痛之條。痧有爲真心痛。亦朝發夕死。夕發旦死。寄於心痛之例。此二症者。雖屬不治。若知其原

於痧者而療之。亦可挽同。况痧有爲頭面腫脹。一似大頭瘟。痧有爲咽喉鎖悶。一似急喉風。痧有爲眩暈昏悶。少頃云殂。一似中風中暑。痧有爲暗啞沉迷。身體重痛。一似驚魂落魄。此皆其勢在危急。刮放不及者。非藥將何以救之乎。而况痧有頭痛寒熱。類於傷寒。咳嗽煩悶。類於傷風。與夫因瘧而兼痧。因痧而化瘧。或又痢以痧發。痧緣痢生。而痧症百出。傳變多端。更不特如此而已也。諸如鼻紅吐紅。瀉血便血。由痧而得者有之。更有大腫大毒。流火流痰。由痧而生者有之。或又有胎前產後。氣鬱食鬱。血鬱火鬱。而痧之兼發者有之。或又有痧而手腫足腫。手痛足痛。連及偏身。不能轉側者有之。或又有痧而胸脇肚腹結成痧塊。一似痞悶。一似結胸者有之。或又有痧而吐衄瀉痢。食結積結。血結者有之。或又有痧而心痛脇痛。腹痛腰痛。盤腸。弔痛。偏身疼痛。幾不能生者有之。况痧嘗有內症所傷。將隣於死者。男子犯此。一似蓄血。而血分之治法不同。女子犯此。一似倒經。而氣分之治法亦異。蓋痧之爲病。種種不一。難以枚舉。予特指其大略。而明其最要者。須看脈之真假。認症之的確。然後投劑必當。用藥無虛。如痧在肌膚。當刮卽刮。痧在血肉。當放卽放。痧在腸胃經絡。與脾肝腎三陰。當藥卽藥。若痧氣肆行。不拘表裏。傳變