

許叔微傷寒論著三種

傷寒百證歌
傷寒發微論
傷寒九十論

重雕元刻傷寒百證歌發微論敍

新編張仲景註解傷寒百證歌五卷發微論二卷題曰白沙許叔微知可述直齋書錄解題云許叔微傷寒歌三卷凡百篇皆本仲景注又有治法八十一篇仲景脈法三十六圖翼傷寒論二卷辨類五卷皆未見

四庫提要云叔微字知可真州人紹興二年進士醫家謂之許學士不知所歷何官也案傷寒歌卽百證歌三與五蓋字之誤翼傷寒論卽發微論也叔微揚州儀徵人少孤力學于書無所不讀而尤邃于醫建炎初劇賊張遇破真州已而疾疫大作知可遍歷里門視病與藥十活八九仕至徽州杭州教官遷京秩見影宋抄本乾道庚寅張鄭序及獨醒雜志西溪叢話張呆醫說知可所著類證普濟本事方十卷宋史藝文志書錄解題文獻通考四庫全書皆著錄餘僅見于書錄解題脈法類辨久佚八十一法當卽張月霄藏書志著錄之傷寒九十論百證發微元明以來不甚顯

四庫未收阮文達張月霄亦皆未見惟錢遵王讀書敏求記著于錄遵王元棄今歸于余夫醫家之有仲景猶儒家之有孔子也醫書之有傷寒論猶儒書之有四書也宋時爲其學者有成無己之注李檉之要旨王實之證治韓祇和之微旨龐安常之總病論朱翼中之活人書錢開禮之百問歌雖皆各有所長而知可之書爲最能得其意百證歌七字韻言意該言簡發微論探微索暗妙悟通神于以歎知可之學之

深且遠。非薄技偏長執一一是之見者所可及也。明萬曆辛亥有喬山堂坊刻合爲四卷。證以元刊不但面目全非。竄改亦復不少。此明人刊板之通病。醫書尤甚者耳。余慮其誤俗醫而害人命也。重摹元刻以廣其傳。後之治醫家言者。由是以求仲景之書。庶幾免廢人之謂乎。

光緒七年歲在重光大荒落季冬之月既生霸歸安陸心源撰

新編張仲景註解傷寒發微論目錄

卷上

一 論傷寒七十二證候

二 論桂枝湯用赤白芍藥不同

三 論傷寒慎用元子藥

四 論桂枝麻黃青龍用藥三證

五 論兩感傷寒

六 論傷寒以真氣爲主

七 論治傷寒須依次第

八 論仲景緩遲沉三脈

卷下

九 論表裏虛實

十 論桂枝肉桂

十一 論滑脈

- 十二 論用大黃藥
- 十三 論陰不得有汗
- 十四 論林儻疑白虎證有差互
- 十五 論弦動陰陽二脈不同
- 十六 論中風傷寒脈
- 十七 論表證未罷未可下
- 十八 論中暑脈不同
- 十九 論傷寒須早治
- 二十 論發熱惡寒
- 廿一 論風溫證
- 廿二 論溫瘡證

新編張仲景註解傷寒發微論卷上

宋 白沙許叔微知可述

論傷寒七十二證候

循衣摸床 仲景云：傷寒吐下後不解，不大便五六日至十餘日，發潮熱，不識人。循衣摸床，微喘，直視，羸弱者生渴者死。華佗曰：病人循衣摸床，讀書者不可治。仲景云：小便利者可治。

瞪目直視 仲景云：直視搖頭，此爲心絕。又云：狂晝反目直視，腎絕也。

汗出如油 仲景云：脈浮而洪，身汗如油，喘而不休，此爲命絕也。

兩手撮空 仲景云：吐下不解，大便不利，潮熱，摸床撮空，皆宜大承氣服。後脈強者生渴者死。華佗云：陰陽俱絕，循衣摸床，空妄言者死也。

瘡症不言 痘病者如發癢之狀，瘡症不言。千金云：熱病七八日其瘡不癰不散，當瘡癰三四日，汗不出者死也。

舌卷囊縮 仲景云：厥陰受病，則舌卷，煩渴而囊縮。扁鵲云：舌卷囊縮者必死。千金云：陰陽病邪聚縮腹中，舌出數寸而死。

鼻中煤煙 宋迪陵謹訣云陰毒漸深則鼻中黑如燒煙

指甲黑青 宋迪陵謹訣云陰毒甚則指甲黑青。扁鵲云手足爪甲下肉黑者死。

目盲見鬼 雜經云脫陽者見鬼脫陰者目盲。

九竅出血 仲景云少陰病濶發汗必動血或從口鼻耳目是謂下厥上竭爲難治。

環口黧色 仲景云潔口黧色柔汗發黃此爲脾絕也。

轉筋入腹 雜亂證轉筋入腹者鵝矢白湯主之。

吃噉噉呃 仲景云寸口脈微而濶根葉枯槁而寒慄欲逆嘔嘔吐涎沫也。又云脈滑則爲喫仲景傷寒欬逆上氣其脈散者死。辨其形拍故也。

鬲肉拒痛 仲景云鬲肉拒痛胃中空虛心下因硬則爲結胸此陷胸證也。

發黃疸熱 萬全云陽明病發熱在裏必發黃凡發黃寸口无脈真氣冷皆不可治。

咽乾聲曖。狐惑溼證也。狐則咽乾或則聲曖。

瘞瘞口噤。仲景云。瘞瘞而赤目。脈亦搖頭。卒口噤。背反張者。痓病也。又風溫發火矣。如瘔瘔瘔。萬全云。傷寒痓者。由肺熱轉於腎。轉而爲痓也。

筋惕肉瞶。仲景云。脈微弱。汗出惡風。誤服大青龍湯。令人筋惕肉瞶。傷寒吐下後。心下逆滿。發汗則動經。身爲振搖。

叉手冒心。仲景云。發汗過多。其人叉手自冒心。所以然者。以重發汗虛故如此。

發斑癰疹。陽毒而赤發斑如錦交者。升麻湯。仲景云。風氣相搏。則爲癰疹。見發爲庠庠者。名泄風。

顛狂不定。雜經云。重陽者。狂。重陰者。顛。仲景云。太陽病熱膀胱。其人如狂者。候核承氣湯。小便利。其人如狂。血證諱也。

耳聾脅痛。仲景云。少陽受病。脅痛而耳聾。仲景云。持脈時。其人叉手自冒心。師因教令歎而不歎。必兩耳不聞也。所以然者。以重發汗虛故如此。

上氣喘急。太陽陽明皆有喘證。或水停心下。亦喘。陰證喘者。必喘而加急。

小腹硬滿。小腹硬滿小便不利者。膀胱有害熱也。小腹硬滿小便利者。血證也。

睡臘咯血 仲景云。脈浮熱甚而反次之必咽
臘咯血。仲景云。吐血不止柏葉湯。

上吐下利 仲景云。發熱惡寒而
嘔吐利者霍亂也。

二便不通 少陰小便不利者真武湯。
陽明大便不利者承氣湯。

振振欲擗地 仲景云。太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。
心下悸頭眩身悶動欲振振擗地者真武湯。

遺尿失溺 仲景云。洩便遺失。狂言反目直視。
晝絕也。風溫證下之則直視失溲。

揚手擗足 太陽中風以火攻。則手足躁擾。又云六
七日三部脈至大。手足躁擾者欲解也。

謔語鄭聲 仲景云。實則謔語。虛則鄭聲。鄭聲
者重語也。直視謔語而喘滿者死。

心下痞鞕 仲景云。病發於陰。
而下之早則爲痞。

心中懊憹 仲景云。心中懊
憹。橘子湯主之。

舌上滑胎 仲景云：溼家，舌上滑胎者，丹田有熱，胸中有寒。又云：藏結滯胎者不可攻也。

又云：陽明證懷胎舌上滑胎者，梔子湯。

脚聾噉齒 風寒熱證屬陽

也。承氣湯主之。

騎上下築動 發汗後，腹下悸

者，欲作奔豚。

項強几几 太陽病，項背強几几，反汗出惡寒者，桂枝湯無汗者葛根湯也。

氣上衝胸 太陽病，下之後，其氣上衝者與桂枝湯。

外氣怫鬱 二陽俱病，小發汗，面色赫赤，正赤者，陽氣怫鬱，當解之，著之，佛音拂。

腳膝聾拳 傷寒脈浮，首汗出，惡寒，腳聾急，反與桂枝湯，此誤也。

大便黑堅 陽明證，其人喜忘，必有蓄血，所以然者，本以久養血，屎須硬，大便反易，其色黑。

手足逆冷 有熱厥，有冷厥，冷厥者求得病，便四肢冷，熱厥者手足雖冷，半日復熱也。

漱水不嚥 陽明但欲漱水不嚥者必創，又達家丹田有熱，胸中有寒，渴欲得水而不能飲口燥頑也。

額上冷汗 溼家額上汗出微喘，陰證亦額上手背皆有冷汗。

煩躁發渴 太陽大汗出後大煩渴，不解宜白虎加人參湯。

肉上粟起 太陽病宜以汗解，反以冷水喫其熱，卻不得法，轉更益煩，肉上粟起。

咽喉乾痛 傷寒脈浮，咽中乾痛，而吐逆者甘草半夏湯主之。又云少陰證者必咽痛。

多眠好睡 此證大約有四少陰狐惑風濕及小柴胡證。

夜不得眠 此證大約有六具在歡中。

心下悸動 傷寒脉結代，心下悸動者，炙甘草湯主之。

腹中雷鳴 仲景云：寒氣相搏，則爲雷鳴。心下痞硬，腹中雷鳴，下有水氣。腹中雷鳴者，生惡露心渴證。

下利濱垢 寒則鳴潛。

熱則垢氣。

潮熱不常

仲景云。潮熱者實也。大抵潮熱有三證。具在厥中。

寒熱往來

此證有三。一者中風證。小柴胡湯。二者熱入血室證。刺期門。三者狀如癲癇。或驚渴證。

身體腫滿 風溼證。鳥微腫。

者甘草附子湯。

鬱冒不仁

仲景云。寒則爲厥。鬱冒不仁。

額上脈陷

頭家不可發汗。發汗則額上脈陷。脈緊急。直視不得眞。不得眠。胸。胡綱切目瘡也。

身重難轉

風溼有搏。桂枝加白朮湯。三陽合病。白虎加人參柴胡加牡蠣龍骨湯。

鼻中衄血

陽明病。口爛。但欲漱水不咽者必衄。○頭家不可發汗。宜小乾地黃湯。

手背冷汗

宋迪云。額上手背有冷汗者。陰毒也。

下利腹血

仲景云少陰下利便
臘血者桃花湯主之

吐逆不止

吐有冷熱二證有胃
熱吐者有胃冷吐者

面垢背寒

中暑則面垢
晝晝寒

腹脹滿悶

發汗後腹脹滿者厚朴五物湯下後心煩脹滿臥起
不安者梔子厚朴湯又云不轉失氣而下之必腹滿

咳嗽涎盛

或上焦有熱或
水停心下皆歟

頭疼惡心

頭疼惡心身不疼痛者食
穉也易疼痛者傷寒也

乾噫食臭

胃中不利心下痞硬乾噫食臭身下有
水氣者生薑瀉心湯無水者食穉也

身痒如蟲行

陽明病當汗而反无汗其身如
蟲行皮中之狀爲其久虛故也

鼻鳴乾嘔

太陽中風證鼻鳴乾嘔者葛根湯主之太
陽陽明合病鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

酒漸憎寒

仲景云。陰氣上入陽中則酒漸惡寒也。

腰脊疼痛

仲景云。一二日太陽受病則頭項痛。腰脊強。

腹脅時痛

仲景云。傷寒五六日。中風或腹中痛。或脅下痞硬者。小柴胡證。又腹中痛。小建中湯。脅下痛。十棗湯。

渾身壯熱

仲景云。陽明受病。則身熱目痛鼻乾。不得臥。又太陽中風與傷寒皆發熱。

以上七十二證。或必死。或可治。淺深雖不同。要之對證用藥。斯過半矣。

論桂枝湯用赤白芍藥不同

仲景桂枝湯加減法。凡十有九證。但云芍藥。聖惠方皆用赤芍藥。孫尚方皆用白芍藥。聖惠乃太宗朝命王懷德等編集。孫兆爲累朝醫師。不應如此背戾。然赤白補瀉極有利害。常見仲景桂枝第四十七證云。病發熱汗出。此爲榮弱衛強。故使汗出。欲救邪風。宜桂枝湯。蓋風傷衛而邪乘之。則衛強榮雖不受邪。終非適平也。故衛強則榮弱。仲景以桂枝發其邪。以芍藥助其弱。故知用白芍藥也。榮既弱而不受病。乃以赤芍藥瀉之。決非仲景意。至於小建中爲尺過血弱而設也。舉此皆用白芍藥。而仲景亦止稱芍藥。可以類推矣。

論傷寒慎用圓子藥

仲景論中百一十三方爲圓者有五。理中陷胸抵當麻仁烏梅是已。理中陷胸抵當皆大彈圓。煮化而服之與湯無異。至於麻仁治脾約證。烏梅治溼暎證。皆欲必達下部。故用小圓。其它皆欲入經絡逐邪毒。破堅癧導瘀血。操屎之類。須憑湯劑以滌除也。余見俗醫用小圓藥巴豆以下邪毒而殺人者不可勝數。蓋巴豆止導食積而不能去熱毒。既下之後。藏氣虛而邪毒宛然猶在。更再以大黃朴消下之。鮮不致薨。大抵下藥欲其必中。必當一服而止也。故不可不慎歟。

論桂枝麻黃青龍用藥三證

仲景論表證一則桂枝二則麻黃三則青龍。桂枝治中風。麻黃治傷寒。青龍治中風見寒脈。傷寒見風脈。此三者人皆能言之。而不知用藥對病之妙處。故今之醫者不敢用仲景方。無足怪也。且脈浮而緩者中風也。故嗚齒惡寒。浙浙惡風。翕翕發熱。仲景以麻黃對之。至於中風脈浮緊。傷寒脈浮緩。仲景皆以青龍對之。何也。予嘗深究三者。審於證候。脈息相對。用之無不應手而愈。何以言之。風傷衛。衛氣也。寒傷榮。榮血也。榮行脈中。衛行脈外。風傷衛。則風邪干陽氣。陽氣不固。發越而爲汗。是以自汗而表虛。故仲景用桂枝以發其邪。用芍藥以助其血。蓋中風則病在脈之外。其病稍輕。雖同曰發汗。特解肌之藥耳。故桂枝證云。令遍身熱。熱微似有汗者益佳。不可令如水流離。病必不除。是知中風不可大發其汗。大發其汗。則反勸榮血。邪乘

虛而居其中故不除也。寒傷榮則寒邪干陰血而榮行脈中者也。寒邪居脈中則非特榮受病也。邪自內作則并與衛氣犯之久則浸淫反骨是以汗不出而煩冤。仲景以麻黃大發其汗又以桂枝辛甘而其發散欲捐其內外之邪。榮衛之病故爾。大抵二藥皆發汗而桂枝則發其衛之邪。麻黃并與榮衛而治之。固有淺深也。何以驗之。仲景桂枝第十九證云。病嘗自汗出者以爲榮氣和。榮氣和者外不譖以衛氣不共榮氣譖和故耳。榮行脈中衛行脈外復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。又第四十七證云。發熱汗出者此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風宜桂枝湯。是知中風汗出者榮和而衛不和也。又第一卷云。寸口脈浮而緊浮則爲風。緊則爲寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼當發其汗。是知傷寒浮緊者榮衛俱病也。麻黃湯中并桂枝而用此仲景之意歟。至於青龍雖治傷寒見風脈傷風見寒脈然仲景云汗出惡風者服之則筋惕肉瞶故青龍一證尤難用必須形證諦當然後可行。王實止以桂枝麻黃各半湯代之蓋慎之者也。

論兩感傷寒

仲景論兩感寒云。凡傷於寒熱雖甚不死若兩感於寒而病者必死文云兩感病俱作治有先後。發表攻裏本自不同既云必死又云治有先後何也。大抵此病表裏雙傳臟府俱受得此者十不全一故云必死然仲景豈以己見而重譏後人哉故有發表攻裏之說以勉後世恐萬世之下一遇大聖而得之者不欲絕望於後人也。則仲景仁心可知矣。

論傷寒以真氣爲主

傷寒不問陰證陽證。陰毒陽毒。要之真氣完壯者易醫。真氣虛損者難治。蓋云傷寒多死下虛人。誠哉是言也。蓋病人元氣不固。真陽不完。受病纔重。便有必死之道。何也。陽病宜下。真氣弱則下之多脫。陰病宜溫。真氣弱則客熱便生。故醫者難於用藥。非病不可治也。主本無力也。素問稱岐伯云。陽勝則身熱腠理閉。喘麤爲之俛仰。汗不出而熱齒乾以煩冤。腹滿死能耐。能音冬不能夏。陰勝則身寒汗出身常清。數慄而寒寒則厥厥則腹滿死。能夏不能冬。黃帝曰。調此二者柰何。岐伯曰。能知七損八益則二者可調。蓋陽勝而汗不出者傷寒也。陰勝身寒而汗出者中風也。二者須知七損八益而已。蓋女子二七天癸至。至七七止。男子二八精氣溢。至八八而止。婦人月事以時下。故七欲損。男子精欲滿而不竭。故八欲溢。如此則男子女人身常無病也。自身無病。真氣完固。雖有寒邪。易於用藥。故曰二者可調。是知傷寒以真氣爲主。

論治傷寒須依次第

仲景論中雖云不避晨夜。卽宜便治。醫者亦須顧其表裏。待其時日。若不循次第。雖暫時得安。損虧五臟。以促壽期。何足尚也。昔范雲爲梁武帝屬官。得時疫熱疾。召徐文伯診視。是時武帝有九錫之命。期在旦夕。雲欲預盛禮。謂文伯曰。可便得愈乎。文伯曰。便瘥甚易。政恐二年外不復起爾。雲曰。朝聞道夕死可矣。况二年乎。文伯於是先以火煅地布桃柏葉布席。置雲其上。頃刻汗出。以溫粉裹之。翌日遂愈。雲甚喜。文伯曰。不足喜。後二年果卒。夫取汗先期。尙促壽限。况不顧表裏。不待時日。便欲速愈者耶。今病家不耐病。