

漢方簡義

王邈达著



L
R2


版社

1016.042
121
17:

王邈达著

漢方簡義

上海衛生出版社



0062586

內容提要

本書內容，以簡單扼要之辭，釋明張仲景一百一十三方之精意；分析其藥物之作用及方劑之配合與應用，並且對用藥之加減與份量之輕重，具有一定之規範；同時闡明一方可治數病，數病同用一方之理。書末又根據白雲閣本增入補遺三方，尤為他書所罕見。讀者見病即可處方，見方即知應用。本書可供研究中國醫學及臨床醫療工作者參考。

2588/26

漢方簡义

王邁達著

上海衛生出版社出版

(上海市淮海中路 1670 弄 11 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 080 号

新光明記印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

*

开本 850×1168 紙 1/32 印張 4 字數 70,000

(原新医廠印 6,000 册)

1956 年 11 月新 1 版 1956 年 11 月第 1 次印刷

印數 1~9,500

統一書號 14120·48

定價 (10) 0.65 元

漢方簡義序

予讀素問。謂古之治病者。唯移精變氣可祝由而已。此猶佛氏之觀想持咒。無假於藥石。今所謂精神治療者也。又覽異法方宜論。謂東方之民治宜砭石。西方之民治宜毒藥。北方之民治宜灸焫。南方之民治宜九鍼。中央之民治宜導引接蹠。是五方之民俗異。其受病亦異。治之亦各有宜。乃近於今之所謂地方病者。大抵陵澤水土風氣既殊。人之居處飲食嗜欲亦別。故疢疾所生。既有方域時代之不同。而湯液醪醴之法。古今之變。亦多而難究。以時人之言概之。則祝由專爲精神作用。導引接蹠屬於生理作用。鍼砭灸焫屬於物理作用。而湯液醪醴。則爲化學作用。凡其術足以愈病者。皆可任之。不必獨重經方也。漢志。經方十一家書。皆亡佚。隋志。始錄張仲景方十五卷。張仲景療婦人方二卷。初無傷寒金匱之目。世傳王叔和。孫思邈。王嘉林。億之所校錄。慮皆後人綴輯而成。然中土良工。必以仲景爲不祧之祖。則以古法存焉耳。自千金外臺出。病益繁。方益雜。爾後南宋局方。及金元四家以降。人自爲說。其流益紛。學者莫知所擇。故醫家之好古者。必原素問。宗仲景。以其精約。爲不可勝用也。吾友王君邈。達精於醫。標仲景爲漢學。退孫思邈爲唐學。六十以後。本其治病經驗之所得。取仲景方。各爲疏釋。命曰漢方簡義。以示予。予其爲我序之。予雖好方伎。而實未暇博涉。平日於柯韻伯。尤在涇鄒潤安之書。皆未能究心。老而忘事。所收醫書。亦經亂亡失。王君書。留置几案。間經月。而未能畢讀。然信王君之篤嗜仲景。其言必不苟且。不爲枝蔓之辭。題曰簡義。其不違精約之旨。可知也。王君更能揭槧漢方。發揮古義。此其志尤足多者。予謂世

漢方簡義 馬序

間病苦之本。不在形體。乃在五志六情。是非湯液醪醴之所能療。非返之恬淡。不能禦賊邪。方且就王君進而求之。無方之書。然應病與藥。十全爲上。不可失。一微工君。固不足以與此。醫本仁術。非仁人不能任。王君拯人疾苦。夙具深心。其爲術。將有大於此者。然則此書。特其嚆矢焉耳。丙戌十一月馬湛翁。

漢方簡義自序

漢方者。漢醫聖張仲景先師所立之方也。方以漢稱。所以別中外分時代也。簡義者。以簡單之辭。簡要之旨。釋明醫聖立方之精意。故名漢方簡義。嗟乎。儒家僅知孔聖而不識孔子之修己教人。醫家僅知醫聖而不明仲景之立方活人。良可嘆矣。去夏著仰觀俯察與地理辨正揭隱成得仲弟曉籟自香島來書。以余研究醫方已五十餘年。不可無著述。以啟後學。此所以有漢方簡義之作也。書成。即以釋此書之命名。與著此書之起意。以爲序。公元一千九百四十二年壬午春王邈達序於時中精舍。

漢方簡義凡例

漢方簡義凡例

一、是書既名漢方簡義。故先列方而後序病。至說義理處。則先釋病。而後釋方者。本仲聖因病立方之旨。以杜後世議方不議病之流弊。

一、是書之釋病。本高漢峙先生所著之傷寒尙論辨似。以爲言。故立方之先後。亦依尙論篇爲次序。間有先後未妥者。僅於該條下辨明之。

一、是書之釋方。本鄒潤菴先生所著之本經疏證。以立說。故於一百十三方。所用藥品之性味。及主治大略。先立一表。以便與本經相印證。

一、是書耑取高鄒二先賢之言。以釋病釋方者。因自來註解傷寒論。與本草經者。不下數百家。惟二先賢之言。最爲詳晰純正。非有所阿好也。幸勿以鮮見寡聞。與剽竊陳言。見哂。

一、是書更附各方症治於後者。以明一方可治數病。與數病同用一方。均有不易之理。在以便後學見方。即可識病。見病即可處方之微意。勿以繁複視之。

傷寒論一百十三方所用藥品性味及主治大略表

以各方先
後爲次序

下列藥物。共八十有八品。爲傷寒論一百十三方中。所應用者也。因醫者欲明處方之理。法須先明藥

物之性味、及主治。然後對於各藥之所以配合成方、與處方之所以能治各病者。始得一一相應合。而無錯誤。故先立此表。冠於一百十三方之首。以便閱者之稽核云。

著者識

桂枝 性溫。味辛。無毒。主通陽而疏衛。

芍藥 性平。微寒。味苦。酸。有小毒。主破陰而和營。

甘草 性平。味甘。無毒。主寒熱邪氣。解百藥毒。

大棗 性平。味甘。無毒。主安中養脾。補中益氣。和百藥。

豬苓 性微溫。味辛。無毒。主頭痛鼻塞。欬逆上氣。止嘔吐。能解表。

澤蘭 性平。味甘。無毒。主風寒濕痺。消水。養五臟。益氣力。

茯苓 性平。味甘。無毒。主胸腹逆氣。利小便。止消渴。

苓 性平。味甘。無毒。主風寒濕痺。消食化痰。

桂 滌 等。性溫。味辛。無毒。主養精神。和顏色。爲諸藥先驅。今稱肉桂。

朮 性溫。味苦。甘。無毒。主風寒濕痺。除痰。消食化痰。

附子 性溫。大熱。味辛。甘。有大毒。主治風寒欬逆。破癥堅積。聚溫中。

人參 性微寒。微溫。味甘。無毒。主補五臟。安精神。定魂魄。除邪氣。

乾薑 性溫。大熱。味辛。無毒。主欬逆上氣。溫中。止血。腸澼下痢。能守中。

漢方簡義

葛根	性平。味甘。無毒。主消渴大熱。開腠理。生根汁。大寒。療壯熱。
黃芩	性平。味苦。無毒。主諸熱。黃疸。腸澼。療皮熱。小腹絞痛。
黃連	性寒。味苦。無毒。主熱氣目痛。腸澼。調胃厚腸。婦人陰腫痛。
黃柏	性溫。味苦。大溫。無毒。主風寒頭痛。寒熱。消瘀下氣。止嘔。止痢。
杏仁	性溫。味苦。甘。有毒。主欬逆上氣。喉癰。頭痛。解肌。
桃仁	性平。味苦。甘。無毒。主瘀血。欬逆上氣。消癥瘕。通月水。止痛。
芒硝	性大寒。味辛。苦。無毒。主五臟積聚。破留血。通經脈。利二便。
黃芩	性寒。味苦。大寒。無毒。主下瘀血。破癥瘕。積聚。調中化食。
水蛭	性平。微寒。味苦。鹹。有毒。主逐瘀血。破血癥。積聚。利水道。
蟲蠶	性大寒。味辛。苦。無毒。主逐瘀血。破積聚。堅癆。利血脈。九竅。
芫花	性微寒。味苦。有毒。主逐瘀血。破積聚。利水道。
甘遂	性溫。味辛。苦。有小毒。主欬逆上氣。咽腫。消胸中痰水。
大戟	性寒。味苦。甘。大寒。有毒。主大腹瀉。瘕宿食。利水道。
蕷藴	性寒。味辛。苦。大寒。無毒。主十二水。腹滿。急痛。皮膚腫痛。
黃麻	性溫。味苦。無毒。主中風傷寒。發表去熱。出汗。止欬逆上氣。

膠 鉛 性微溫。味甘。無毒。主補虛乏。止欬去血。如蜜而稀者。名鉛。

乾者、名鈣。抽白而堅、名糖。

禹餘糧 性寒。味甘。無毒。主欬逆。寒熱煩滿。血閉癥瘕。小腹痛。

五味子 性溫。味酸。無毒。主養氣。欬逆上氣。強陰。益男子精。

石 膏 性微寒。味辛。甘大寒。無毒。主中風寒熱。口乾舌焦。腹痛。

半 夏 性平。味辛。有毒。主寒熱。下氣咽喉痛。欬逆。消痰。生微寒。

赤石脂 性大溫。味甘酸。無毒。主養心氣。療腹痛。洩澼。下痢。赤白。小便利。

柴 胡 性平。微寒。味苦。無毒。主心腹。去腸胃結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。

枳 實 性寒。味苦。酸。無毒。主大風在皮膚。苦痒。除寒熱。結止痢。

旋覆花 性溫。味鹹。甘。有小毒。主結氣。脅下滿。驚悸。除水。去五臟間寒熱。

代赭石 性寒。味苦。甘。無毒。主賊風。腹痛。邪氣。除五臟血脈中熱。止赤沃。

括囊實 性寒。味苦。無毒。主胸渾。悅澤人面。除結痛。溼阻。逆捨。

龍 骨 性平。微寒。味甘。無毒。主欬逆。泄利。膿血。養精神。定魂魄。安五臟。

牡 蟻 性平。微寒。味鹹。無毒。主傷寒。寒熱。營衛虛熱。止汗。止渴。固帶。

鉛 丹 性微寒。味辛。有毒。主吐逆。反胃。驚癲癇疾。除熱。下氣。止小便利。

生 地 性寒。味甘苦。無毒。主傷中。逐血。溼除寒熱。積聚。補內傷不足。

漢方簡義

- 阿膠 性平。微溫。味甘。無毒。主心腹內崩。腰腹痛。女子下血。安胎。
- 麥冬 性平。微寒。味甘。無毒。主心腹結氣。傷飽。胃絡血絕。定肺氣。
- 麻子仁 性平。味甘。無毒。主補中益氣。中風汗出。利小便。復血脈。
- 酒 酒性大熱。味苦。甘辛。有毒。主行藥勢。殺百邪惡毒氣。
- 梔子 性寒。味苦。大寒。無毒。主五內邪氣。胃中熱氣。心胸大小腸大熱。
- 香豉 性寒。味苦。無毒。主傷寒頭痛。寒熱。煩躁。滿悶。喘吸。
- 赤小豆 性平。味甘酸。無毒。主下水腫。止洩痢。利小便。下腹脹滿。
- 連翹 軺連翹根。性平。味苦。無毒。主寒熱。鼠瘻。瘰癧。癰腫。惡瘡。結熱。
- 梓白皮 性寒。味苦。無毒。主熱去三蟲。
- 茵陳蒿 性平。微寒。味苦。無毒。主風濕寒熱。邪氣。熱結黃疸。
- 柏皮 性燥。氣寒。味苦。無毒。主五臟腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止洩。
- 蜀漆 性平。微溫。味苦。無毒。主瘧及欬逆。寒熱。腹中癰瘕痞結。
- 細辛 性溫。味辛。無毒。主欬逆。頭痛。風濕痺痛。能提出依附津液之風寒。
- 蕘花 性寒。味苦。有毒。主傷寒溫瘞。去十二水。療瘻飲欬嗽。
- 知母 性寒。味苦。無毒。主消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。

穎米 性平。味甘苦。無毒。主益氣。止煩。止洩。

吳茱萸

性溫。味辛。大熱。有小毒。主溫中下氣。止痛。去痰冷逆氣。

滑石

性寒。味甘。大寒。無毒。主身熱。澆澼。利小便。蕩腸胃中積聚。乳難。

蜜

性平。味甘。無毒。主心腹邪氣。止痛。解毒。養脾。除煩。和百藥。

豬胆汁

性寒。味苦。無毒。主傷寒。熱渴。解斑貓。羌青。毒。滑潤大腸。

括蔞根

性寒。味苦。無毒。主消渴。身熱。補中安虛。絕續傷。

瓜蒂

性寒。味苦。有毒。主大水。欬逆上氣。及食諸果。皆吐下之。

葱白

性平。味辛。無毒。主傷寒。寒熱能出汗。

人尿

性寒。味鹹。療寒熱頭痛。溫氣。童男者尤良。能通水道。止吐血。

桔梗

性微溫。味辛苦。有小毒。主胸脅痛。如刀刺。腹滿腸鳴。療咽喉痛。

鷄子黃

性微溫。氣厚。味鹹。有涵淹孕育。及安定神魂之功。

豬膚

性寒。滋潤。能治上焦虛浮之火。且有滋腎清胃之功。即豬肉之皮。外垢及肉脂。

白粉

性微寒。味甘。微苦。無毒。主益津。除腸胃中痼熱。即括蔞根、磨粉。

苦酒

性溫。味酸。無毒。主癰腫。散水氣。殺邪毒。能軟堅。即米醋。

鷄子白

性微寒。有解散浮陽之效。

漢方簡義

薤白性溫而滑。味辛苦。無毒。主開胸痞。洩痢下重。

烏梅性平。味酸。無毒。主下氣。除熱滿。安心。止肢體痛。偏枯不仁。死肌。

蜀椒性溫。味辛。大熱。有毒。主邪氣。效逆。溫中。能降胃升脾。

當歸性溫。甘辛。大溫。無毒。主效逆上氣。溫中止痛。止客血。肉塞。

黃蘗性寒。味苦。無毒。主五臟腸胃中結熱。黃疸。腸痔。止洩利。

通草性平。味辛甘。無毒。主去惡蟲。除脾胃寒熱。通利九竅。

升麻性平。味甘苦。微寒。無毒。主解百毒。中惡腹痛。頭痛寒熱。風腫。

葛根性平。味甘。無毒。主中風。暴熱。跌筋結肉。諸不足。卽女萎。

天冬性平。味苦。甘大寒。無毒。主諸暴風癥。強骨髓。

白頭翁性溫。味苦。無毒。主溫瘡。狂易。寒熱癰癧。積聚逐血。止痛。

秦皮性微寒。味苦。無毒。主風寒濕。除熱。男子少精。婦人帶下。

商陸性平。味辛酸。有毒。主水腫疝瘕。療腸中邪氣。

海藻性寒。味苦鹹。無毒。主癰瘤。氣破散。結氣。下十二水腫。

竹葉性平。味苦。大寒。無毒。主欬逆上氣。除煩熱。風瘡。喉瘡。嘔吐。

燒視主陽陰易病。女病易男。用女子視。男病易女。卽須男子視也。

漢方簡義目錄

馬序自序凡例

藥品性味及主治大略表

太陽上篇共十六方 桂枝湯 五苓散 真武湯 桂枝加附子湯 桂枝加桂湯更加桂方 桂枝人參湯

葛根黃芩黃連湯 桂枝去芍藥湯 桂枝去芍藥加附子湯 桂枝加厚朴杏仁湯 桃仁承氣湯

抵當湯 調胃承氣湯 十棗湯 大陷胸湯 大陷胸丸 ······ 一一七

太陽中篇共三十七方 麻黃湯 小建中湯 茯苓甘草湯 禹餘糧丸 芍藥甘草附子湯 新加湯 麻黃

杏仁甘草石膏湯 桂枝甘草湯 茯苓桂枝甘草大棗湯 厚朴生薑甘草半夏人參湯 生薑瀉心湯

甘草瀉心湯 大黃黃連瀉心湯 附子瀉心湯 半夏瀉心湯 赤石脂禹餘糧湯 大柴胡湯 旋覆

代赭湯 小陷胸湯 柴胡桂枝湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 炙甘草湯 四逆湯 桔子厚朴湯 桔子

乾薑湯 桔子豉湯 桔子甘草豉湯 桔子生薑豉湯 乾薑附子湯 茯苓桂枝白朮甘草湯 抵當

丸 桂枝附子湯 桂枝附子湯去桂枝加白朮湯 甘草附子湯 麻黃連翹赤小草湯 茵陳蒿湯

梔子柏皮湯 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ 一八一四九

太陽下篇共十五方 大青龍湯 真武湯 桂麻各半湯 桂枝二越婢一湯 桂枝二麻黃一湯 桂枝湯

去桂加茯苓白朮湯 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 桂枝甘草龍骨牡蠣湯 牡草乾薑湯

芍藥甘草湯 茯苓四逆湯 黃連湯 小青龍湯 白虎加人參湯 白虎湯 ······ ······ ······ ······ 五〇一六二

漢方簡義 目錄

陽明上篇共四方	小承氣湯	調胃承氣湯	吳茱萸湯	猪苓湯	六四一六八
陽明中篇共四方	蜜煎導方	豬膽導方	大承氣湯	麻仁丸	六九一七二
陽明下篇無正方					七三一七四
少陽全篇共八方	小柴胡湯	柴胡桂枝乾薑湯	桂枝加葛根湯	葛根湯	
黃芩加半夏生薑湯	瓜蒂散			葛根加半夏湯	黃芩湯
太陰全篇共二方	桂枝加芍藥湯	桂枝加大黃湯			八一—八三
少陰前篇共六方灸穴考三	麻黃附子細辛湯	附子湯	麻黃附子甘草湯	吳茱萸湯	
少陰後篇共八方	黃連阿膠湯	桃花湯	猪膚湯	甘草湯	八四一九一
傷寒過經不解共四方三方繹已上見	柴胡加芒硝湯		桔梗湯	半夏散及湯	
參湯	白頭翁湯			苦酒湯	四逆散
厥陰全篇共六方	烏梅圓	當歸四逆湯	當歸四逆加吳茱萸生薑湯	麻黃升麻湯	九二—九七
傷後勞復陰陽易病共六方	枳實梔子豉湯	牡蠣澤瀉散	理中圓	竹葉石膏湯	燒根散
差後勞復陰陽易病共六方					一〇四一—〇五
漢方補遺共三方					九八—一〇三
漢方用藥分量舉一以例其餘					一〇六一一〇

漢方簡義

古列王邈達鑄

傷寒論太陽上篇

共十六方

桂枝

湯

桂枝三兩 茯苓三兩 甘草一兩 生薑三兩切 大棗十二枚劈

右五味。啜咀水七升。微火。煮取二升。去渣。適寒溫。服一升。服已。須臾。啜熱粥一升。餘以助藥力。溫覆。令一時許。遍身。蟄蟄。微如有汗者佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出。病差。停後服不必盡劑。若不汗。仍服。依前法。又不汗。後服小促。役其間半日許。令三服盡。若重者。一晝一夜服。周時觀之。服一劑。盡。病症猶在者。更作服。乃服至二三劑。禁生冷。黏滑肉麵。五辛酒酪。臭惡等物。

此湯爲太陽中風。陽浮陰弱。陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出。嗇嗇惡寒。淅浙惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾脣者之主方。太陽經名。爲手足六經之一。主人身之營衛。營者。有經營於內。衛者。有護衛於外之義。卽氣血之精粹而爲作用者也。其隧道從目內眞精明穴。上頭。歷項後。由夾脊而行足外廉之後側。故病則見頭痛。項強。脊累。腰疼。而腿痠。其轄周身之表。故外皮發寒熱。因內連肌肉。且易動陽明之壯熱也。其署爲胸次。故表邪上入。則



胸煩喘渴而結胸。胸下卽與胃相逼。故邪少少下引。則嘔。大熱逼之。且能移熱於胃。與大小腸也。胸之兩旁。下通於脇。故於陽明之經府兩壯者。又能跳傳於少陽也。其府爲膀胱。故熱邪下入。則小便赤而不利。膀胱與腎爲表裏。故熱邪又能從府而入腎藏也。太陽病。卽本論本篇所云太陽之爲病。脈浮頭項強痛而惡寒。第曰太陽之爲病。尙未分風。因與寒。因是太陽病之提綱也。太陽中風。卽本篇所云太陽病發熱。汗出。惡風。脈浮緩者。名爲中風。太陽病。該上文脈浮頭項強痛而惡寒。言若前症具。而發熱汗出。惡風。脈浮且緩。始得名爲中風。陽浮陰弱。卽浮候。與寸部之陽脈浮沈候。與尺部之陰脈弱也。陽浮發熱。陰弱自汗。由診脈以言病也。惡寒惡風。發熱。鼻鳴。乾嘔。從見症以言病也。此湯主之者。卽見此病。以此湯爲主治也。方用桂枝之辛溫。疏衛而通陽。芍藥之酸寒。和營而破陰。因桂爲血分陽藥。主走表。芍爲血分陰藥。主走裏。今以二物平配。則桂得芍。而不任性走表。芍得桂。而不任性走裏。適於不表不裏。而行於營衛。然後用生薑之辛溫以散之。甘草之甘平以和之。更用大棗之甘平以滋之。卽頭頭是道矣。服後須臾。微以助甘。熱以助辛。故曰。助藥力也。又溫覆令一時許。遍身熱。微似有汗。不可令如水流滴。因太陽中風邪在肌表。而此湯本爲解肌而設。恐過汗虛中。譬如被盜之家。家人躊躇奪門而出。則賊反逗遛於主人出奔之空處矣。故曰病必不除。其下數條云。若其人脈浮緊。發熱汗不出者。不可與也。嘗須識此。勿令誤也。因脈緊。汗不出。爲傷寒。非中風。故勿令誤。吐家。酒家。血家。瘡家。俱不可與者。因吐家。酒家。惡甘辛。以動陽。血家。瘡家。本陰虛而血熱。以其甘辛助陽。卽能耗陰。故也。一服病差。停後服。如不汗。後服小促役其間。又不差。可更服。至二三劑。因服藥以。