

左季雲編

傷寒論類方彙參

样本庫


傷寒論類方彙參

左季雲編

人民衛生出版社

一九五七年·北京

07542



內容簡介

此書是作者根據張仲景所著傷寒論所列的113方(原缺一方)的類別加以整理而成。

全書分桂枝湯類、麻黃湯類、葛根湯類、梔子豉湯類、承氣湯類、瀉心湯類、白虎湯類、五苓散類、四逆湯類、理中湯類及雜方類等十二章，將有關加減各方附入各大類下。

每一處方下大多分別詳列本方的適應證、禁忌證、藥物作用、湯藥服法、藥後反應、預後等，並將有關近似處方，詳述其鑑別方法。

此書除可供中西医在臨牀上作為一般的“辨證論治”的參考外，又因本書作者以處方為主，進行研究傷寒論，亦屬整理和學習祖國醫學方法之一，故亦可作為學習參考資料。

傷寒論類方彙參

開本：850×1168/32 印張：13 7/8 振頁：4 字數：303千字

左季雲 編

人民衛生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區矮子胡同三十六號。

人民衛生出版社印制·新華書店發行
長春印刷厂

統一書號：14048·1086
定 價：(9) 2.40 元

1957年4月第1版—第1次印刷
(長春版) 印數：1—8,500

序

夫傷寒者，外感之總名也。而傷寒論者，又總論外感之成書也。故仲景傷寒論，實爲中醫治病群方之祖；論中三百九十七法，一百一十三方，神明變化，包舉概括。不僅用治傷寒由來已久，明乎此則六淫之病無不通貫矣。蓋傷寒論專論六氣之邪，而後人誤爲專論傷寒，無惑乎恒多窒塞不通。自漢唐以迄清末，如王叔和、孫思邈、成無己諸先輩著作，於傷寒論多所發明，皆仲景功臣也。然讀是書者，非苦辭旨古奧，即醫統系混淆。加以是丹非素，莫衷一是，割截剪裁，愈改愈晦。至有終身誦其書而不能了然於心者，遂使至要之心傳不能軒露人寰，詎非憾事。季雲肆力醫學，念年於茲，竊以爲中醫之精神意義，出奇製勝，誠有不可思議者。特其著書方式，條理不清，不免貽人口實耳。丁此中西醫學互相角逐之秋，但能於傷寒精義，顯揭披露，明其當然與夫所以然之故，自足有補於世，有功於仲景，固不必沾沾以著述爲能也。徐洄溪云：「方之治病有定，病之變遷無定。」知其病之千變萬化，而應用不爽，庶能窮流溯源，病無遁情矣。後學津梁其在斯乎！其在斯乎！用是採科學之體例，述仲景之心法，宗洄溪之方式，以方名編次，不類經而類方。且繁徵博引，爲見證施治之準繩，必不拘於一經二經，單傳雙傳，自與仲景之意無不符合。蓋法者，方也。必有法乃可云方。案者，斷也。必能斷方可云案。若非步武前哲，安能有此學術。是故專讀仲景書不讀後賢書不可；僅讀後賢書不讀仲景書亦不可。何則？尙時方者，類少實學。而潛心古訓者，又類多不合時宜。必二者兼而能之，乃克有濟。茲編以仲

景成法、時寶諸案、名醫傑作、準古酌今彙合一編，參以新式標題名目，俾對證而求方，因方而援案，因案而知所取捨，先聖後寶，如晤一室。二千年來大法微言，昭如日月。豈非至簡至便，至顯至明之法乎？區區之心，竊慕乎此，此傷寒論類方法案彙參之所由作也。計自纂集成帙，時閱廿載，稿凡五易，始畢乃事。後之學者，開卷豁然，不至如霧裡看山，難得真相。儻所謂梓匠與人以規矩者非耶。誠能以所引諸書，廣爲搜索，再事增益，俾醫學緝熙於光明則大幸矣。

公元一九二七年在疆圉單闢春正月中浣四川江北洛磧左季雲序

2J646B3

目 錄

第一章 桂枝湯類	第十四節 桂枝去桂加茯苓白朮湯
第一節 桂枝湯	第十五節 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯
第二節 桂枝加附子湯	第十六節 桂枝甘草龍骨牡蠣湯
第三節 桂枝加桂湯	第十七節 桂枝加葛根湯
第四節 桂枝去芍藥湯	第十八節 桂枝加芍藥湯
第五節 桂枝去芍藥加附子湯	第十九節 桂枝加大黃湯
第六節 桂枝加厚模杏仁湯	
第七節 小建中湯	
第八節 桂枝加芍藥生薑人參新加湯	
第九節 桂枝甘草湯	
第十節 茯苓桂枝甘草大棗湯	
第十一節 桂枝麻黃各半湯	
第十二節 桂枝二麻黃一湯	
第十三節 桂枝二越婢一湯	
第三章 葛根湯類	

第一節 葛根湯	一	第六節 梔子柏皮湯	三
第二節 葛根黃芩黃連湯	三	第七節 枳實梔子湯	四
第三節 葛根加半夏湯	六		
第四章 柴胡湯類		第六章 承氣湯類	
第一節 小柴胡湯	100	第一節 大承氣湯	一至
第二節 大柴胡湯	116	第二節 小承氣湯	六
第三節 柴胡加桂枝湯	117	第三節 調胃承氣湯	七
第四節 柴胡加龍骨牡蠣湯	119	第四節 桃仁承氣湯	九
第五節 柴胡桂枝乾薑湯	119	第五節 抵當湯	九
第六節 柴胡加芒硝湯	120	第六節 抵當丸	十四
第五章 梔子湯類		第七節 十棗湯	十六
第一節 梔子豉湯	三	第八節 大陷胸湯	十九
第二節 梔子甘草豉湯	三	第九節 大陷胸丸	十九
第三節 梔子生薑豉湯	四	第十節 小陷胸湯	十九
第四節 梔子乾薑湯	四	第十一節 三物白散	二十
第五節 梔子厚樸枳實湯	四	第十二節 麻仁丸	二十八
第七章 瀉心湯類			

第一節 生薑瀉心湯	111	第二節 猪苓湯	五
第二節 甘草瀉心湯	115	第三節 文蛤散	160
第三節 半夏瀉心湯	119	第四節 茯苓甘草湯	173
第四節 大黃黃連瀉心湯	131		
第五節 附子瀉心湯	134		
第六節 黃連湯	138		
第七節 黃芩湯	139		
第八節 乾薑黃連黃芩人參湯	140		
第九節 旋覆代赭湯	141		
第十節 厚樸生薑甘草半夏人參湯	148		
第八章 白虎湯類			
第一節 白虎湯	150	第一節 四逆湯	167
第二節 白虎加人參湯	151	第二節 四逆加人參湯	191
第三節 竹葉石膏湯	155	第三節 通脉四逆湯	200
第九章 五苓散類		第四節 白通加人尿猪膽汁湯	208
第一節 五苓散	166	第五節 通脉四逆加猪膽汁湯	214
第二節 附子四逆湯	211	第六節 乾薑附子湯	219
第七節 白通湯	210	第七節 白虎湯	220
第八節 茯苓四逆湯	211	第八節 乾薑四逆湯	221
第九節 四逆散	214	第九節 四逆散	224
第十節 當歸四逆湯	219	第十節 當歸四逆湯	229
第十一節 當歸四逆加吳茱萸生薑湯	221	第十一節 當歸四逆加吳茱萸生薑湯	231
第十一章 理中湯類			

第一節 理中丸	三七
第二節 真武湯	三八
第三節 附子湯	三九
第四節 甘草附子湯	四〇
第五節 桂枝附子湯	四一
第六節 桂枝附子去桂加白朮湯	四二
第七節 茯苓桂枝白朮甘草湯	四三
第八節 芍藥甘草附子湯	四四
第九節 桂枝人參湯	四五
第十一章 雜方類	
第一節 赤石脂禹餘糧湯	五三
第二節 炙甘草湯(又名復脈湯)	五五
第三節 甘草乾薑湯	五六
第四節 芍藥甘草湯	五七
第五節 茵陳蒿湯	五八
第六節 麻黃連轺赤小豆湯	五九
第七節 麻黃升麻湯	六七
第八節 瓜蒂散	三九
第九節 吳茱萸湯	三五
第十節 黃連阿膠湯	四〇
第十一節 桃花湯	四一
第十二節 半夏散及湯	四八
第十三節 猪膚湯	四九
第十四節 甘草湯	五三
第十五節 桔梗湯	四八
第十六節 苦酒湯	四五
第十七節 烏梅丸	四二
第十八節 白頭翁湯	四六
第十九節 牡蠣澤瀉散	四〇
第二十節 蜜煎導方	四一
第二十一節 大猪膽汁並土瓜根導	四二
第二十二節 燒輝散	四三

第一章 桂枝湯類

第一節 桂枝湯類

一、用量

(一)仲景

桂枝三兩
去皮

芍藥三兩

甘草二兩
炙

生薑三兩
切

大棗十二
枚擘

(二)洄溪

桂枝錢半
芍藥錢半
甘草五分
大棗三分
生薑三片

二、定義

此因傷寒或中風，而又脈弱自汗。爲製滋陰和陽，調和營衛，解肌達表之溫方也。

三、病狀

(一)太陽中風，嗰嗰惡寒，淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴乾嘔者，桂枝湯主之。

太陽中風者，陽受風氣而未及乎陰也。

嗰嗰惡寒，淅淅惡風者，謂肌腠疏緩，衛氣不諧。雖無寒而若不能禁；雖無風而常覺洒淅也。翕，越也。



動也、盛也。鼻鳴、噓也。乾嘔，風邪干胃也。但就鼻鳴、乾嘔而論，似屬陽明、少陽兼證。益從陽明、少陽施治，不知臟腑相通，原不必處處皆治。良以病從陽明而來，主以桂枝湯則太陽之外邪去，而他病自愈也。餘皆準此。

(二) 太陽病，頭痛發熱，汗出惡風者。

此桂枝湯總症。

(三) 太陽病，下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。若不上衝者，不可與之。

隨證施治。論中誤治諸法，詳觀自明。

(四) 太陽病，初服桂枝湯，反煩不解者，先刺風池、風府，卻與桂枝湯則愈。

此誤下之症，誤下而仍上衝，則邪氣猶在陽分，故仍用桂枝發表。若不上衝，則其邪已下陷，變病不一，當須刺之以洩經氣。

風府一穴，在項上入髮際一寸，大筋內宛宛中，督脈陽維之會也。刺入四分，留三呼。風池一穴，在頸顎後髮際陷者中，足少陽陽維之會。針入三分，留三呼。

(五) 太陽病，發熱汗出者，此爲營弱衛強，故使汗出，欲救風邪者，宜桂枝湯。

提出「風邪」二字，見桂枝爲驅風要藥。

(六)病嘗自汗出者，此爲榮氣和。榮氣和者，外不諧，以衛氣不共榮氣和諧故爾。榮氣和者，言榮氣不以榮行脈中，衛行脈外，復發其汗，榮衛和則愈，宜桂枝湯。

自汗與發汗迥別。自汗乃榮衛相離，發汗使榮衛相合。自汗傷正，發汗驅邪。復發者因其自汗而更發之，則榮衛和而自汗反止矣。或問：傷風自汗與中渴自汗皆相似，傷寒無汗與冬溫無汗皆相類，敢問如何不同？曰：傷風不渴，中渴即渴。傷寒脉浮緊，冬溫脉不浮也（此條重在「嘗」字）。

(七)病人藏無他病，時發熱，自汗出而不愈者，此衛氣不和也。先其時未熟之發汗則愈，宜桂枝湯。

無他病太陽諸證不必備，而惟發熱自汗，故亦用桂枝湯。

前條自汗，因發熱有時，係表邪未清，故時自汗。此條自汗覺無熱而常出，係表邪毫無，故嘗汗。易言之，嘗出者，無表邪也。時出者，有表邪也。是故上條之嘗出，指陽虛言。本條之自出，指表邪言（此條重在發熱二字）。

藏無他病云者，謂內無他病，外有表邪也。何也？以其發熱故也。

(八)傷寒，不大便六七日（宜下之候），頭痛有熱者，未可與承氣湯。太陽症仍在，不得以日久不便而下也。可二字，從金匱增入，傷寒論失此二字。按未其小便清者，知不在裡仍在表也。有熱赤爲裡當須發汗。若頭痛者，必衄。汗出而頭痛未解，則血動矣。宜桂枝湯。

(九)傷寒，醫下之，續得下利清穀不止。裡身疼痛者，表當急救裡。此誤下之症，邪在外而引之入陰，故便清穀。陽不可下篇云：誤下寒多者，便脹血。後身疼痛清便自調者，急當救裡。清穀已止，疼痛未除，仍從表治。蓋凡病當先表後裡，惟下利

欲以一方治數症，必至兩誤。救裡宜四逆湯，救表宜桂枝湯。

(十) 下利、腹脹滿、裡症。身疼痛者，表證。先溫其裡，乃攻其表。溫裡，宜四逆湯。攻表，宜桂枝湯。

此節屬厥陰症，未必由誤治而得。然既見表症，亦宜兼治。

(二) 吐利止，而身痛不休者，當消息和解其外，宜桂枝湯小和之。

(三) 吐利止，而身痛不休者，當消息和解其外，宜桂枝湯小和之。

(三) 傷寒大下後，復發汗，再誤。心下痞，邪入中焦。惡寒者，表未解也。不可攻痞，當先解表。表解，乃可攻痞。解

裡症除而表症猶在，仍宜用桂枝法。輕其劑而加減之可也。

或問：傷風汗自出，用桂枝湯以散其邪。傷寒無汗，用麻黃湯以發其汗。又言表證未解者，用桂枝湯。

其理似乎相反？曰：傷風汗出，腠理既開。傷寒已汗後，腠理亦開。並用桂枝湯以解肌，可謂宜矣。

(三) 太陽病，外症未解者，不可下也，此禁下之爲逆。欲解外者，宜桂枝湯主之。

言雖有當下之症，而外症未除，亦不可下，仍宜解外而後下也。

四、脈象

(一) 太陽中風，陽浮而陰弱。陽浮者，熱自發。陰弱者，汗自出。

寸陽浮，則主衛陽外越，故熱自發。尺陰弱，則營血受傷，營爲衛之守，營不守衛，故衛氣外泄而自汗。故本湯認症，以自汗爲主。

桂枝證之脉，有陽浮陰弱者。陽謂寸脉，陰謂尺脉。言病在上不在下也，不可以陰弱指爲陰虛。故柯韻伯曰：如所云頭痛發熱，惡寒惡風，鼻鳴乾嘔等病，但見一症即是，不必悉具，惟以脈弱自汗爲主耳。

(二)太陽病，外證未解，脉浮弱者，當以汗解，宜桂枝湯。

病雖過期，而脈症屬太陽，仍不離桂枝法。

(三)太陽病，先發汗不解，而復下之。脉浮者不愈，浮爲在外，而反下之，故令不愈。今脉浮，故知在外。當須解外則愈，宜桂枝湯主之。

脉浮而下，此爲誤下。下後仍浮，則邪不因誤下而陷入，仍在太陽，不得因已汗下，而不復用桂枝也。

(四)陽明病，脉遲、汗出多、微惡寒者，表未解也。可發汗，宜桂枝湯。

陽明本自多汗，但不惡寒而惡熱，今多汗而猶惡寒，則仍在太陽矣。雖陽明病，而治從太陽。

(五)傷寒發汗，解半日許，復煩，脉浮數者，可更發汗，宜桂枝湯。
發汗未透，故煩。乃服藥不及之故。

(六)太陰病，脉浮者，可發汗，宜桂枝湯。

太陰本無汗法，因其脉獨浮，則邪仍在表，故亦用桂枝。從脈不從證也。

(七)病人煩熱，汗出則解，又如瘡狀，有時復日晡所發熱者，屬陽明也。日晡熱，則爲陽明也。之潮熱，而非煩矣。脉實者，宜下之。脉虛浮者，宜發汗。一症而治法迥別，全以脈爲憑。此亦從脈而不從症之法。發汗，宜桂枝湯。

五、藥解

本方用桂枝發汗，即用芍藥止汗。生薑之辛，佐桂枝以解肌。大棗之甘，佐芍藥以利裡。甘草甘平，安內攘外。用以調和氣血者，即以調和表裡，且以調和諸藥矣。

本湯薑、棗爲主要之品。成無己註云：以甘緩之，以辛散之，故辛散爲開卷第一方也。蓋薑、棗具安內攘外之功，故桂枝湯重之。即單用二物，亦爲正治。

桂枝，能活動脈之血者也。芍藥，能活靜脈之血者也。動脈爲陽，故曰桂枝爲陽藥。靜脈爲陰，故曰芍藥爲陰藥。動脈之血，由心以達周身血管，其地位由小而大，桂枝輔之，故曰桂枝發散爲陽。靜脈之血，由毛細血管以歸於心，其地位由大而小，故曰芍藥收斂爲陰。一散一收，互爲起訖，如環無端，依道運行。

本湯芍藥宜用赤芍藥之治驗

馬亨道庚戌春，病發熱、頭疼、鼻鳴、惡心、自汗、惡風，宛然桂枝證也。時賊馬破儀真三日，市無芍藥，自詣圃園採芍藥以利劑。一醫曰：此赤芍藥耳，安可用也？許叔微曰：此正當用，再啜而微汗解。

論曰：仲景桂枝加減法，十有九證但云芍藥。聖惠方皆稱赤芍藥，孫尚藥方皆曰白芍藥。聖惠方，太宗朝翰林王懷隱編集。孫兆爲國朝醫師，不應如此背戾？然赤者利，白者補，予嘗以此難名醫，皆愕然失措。案神農本草稱：芍藥主邪氣、腹痛、利小便、通順血脉、利膀胱、大小腸、時行寒熱，則全是赤芍藥。

也。又桂枝第九證云：微寒者，去赤芍藥，蓋懼芍藥之寒也。惟芍藥甘草湯一證云：白芍藥，謂其兩脰拘急，血寒也。故用白芍藥以補，非此症也。素問云：濇者，陽氣有餘也。陽氣有餘，爲身熱無汗。陰氣有餘，爲多汗身寒。傷寒脉濇，身無汗，蓋邪中陰氣，故陽有餘，非麻黃不能發散。中風脉滑，多汗，身寒，蓋邪中陽氣，故陰有餘，非赤芍藥不能劫其陰邪。然則桂枝用芍藥赤者明矣（參百證歌）。

本湯桂枝非肉桂之治驗

里間張太醫家，一婦病傷寒，發熱、惡風、自汗、脈浮而弱。許叔微曰：當服桂枝。彼云：家有自合者，許令三啜之，而病不除。詢其藥用肉桂耳。許曰：肉桂與桂枝不同。許自治以桂枝湯一啜而解。論曰：仲景論用桂枝者，蓋取桂枝輕薄者耳，非肉桂之肉厚也。蓋肉桂厚實，治五藏用之，取其鎮重。桂枝清輕，治傷寒用之，取其發散。今人一例，是以無功。

六、煮服法

右五味咬咀，以水七升，微火煮取三升。去滓，適寒溫，服一升。（凡云一升者準今六勺七抄）服已須臾，歎熱稀粥一升餘，以助藥力。試分釋如左：

(一) 咬咀與剉如麻豆之考據及意義

仲景云：剉如麻豆大與咬咀同意。夫咬咀者，古之製也。古無鐵刃，以口咬細令如麻豆大，爲粗藥煎之，使藥水清飲於腹中，易升易散，此所謂咬咀也。今人以刀器剉如麻豆大，此咬咀之易成者。若一概爲細

末，則不分清濁矣。經曰：清陽發腠理，濁陰歸五藏，果何謂耶？又曰：清陽實四肢，濁陰歸六府是也。咬咀之法，取汁清易循經絡，故古人製咀咬剉如麻豆大，煮清汁飲之，名曰湯。所以入經絡攻病取快。

釋音 咬咀。上音父。下才與切。嚼也。剉如麻顆也。

(二)啜薄粥之解釋

桂枝本不能發汗，故須助以熱粥。內經云：穀入於胃，以傳於肺，肺主皮毛，汗所從出。獸粥，充胃氣以達於肺也。觀此可知傷寒不禁食，亦可見複方之妙用。

徐洄溪云：仲景用桂枝等藥，猶恐其營中陰氣爲風火所煽，而消耗於內，不能滋潤和澤，托邪於外。於是啜薄粥以助胃氣，以益津液，此服桂枝湯之良法。凡發汗之方，皆可類推。汗之必資於津液者如此。

釋音 獗。昌悅切。飲水也。

七、服後現象

(一)溫覆令一時許，遍身漸漸微似有汗者，益佳。不可令如水流漓，病必不除，此解肌之法也。若如水流漓，則動榮氣，衛邪仍在。

徐洄溪云：總之有病之人不可過涼，亦不宜太煖，無事不可令出汗，惟服藥之時宜令小汗。服本湯已，溫覆令微似汗，不可如水淋漓，此其法也。

(二)若一服汗出病差，停後服，不必盡劑。若不汗，更服依前法。又不汗，後服小促，其間半日許，令三服盡。