

金匱鉤玄

元

朱震亨



金匱钩玄

元·朱震亨

人民卫生出版社

内 容 提 要

《金匱钩玄》(《薛氏医案》称“平治荟萃”),三卷。系元·朱震亨撰,明·戴元礼校补。卷一、卷二,所列杂证近百余条,有论有方,词旨简明精要,真可谓不失钩玄之旨。卷三对妇人科及小儿科疾病也做了介绍。书中有戴元礼所补的内容也较精确。书末附有专题论述六篇,不仅反应出朱丹溪的学术思想,同时也是临床实践经验的总结。

此书不仅实用于临床医生,同时对于我们进一步探讨朱丹溪的学术思想,也有一定的帮助。

这次刊行是据《古今医统正脉》本为蓝本,据他书做了必要的校点。原书系竖排,现为便于阅读,采取横排形式,书中“右为末”、“右咬咀”等的“右”字,按现在形式均改为“上”字。

金 匪 钩 玄

元·朱震亨 编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

人民卫生出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 2 $\frac{1}{2}$ 印张 47千字

1980年12月第1版第1次印刷

印数: 1—37,200

统一书号: 14048·3906 定价: 0.23元

3JB'26

丹溪先生金匱钩玄目录

卷 第 一

中风	1
六郁	2
癫痫	3
寒	4
伤寒	4
暑	4
注夏	5
暑风	5
湿	5
内伤	6
火	6
伤风	7
发斑	7
疹	7
温病	7
疟	8
咳嗽	9
痰	11
喘	14
哮	15
痢	15
禁口痢	17
泄泻	17

脾泄	18
霍乱	18
干霍乱	19
呕吐	19
恶心	20
翻胃	20
伤食	20
痞	21
嗳气	21
吞酸	21
嘈杂	21
五疸	21
消渴泄泻	22
水肿	22
鼓胀	22
自汗	23
盗汗	23
吃逆	23
头风	24
头痛	24
头眩	24
眩晕	25
眉棱痛	25
耳聋	25

卷 第 二

心痛	26
腰痛	27
胁痛	28
腹痛	28
痛风	29
劳瘵	29
咳血	30
呕血	30
咯血	30
衄血	31
溺血	31
下血	31
肠风	32
梦遗	32
精滑	33
浊	33
淋	34
小便不通	35
关格	35
小便不禁	35
痈	35
健忘	36
怔忡	36
惊悸	36
癰	36
血块	36
吐虫	37
癰痕	37

疝	38
脚气	39
痿	40
发热	41
阳虚恶寒	41
手心热	41
手麻	41
手木	41
厥	42
面寒面热	42
喉痹	42
缠喉风	42
咽喉生疮	42
口疮	43
酒皏鼻	43
肺痈	43
肺痿	43
天疱疮	43
漏疮	43
痔漏	44
肠痈	44
结核	44
脱肛	45

卷 第 三

妇人科	46
经水	46
血崩	47
带下赤白	47
子嗣	48

产前胎动	49	痘疮	54
恶阻	49	腹胀	55
束胎	50	夜啼	55
安胎	50	口糜	55
胎漏	51	脱囊肿大	55
子肿	51	脱肛	55
难产	51	木舌	55
催生方	51	癰疹	56
产后血晕	51	咯红	56
产后补虚	51	吃泥	56
消血块	52	痢疾食积	56
泄	52	解颅	56
恶露不尽	52	蛔虫	56
中风	52	口噤	57
发热恶寒	52	风痰	57
小儿科	53	癫痫	57
吐泻黄疸	53	赤瘤	57
急慢惊风	53	鼻赤	57
疳病	54		
附录:			58
一、火岂君相五志俱有论			58
二、气属阳动作火论			59
三、血属阴难成易亏论			61
四、滞下辩论			63
五、三消之疾燥热胜阴			64
六、泄泻从湿治有多法			66

丹溪先生金匱钩玄卷第一

门人戴元礼录 新安吴勉学校正

中 风

大率主血虚。有痰以治痰为先，或虚挟火与湿；亦有死血留滞者，外中于风者；亦有中气者，当从痰治，顺气化痰。若口开、手撒、眼合、遗尿、吐沫直视、喉如鼾睡、肉脱筋痛者，皆不治。

半身不遂，大率多痰。在左属死血、无血；在右属痰、有热、气虚。

病若在左者，四物汤等加桃仁、红花、竹沥、姜汁；在右者，二陈汤、四君子等加竹沥、姜汁。

痰壅盛者、口眼喎斜者、不能言者，皆当吐。

吐法：轻用瓜蒂、虾汁、皂角；重用藜芦半钱或三分，加麝香灌入鼻内或口内，吐痰出。一吐不已，再吐之。亦有虚而不可吐者。

气虚卒倒，参芪补之。

气虚有痰，浓参汤合竹沥、姜汁。

血虚，宜四物汤，俱用姜汁炒；恐泥痰，再加竹沥、姜汁入内服；能食者，去竹沥，加荆沥。

又法：以猪牙皂角、白矾等分为末，姜汤调下，名稀涎散。血虚者，四物汤补之。挟痰者，亦用姜汁、竹沥。

脉诀内言诸不治证，见则不可治，筋枯者不治。举动则

筋痛者，是筋枯，以其无血滋润故也。

治痰：气实能食，用荆沥；气虚少食，用竹沥。此二味用开经络，行血气。入四物汤中，必用姜汁助之。

肥白人多湿，少用附子、乌头行经。

初昏倒，急掐人中至醒，然后用去痰药，二陈汤、四物、四君子等汤加减用。

六 郁

戴云：郁者，结聚而不得发越也。当升者不得升，当降者不得降，当变化者不得变化也。此为传化失常，六郁之病见矣。气郁者，胸胁痛，脉沉涩；湿郁者，周身走痛，或关节痛，遇阴寒则发，脉沉细；痰郁者，动则即喘，寸口脉沉滑；热郁者，瞀，小便赤，脉沉数；血郁者，四肢无力，能食，便红，脉沉；食郁者，嗳酸腹饱不能食，人迎脉平和，气口脉紧盛者是也。

气血中和，万病不生，一有怫郁，诸病生焉。

气郁：香附子、苍术、川芎。

湿郁：苍术、川芎、白芷。

痰郁：海石、香附、南星、瓜蒌。

热郁：青黛、香附、苍术、川芎、栀子。

血郁：桃仁、红花、青黛、川芎、香附。

食郁：苍术、香附、针沙醋炒、山楂、神曲炒。

春加芎，夏加苦参，秋冬加吴茱萸。

越鞠丸，解诸郁，又名芎术丸。

苍术 香附 抚芎 神曲 栀子 等分为末，水丸，如绿豆大。

凡郁皆在中焦，以苍术、抚芎、开提其气以升之。假如

食在气上，提其气则食自降。余皆仿此。

癰

大风病，是受得天地间杀物之气，古人谓之疠风者，以其酷烈暴悍可畏耳。人得之者，须分在上、在下。夫在上者，以醉仙散取涎血于齿缝中出；在下者，以通天散取恶物陈虫于谷道中出。取出虽有道路之异，然皆不外乎阳明一经。治此证者，须知此意。看其疙瘩与疮，上先见者、上体多者，在上也；下先见者、下体多者，在下也。上下同得者，在上复在下也。阳明胃经与大肠无物不受，此风之入人也。气受之，则在上多；血受之，则在下多；血气俱受之者，上下俱多也。自非医者神手，病者铁心，罕有免此。夫从上从下以渐而来者，皆可治。人见其病势之缓，多忽之。虽按法施治，病已痊可，若不能忌口、绝色，皆不免再发，发则终于不能救也。余曾治五人中间，惟一妇人不再发，以其贫甚而且寡，无物可吃也。余四人，三、四年后皆再发。孙真人云：吾尝治四五十人，终无一人免于死。非真人不能治，盖无一人能守禁忌耳。此妇人本病药外，又服百余贴加减四物汤，半年之上，方得经行，十分安愈。

治法：在上者醉仙散，在下者通天再造散。后用通神散，及三棱针于委中出血。但不能忌口、绝房者，不治之也。

醉仙散：

胡麻仁 牛蒡子 蔓荆子 枸杞子各半两为粗末，同炒紫色白蒺藜 苦参 瓜蒌根 防风各半两

上八味为细末，每一两半入轻粉三钱，拌匀。大人一钱，空心，日午、临睡各一服，淡茶调下。五七日间，必于齿缝中出臭涎水，浑身觉痛，昏闷如醉，利下恶臭屎为度。量大

小虚实加减与之。证候重而急者，须以再造散下之，候补养得还，复与此药吃。须断盐酱醋诸般鱼肉椒料果子烧炙等物，止可淡粥及淡煮熟时菜食之。茄尚不可食，惟有乌梢蛇、菜花蛇可以淡酒煮熟食之，以助药力。

再造散：郁金半两，生用 大黄一两，炮 皂角刺一两，黑者大者白牵牛头末六钱半，炒半生用之。

上为末，五钱临夜冷酒调下。以净桶伺候泄出虫。如虫口黑色，乃是多年虫，口如赤色，是近者。三数日又进一服，直候无虫，即绝根也。

寒 主乎温散。

有卒中天地之寒气，有口伤生冷之物。

戴云：此伤寒，谓身受肃杀之气，口食冰水瓜果冷物之类。病者，必脉沉细、手足冷、息微、身倦，虽身热亦不渴，倦言语。或遇热病，误用此法，轻者至重，重者至死。凡脉数者、或饮水者、或烦躁动摇者、皆是热病。寒热二证，若水火也，不可得而同治，误即杀人。学者慎之。

伤 寒

伤寒，必须身犯寒气，口食寒物者，从补中益气汤中加发散药。属内伤者，十居八九。其法：邪之所凑，其气必虚，只用补中益气汤中，从所见之证，出入加减。气虚热甚者，少用附子，以行参芪之剂。如果气虚者，方可用此法。以上伤寒治法，可用于南方，不宜北。

暑

戴云：暑乃夏月炎暑也，盛热之气著人也。有冒、有伤、

有中、三者有轻重之分，虚实之辨。或腹痛水泻者，胃与大肠受之；恶心者，胃口有痰饮也；此二者，冒暑也。可用黄连香薷饮。盖黄连退暑热，香薷消畜水。或身热头疼躁乱不宁者，或身如针刺者，此为热伤在分肉也。当以解毒白虎汤加柴胡。气如虚者，加人参。或咳嗽发寒热、盗汗出不止、脉数者，热在肺经，用清肺汤、柴胡天水散之类。急治则可，迟则不可治矣。或火乘金也，此为中暑。凡治病须要明白辨别，慎勿滚同施治。春秋间亦或有之，切莫执一。随病处方为妙。

黄连香薷饮，挟痰加半夏，乘虚加人参、黄芪，或清暑益气汤加减用之。

注 夏 属阴虚，元气不足。

戴云：秋初夏末，头痛脚软，食少体热者是也。补中益气汤去柴胡、升麻，加炒黄柏。挟痰，止用南星、半夏、陈皮之类；或生脉散出千金方。

暑 风

戴云：暑风者，夏月卒倒不省人事者是也。有因火者，有因痰者。火，君相二火也；暑，天地二火也；内外合而炎烁，所以卒倒也。痰者，人身之痰饮也，因暑气入，而鼓激痰饮，塞凝心之窍道，则手足不知动蹑而卒倒也。此二者皆可吐。内经曰：火郁则发之。挟火挟痰实者，可用吐法。吐即发散也。量其虚实而吐之，吐醒后，可用清剂调治之。

湿

戴云：湿有自外入者，有自内出者，必审其方土之致病

源。东南地下多阴雨地湿，凡受必从外入，多自下起，以重腿脚气者多。治当汗散；久者，宜疏通渗泄。西北地高，人多食生冷湿面，或饮酒后，寒气怫郁，湿不能越，作腹皮胀痛，甚则水鼓胀满，或通身浮肿如泥，按之不起，此皆自内而出也。辨其元气多少，而通利其二便，责其根在内也。此方土内外，亦互相有之，但多少不同，须对证施治，不可执一。

本草苍术治湿，上下俱可用。

二陈汤加酒芩、羌活、苍术、散风之药，行湿最妙。

内 伤

内伤：病退后燥渴不解者，有余热在肺家，可用参苓甘草少许，姜汁冷服；或茶匙挑姜汁与之。虚者可用人参汤。世之病此者为多，但有挟痰者，有挟外邪者，有热郁于内而发者，皆以补元气为主。看其所挟之病，而兼用药物。

火

有可发者二：风寒外来者可发，郁者可发。

阴虚火动难治。火郁当发看何经，轻者可降，重则从其性升之，实火可泻。小便降火极速。

凡气有余便是火。

火急甚重者，必缓之，生甘草兼泻兼缓，人参、白朮亦可。

人壮气实、火盛颠狂者，可用正治，或硝冰水饮之。人虚，火盛狂者，可用生姜汤与之。若投以冰水正治，立死。有补阴即火自降者，炒黄柏、地黄之类。

山栀子仁大能降火，从小便泄去。其性能屈曲下行，降

火人所不知。

凡火盛者，不可骤用凉药，必用温散。

又方：左金丸治肝火

黄连六两 茄萸一两或半两 水为丸。白汤下五十九。

伤 风

戴云：新咳嗽，鼻塞声重者是也。

属肺者多，散宜辛温或辛凉之剂。

发 斑 属风热。

戴云：斑，有色点而无头粒者是。如有头粒，即疹也。风热挟痰而作，自里而发于外，通圣散消息，当以微汗而散之。下之，非理也。

内伤斑者，胃气极虚，一身火游行于外所致。宜补以降之。发斑似伤寒者，痰热之病发于外，微汗以散之。下之，非理也。

疹

戴云：疹，浮小有头粒者是。随出即收，收则又出者是也。非若斑之无头粒也。当明辨之。

属热与痰在肺，清肺火降痰，或解散出汗，亦有可下者。

温 痘

众人病一般者是也。又谓之天行时疫。有三法：宜补、宜降、宜散。

又方：

大黄 黄芩 黄连 人参 桔梗 防风 苍术 滑石
香附 人中黄

上为末，神曲为丸。每服五七十九。分气血痰作汤使：气虚，四君子汤；血虚，四物汤；痰多，二陈汤送下。如热甚者，可用童子小便送下。

大头天行病，东垣有方：

羌活 酒芩 大黄酒蒸

冬温为病，非其时而有其气者。冬时君子当闭藏，而反发泄于外。专用补药带表。

又方：以竹筒两头留节，中作一窍，纳甘草于中，仍以竹木钉闭窍，于大粪缸中浸一月，取出晒干，专治疫毒。

症 有风、有暑、有食、老症、疟母、瘈疭。

老症病：此系风暑入阴分。在脏用血药：川芎、抚芎、红花、当归，加苍术、白术、白芷、黄柏、甘草煎。露一宿，次早服之。无汗要有汗，散邪为主，带补。有汗要无汗，正气为主，带散。有疟母者，用丸药消导，醋煮鳖甲为君，三棱、蓬术、香附随证加减。

三日一发者，受病一年。间发者，受病半年。一日一发者，受病一月。连二日发者，住一日者，气血俱受病。一日间一日者，补药带表。药后用疟丹截之。在阴分者用药彻起，在阳分方可截之。

又方：

草果 知母 槟榔 乌梅 常山 甘草 炙 川山甲炮
用水酒一大碗，煎至半碗，露一宿。临发日前二时，温服。
如吐，则顺之。

截疟青蒿丸：

青蒿一两 冬青叶二两 马鞭草二两 官桂二两
上三叶，皆晒干，秤为末，法丸如胡椒子大。每两作四服。于当发前一时服尽。

大法：暑风必当发汗。夏月多在风凉处歇，遂闭其汗，而不泄。因食者，从食上治。

疟而虚者，须先用参术一二贴，托住其气不使下陷，后用他药。治内伤挟外邪者同法。内必主疟，必以汗解，二陈汤加常山、柴胡、黄芩、草果。

疟而甚者，发寒热、头痛如破、渴而饮水、自汗。可与参、芪、术、苓、连、栀子、川芎、苍术、半夏等治。

久病疟，二陈汤加川芎、苍术、柴胡、葛根、白朮，一补一发。

咳 嗽

风寒、火主降火、劳、肺胀、火郁、痰主降痰。

戴云：风寒者，鼻塞、声重、恶寒者是也；火者，有声、痰少、面赤者是也；劳者，盗汗出，兼痰者，多作寒热；肺胀者，动则喘满，气急息重；痰者，嗽动便有痰声，痰出嗽止。五者大概耳，亦当明其是否也。

风寒，行痰开腠理。二陈汤加麻黄、杏仁、桔梗。

火，降火、清金、化痰。

劳，四物汤中加竹沥、姜汁。必以补阴为主。

肺胀而嗽者，用诃子、青黛、杏仁。诃子能治肺气，因火伤极，遂成郁遏胀满，取其味酸苦，有收敛降火之功。佐以海蛤粉、香附、瓜蒌、青黛、半夏曲。

食积痰作嗽发热者，半夏、南星为君，瓜蒌、萝卜子为臣，青黛、石碱为使。

火郁嗽者，诃子、海石、瓜蒌、青黛、半夏、香附。

咳嗽声嘶者，此血虚受热也。用青黛、蛤粉，蜜调服。

久嗽风入肺，用鹅管石、雄黄、郁金、款冬花碾末和艾中，以生姜一片留舌上灸之，以烟入喉中为度。

干咳嗽者，难治。此系火郁之证，乃痰郁火邪在中。用苦梗以开之，下用补阴降火。不已，则成劳，倒仓好。此证不得志者有之。

嗽而胁痛，宜疏肝气，用青皮等方。在后，二陈汤内加南星、香附、青黛、姜汁。

治嗽药，大概多用生姜者，以其辛散也。

上半日嗽多者，属胃中有火。贝母、石膏能降胃火。

午后嗽多者，此属阴虚。必用四物汤加知母、黄柏，先降其火。

五更嗽多者，此胃中有食积，至此时候，流入肺金。知母、地骨皮降肺火。

火气浮于肺者，不宜用凉药，用五味、五倍敛而降之。有痰因火逆上者，先治火，后治其痰也。

肺虚甚者用参膏，此好色肾虚有之。以生姜、陈皮佐之。大概有痰者，可加痰药治之。

治嗽多用粟壳，不必疑，但要先云病根，此乃收后之药也。师云：阴分嗽者，多属阴虚治之也。

有嗽而肺胀壅遏不得眠者，难治。

治嗽烟筒：

佛耳草 款冬花 鹅管石

上为末，用纸卷烧其烟熏之；或白汤调亦得。

治嗽有痰，天突、肺腧二穴灸。治嗽泄火热，大泻肺气，三椎骨下横过各一寸半是穴。

嗽：春是春升之气，用清药，二陈加薄、荆之类；夏是火炎上，最重芩、连；秋是湿热伤肺；冬是风寒外来，用药发散之后，以半夏必逐去痰，庶不再来。

又方：治嗽劫药。

五味子半两 五倍子一钱 甘草二钱半 风化硝一钱 为末以蜜为丸，噙化之。

痰 脉浮当吐。

凡治痰，用利药过多，致脾气下虚，则痰反易生多。

湿痰用苍术。

老痰：海石、半夏、瓜蒌子、香附、五倍子。

热痰用青黛、黄连。

食积痰：神曲、麦蘖、山楂子。

痰在肠胃间者，可下而愈。痰在经络中者，非吐不可出。吐法中就有发散之义也。

膈上之痰，必用吐之，泻亦不能去也。

气实痰热结在上者，则吐。吐难得出，或成块，或吐咯不出，气滞兼郁者，此则难治矣。

胶固者，必用吐之。

吐法兼用牙茶、蜜水、姜汁、醋少许，瓜蒌散少许，加防风、桔梗，皆升动其气，便吐也。

吐法：用附子尖 桔梗芦 人参芦 瓜蒂 砒不甚用藜芦 艾叶 末茶

上药，此皆自吐，不用手探。但药但汤，皆可吐。

吐法：先以布搭膊勒腰，于不通风处行此法。

萝卜子半升擂和，以浆水一碗，滤去粗，入少油与蜜，旋至半温。服后，以鹅翎探吐。凡用鹅翎，须以桐油浸，却