

# 常用

# 中草药彩色图谱

与验方

○江西科学  
技术出版社

○主编 \ 舒普荣



105010

# 常用中草药彩色

## 图谱与验方

○主编 舒普荣

○副主编 徐志杰

○编者 舒普荣 徐志杰 朱珍菊



○江西科学技术出版社

\*C0191590\*



## 图书在版编目(CIP)数据

常用中草药彩色图谱与验方/舒普荣

—江西南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-0755-9/R·166

I. 常用中草药彩色图谱与验方 I. 舒普荣

III. 中药学 N.R·28

国际互联网(Internet)地址:

[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN](http://WWW.NCU.EDU.CN):800/

## 常用中草药彩色图谱与验方

舒普荣 主编

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号 邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513913
印刷	江西新华印刷厂
经销	各地新华书店经销
开本	787×1092 1/32
字数	19 万
印张	8.125
印数	30001—38000
版次	1994 年 8 月第 1 版 1997 年 4 月第 3 次印刷
书号	ISBN 7-5390-0755-9/R·166
定价	45.00 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

## 出版者的话

我社出版的《中草药彩色图谱与验方》一书于1993年发行后，受到广大读者、特别是广大农村药农和乡村医生的欢迎。他们反映该书实用性强，针对了农村药农和乡村医生识别采集中草药和应用中草药防治常见病的需要，起到了参谋作用，亦为社会业余爱好草药草医者的良师益友。

《中草药彩色图谱与验方》出版后，发行形势很好，初版印刷21000册，仅一年时间已销售一空，目前仍有许多读者来信要求购书。与此同时，也有不少读者、特别是农村读者来信，要求我们出版一本更为常用普及的《中草药彩色图谱与验方》，定价低廉一点，以适应农村读者的购买能力。为了满足广大农村读者的需要，使我国中草药这一医药瑰宝，在建设有中国特色的社会主义建设中发挥作用，我们又编辑出版这本《常用中草药彩色图谱与验方》。

该书收载了更为常用的中草药一百一十六种，所载中草药彩色图按照原植物标本精工绘画而成，植物形态逼真，色彩鲜艳调和。我们相信，该书出版发行后，更会得到广大读者的欢迎。

一九九四年三月

## 目 录

灵芝	(2)	蝶猪刺	(52)
海金沙	(4)	六角莲	(54)
乌韭	(6)	箭叶淫羊藿	(56)
水龙骨	(8)	木防己	(58)
石韦	(10)	青牛胆	(60)
侧柏	(12)	山苍子	(62)
鱼腥草	(14)	乌药	(64)
接骨金粟兰	(16)	夏天无	(66)
桑	(18)	血水草	(68)
穿破石	(20)	茅膏菜	(70)
青木香	(22)	垂盆草	(72)
绵毛马兜铃	(24)	虎耳草	(74)
杜衡	(26)	仙鹤草	(76)
野荞麦	(28)	金樱子	(78)
火炭母	(30)	地榆	(80)
虎杖	(32)	锦鸡儿	(82)
何首乌	(34)	草决明	(84)
荭草	(36)	鸡血藤	(86)
羊蹄	(38)	苦参	(88)
牛膝	(40)	竹叶椒	(90)
马齿苋	(42)	苦棟	(92)
草乌	(44)	黄花远志	(94)
威灵仙	(46)	瓜子金	(96)
毛茛	(48)	铁苋菜	(98)
大血藤	(50)	地锦	(100)

毛冬青	(102)	苦蘗	(162)
钻石风	(104)	白英	(164)
乌蔹莓	(106)	蚊母草	(166)
三叶青	(108)	毛腹水草	(168)
木芙蓉	(110)	穿心莲	(170)
地耳草	(112)	狗肝菜	(172)
八角枫	(114)	爵床	(174)
五加	(116)	车前	(176)
枫荷梨	(118)	虎刺	(178)
隔山香	(120)	黄梔子	(180)
积雪草	(122)	白花蛇舌草	(182)
羊蹄躅	(124)	鸡矢藤	(184)
紫金牛	(126)	茜草	(186)
过路黄	(128)	钩藤	(188)
龙胆草	(130)	金银花	(190)
合掌消	(132)	陆英	(192)
徐长卿	(134)	绞股蓝	(194)
柳叶白前	(136)	栝蒌	(196)
娃儿藤	(138)	羊乳	(198)
菟丝子	(140)	半边莲	(200)
紫珠	(142)	艾	(202)
大青	(144)	鵝不食草	(204)
马鞭草	(146)	野菊花	(206)
牡荆	(148)	地胆草	(208)
筋骨草	(150)	千里光	(210)
连钱草	(152)	蒲公英	(212)
益母草	(154)	苍耳	(214)
夏枯草	(156)	白茅	(216)
丹参	(158)	淡竹叶	(218)
半支莲	(160)	滴水珠	(220)

半夏	.....	(222)	石蒜	.....	(228)
七叶一枝花	.....	(224)	麦斛	.....	(230)
万年青	.....	(226)	斑叶兰	.....	(232)

## 内 容 提 要

本书收载了 116 种我国最常见常用的中草药彩色图，内文以每一种中草药分正名(包括拉丁学名)、别名、植物特征、药用部分、采集时间和性能项目介绍，文后附所载中草药防治常见病的有效验方。

本书彩图是依照原植物标本绘制的，形态逼真，色彩鲜艳调和；文字简洁易懂。可供农村山区药农识别采集中草药，和乡村医生应用中草药防病治病参用，亦可供中医院校教学参考。

## 灵 芝

Ganoderma lucidum (Leyss. ex Franch.) Karst. (多孔菌科)

**别 名** 赤芝、红芝、木灵芝

**植物特征** 菌盖半圆形或肾形木栓质，大小不一，皮壳坚硬，初黄色，后变红褐色，有光泽，具环状纹和辐射状皱纹，边缘薄，常内卷，菌盖下表面菌肉白色后呈棕色，菌柄侧生，红褐色或紫褐色，有光泽。

另有紫芝 *Ganoderma sinensis* zhao, Xu et Zhang 与上种相似，外观上紫芝的菌盖和菌柄的皮壳呈紫黑色或黑色。现在多有栽培。

**药用部分** 子实体。

**采集时间** 全年可采。

**性 能** 性温，味淡；滋养老壮。

**验 方**

1. 胃痛：(1) 灵芝、杉寄生、青木香、乳香各3克，水煎服。  
(2) 灵芝、骨碎补、高良姜各3克，水煎服。
2. 神经衰弱、头昏失眠：干灵芝3克，水煎服；或研末服，每次服1.5克。



灵 芝

# 海金沙

*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. (海金沙科)

**别名** 铁蜈蚣、金砂蕨、罗网蕨、铁线藤、蛤蟆藤、左转藤

**植物特征** 多年生攀援草本，长可达4米。生于溪边或林中杂草灌丛中，根状茎细长，横生，生黑褐色有节的毛。叶纸质；2~3回羽状复叶，叶有两种，一种为营养叶；一种为孢子叶，外形通常相同，但孢子叶小，羽片较小，有深缺刻。夏末孢子囊在叶背面生出；孢子囊单生，沿裂片的中脉两行排列成穗状，穗长约5毫米。

**药用部分** 干燥成熟的孢子；全草。

**采集时间** 孢子：于秋分前后；全草：夏、秋采集。

**性 能** 性寒，味甘；清热解毒，利尿通淋。

## 验 方

1. 烫火伤：海金沙茎、叶烧灰存性研成细末，用麻油调搽患处。
2. 流行性腮腺炎：海金沙藤根30克，水煎服。
3. 上呼吸道感染、扁桃体炎、肺炎、支气管炎：海金沙藤30克，大青叶15克，水煎服。
4. 热淋：鲜海金沙茎叶30克，捣汁，冷开水兑服。
5. 乳腺炎：海金沙根20~30克，黄酒、水各半煎服，暖睡取汗；另用鲜海金沙茎叶、鲜梨头草各等份，捣烂外敷。



海金砂

## 乌 韭

*Stenoloma chusanum* (L.) Ching (林蕨科)

**别 名** 小叶野鸡尾、小金芯草、解毒藤、金粉蕨、仙鹤尾、凤尾连、孔雀尾

**植物特征** 高 60~100 厘米, 根状茎横走, 疏生褐色钻状鳞片, 叶柄禾秆色, 叶片 3~4 回羽状分裂, 小羽片用裂片多数, 先端多少呈截形。孢子囊群位于裂片顶部, 顶生于小脉上。生于山坡林中, 沟边阴湿处。

[附注]与本植物相近有乌蕨 [*Onychium japonicum* (Thunb.) Kze.], 末回小羽片 3 裂, 裂片披针形, 先端有短尖, 孢子囊群成熟时, 满布裂片下面。与本种常相混用, 有人认为乌韭效好。

**药用部分** 全草。

**采集时间** 四季可采。

**性 能** 性寒, 味苦; 清热解毒, 利湿消肿。

**验 方**

1. 食物中毒、农药中毒: 乌韭 100~200 克, 捣烂取汁, 冷开水冲服。服用时忌盐。

2. 肝炎: 乌韭 60 克, 虎刺根、凤尾草、过江龙各 30 克, 水煎去渣; 猪肝 120 克, 用药汁炖猪肝, 服汤食肝。

3. 痢疾: 乌韭 60 克, 米酒煎服。

4. 创伤出血: (1) 乌韭叶晒干, 研极细末撒患处, 纱布包扎。  
(2) 鲜乌韭叶捣烂, 敷伤处, 纱布包扎。

5. 急性胃肠炎: 鲜乌韭叶 60 克, 生姜 3 克, 冰糖 15 克, 食盐 10 克, 煎水代茶饮。



乌韭

# 水 龙 骨

*Polypodium nipponicum* Mett. (水龙骨科)

**别 名** 回本、多足蕨、石伸筋、青根、石蜈蚣、青石莲、青石蚕、青竹标、青豆鞭、光石蚕

**植物特征** 多年生草本，高 16~40 厘米。附生于阴湿岩石和树干上。根状茎横生，细棒状，弯曲分枝，碧绿色并被有白粉。叶疏生，直立，叶柄长；叶片长圆形，长 10~25 厘米，1 回羽状深裂，羽片 20 对以上，平展，长圆形，长 2~3.5 厘米，全缘，下部羽片通常较短而下斜，两面密生白色柔毛。孢子囊群圆形，金黄色，生于羽片主脉两侧。


**药用部分** 根茎、全草。

**采集时间** 全年可采。

**性 能** 性凉，味甘苦；祛风散热，消肿解毒。

**验 方**

1. 急性关节炎：水龙骨根 120 克，冰糖少许，水煎服。
2. 背痛、无名肿毒：鲜水龙骨适量，白糖少许，捣烂外敷。
3. 五淋白浊：水龙骨根茎 15 克，水煎服。
4. 风火眼、红肿疼痛：鲜水龙骨根茎 60 克，加冰糖或白糖少许，水煎，每日早晚饭前各服一次（忌食酸辣及芥菜、萝卜菜）。
5. 手指疔毒：水龙骨根茎 30 克，研末，冲黄酒服。并将渣滓（未出头的加食盐，已出头的加白糖）捣烂敷患处。
6. 黄疸：水龙骨根茎 30 克，阴石蕨 60 克，马兰根 90 克，水煎服。



水龙骨

## 石 韦

*Pyrrosia lingua* (Thunb) Farw. (水龙骨科)

**别 名** 小叶石韦、象皮草、尖刀草、牛舌、石茶、牛皮茶、金茶匙、长柄石韦

**植物特征** 多年生草本，附生于石头上或树干上。根状茎横生，木质，粗不过5毫米，密生铁锈色鳞片；根须状，从根茎上分散生出。叶革质，疏生，叶之间距离在2厘米以上；叶片长披针形，长8~20厘米，背面有灰褐色星状毛；叶柄细长，长5~10厘米。

〔附注〕与本植物相近有同属植物庐山石韦〔*Pyrrosia sheareri* (Bak.) Ching〕，叶片基部较宽，耳形，两侧不等，叶与叶相靠很近，近于簇生。效用相似，民间常混用。

**药用部分** 干燥的地上部分。

**采集时间** 全年可采。

**性 能** 性凉，味苦辛；利水通淋。

**验 方**

1. 小便不利：石韦、车前各30克，水煎服。
2. 血淋：石韦30克，当归15克，蒲黄、赤芍各10克，水煎服。
3. 肺气肿、喘息不得卧：石韦120克，水煎服。
4. 肺痈吐脓、肺热咯血：鲜石韦60克，水煎服。
5. 急性膀胱炎、尿路感染：石韦30克，车前草20克，滑石18克，甘草3克，川柏10克，水煎服。