

《中级医刊》编辑部 编

中级卫生技术人员晋升试题选答

(五官科分册)

● 人 民 卫 生 出 版 社 ●

中级卫生技术人员 晋升试题选答

(五官科分册)

《中级医刊》编辑部 编

人 民 卫 生 出 版 社

中级卫生技术人员晋升试题选答
(五官科分册)

《中级医刊》编辑部 编

人 民 卫 生 出 版 社 出 版
(北京市崇文区天坛西里10号)

人民卫生出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 5 $\frac{1}{2}$ 印张 119千字
1987年5月第1版 1987年5月第1版第1次印刷
印数: 00,001—9,000

统一书号: 14048·5438 定价: 0.90元

〔科技新书目142—86〕

编者的话

《中级医刊》自1980年第3期连载中级卫生技术人员“晋升试题选答”以后，深受广大基层医务人员的欢迎，普遍认为对复习医学基础理论、提高业务技术水平和准备晋升考核很有帮助。因此，纷纷来信要求本刊在已刊出的试题及答案的基础上，再征集一些试题及答案，按学科选编成《中级卫生技术人员晋升试题选答》若干分册，陆续出版，以供各地读者学习参考。

根据广大读者的要求，在卫生部人事司干部二处的支持与协助下，我们征集了全国大部分省、市、自治区、直辖市及部分地区的中级卫生技术人员晋升考试题及其答案，分科按系统编排，并送请有关专业人员协助补充、修改、审阅、定稿。

为了帮助读者提高理论水平，部分选择题除有正确答案外，还撰写了简明扼要的题解。

为便于读者思考、进行自我测验，本书将试题与答案分开编排，统一编号，前后对应，以便查找。

《五官科分册》分为名词解释、填空题、选择题、是非题、问答题和思考病案六部分。本分册主要选自山西、江西、新疆、宁夏、陕西、河南以及云南丽江地区、江西上饶地区、山东德州地区、四川内江地区共10个省、自治区和地区“中晋高”五官科试题及答案，并请刘英奇、赵光喜、苗凤源、杨和钧、李春福、李国佳、苏宗辙、李春生、钱端申同志审阅、修改、补充、定稿。

本分册在选编过程中承蒙上述省、自治区及部分地区卫生部门积极供稿，审稿同志大力协助，特在此一并致谢。

本书试题多样，涉及临床和基础知识，适于城乡广大中级医务人员学习。

本书难免存在缺点和错误，恳切希望读者们批评、指正。

《中级医刊》编辑部

1986年7月

目 录

眼科部分

	试题	答案
第一章 名词解释 (1.1~1.50).....	(1)	(24)
第二章 填空题 (2.1~2.50).....	(2)	(30)
第三章 是非题 (3.1~3.50).....	(6)	(33)
第四章 选择题 (4.1~4.50).....	(9)	(34)
第五章 问答题 (5.1~5.50).....	(18)	(54)
第六章 思考病案 (6.1~6.6).....	(21)	(81)

耳鼻咽喉科部分

第一章 名词解释 (1.1~1.20).....	(88)	(101)
第二章 填空题 (2.1~2.32).....	(88)	(104)
第三章 是非题 (3.1~3.20).....	(91)	(106)
第四章 选择题 (4.1~4.15).....	(92)	(106)
第五章 问答题 (5.1~5.45).....	(97)	(109)
第六章 思考病案 (6.1~6.8).....	(99)	(127)

口腔科部分

口腔科医师

第一章 名词解释 (1.1~1.20).....	(132)	(135)
第二章 填空题 (2.1~2.20).....	(132)	(138)
第三章 问答题 (3.1~3.20).....	(134)	(139)

口腔科技师

第一章	名词解释 (1•1~1•20)·····	(147)	(150)
第二章	填空题 (2•1~2•20)·····	(148)	(154)
第三章	问答题 (3•1~3•20)·····	(149)	(155)

眼 科 部 分

试 题

第一章 名词解释(1.1~1.50)

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1.1 视泡 | 1.20 虹膜投影 |
| 1.2 Placido 氏角膜盘 | 1.21 Morgagni氏白内障 |
| 1.3 远视力 | 1.22 玻璃体疝 |
| 1.4 视野 | 1.23 后发性(继发性)白内障 |
| 1.5 Horner 氏综合征 | 1.24 Elschmig 珠状小体 |
| 1.6 隐眼畸形 | 1.25 飞蝇症 |
| 1.7 Mikulicz 氏病 | 1.26 眼内压 |
| 1.8 结膜结石 | 1.27 虹视 |
| 1.9 Koch-Weeks 杆菌 | 1.28 青光眼斑 |
| 1.10 包涵体 | 1.29 Seidel 氏暗点 |
| 1.11 角膜血管翳 | 1.30 恶性青光眼 |
| 1.12 后弹力层突出 | 1.31 水眼 |
| 1.13 Bitot 氏斑 | 1.32 无晶状体性闭角青光眼 |
| 1.14 蓝色巩膜 | 1.33 增殖性视网膜炎 |
| 1.15 角膜后沉着物 | 1.34 Gunn 氏征 |
| 1.16 Tyndall 氏现象 | 1.35 尿毒症性黑蒙 |
| 1.17 瞳孔膜闭 | 1.36 黑蒙性猫眼 |
| 1.18 Behçet 氏病 | |
| 1.19 瞳孔残膜 | |

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1•37 Föster-Kennedy
氏综合征 | 1•44 调节 |
| 1•38 黄斑回避 | 1•45 交叉圆柱镜 |
| 1•39 球面透镜 | 1•46 辐辏 |
| 1•40 屈光度 | 1•47 弱视 |
| 1•41 恶性近视 | 1•48 主斜角 |
| 1•42 混合散光 | 1•49 眼眶假瘤 |
| 1•43 屈光参差 | 1•50 铜锈症 |

第二章 填空题(2•1~2•50)

2•1 眼球的外层(纤维膜),其前面()为透明的角膜,后面()为瓷白色不透明的巩膜,两者的移行处称为角膜缘,宽约()毫米。

2•2 角膜的横径约(),垂直径约(),厚度约()。从组织学上上角膜可分()层,由外向内为()。

2•3 眼球的屈光系统包括()、()、()、()。感光系统指()。

2•4 前房深度(1.645)毫米,房水总量()毫升。

2•5 房水产生后,首先进入(),然后通过()流入(),由此通过()进入()管,最后注入()。

2•6 脉络膜组织学上由外向内分为5层:()、()、()、()、()。

2•7 晶状体直径(9-10)毫米,厚度(4-5)毫米,曲

率半径前面 (2.1) 毫米, 后面 (5.5) 毫米。

2.8 眼球总屈光力 (58.4)

2.9 视神经分为 ()、()、()、() 四段。

2.10 眼的动脉系统可分两个系统, 即 () 和 (), 这两个系统都是起源于 ()。

2.11 瞳孔开大肌由 () 神经支配; 瞳孔括约肌由 () 神经支配。

2.12 鼻泪管骨内部长约 (12.4) 毫米; 鼻内部长约 (5.3) 毫米。

2.13 内直肌受 () 支配, 外直肌受 () 支配, 上直肌受 () 支配, 下直肌受 () 支配, 上斜肌受 () 支配, 提上睑肌受 () 支配, 眼轮匝肌受 () 支配。

2.14 远视力检查距离 (用国际标准视力表) 是 () 米, 正常远视力是 (), 被检查者在 3 米处仅能看清视力表的最大的视标, 则视力为 ()。

2.15 视野检查分为 () 和 () 两种。

2.16 间接检眼镜主要由一个 () 并配以一个 () 屈光度的 () 和 () 所组成。

2.17 正常前房角在前房角镜下自前向后可以见到下列一些结构的标志: ()、()、()、()、()。

2.18 上睑下垂根据原因临床上分为四类: ()、()、() 及其他——()、()、()。

2.19 泪腺产生的泪液过多, 超过泪道的正常排出量而流至面颊称为 (); 若泪道狭窄或阻塞使泪液不能流入

鼻腔而流至面颊称为 ()。

2·20 淋菌性结膜炎为淋球菌感染所致，成年人淋菌性结膜炎病菌多来自 () 分泌物，而初生儿则多来自 () 分泌物。

2·21 沙眼的病原体是 ()，沙眼炎症活动期的基本表现是 ()、()、()、()。

2·22 巩膜葡萄肿以其部位的不同可分为 ()、()、() 三种，() 又可分为 () 及 ()。

✓ 2·23 葡萄膜炎内源性的病因常见的有 ()、()、()、()、()。

2·24 急性虹膜睫状体炎的主要体征是 ()、()、()、()。

2·25 外伤性白内障计有 ()、()、()、()。

2·26 无晶状体眼的特征是 ()、()、()、()、()、()。

2·27 急性闭角青光眼发作后的三联征是 ()、()、()。

✓ 2·28 房水流畅系数(C)正常值 ()，病理值 ()。

2·29 视神经盘与杯状凹陷的比例称 () 比。

✓ 2·30 白内障膨胀期引起的继发青光眼处理是 ()。

2·31 中心性视网膜炎的屈光表现为暂时性 ()。

2·32 糖尿病性视网膜病变从眼底改变方面可分为下列两型：()、()。

2·33 糖尿病性视网膜病变的眼底改变如下：()、()、()、()、()。

2·34 视网膜脱离是指 () 与 () 发生分离。

2•35 垂体肿瘤时常见的视野改变为()偏盲。

2•36 玻璃体内寄生虫有()、()、()、()。

2•37 搏动性突眼是()破裂,与()相沟通而形成一种特殊的突眼状态。

2•38 海绵窦血栓可由一侧发展到另一侧,()是其特有的体征。

2•39 在无调节的状态下能看清最远的一点称()。

2•40 平行光线进入眼内聚焦于视网膜之上为();平行光线进入眼内聚焦于视网膜之前为();平行光线进入眼内聚焦于视网膜之后为()。

2•41 远视眼用()镜片矫正;近视眼用()镜片矫正。

2•42 主觉验光时,在使病人获得最好视力的条件下,近视眼应取最()度数,远视眼应取最()度数。

2•43 上斜肌收缩可使眼球()转、()转、()旋。

2•44 临床上根据弱视原因可分为五类:()、()、()、()、()。

2•45 斜视检查时应用角膜光点反映法,若灯光在角膜上反光的位置相当于瞳孔缘时,斜视度为(),位于瞳孔缘与角膜缘中间时为(),位于角膜缘处时为()。

2•46 内斜视病人向上注视时,其内斜程度大于向下注视 10° 以上时称(),向下注视内斜程度大于向上注视 15° 时称();外斜视病人向上注视时,其内斜程度大于向下注视 15° 时称(),向下注视外斜程度大于向上注视 10° 时称()。

√2.47 穿孔性眼外伤的主要临床表现是()、()、()、()。

√2.48 颞动脉炎的眼部表现为()、()、()、()、()。

2.49 重症肌无力的眼部表现为()、()、()、()。

2.50 常用的散瞳药物有()、()、()；缩瞳药物有()、()。

第三章 是非题(3.1~3.50)

(正确者在括号内填“√”，错误者填“×”)

3.1 眼球的重量约 7.5 克。()

3.2 眼球的容积约 7.5 毫升。()

3.3 眼球的矢状轴约 24 毫米。()

3.4 视网膜锥细胞能感受弱光。()

3.5 六条眼外肌均起自眶尖部。()

3.6 中心视力最敏锐的部位是视神经乳头。()

3.7 在波长 3900~7600 埃 (Å) 的可见光谱中，正常人能辨别 120~180 种不同波长的色调。(√)

3.8 正常两眼球突出度差异不应超过 3 毫米。()

3.9 杆细胞外节内有视紫红质，它是由维生素 A 转变来的视黄醛和视蛋白相结合而成。()

3.10 视近处时瞳孔缩小，与调节和辐辏作用同时发生。()

3.11 正常视网膜动静脉血管比例是 A:V 等于 1:2。

()

3•12 ERG是表示视网膜的静止电位。(X)

3•13 眦部睑缘炎是由 Morax-Axenfeed 氏双杆菌所引起。()

3•14 结膜炎病情严重者可 10~30 分钟滴眼一次。
(V)

3•15 我国现在将沙眼分为二期。()

3•16 国际文献上把沙眼通常分为三期。(V)

3•17 流行性出血性结膜炎是由一种微小的 DNA 病毒感染引起。()

3•18 翼状胬肉手术易复发，如果翼状胬肉体薄、不充血、头部纤维化、进入角膜 2 毫米，可考虑不手术。()

3•19 角膜溃疡痊愈后，在角膜面遗留透明的凹陷称为角膜小面。()

3•20 角膜软化症多发生于 5 岁以下的儿童。(V)

3•21 三硝基甲苯中毒常引起完全性白内障。()

3•22 强的松每日用量大于 10 毫克，用药一年以上易引起白内障。(V)

3•23 对青光眼可疑者，如测量眼压未超过正常标准时，就可除外青光眼。(V)

3•24 0.1~1.5% 噻吗心安溶液滴眼治疗青光眼，每日三次。(V)

3•25 C 值如在 0.19 以下则肯定为病理状态。()

3•26 青光眼睫状体炎综合征的眼压升高可能与前列腺素有关。(V)

3•27 虹膜睫状体炎继发青光眼的局部治疗是散瞳。
()

3•28 瞳孔缩小、对光反应迟钝或消失时就可诊断为虹膜睫状体炎。()

3•29 交感性眼炎是与自身免疫有关的一种迟发型自体免疫性疾病。()

3•30 视网膜中央动脉栓塞时，压迫眼球可见视网膜动脉搏动。()

3•31 视盘充血、边缘模糊、视力不良就可诊断为视乳头炎。()

3•32 找不到足以解释视力障碍的眼内外体征者，就可诊为球后视神经炎。()

3•33 视乳头水肿时可发生一过性黑蒙。()

3•34 检眼镜下视盘苍白时就可诊断为视神经萎缩。()

3•35 矫正近视应该给予最高度数能被接受的凹镜片。()

3•36 角膜垂直子午线的曲率大于水平子午线的曲率称逆规性散光。()

3•37 下列配镜处方为混合散光：

-2.00 球 $\odot$ +1.00 柱 $\times 90^\circ$ ()

3•38 检影镜检查时出现顺动光影，该眼的屈光状态可能为正视、-1.00 以内的近视或远视。()

✓ 3•39 外直肌肌腱止于距角膜外侧缘 6.5 毫米处的巩膜上。()

3•40 Maddox 氏杆是用数个小圆柱玻璃棒并列组成的一镜片。()

✓ 3•41 婴儿在生后 4 个月内由于练习集合功能而出现间歇性内斜。()

- 3•42 增视疗法是治疗器质性弱视的一种疗法。()
- 3•43 外直肌麻痹可引起交叉复像。(X)
- 3•44 眼睑皮样囊肿表面光滑、边界清楚、不与皮肤粘连，但常与骨膜愈着。(✓)
- 3•45 泪腺混合瘤病人多数为老年人。()
- 3•46 视网膜母细胞瘤一般累及单眼，约有30%病人可先后或同时双眼罹病。(X)
- 3•47 神经性毒剂中毒时，眼部表现为瞳孔散大。(X)
- 3•48 动眼神经麻痹出现上睑下垂。(✓)
- 3•49 世界卫生组织1973年制定的国际疾病分类法，将视力障碍分为3级。(X)
- 3•50 世界卫生组织规定的盲标准为经最佳矫正后的视力 ≥ 0.02 。(X)

第四章 选择题(4•1~4•50)

答题说明 每一道考题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案，在选题时，只准从中选择一个最合适的答案，并在答卷上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确回答。

4•1 维持正常眼内压的房水产生于

- | | |
|-------|-------|
| A、虹膜 | D、晶状体 |
| B、脉络膜 | E、玻璃体 |
| C、睫状体 | |

4•2 下列哪种情况能加速房水自前房角排出

- A、睫状肌的纵形纤维收缩
- B、睫状肌的放射状纤维收缩

C、睫状肌的环形纤维收缩

D、睫状肌的纵形纤维舒张

E、睫状肌的环形纤维舒张

4•3 组织学上视网膜分为 10 层，杆细胞和锥细胞的细胞核位于

A、色素上皮层

VD、外颗粒层

B、杆细胞、锥细胞层

E、内颗粒层

C、外丛状层

4•4 人一生中晶状体纤维不断增生，新的晶状体纤维是由

A、晶状体囊分泌而来

☒ B、赤道部上皮细胞增生所致

C、老的晶状体纤维分裂所致

D、晶状体核产生

E、后囊下上皮细胞增生所致

4•5 下斜肌的作用是

☒ A、外转、内旋、上转

D、下转、内旋、外转

☒ B、外旋、上转、外转

E、下转、外旋、外转

C、内旋、内转、上转

4•6 正常周边视野按下列颜色顺序依次减小

☒ A、白、蓝、红、绿

D、白、红、蓝、绿

B、白、红、蓝、绿

E、白、蓝、绿、红

C、白、绿、红、蓝

4•7 生理盲点是一个

☒ A、虚性绝对性暗点

D、实性比较性暗点

B、实性绝对性暗点

E、中心虚性暗点

C、虚性比较性暗点