

陳存仁編校

皇漢醫學叢書

伊豫專安著

中國藥物學大綱

上海中醫學院出版社

EV45/3004
0504

中國藥物學大綱

提 要

本書日本伊豫專安氏遺著。松岡玄遠氏所鑑定也。彼以本草綱目。網羅古今。纖介不遺。可謂大成。惟其卷帙浩繁。苦於檢閱。爰摘其要。參以己意。俾華文簡義明。而便約籠檢考。故原書名爲袖珍本草傳也。全書羅列一百數十餘品之緊要藥品。每品之下。首爲釋名。次集解。次選用。次修治。次氣味。次夏毒。次主治。其體例一如綱目而少異。未附補正二十五品。實爲研究漢藥之綱要。

中國藥物學大綱目錄

甘草	一	前胡	一五
黃耆	一	防風	一五
人參	二	獨活	一六
沙參	四	升麻	一七
桔梗	五	苦參	一八
萎蕤	六	白蘚皮	一八
黃精	七	延胡索	一九
知母	七	貝母	一九
天麻	七	茅根	二〇
白朮	八	龍膽	二〇
蒼朮	九	細辛	二一
遠志	〇	當歸	二二
玄參	〇	川芎	二三
地榆	一	黨本	二四
紫草	二	白芷	二四
黃連	二	芍藥	二五
胡黃連	三	牡丹皮	二六
黃芩	三	木香	二七
柴胡	四	良薑	二七

草豆蔻	一八	旋覆花	三九
白豆蔻	一八	紅花	四〇
縮砂	一九	大薊小薊	四〇
益智	一九	牛蒡子	四一
肉豆蔻	二〇	麻黃	四一
補骨脂	二〇	木賊	四二
薑黃	三一	燈心草	四二
鬱金	三一	生熟地黃	四三
菝葜	三一	牛膝	四四
三稜	三一	紫苑	四五
香附子	三三	麥門冬	四五
麝香	三三	款冬花	四六
澤蘭	三四	瞿麥	四六
香薷	三五	葶藶	四七
荊芥	三五	車前子	四八
薄荷	三六	連翹	四八
紫蘇	三六	蒺藜	四九
菊花	三七	海金沙	四九
茵陳	三七	大黃	五〇
益母草	三八	常山	五〇
夏枯草	三九	附子	五一

川烏頭	五二	生薑	六四
白附子	五二	乾薑	六四
天南星	五三	茴香	六五
半夏	五三	山藥	六五
五味子	五四	薏苡仁	六六
栝樓仁	五五	黃蘗	六六
天花粉	五五	厚朴	六七
葛根	五五	杜仲	六八
天門冬	五六	訶子	六八
何首烏	五七	杏仁	六九
土茯苓	五八	烏梅	六九
威靈仙	五八	桃仁	七〇
防己	五九	大棗	七〇
木通	五九	木瓜	七一
釣藤鈎	六〇	山萆	七一
忍冬	六〇	陳皮	七二
澤瀉	六一	青皮	七二
菖蒲	六一	龍眼肉	七三
白扁豆	六二	檳榔	七三
神麩	六三	大腹皮	七四
麥芽	六三	吳茱萸	七四

蓮肉	七五
肉桂	七五
沉香	七六
丁香	七七
烏藥	七七
桑白皮	七八
枳實	七八
枳殼	七九
山梔子	七九
酸棗仁	八〇
山茱萸	八〇
地骨皮	八一
蔓荊子	八一
茯苓	八二
豬苓	八二
桑寄生	八三
竹茹	八三
竹瀝	八三
蠶蠶	八四
全蠍	八四
蟬蛻	八五

阿膠	八五
犀角	八六
鹿茸	八六
石膏	八七
滑石	八七
芒硝	八八
人中白	八八
童便	八九
補正	一一二

中國藥物學大綱

伊豫專安氏著

甘草 本經上品

【釋名】根因味甘甜。遂名「蜜甘」。『蜜草』。『蜜有沉香之一名。謂其氣味如蜜。此草最爲衆藥之王。猶如香中有沉香。』『路草』。『靈通』。『偷蜜』。『珊瑚』。『太嫩』。『笑草』。以上名義未詳。國老。國老卽帝師之稱。雖非君而爲君所宗。

【各方記述】甘草枝葉。悉如槐。高五六尺。但葉端微尖而殘。似有白毛。結角子。扁如小豆極堅。齒嚼不破。〔略文〕○今出山西省。汾州府。及南京省。廬州府。福州府。可共用。一種有稱阿蘭陀及朝鮮者。皆不堪用。○延喜式載常陸。陸奥。出羽三國獻之。近世自甲斐出。與唐來者不少異。吾聞之。出甲斐者。葉如藤。而尖有毛。

【辨別道地】今藥肆所稱。暨鞭者。長大也。稱中鞭者。中細也。稱切込者。短也。稱夏姜樣者。揀餘之麁者也。稱薑甘草者。細小曲弦者也。時珍曰。大徑寸而結緊。斷文者爲佳。謂之粉草。選其壯大皮薄。色黃者。堅實緊。

文者爲上。是藥肆所謂暨鞭也。

【修治】刮去麁皮剉用。製法頗多。宜從本方。生寒。炙溫。補中宜炙用。瀉火宜生用。指節頭三者皆生用。

【氣味】甘平無毒。

【功用】氣薄味厚。升而浮陽也。入足太陰厥陰經。通入手足十二經。白朮苦參乾漆爲使。惡遠志。反大戟芫花甘遂海藻。忌猪肉。中滿嘔家酒家。諸濕脹滿。咸不宜服。『梘』止莖中澀瘡。『節』主癰疽。消腫導毒。【主治】五藏六府寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉。倍氣力。金瘡腫。〔腫也〕解毒。溫中下氣。煩滿短氣。傷臑。咳嗽。止渴。通經脈。利血氣。解百藥毒。安和七十二種石。一千二百種草。主腹中冷痛。除腹脹滿。補益五藏腎氣。內傷。婦人血慙腰痛。凡虛而多熱者用之。解小兒胎毒。驚癇。降火止痛。

黃耆 本經上品

在五參色黃屬土而補脾胃。生陰血故名之。『人銜』銜乃獲字之訛也。『鬼蓋』此草背陽向陰故云。『神草』下有人參。上有紫氣。又曰掃光星散爲人參。土積地精。得地之精靈故有此名。『海腴』。『鐵面還丹』。二名未詳。或曰日本邦產人參之地。深山陰谷。雖夏亦陰。冷氣甚而蚊蚋可以遁去故名。未知是否。『各方記述』人參生上黨山谷及遼東。上黨在冀州西南。今來者形長而黃。狀如防風。多潤實而甘。俗乃重百濟者。形細而堅白。氣味薄於上黨者。次用高麗。卽是遼東。形大而虛軟。不及百濟。并不及上黨者。其草一莖直上。四五相對。花紫色。高麗人作人參讚云。三極五葉。背陽向陰。欲來求我。椶樹相尋。或云。椶。我邦謂登知者。未詳。○松岡先生曰。今人參。以朝鮮產爲上。中夏次之。其中好惡真僞。互有之。形小而堅。色帶黃褐。嘗試之。有餘味者。最爲上。近來有判事手。此又有真僞。真判事。今無之。唐參中。以肥大而蠟色者充之。是女直參。近來稱唐參者。非韓參。而多是女直參也。此種今多渡日本。雜韓參以貨之。當審擇。○和產『小人參』始出自薩摩州。今處處有之。三極五葉。四五月有花。細小紫白色。結子生青熟紅。根橫生。狀如竹節。其味太苦者多。甘者少。以甘者用之。其類嚼

之。甘苦氣味微與人參相近。又名『三枝五葉草』。苗葉花狀。雖與圖經之說相合。根形不同。浸煎甘草湯。以代人參用之。稱『蔓人參』者。羊乳根。而蔓生。花如鈴鐸。乃沙參類也。近來種防葵。以爲人參。攝州『平野人參』是也。稱『節人參者』。三七草根也。藝州有稱『山人參』者。真防風也。豫州稱『日振人參』。亦防風類而粗大也。近來有稱『蠻人參』者。出于東國。是亦小人參之類。而形狀長大於小人參也。稱『參葉』者。近年從朝鮮來。乃人參莖葉也。予屢用試之。其氣烈。其味苦。有肺熱者。用之。猶有效。甚勝於砂參。而亦實非補大虛者。用者審之。『服人參』。本草所謂湯參。近來有『切人參』者。亦此類也。

【辨別道地】選要肥大。塊如鷄臍。併似人形。黃色者。乃藥鋪稱蝦蟆者也。連皮者。黃潤色如防風。去皮者。堅白如粉。其似人形者。謂之孩兒參。尤多實僞。市之貨者。隨品立名。曰土佐。向單股好人參也。延喜式載人參。古既有之。今所用之。和人參。將用沙參。數。不可知焉。

【修治】去蘆頭用之。凡生用宜咬咀。熟用宜隔紙焙之。浸水少焙。則柔軟而易剉。或醇酒潤透焙熟。用宜從

本方。雖足鐵器。不必在忌列。參類見風日則易蛙。惟納瓦罐。雜細辛密封。可留經年不壞。

【氣味】甘微苦溫。無毒。

【功用】氣味俱薄。浮而升。陽中之陽。又曰陽中微陰。入手太陰經。與藜蘆相反。茯苓馬蘭爲之使。惡溲瀉。鹵鹹。畏五靈脂。惡皂莢黑豆。動紫石英。得升麻補上焦之元氣。得麥門冬則生脈。得乾姜則補氣。得黃芪甘草除大熱。若血證驟起。肺脈獨實。脹證暴成。九候堅強。痧疹初發。斑點未彰。傷寒始作。邪熱昌熾。血熱妄行。諸痛。不可驟用。邪氣方銳。宜散不宜補故也。

【主治】補五藏安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目開心益智。療腸胃中冷。心腹鼓痛。胸脇逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脈。癥堅積。令人不忘。主五勞七傷。虛損瘦弱。止嘔噦。補五藏大府。保中守神。消胸中痰。治肺痿及癘疾。冷氣逆上。傷寒不下食。凡虛而多夢紛紛者加之。止煩燥酸水。消食開胃。治氣殺金石藥毒。治肺胃陽氣不足。肺氣虛促。短氣少氣。補中緩中。瀉心肺脾胃中火邪。止渴生津液。治男婦一切虛證。發熱自汗。眩暈頭痛。反胃吐食。痲痺滑瀉。久痢。小便頻數。淋瀝。勞倦。內傷。中風中暑。痿痺吐血。嗽血下血。血淋血崩。胎前產後諸病。『參蘆』苦溫。『主治』

吐。虛勞。痰飲。人弱者。以參蘆代瓜蒂。

沙參本經上品

【釋名】沙參白色。宜砂地。久服益氣。有參贊之功用。故名。『白參』白色名之。『知母』莖有白汁如乳。故名。『參乳』根多白汁。但人呼爲羊婆奶。『鈴兒草』象花形也。『虎鬚』說同上。『苦心』此物無心。而味不苦。不知其謂也。『文希』『讖笑』『志取』三名未詳。因地名亦異。逐一不載之。

【各方記述】所所山。原有之。二月生苗。葉如初生小麥。而圓扁不光。入九月抽莖高一二尺。莖上之葉。則尖長如枸杞葉。而小有細齒。秋月葉間開小紫花。長二三分。狀如鈴鐸。五出。白蕊亦有白花者。並結實。大如冬青實。中有細子。霜後苗枯。其根生砂地者。長尺餘。大一虎口。黃土地者。短而小。根莖皆有白汁。

【辨別道地】今謂釣鐘草者是也。其草亦有杏葉與竹葉之別。花有紫白二種。而花狀根形。氣味不異。所所砂地有之。而今藥鋪。不別沙參與薺芫。而混售之。今唐來者。束細長根。而爲團。其色黃。謂之鬆沙參。然與時珍取說不合。今濟亦用之。和產符合時珍說。則不爲不佳。用者審擇之。『羊乳』根狀如薺芫。而圓。大

小如拳。上有角節。折之有白汁。人取根當薺芩。味甘潤。實大勝於砂參。不得止則代用人參亦可。今藥鋪稱砂參者也。『薺芩』。『釋名』。『杏葉砂參』。根如砂參。而葉如杏葉。故呼之。『甜桔梗』。梗甜。葉如桔梗。故名之。○今按砂參薺芩。形狀相似。其說亦相混同。救荒野譜。既謂本草所載之杏葉砂參。則分明一種也。欲知其臧否。則繙諸本草。可以審擇之。而今不云云。

【修治】去頭剉用。或少焙用。

【氣味】淡甘微寒。無毒。

【功用】入手太陰。足厥陰經。惡防己。反藜蘆。藏府無實熱。肺虛寒客之作嗽者。勿服。

【主治】血結驚氣。除寒熱。補中益肺氣。療胸痺。心腹結熱邪氣。頭痛皮間邪熱。安五藏。久服利人。『牟乳』。

【主治】頭腫痛。益氣長肌肉。去皮肌浮風。疝氣下墜。治常欲眠。養肝氣。宜五藏風氣。補虛止驚煩。益心肺。並一切惡瘡疥癬。及身癢。排膿消腫毒。清肺火。治久欬肺痿。『薺芩』。『主治』解百藥毒。利肺氣。和中明目。止痛。主效嗽消渴。強中瘡毒。丁腫。砂參牟乳薺芩。一物別種。故功用亦有大同少異也。

桔梗。本經上品。

【釋名】桔。結也。梗。硬也。其文纏結如梗也。因名。『白藥』。『梗草』。『薺芩』。桔梗薺芩。乃一類有甜苦二種。故俗呼薺芩為甘桔梗也。

【各方記述】春生苗高尺餘。葉似杏葉而長橢。四葉相對而生。嫩時亦可煮食。夏開小花。紫藍色。頗似牽牛花。秋後結實。根如指大。黃白色。花有紫白單瓣者。宜用紫色單瓣者。

【辨別道地】凡使勿用木梗。真如桔梗。咬之只是腥澀。不堪用。根有細大。藥家謂小稱楊枝。樣以貴之。然不可拘泥之。應用大小。俱選堅實肥白者。

【修治】刮去浮皮。及尖。浸米泔水一夜。切片。微炒用。或以百合搗爛同浸一日。剉碎微焙用。○今按在藥肆者。欲其色白。以米泔浸暴乾數日。則其色潔白。浮皮亦隨去。醫家再浸米泔一夜。則恐氣味倍薄。用者審之。宜只去頭剉用。或微炒亦可。

【氣味】苦辛微溫。有小毒。○氣味有諸說。繆仲淳曰。觀其主諸病。應是辛苦甘平微溫無毒。

【功用】味厚氣輕。陽中之陰升也。入手太陰肺經氣分。及足少陰經。節皮為之使。長白及龍膽。忌猪肉。得牡蠣。遠志。療恚怒。得消石石膏。療傷寒。白粥解其葷味。風症鬱症肺症。皆不可缺。若病氣逆上。與以補下焦。

藥中勿用。病不屬肺者。亦不益。○時珍曰。伏砒。節皮。不知謂何物也。

【主治】胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴。幽幽驚恐悸氣。利五藏腸胃。補血氣。除寒熱風痺。溫中消穀。療喉咽痛。下蟲毒。治下痢。破血積氣。消聚痰涎。去肺熱。氣促嗽逆。除腹中冷痛。主中惡。及小兒驚癇。下一切氣。止霍亂轉筋。心腹脹痛。除邪辟瘟。破癥瘕。肺癰。養血排膿。補內漏。及喉痺。利竅。除肺部風熱。清利頭目。咽啞。胸膈滯氣。及痛。除鼻塞。治寒嘔。主口舌生瘡。赤目腫痛。

萎蕤 本經上品

【釋名】『女萎』苗葉類冬青。但冬青凌冬不萎。故得獲女貞之譽。『葇蕤』葇蕤草本葉垂之貌。此草多髮如冠纓下垂之綫。而有威儀。故以名之。『萎蕤』移萎音相近。『萎香』未詳。『熒』其葉光聲。而象竹。『玉竹』『地節』其根多節。故有此名。『烏文』

『蟲蟬』未詳。

【各方記述】處處山中有之。其根橫生。似黃精差小。黃白色。性柔多鬚。最難燥。其葉如竹。兩兩相值。亦可采根種之。極易繁也。嫩葉及根。並可煮淘食。茹。○黃精萎蕤相似。最難辨。黃精根如佛掌薯。葉青黃色。而長

萎蕤根長。莖亦如桃枝。葉短青白色。黃精葉尖。萎蕤葉如七。二種共劈根長二三寸栽種也。子復種之易繁生。

【辨別道地】肆中各地黃精黃精者是也。以肥潤而大為佳。○今按黃精萎蕤。性味功用。大抵相近。而萎蕤功為勝。然世人只知黃精之有功。而不知萎蕤之可用。况亦黃精不可用煎服。而今萎蕤代人參。故特舉之。而後黃精者也。

【修治】忌鐵。竹刀刮去節皮。蜜水浸蒸焙用。或微炒。或水浸飯上蒸透。或酒浸蒸透用。○今按此物。暴乾。經日難乾。甑上一蒸。當風日克乾。不失潤。而后洗剝。從本方製之。今售藥肆。亦酒浸蒸用而良。

【氣味】甘平無毒。

【功用】能升能降。陽中陰也。入手太陰足太陰厥陰少陰經。甘入脾。柔潤入腎。畏鹵鹹。土材曰滋。益陰精。與地黃同功。增長陽氣。與人參同力。潤而不滑。和而不一。偏。譬諸盛德人無往不利。穆仲淳曰。純而不駁。和而不偏。有益無損。故無簡謬。可謂知萎蕤者也。

【主治】主中風暴熱。不能動搖。跌筋結肉。諸不足。久服去面黑黧。好顏色。主潤澤。心腹結氣。虛熱濕毒。腰痛。室中寒。及目痛。皆爛煖出。時疾寒熱。內補不足。去虛

勞客熱。頭痛不安。補中益氣。除煩悶。止消渴。潤心肺。補五勞七傷。虛損腰脚疼痛。天行熱狂。服食無忌。主風溫自汗灼熱。及勞瘵寒熱。脾胃虛乏。男子小便頻數。失精。一切虛損。

黃精本經上品

【釋名】以其得坤土之精粹。故謂之黃精。

【各方記述】苗葉與蕤蕤相似。根如白菝。多生北方山中。大者苗高五六尺。根如拳。夏月開小白花。結子如藥粒。

【辨別道地】肆中稱生姜樣黃精者。真也。

【修治】洗淨後蒸。從巳至子。薄切暴乾用。

【氣味】甘平無毒。

【功用】忌梅實。

【主治】補中益氣。除風濕。安五藏。補五勞七傷。助筋骨。耐寒暑。益脾胃。潤心肺。補諸虛。填精髓。下三尸蟲。

知母本經上品

【釋名】補陰藥用之。以其能知血之母故名。『蜥母』宿根之旁。初生子根。狀如蜥蟲之狀故名。『連母』『蜆母』蜆音提。蜆訛爲提。『水母』『地參』『水

參』『蕤』音單。『苑落』音沉煩。『苦心』『兒草』諸名未詳。

【各方記述】葉如韭。花如韭。故一名韭。逢四月開青花。八月結實。

【辨別道地】和漢俱皆真。擇其黃色有毛。似菑陽而肥。潤用之。腐者不可用。

【修治】須以竹刀去毛剝。勿令犯鐵器。損腎。引經上行。用酒浸焙。下行鹽水潤焙。久炒如褐色。

【氣味】辛苦寒無毒。

【功用】氣味俱厚。沉而降陰也。陰中微陽。入足陽明手太陰經氣分。得黃柏及酒夏。能伏鹽及蓬砂。陽痿及易舉易痿。洩瀉脾弱。飲食不消化。胃虛不思食。腎虛澆洩等證。法並禁用。

【主治】消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足。益氣。療傷寒久瘧。煩熱。脇下邪氣。膈中惡。及風汗內疽。心煩燥悶。骨熱勞往來。產後羸勞。腎氣勞。憎寒虛煩熱。勞傷尸注病。通小腸。消痰止咳。潤心肺。安心止驚悸。涼心去熱。治陽明火熱。瀉膀胱。腎經火熱。厥頭痛。下痢腰痛。喉中腥臭。瀉肺火。滋腎水。治命門相火有餘。安胎止子煩。

天麻宋開寶

【釋名】以形名。形如黃瓜。味辛而辣。故呼為瓜天麻。『赤箭芝』。芝類莖如箭幹赤色。葉生莖端。遠見箭有羽故名之。『獨搖芝』。有風不動。無風自搖。『定風草』。二名以性異而名。『離母』。『合離草』。二名以根異而名。『神草』。『鬼督郵』。以功而名。

【各方記述】葉如芍藥而小。當中抽一莖直上如箭幹。莖端結實。狀若纒隨子。其根連一二十枚。猶如天門冬百部之類。四月開花。○今考中華產有葉。見和產一莖一花。如葱花。而無枝葉。餘皆相同。和產出良州。他處未聞有之。

【辨別道地】和漢可俱用。破開明亮堅實者佳。

【修治】濕紙包於糠火中煨熟。取出切片。酒浸焙用。

【氣味】甘辛平。無毒。

【功用】苦平。陰中之陽也。入足厥陰太陽經。風藥多燥。風能勝濕故也。凡病人覺津液衰少。口乾舌燥。咽乾為瘡。大便閉滯。病火上頭暈。血虛頭痛及南方似中風。皆禁用之。

【主治】消癰腫。下支漏。寒疝下血。諸風濕痺。四肢拘攣。小兒風癩驚氣。利腰膝。強筋力。治冷氣瘡痺。攤緩不隨。語多恍惚。善驚失心。助陽氣。通血脈。治風虛眩暈頭痛。

白朮本經上品

【釋名】有白朮。赤朮。故以名分之。朮字篆文象其根幹枝葉之形。『山薊』。其葉似薊。而味似姜芥。一名山芥。一名天薊。『揚袍』。揚州多種白朮。其狀如鼓袍。故有揚袍抱薊之名。『馬薊』。馬者以大名乎。『山姜』。以形味而名。『山連』。未詳。『吃力伽』。西域名之。

【各方記述】朮有兩種。白朮。梢大有毛。而無根。甜而少膏。可作丸散用。赤朮。葉細無根。根小苦。多膏。可作煎用。春生苗。青色無根。莖作蒿幹狀。青赤色。長二三尺。以來。夏開花紫碧色。亦似刺薊花。或有黃白色者。入伏後。結子。至秋而苗枯。根似姜。而旁有細根。皮黑心黃白色。中有膏液。○和邦稱白朮者。高一二尺。葉三葉。一朵似杏。而鋸齒。莖強直。四五月開青白花。形如夏枯草花狀。而中有子。是乃蒼朮也。

【辨別道地】和漢俱有之。而漢為真。今所饒者。合雲頭朮。鷄腿朮之說。最為上品。一種稱片白朮。川白朮者。性味功用稍劣之。和邦蒼白二朮。同一物。藥肆以老根為蒼朮。以嫩根為白朮。以售之。今醫家亦以老為白。以嫩為蒼而用之。俱皆不是。白朮可必用漢產和

產稱三好丸白朮者。乃蒼朮嫩根也。

【修治】浸米泔。去頭剉炒用。又土製。取陳壁土。或土器碎粉拌之炒過。篩去土而用之。其餘有蜜水姜汁乳汁之製。或曰白朮不必泔浸。煖胃炒用。其餘皆生用可也。

【氣味】苦甘辛溫。無毒。

【功用】味苦而甘。性溫味厚。氣薄。可升可降。陽中之陰也。入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰經。防風地榆爲使。忌桃李。菜。青魚。雀肉。癰疽毒。禁用。爲多生膿。白朮得中宮中和之氣。爲除風痺之上品。然脾虛無濕者。用之却致燥渴。津液。大抵陰虛燥渴。少血骨蒸。痰嗽哮喘。唇燥咽塞。便閉滯下。肝腎攻築。腹滿動氣者。切須忌之。

【主治】風寒濕痺。死肌瘰疽。止汗除熱。消食。主大風在。身面。風眩頭痛。目淚出。消痰水。逐皮膚間風水結腫。除心下急滿。霍亂吐下不止。利腰臍間血。益津液。暖胃消穀。嗜食。治心腹脹滿。腹中冷痛。胃虛下利。多年氣痢。除寒熱。止嘔逆。反胃。利小便。主五勞七傷。補腰膝。長肌肉。治冷氣痿痺。氣塊。婦人冷癥瘕。除濕益氣。和中補陽。消痰逐水。生津止渴。止瀉痢。消足脛濕腫。除胃熱肌熱。得枳實消痞滿氣分。佐黃芩安胎燻熱。

補肝風虛。主舌本強。食則嘔。胃脘痛。身體重。心下急痛。心下水痞。衝脈爲病。逆氣裏急。臍腹痛。

蒼朮

【釋名】其色蒼黑故名之。朮獨也。「赤朮」「山精」「仙精」朮者山之精也。服之令人長生。辟殺致神。仙。故有名「山薊」。說見白朮條下。「茅君」「黃髓」。茅。茅山也。朮以茅山爲好。君主也。實髓。笑稱也。【各方記述】和產所所有之。和以有蒼朮。而無白朮。而已形狀於白朮條下謂之者。乃是也。若強分二朮。則其根色白黃。而形如槌。味微苦甘而氣不烈者。可爲白朮也。其根如姜。色黑蒼而味苦辛氣烈者。可爲蒼朮也。予在東北西南諸州而親探之。屢致觀誤。謂有二朮。而今熟思。則不然。其色蒼白。其狀小大。其味厚薄。是皆土地。而雖有少異。俱下物也。強勿分二朮以用之。

【修治】製法。同白朮。蓋二朮留皮者。當以米泔水浸半日。去粗皮。肆售者。多削淨。不可水浸。更性味。凡用不拘州土。惟白爲勝。○或謂漢產多白。懲浸泔則雖脫亦生拙。按蒼朮生白者。非必懲。乃糟也。仲淳曰。真茅朮蒼朮。細而帶糖者也。不必脫去。而佳也。

【辨別道地】松岡先生曰。漢蒼朮氣烈多膏。不經製法。而卒爾用之。則發腹痛。宜克炒用。予亦屢試知之。製法。愈則發腹痛。用者勿忽。予每療雀眼。用漢蒼朮。多得效用。和產則少見效。不知漢產多膏。故潤之而奏驗者。歟。書以俟後日之案而已。

【氣味】辛烈苦溫。無毒。

【功用】甘而辛烈。性溫而燥。可升可降。陰。中陽也。入足太陽陽明手太陰陽明太陽之經。使忌同白朮。功用亦相似。但止發之間。少有異。蒼朮氣重。體沉。有雄壯上行之氣。故除上濕發汗之功最大。上能除濕。下安太陰。邪氣不傳入脾。若補中焦除濕力。大不及白朮。與白朮止汗時異。若無濕者。豈敢用哉。

【主治】風寒濕痺。死肌癰疽。作蒸餌。主頭痛。消痰水。逐皮間風水結腫。除心下結滯。及霍亂吐下不止。暖胃消穀嗜食。除惡氣。弭災疹。主大風瀉痺。心腹脹痛。水腫脹滿。除寒熱。上嘔逆。下泄冷痢。治筋骨軟弱。疥癬氣塊。婦人冷氣癥瘕。山嵐瘴氣。溫疾。明目。暖水藏。除濕發汗。健胃安脾。治痿散風。益氣。總解諸毒。濕痰留飲。或挾痰血成窠囊。脾濕下流。濁瀝帶下。滑瀉腸風。

遠志 本經上品

【釋名】服之能益智強志。故有之稱。『小草』莖葉青色。而極細小。故名之。『細草』細小同意。『棘菟』『蔓繞』『醒心枚』三名未詳。

【各方記述】和漢俱有之。俱皆真。和有。大葉小葉兩種。以小葉者為是。和產所所有之。其苗細莖。其葉細小。似黃楊。秋開細紫花。花鋪喚。癡者。乃是也。

【辨別道地】皮有皺肉者。良。

【修治】洗去土氣。以甘草湯浸一宿。去骨焙乾用。或浸薑汁。或浸酒。當隨本方忌鐵器。

【氣味】苦溫無毒。

【功用】陰中之陽。可升可降。腎經氣分藥也。入足少陰。畏珍珠。聚蘆。蠶。蟻。蟻。蟻。得茯苓。麥子。龍骨。良。心經有實火。為心家實熱。應用黃連。生地。黃者。禁與參朮等補陽氣藥同用。

【主治】欬逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智。慧。耳目聰明不忘。強志倍力。利丈夫。定心氣。止驚悸。益精。去心下膈氣。皮膚中熱。面目黃。殺天雄。附子。烏頭。毒。治健忘。安魂魄。令人不迷。堅壯陽道。長肌肉。助筋骨。婦人血噤失音。小兒客忤。腎積。奔豚。治一切癰疽。

女參 本經中品

【釋名】玄黑也。其莖微似人參。故名。『黑參』『玄臺』義同于上說。『鹿腸』『正馬』『逐馬』『鬼藏』以上四味未詳。『馥草』合香家用之。故呼之。『野脂麻』以形名。

【各方記述】二月生苗。葉似脂麻對生。又如槐柳而尖長。有鋸齒。細莖青紫色。七月開花。青碧色。八月結子。黑色。○恭曰。玄參根苗並臭。莖亦不似人參。未見合香。今按此說是也。

【辨別道地】和漢皆可用。選黑潤者用之。和產關東者。根最佳。諸州多有之。

【修治】用蒲草重重相隔蒸晒。勿犯銅器。犯之損人眼。喪人目。

【氣味】鹹苦無毒。

【功用】足少陰腎經。君藥也。惡黃耆乾姜大棗山茱萸。反藜蘆。血少目昏。停飲寒熱支滿。血虛腹痛。脾虛泄瀉。並不宜服。

【主治】腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。令人明目。暴中風傷寒。身熱支滿。狂邪。忽忽不知人。溫瘧酒洒血癥。下寒血。除胸中氣。下水止煩渴。散頸下核癰腫。心腹痛。堅癥。疔五藏熱風頭痛。傷寒勞復。治暴結熱。散瘤癭瘰癧。治遊風。補虛損。心驚煩躁。骨蒸傳尸。

邪氣。止健忘。消腫毒。滋陰降火。解斑毒。利咽喉。通小便血滯。

地榆本經中品

【釋名】其葉似榆而長。初生布地。故名。『玉豉』其花子紫黑色。如豉故名。『酸楮』其味酸。其色赭故名。

【各方記述】宿根三月內生苗。初生布地。獨莖直上。高三四尺。對分出葉。葉似榆葉。而稍狹細長。似鋸齒狀。青色。七月開花如椹。子紫黑色。根外黑裏紅。似柳根。

【辨別道地】用和產。近年花肆以荊釐稱和連茂加字。不可以名同誤用。

【修治】宜生用。見火無功。

【氣味】甘酸苦寒。無毒。

【功用】氣味俱薄。其體沉而降。陰中陽也。入足厥陰少陰手足陽明經。得髮夏。惡麥冬。伏丹砂雄黃硫黃。性寒而下行。凡脾胃虛寒。作泄白痢。久而胃弱。胎產虛寒。泄瀉。血崩。並禁服。

【主治】婦人乳產。瘡痛。七傷帶下五漏。止痛止汗。除惡肉。療金瘡。止膿血。諸癰惡瘡。熱瘡。補絕傷。產後內塞。可作金瘡膏。消酒除渴。明目。止冷熱痢。疔痢。止吐血。鼻衄。腸風。月經不止。血崩。產前後諸血症。芥水瀉。治