

2

高等医学院校毕业生 统考试题选答

《中级医刊》编辑部 编

人民卫生出版社

高等医学院校 毕业生统考试题选答

——我国部分高等医学院校医学专业
1982、1983 年应届毕业生业务统考试题、答案及题解

《中级医刊》编辑部 编

人民卫生出版社

**高等医学院校
毕业生统考试题选管**
《中级医刊》编辑部 编

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里 10 号)
北京通县印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 32开本 74印张 8 插页 171千字
1984年8月第1版 1984年8月第1版第1次印刷
印数: 00,001—110,000
统一书号: 14048·4829 定价: 1.10元
【科技新书目80—77】

编 者 的 话

本书是由《中级医刊》连载的我国 13 所高等医学院校医学专业 1982 年应届毕业生业务统考试题、答案与题解与我国 44 所高等医学院校医学专业 1983 年应届毕业生业务统考试题、答案与题解汇编而成的。考题范围涉及内、外、妇、儿、传染病科的专业知识及其有关基础知识。两次考试采用了当今国际上通用的“多选题”命题，具有以下特点：题量多，涉及知识面广，内容丰富，能较好而全面地了解学生掌握知识的广度和深度。本书不仅对在校学生的学习很有帮助，同时也是住院医师、基层医务人员，特别是广大中级医务人员准备参加医学专业晋升考试的一本很好的学习资料。本书 1982 年和 1983 年题解部分分别由武汉医学院和湖南医学院有关教师编写。

目 录

一、1982 年试题·····	1
二、1982 年试题、答案与题解·····	49
三、1983 年试题·····	124
四、1983 年试题、答案与题解·····	170
附：1982年试题附图·····	243
附：1983年试题附图·····	248

一、1982年试题

第一部分

[A 型 题]

A 型题答题说明：每一道考题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。在答题时，只许从中选择一个最合适的答案，并在答卷上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确回答。

试题 1 下列哪项检查对门脉性肝硬变的肝功能判断最有意义？

- A. 谷丙转氨酶
- B. 碱性磷酸酶
- C. 麝香草酚浊度
- ☒ D. BSP 潴留试验
- E. 白蛋白/球蛋白比值

试题 2 有机磷中毒应用阿托品治疗时，下述哪项是错误的？

- A. 用量应根据中毒程度适当掌握
- B. 重度中毒时必须早期给予足量
- C. 重度中毒时应静脉给药
- D. 达阿托品化后应立即停药
- E. 与胆碱酯酶复能剂合并用药时应减少阿托品用量。

试题 3 甲胎蛋白阳性时，对下列哪一疾病最有诊断意

义?

- A. 慢性活动性乙型肝炎
- B. 肝转移癌
- ☒ C. 原发性肝癌
- D. 原发性肝内胆管细胞癌
- E. 肝硬变

试题 4 与维生素 B_{12} 吸收有关的内因子是胃粘膜中哪种细胞产生的?

- ☒ A. 贲门腺
- B. 粘液细胞
- C. 主细胞
- D. 壁细胞
- E. G细胞

试题 5 洋地黄中毒的常见表现是:

- ☒ A. 心电图 ST-T 改变呈鱼钩状
- B. 心电图 Q-T 间期缩短
- C. 出现室性二联律
- D. 窦性心动过缓
- E. 出现奔马律

试题 6 诊断典型心绞痛, 下列哪项最具特征?

- A. 胸痛多在夜间发作
- B. 持续左前胸憋闷感
- C. 胸痛发作多在 15 分钟以上
- ☒ D. 含硝酸甘油 5 分钟内疼痛消失
- E. 疼痛时心电图示 ST 段上升

试题 7 诊断早期肺心病的主要依据是:

- A. 长期肺及支气管疾病史

- B. 发绀
- C. 两肺干湿罗音及肺气肿体征
- D. 肺动脉高压及右心室增大征象
- E. 高碳酸血症

试题 8 肺结核病化学药物治疗，判断疗效最重要的指标是：

- A. 病灶吸收好转
- B. 痰结核菌转为阴性
- C. 血沉恢复正常
- D. 结核菌素试验阴性
- E. 体温恢复正常，体重增加

试题 9 女性，26岁，右上浸润型肺结核空洞，痰结核菌阳性，初治宜选用：

- A. 异烟肼
- B. 待药物敏感试验后选用抗结核药物
- C. 手术治疗
- D. 异烟肼 + 链霉素 + 对氨基水杨酸
- E. 对氨基水杨酸 + 乙胺丁醇

试题 10 急性肺脓肿的最主要的临床表现是：

- A. 咳嗽，咯血
- B. 急起畏寒发热
- C. 剧烈胸痛
- D. 湿罗音及支气管呼吸音
- E. 以上都不是

试题 11 慢性肾小球肾炎（肾病型）与肾小球肾病的鉴别，下列哪项最有参考意义？

- A. 水肿程度

- B. 尿蛋白量
- C. 低蛋白血症
- D. 血胆固醇
- ☒ E. 肾功能

试题 12 中性粒细胞碱性磷酸酶的活性明显增高见于:

- A. 慢性粒细胞性白血病
- B. 急性淋巴细胞性白血病
- C. 类白血病反应
- D. 淋巴瘤
- ☒ E. 多发性骨髓瘤

试题 13 贫血伴轻度黄疸最可能的诊断是:

- A. 再生障碍性贫血
- B. 脾功能亢进
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- ☒ D. 溶血性贫血
- E. 急性白血病

试题 14 40 岁, 男, 体检发现尿糖(+), 根据下列哪一项检查即可诊断为糖尿病?

- A. 空腹血糖 120 毫克% (真糖法, 正常值 60~120 毫克%)
- B. 餐后一小时血糖 140 毫克% (正常人 <140 毫克%)
- ☒ C. 口服葡萄糖耐量试验呈耐量减低
- D. 血浆胰岛素为 6 微单位/毫升 (正常 5~24 微单位/毫升)
- E. 尿糖检查证实为葡萄糖

试题 15 对钩端螺旋体病的病原治疗应首选:

- ☒ A. 四环素

- B. 青霉素
- C. 氯霉素
- D. 链霉素
- E. 庆大霉素

试题 16 对流脑和乙脑，具有很大临床鉴别意义的是：

- A. 意识障碍的出现和程度
- B. 生理反射异常及出现病理反射
- C. 皮肤瘀点和瘀斑
- D. 发病季节
- E. 颅内压增高程度

试题 17 伤寒发病第一周内，阳性率最高的化验是：

- A. 大便培养
- B. 肥达氏反应
- C. 血培养
- D. 尿培养
- E. 补体结合试验

试题 18 患者突然发生面部歪斜，右侧额纹消失，右眼裂较左侧大，露齿口角偏向左侧，可能是：

- A. 右侧中枢性面瘫
- B. 左侧中枢性面瘫
- C. 右侧周围性面瘫
- D. 左侧周围性面瘫
- E. 双侧周围性面瘫

试题 19 用氯丙嗪治疗精神分裂症要：

- A. 一次大剂量
- B. 持续使用小剂量
- C. 开始小剂量，逐渐增至治疗量

- D. 断续应用
- E. 按需要不定期服用

试题 20 腰麻的绝对禁忌证为:

- A. 高烧
- B. 有普鲁卡因过敏史
- C. 血红蛋白 8 克%以下
- D. 高血压、心脏病
- E. 休克

试题 21 局麻药毒性最小的是:

- A. 1%普鲁卡因 100 毫升
- B. 2%普鲁卡因 50 毫升
- C. 0.5%普鲁卡因 200 毫升
- D. 2%利多卡因 30 毫升
- E. 0.33%地卡因 40 毫升

试题 22 中年妇女, 乳房肿块的分界不清, 月经来时乳房胀痛, 应首先考虑:

- A. 乳腺癌
- B. 乳房囊性增生病
- C. 乳管内乳头状瘤
- D. 湿疹样癌
- E. 乳房纤维腺瘤

试题 23 防止术后肺不张, 下列哪项是错误的?

- A. 术前锻炼深呼吸
- B. 急性上呼吸道感染病人应先控制感染
- C. 防止术后呕吐物吸入
- D. 及时用镇咳剂控制咳嗽
- E. 嗜烟者术前一周禁烟

试题 24 治疗下肢急性丹毒,应首选:

- A. 四环素
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 氨苄青霉素
- E. 青霉素

试题 25 容易引起急性肾功能衰竭的外伤是:

- A. 严重挤压伤
- B. 关节扭伤
- C. 创伤性窒息
- D. 严重裂伤
- E. 严重头皮撕脱伤

试题 26 脓性指头炎切开引流时最好采用:

- A. 侧面横切口
- B. 侧面纵切口
- C. 掌面横切口
- D. 掌面纵切口
- E. 鱼口形切口

试题 27 胃癌最主要的转移途径是:

- A. 直接蔓延
- B. 淋巴转移
- C. 血行转移
- D. 腹腔内种植
- E. 消化道转移

试题 28 混合痔是指:

- A. 痔与瘻同时存在
- B. 两个以上内痔

- C. 直肠上下静脉丛彼此相通所形成的痔
- D. 内痔和外痔分别在不同位置存在
- E. 内痔多发，遍布一周

试题 29 膝关节单纯滑膜结核的治疗除应用全身抗结核药物外，下列哪项为首选？

- A. 皮肤牵引
- B. 石膏固定
- C. 病灶清除
- D. 膝关节加压融合
- E. 关节穿刺抽脓，注入抗结核药物

试题 30 骨折的临床专有体征是：

- A. 压痛
- B. 肿胀
- C. 挫伤
- D. 骨擦音
- E. 功能障碍

试题 31 老年男性患者进行性排尿困难，最可能的原因是：

- A. 前列腺癌
- B. 前列腺增生
- C. 膀胱颈纤维性增生
- D. 膀胱结石
- E. 尿道狭窄

试题 32 单侧多根多处肋骨骨折急救的原则首先是：

- A. 肋间神经封闭
- B. 输血
- C. 局部加压包扎

D. 止痛

E. 气管切开

试题 33 防治脑水肿,当前应用最广且效果较好的脱水剂是:

A. 50%葡萄糖溶液

B. 20%甘露醇溶液

C. 25%山梨醇溶液

D. 30%尿素溶液

E. 浓缩血清白蛋白

试题 34 子宫内膜异位症最主要的临床特点是:

A. 腹痛于经期第1~2天,经血畅后缓解

B. 下腹两侧疼痛

C. 经期腹痛伴发热

D. 经期腹痛伴肛门坠胀感

E. 痛经继发性及进行性加重

试题 35 确诊早期宫颈癌,可依靠:

A. 白带多,性交后偶有出血

B. 阴道镜检查

C. 盆腔检查

D. 宫颈刮片细胞学检查

E. 宫颈活体组织病理切片检查

试题 36 阴道有大量脓性含泡沫的白带,最常见的疾病是:

A. 慢性宫颈炎

B. 子宫内膜炎

C. 输卵管炎

D. 滴虫性阴道炎

E. 霉菌性阴道炎

试题 37 具备下列哪项情况，分娩时方可“试产”？

- A. 头位，骨盆入口轻度狭窄
- B. 头位，中骨盆狭窄
- C. 头位，骨盆出口狭窄
- D. 臀位，骨盆入口轻度狭窄
- E. 臀位，骨盆出口轻度狭窄

试题 38 关于临产后宫缩的特点，下列哪一项叙述是错误的？

- A. 有节律的阵发性收缩，由弱到强
- B. 自子宫两角开始，先向宫底中部集中，再向下扩展
- C. 底部最强，下段最弱
- D. 体部肌纤维收缩变短变宽，松弛时恢复原状
- E. 宫缩高峰时子宫体变硬

试题 39 新生儿败血症的特点：

- A. 高烧
- B. 白细胞总数增高
- C. 皮肤有伤口
- D. 有胎内、产道感染史
- E. 缺乏特异症状

试题 40 小儿肺炎并心力衰竭时应：

- A. 立即静脉注入 10% 葡萄糖
- B. 立即静脉注入酚妥拉明
- C. 立即静脉注入地塞米松
- D. 立即肌肉或静脉注入西地兰
- E. 立即肌肉注射地高辛

试题 41 4:3:2 (2/3张) 混合液的组成是：

A. 4份10%葡萄糖, 3份生理盐水, 2份1.4%碳酸氢钠

B. 4份生理盐水, 3份10%葡萄糖, 2份5%碳酸氢钠

C. 4份5%葡萄糖, 3份生理盐水, 2份5%碳酸氢钠

D. 4份生理盐水, 3份5%葡萄糖盐水, 2份11.2%乳酸钠

E. 4份生理盐水, 3份5%葡萄糖, 2份1.4%碳酸氢钠

试题 42 室间隔缺损时血液动力学的改变首先引起:

A. 右心室增大

B. 左心室增大

C. 左心房扩大

D. 主动脉扩张

E. 肺动脉扩张

试题 43 正常小儿喂养:

A. 1~2个月加辅食, 10~12个月断奶

B. 1~2个月加辅食, 2~2½岁断奶

C. 3~4个月加辅食, 1~1½岁断奶

D. 3~4个月加辅食, 2~2½岁断奶

E. 半岁左右加辅食, 1岁左右断奶

试题 44 女, 42岁, 十年前患急性肝炎, 并患有慢性肝病三年, 肝脏活体组织检查结果见第243页附图, 诊断是:

A. 慢性活动性肝炎

B. 慢性迁延型肝炎

C. 结节性肝硬化

D. 胆汁性肝硬化

E. 原发性肝癌

试题 45 男性, 45岁, 右胁痛三月, 微热, 巩膜轻度

黄染，肝于吸气时肋下 1 厘米，质地中等，未扪及结节，右膈外侧略抬高，肝扫描见第 243 页附图，超声波未发现液平段，HBsAg(+)，甲种胎儿蛋白 400 毫克/100 毫升血清，最可能的诊断是：

- A. 乙型肝炎
- B. 肝硬变
- C. 阿米巴肝脓肿
- D. 原发性肝癌
- E. 淤胆性肝大

试题 46 男性，34 岁，患风湿性心脏病，心电图见第 243 页附图，诊断是：

- A. 阵发性房性心动过速，伴房室传导阻滞
- B. 非阵发性心动过速
- C. 预激综合征 (WPW 综合征)
- D. 心房颤动
- E. 心房扑动

试题 47 男性，25 岁，主诉劳累后心悸、气短已数年，近来症状加重，X 线胸片见第 244 页附图，应首先考虑：

- A. 冠心病
- B. 慢性肺原性心脏病
- C. 风湿性心脏病，主动脉瓣关闭不全
- D. 原发性心肌病
- E. 心包积液

试题 48 男性，30 岁，以往健康，突然寒战，高热，咳嗽，胸痛，粘液脓痰。次日症状加重，气促，烦躁，神志模糊，四肢厥冷，出汗，指端发绀，心率 120 次/分，血压 80/50 毫米汞柱。最可能的诊断为：