

段富津 李飞 康广盛 编著

金匱要略方義

黑龙江科学技术出版社

金匱要略方義

JINGUIYAOLIAOFANGYI

段富津 李 飞 康广盛 编著

黑龙江科学技术出版社

一九八四年·哈尔滨

责任编辑：于葆琳

封面设计：晓白

金 匱 要 略 方 义

段富津 李 飞 康广盛 编著

黑龙江科学技术出版社出版

(哈尔滨市南岗区分部街28号)

佳木斯印刷厂印刷·黑龙江省新华书店发行

开本787×1092毫米1/32·印张12.75·字数275千

1984年8月第一版·1984年8月第一次印刷

印数：1—11,200

书号：14217·075 定价：1.40元

内 容 提 要

《金匱要略》是祖国医学中著名的古典医籍，其中绝大多数方剂用药精专，法度严谨，疗效卓著，为历代医家所赞颂。惟原书词简理奥，对组方意义未作论述，药物用量亦与今大异，致使学者不易理解，难以运用。本书对《金匱要略》中175首方剂(除外附方、食疗方、禽兽虫鱼禁忌、果实菜谷禁忌方)，逐方诠释义，在引证历代注述的基础上，系统地分析了各方的组成原理，配伍意义，功能主治及其适应证等，并通过部分医案选录、临床报道以及实验研究，进一步说明在现代临床中的实用价值，以便古为今用。

本书可供学习中医者阅读，亦可供临床与研究《金匱要略》、方剂学参考。

前 言

东汉末年著名医学家张仲景所撰《金匱要略》一书，是祖国医学现存书籍中，最早将理、法、方、药汇成一体的古典医籍，是集汉代以前及张氏本人治疗杂病经验之大成。其高深的学识理论与丰富的治疗经验，在千余年来的医疗实践中，一直起着积极地指导作用。书中所载诸方，绝大多数用药精专，法度严谨，疗效卓著，为历代医家所赞颂，誉称“群方之祖”。但因原文古奥，义理深邃，加之历代注述纷纭，使学者不易理解，难以运用，以致许多宝贵之方，未能充分发挥其应有的作用。另外，对于研究《金匱要略》来说，由于原书中许多条文对病因病机的阐述极略，常须通过方药分析，与之相互印证，始得要旨。有感于此，我们撰写了这本《金匱要略方义》。

本书以《金匱要略方论》(明·赵开美校刻本)为蓝本，按着原书章节顺序，将每首方剂分为组成、用法、原方主治、历代论述、方义分析、临证应用、现用剂量等项编写。其中组成与用法二项，照原书抄录，以存原貌；原方主治，除抄录金匱该方条文外，还部分地选录了《伤寒论》中有关条文，以助于对该方的理解；历代论述，摘录历代医家具有代表性的注述2~4则，以期开阔学术视野，启迪思维；方义分析，结合证治机理，着重阐述组方原则、配伍意义、功能主治等，并对其相近方剂加以鉴别比较；临证应用，在原方主治的基础上，结合历代临床经验，列举了该方的适应证候以及一般加减方法；现用剂量，据原方配伍原则，参照现代用

药情况，拟定常用剂量，以做临床处方之参考。其计量单位，一律采用米制“克”（大枣仍以“枚”计）。此外，多数方剂附有医案选录，部分方剂录有临床报道或实验研究，此三项意在进一步说明金匱诸方在现代临床医疗实践中的实用价值，以便古为今用。

本书在编写中，力求做到观点明确，说理清楚，言之有据，论之成理。但由于学识所限，对仲景学说理解欠深，不当之处，在所难免，诚望读者批评指正。

目 录

1. 栝蒌桂枝汤·····	1
2. 葛根汤·····	3
3. 大承气汤·····	6
4. 麻黄加术汤·····	11
5. 麻黄杏仁薏苡甘草汤·····	13
6. 防己黄芪汤·····	16
7. 桂枝附子汤·····	18
8. 白术附子汤·····	20
9. 甘草附子汤·····	22
10. 白虎加人参汤·····	24
11. 一物瓜蒂汤·····	28
12. 百合知母汤·····	30
13. 滑石代赭汤·····	32
14. 百合鸡子汤·····	33
15. 百合地黄汤·····	35
16. 百合洗方·····	37
17. 栝蒌牡蛎散·····	38
18. 百合滑石散·····	40
19. 甘草泻心汤·····	42
20. 苦参汤·····	45
21. 雄黄熏法·····	47
22. 赤豆当归散·····	48
23. 升麻鳖甲汤·····	50

24. 鳖甲煎丸	53
25. 白虎加桂枝汤	56
26. 蜀漆散	85
27. 侯氏黑散	60
28. 风引汤	62
29. 防己地黄汤	65
30. 头风摩散	67
31. 桂枝芍药知母汤	68
32. 乌头汤	71
33. 矾石汤	74
34. 黄芪桂枝五物汤	75
35. 桂枝加龙骨牡蛎汤	78
36. 天雄散	81
37. 小建中汤	82
38. 黄芪建中汤	85
39. 肾气丸	87
40. 薯蓣丸	91
41. 酸枣汤	93
42. 大黄蛰虫丸	95
43. 甘草干姜汤	98
44. 射干麻黄汤	101
45. 皂荚丸	103
46. 厚朴麻黄汤	104
47. 泽漆汤	107
48. 麦门冬汤	109
49. 葶苈大枣泻肺汤	112
50. 桔梗汤	114

51. 越婢加半夏汤	116
52. 小青龙加石膏汤	118
53. 奔豚汤	121
54. 桂枝加桂汤	124
55. 茯苓桂枝甘草大枣汤	126
56. 栝蒌薤白白酒汤	128
57. 栝蒌薤白半夏汤	130
58. 枳实薤白桂枝汤	132
59. 人参汤	134
60. 茯苓杏仁甘草汤	136
61. 橘枳姜汤	138
62. 薏苡附子散	140
63. 桂枝生姜枳实汤	142
64. 赤石脂丸	144
65. 厚朴七物汤	147
66. 附子粳米汤	149
67. 厚朴三物汤	151
68. 大柴胡汤	153
69. 大建中汤	156
70. 大黄附子汤	158
71. 赤 丸	160
72. 乌头煎	162
73. 当归生姜羊肉汤	163
74. 乌头桂枝汤	165
75. 麻子仁丸	167
76. 甘草干姜茯苓白术汤	170
77. 苓桂术甘汤	172

78. 甘遂半夏汤	174
79. 十枣汤	177
80. 大青龙汤	181
81. 小青龙汤	184
82. 木防己汤	187
83. 木防己加茯苓芒硝汤	189
84. 泽泻汤	191
85. 厚朴大黄汤	193
86. 小半夏汤	194
87. 己椒苈黄丸	196
88. 小半夏加茯苓汤	199
89. 五苓散	200
90. 桂苓五味甘草汤	204
91. 苓甘五味姜辛汤	207
92. 桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤	209
93. 苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤	211
94. 苓甘姜味辛夏仁黄汤	213
95. 文蛤散	215
96. 栝蒌瞿麦丸	216
97. 蒲灰散	219
98. 滑石白鱼散	221
99. 茯苓戎盐汤	222
100. 猪苓汤	224
101. 越婢汤	226
102. 防己茯苓汤	229
103. 越婢加朮汤	231
104. 甘草麻黄汤	234

105. 麻黄附子汤	235
106. 黄芪芍桂苦酒汤	238
107. 桂枝加黄芪汤	240
108. 桂姜草枣黄辛附子汤	243
109. 枳术汤	245
110. 茵陈蒿汤	247
111. 消石矾石散	251
112. 栀子大黄汤	254
113. 猪膏发煎	255
114. 茵陈五苓散	257
115. 大黄消石汤	259
116. 桂枝救逆汤	261
117. 半夏麻黄丸	263
118. 柏叶汤	265
119. 黄土汤	267
120. 泻心汤	269
121. 茱萸汤	271
122. 半夏泻心汤	273
123. 黄芩加半夏生姜汤	276
124. 猪苓散	279
125. 四逆汤	280
126. 小柴胡汤	283
127. 大半夏汤	287
128. 大黄甘草汤	289
129. 茯苓泽泻汤	291
130. 文蛤汤	293
131. 半夏干姜散	295

132. 生姜半夏汤	296
133. 橘皮汤	298
134. 橘皮竹茹汤	300
135. 桂枝汤	302
136. 小承气汤	305
137. 桃花汤	307
138. 白头翁汤	309
139. 栀子豉汤	311
140. 通脉四逆汤	313
141. 紫参汤	315
142. 诃梨勒散	216
143. 薏苡附子败酱散	318
144. 大黄牡丹汤	320
145. 王不留行散	322
146. 排脓散	324
147. 排脓汤	326
148. 鸡屎白散	328
149. 蜘蛛散	329
150. 甘草粉蜜汤	331
151. 乌梅丸	333
152. 桂枝茯苓丸	336
153. 芎归胶艾汤	338
154. 当归芍药散	341
155. 干姜人参半夏丸	343
156. 当归贝母苦参丸	345
157. 葵子茯苓散	348
158. 当归散	349

159. 白术散	351
160. 枳实芍药散	353
161. 下淤血汤	355
162. 竹叶汤	357
163. 竹皮大丸	360
164. 白头翁加甘草阿胶汤	362
165. 半夏厚朴汤	364
166. 甘草小麦大枣汤	366
167. 温经汤	368
168. 土瓜根散	371
169. 旋覆花汤	372
170. 大黄甘遂汤	374
171. 抵当汤	377
172. 矾石丸	380
173. 红蓝花酒	382
174. 蛇床子散	383
175. 狼牙汤	385
方名索引	387

栝蒌桂枝汤

组 成

栝蒌根二两 桂枝三两 芍药三两 甘草二两 生姜三
两 大枣十二枚

用 法

上六味，以水九升，煮取三升，分温三服，取微汗，汗不出，食顷，啜热粥发之。

原方主治

太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痿，栝蒌桂枝汤主之。

历代论述

赵以德：脉沉迟，汗必不出，不出则亦不恶风，则是病在表之荣血分。荣血，阴也，其体沉，其行迟，所以脉应其象，外息于寸口，内不养于筋经，故痿强之病作焉。所以栝蒌根味苦入阴，用以生荣血，益阴分津液，养其筋经者为君。桂枝之辛以散，芍药之酸以收，一阴一阳，在里在表者为臣，甘草姜枣合辛甘之味，行脾之津液和荣卫者为使，立方之旨，其在斯欤。（《金匱玉函经二注》）

尤在泾：伤寒项背强几几，汗出恶风者，脉必浮数，为邪风盛于表。此证身体强几几然，脉反沉迟者，为风淫于外而津伤于内。故用桂枝则同，而一加葛根以助其散，一加栝蒌根兼滋其内，则不同也。（《金匱要略心典》）

方义分析

本方即桂枝汤加栝蒌根而成，其所主治之证，当是柔痉。柔痉为病，颈项强，背反张，发热汗出。本条原文首揭“太阳病，其证备”，可知必有发热恶风，汗出之表证。缘于风邪外客，营卫不和，故以桂枝汤治之。然又见有“身体强，几几然，脉反沉迟”，是为外有表邪，经路受阻，经脉拘急不舒，复因表虚汗出，阴津有伤，经脉不得濡润之故。此又非桂枝汤所能独任，因而仲景于桂枝汤中加入栝蒌根二两，取其甘寒润枯燥而通津液。成无己云：“栝蒌根润燥者也，加之则津液通行”。张锡纯更言其“善通行经络”。如此配伍，栝蒌根虽寒而不碍桂枝汤之发散，桂枝汤有栝蒌根为佐，非但散不伤阴，且可于发散之中而润燥通津，以收解表生津并重之效。但本方发散之力极弱，故方后又注：温服取微汗，汗不出，食顷，啜热粥发之。综合观之，本方所主之证，当是外受风邪，营卫不和，汗出津伤，经脉失养之柔痉。制方的特点，是于解表和营卫之中加入养阴通津液之品，使之风邪散，营卫和，则表证得解；津液通，经脉濡，而痉亦自愈。

此方证与《伤寒论》桂枝加葛根汤证所不同者，彼仅项背强，几几然，其脉浮，乃津未大伤；此则身体强，几几然，脉反沉迟，而津伤较重。彼方发散之力强于此，此方生津之力胜于彼。

临证应用

痉病；发热汗出，恶风身痛，身体强，背反张，脉沉涩或沉迟等。若兼血虚，可加当归；若身痛较重，可加秦艽、防风。

现用剂量

栝蒌根15克 桂枝9克 白芍9克 生姜9克 大枣4

枚 甘草6克 水煎服。服后温覆取微汗，汗不出者，喝热稀粥一碗，再温覆取汗。

医案选录

丁××，男，半岁，萍乡人。1931年初夏，身热，汗出，口渴，目斜，项强，角弓反张，手足搐搦，指尖发冷，指纹浮紫，舌苔薄黄。此为伤湿兼风，袭入太阳卫分，表虚液竭，筋脉失荣。拟用调和阴阳，滋养荣液法，以栝蒌桂枝汤，煎服三剂，各症减轻。后以本方去桂枝、生姜、大枣，加当归、生地、忍冬藤等，四剂而愈。（《蒲园医案》）

葛 根 汤

组 成

葛根四两 桂枝二两（去皮） 芍药二两 麻黄三两（去节） 甘草二两（炙） 生姜三两 大枣十二枚。

用 法

上七味，咬咀，以水一斗，先煮麻黄、葛根减二升，去沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝汤法将息及禁忌。

原方主治

太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。

《伤寒论》的相关论述：

太阳病，项背强几几，无汗恶风者，葛根汤主之。

太阳与少阳合病者，必自下利，葛根汤主之。

历代论述

许宏：葛根性平，能祛风，行于阳明之经，为用之君；

麻黄为臣，辅之发汗解表；桂枝芍药为佐，通行于荣卫之间；甘草大枣之甘，生姜之辛，以通脾胃之津为使。此方乃治其表实而并治其合病并病者也。（《金镜内台方议》）

柯韵伯：葛根味甘气凉，能起阴气生津液，滋筋脉而舒其牵引，故以为君。麻黄、生姜能开玄府腠理之闭塞，祛风而出汗，故以为臣。寒热俱轻，故少佐桂、芍，同甘、枣以和里。此于麻桂二方之间，衡其轻重，而为调和表里之剂也，故用之以治表实，而外邪自解，不必治里虚，下而利自瘳。（《伤寒来苏集》）

方义分析

本方所治之欲作刚痉，与《伤寒论》太阳病，项背强几几，无汗恶风之证雷同。其病机皆属风寒束表，脾胃之清阳不升，津液失于输布所致。风寒外束，玄府闭塞，则恶寒无汗，太阳经输受邪，脾气不能输布津液，则筋失所养，经输不利，故项背强，甚则口噤，身体强，欲作刚痉之状；津失输转，非但无汗，且小便亦少；脾阳不升，浊气上逆，故见气上冲胸，或呕吐，或下利。治之之法，必开其表，升发脾阳，而布其津液。本方以葛根为君，既可解表发汗以祛外邪，又能升发脾胃清阳而输布津液，可谓一药三得，表里双解。然风寒外袭，表实无汗，葛根开表之力尚为不足，故臣以麻黄助其解表发汗之力。佐以桂枝，不仅配合麻黄以发汗，尤可于发汗之中而和营卫，使邪气一去，表气自和。葛根、麻黄、桂枝三者合用，发汗之力较强，表邪虽解，恐反过汗致痉，故又佐以芍药，取其酸收之性，敛阴和营，既减缓发汗之力，更能荣筋缓急；与桂枝配伍，其调和营卫之功益著。生姜、大枣得表药则解表祛邪而和营卫，得里药则升清降浊而和脾胃。使以甘草，调和诸药，与芍药相配，更可