

2009 国家执业医师资格考试用书

遵循新编大纲 贴近实际考试

临床医师历年考题 精析与避错

LINCHUANG YISHI LINIANKAOTI
JINGXIYUBICUO

《国家执业医师资格考试历年考题精析与避错》专家组 编

- ★ 重视新增内容
- ★ 贴近不同考生
- ★ 精确复习范围
- ★ 提升考试成绩

赠20元
免费学习卡



中国协和医科大学出版社

国家执业医师资格考试

临床医师历年考题 精析与避错

《国家执业医师资格考试历年考题精析与避错》专家组 编

参委名单 (按姓氏拼音排序)

贝 尔	蔡闰海	昌 欢	冯国海	付 涛	黄科涛
黄晓玉	李翠萍	李华平	李 军	李 林	李 娜
李 涛	李正清	梁 芳	廖 鸿	刘 刚	聂焱焱
欧阳昌健		曲金英	闪 烁	汪大成	王 东
王海霞	王丽娟	王 薇	王乌兰	王晓东	王 雄
王宜青	吴珊珊	吴暑林			

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家执业医师资格考试临床医师历年考题精析与避错 / 《国家执业医师资格考试历年考题精析与避错》专家组编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 81136 - 059 - 2

I. 国… II. 国… III. 临床医学 - 医师 - 资格考核 - 解题 IV. R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 092940 号

国家执业医师资格考试 临床医师历年考题精析与避错

编 者: 《国家执业医师资格考试历年考题精析与避错》专家组
责任编辑: 姜淑惠 左 谦

出版发行: 中国协和医科大学出版社
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com
经 销: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 北京丽源印刷厂

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16 开
印 张: 37
字 数: 1100 千字
版 次: 2009 年 1 月第一版 2009 年 1 月第一次印刷
印 数: 1—5000
定 价: 61.00 元

ISBN 978 - 7 - 81136 - 059 - 2/R · 059

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

目 录

五步大法，助你过关

——命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍 …… (1)

第一章 生理学 …… (32)

第二章 生物化学 …… (54)

第三章 病理学 …… (75)

第四章 药理学 …… (97)

第五章 医学微生物学 …… (114)

第六章 医学免疫学 …… (123)

第七章 内科学 …… (133)

第八章 神经病学 …… (277)

第九章 精神病学 …… (286)

第十章 外科学 …… (298)

第十一章 妇产科学 …… (429)

第十二章 儿科学 …… (486)

第十三章 预防医学 …… (543)

第十四章 医学心理学 …… (555)

第十五章 医学伦理学 …… (563)

第十六章 卫生法规 …… (571)

五步大法，助你过关

——命题规律、复习方法、记忆窍门、 解题策略与避错诀窍

一、第一步：透析命题规律，做到知己知彼

对待所有考试第一步都是要了解考试范围（即了解考点）与命题方式。其中考试范围包括：①考题类型；②各门课程所占的大致比例；③各章节试题分布情况。这可以参照大纲。在此不做赘述。

下面就考试命题的方式做深入探讨。首先来看总的出题方式，不外乎有4种：

第一种：1对1型，也就是说题干所问是一个点，所有备选项都是围绕该“点”而设，例如：题干问“最”、“首选”、“主要”、“首先”、“数据”、“部位”、“适应证”、“并发症”、“诊断”、“检查”、“治疗”等等的就属于这一类。这种类型的题目最多见。所以也是复习时要重点下功夫的地方。命题者可以根据课本上任何一句话来命题，类似填空。这就要求考生在看书的时候有敏感的“火眼金睛”找出哪些内容是可能的考点。同时这也是有些考生认为自己复习得很到位（花费了很多时间和很大精力）但就是不能上线。换句话说夸张地说，你复习到的都没有考，你没有复习的都考了。因此，锁定或者找出哪些是可能的考点成为了每个考生第一要务而不是盲目地看书和做题。下面的复习方法中我们会提醒大家哪些是容易考的考点。另外一个好的方法就是看真题，仔细分析历年的真题是怎么考的无疑是最佳的办法。这也是我们出版这套书的根本出发点。

第二种：1对多型，也就是说题干所问是一个点，备选项中是针对该“点”的不同侧面而设，例如：题干问“临床表现”、“不包括”、“不属于”、“除外”、“不正确”等等就属于这类题。这类题目越来越多，也就是说考试的难度加大了。考生对一个问题方方面面都要牢固的掌握，而不是像1对1型的题目那样单纯而重点在“点”。这类题实际上是“以点带面”，最常见的考法有3种：一种是串联的考，例如，把一个疾病的病因、机制、表现、检查、诊疗和预防做为选项。第二种是横向的考，例如，把一个疾病的与另外一个疾病的不同或者相同的病因、机制、表现、检查、诊疗和预防作为选项。第三种是纵深的考，例如，把某个疾病的病因（或者机制、表现、检查、诊疗和预防等等）综合起来考察。与1对1型题一样，这类题的标准答案往往在课本上能直接找到，但是不象1对1型题目能够在某一段或者一句话中找到，而是在几个段落甚至几页才能找到。也就是说，这种题找答案都这么费劲，可想而知复习的时候要把这类题的考点找出来就非常的困难。对待这类题有两个方法：第一是平时多总结，功夫在平时，第二是多做比较综合的题，锻炼自己的这方面能力。

第三种：多对1型，也就是说题干描述了多个“点”，备选项中有一个与其对应，例如：绝大多数的病例题就是多对1型典型的代表。这类题考查综合能力，看似很难，因为往往在课本上不能直接找到答案。但是实际上，题干会有很多提示，如何找出关键的“题眼”便迎刃而解。这类题往往在题干中已经考察了，例如，题干中提到了血常规的值，那么实际上已经对你是否记住了血常规的正常值进行了考查。因此，对待多对1型的题目，第一要把正常的化验、检查、药物剂量、诊疗标准等等牢固掌握以便能对题干提出的数据、检查、剂量、标准做出正常的判断。第二是，抓题干中的特征性的字眼。这一点也需要通过大量的练习才能达到。

第四种：多对多型，也就是题干描述了多个“点”，备选项中也从不同侧面来对应该题干，这类题比较少见，大多见于病历题。这类题属于天马行空的题目，类似临床上的疑难病例。好在这类题并不多。应对的唯一方法就是提高自己的专业水平而不仅仅是考试水平。

通过以上分析，可见考试还是有规律的，针对命题规律进入下一步——复习方法。

二、第二步：掌握复习方法，不走弯路错路

既然我们了解了命题规律，那么就应该为我们的复习做指导，下面是大家复习时候要时时注意的：

(一) 牢记数值 包括常见的化验检查的正常值、常见疾病的发病率、药物剂量、比例等等。

常考数据举例如下，请牢记：

1. 甲亢病人术前准备可以手术的基础代谢率，至少降至
 - A. +10% 以下
 - B. +20% 以下
 - C. +25% 以下
 - D. +30% 以下
 - E. +35% 以下
 答案：B
2. 主动脉瓣中度狭窄时瓣口面积为
 - A. $<0.75\text{cm}^2$
 - B. $0.75 \sim 1.0\text{cm}^2$
 - C. $1.1 \sim 1.75\text{cm}^2$
 - D. $1.76 \sim 2.0\text{cm}^2$
 - E. $2.1 \sim 4.0\text{cm}^2$
 答案：C
3. 正常足月儿的出生体重是
 - A. $<1000\text{g}$
 - B. $>1000\text{g}$
 - C. $>1500\text{g}$
 - D. $>2000\text{g}$
 - E. $>2500\text{g}$
 答案：E
4. 高血压合并糖尿病患者，血压应控制在
 - A. $<130/80\text{mmHg}$
 - B. $<130/85\text{mmHg}$
 - C. $<135/85\text{mmHg}$
 - D. $<140/90\text{mmHg}$
 - E. $<150/90\text{mmHg}$
 答案：A
5. 小儿腹泻发病率高的年龄组是
 - A. <3 月
 - B. 3 月 ~ 5 月
 - C. 6 月 ~ 2 岁
 - D. 3 岁 ~ 4 岁
 - E. 5 岁 ~ 6 岁
 答案：C
6. 最早出现结核菌素试验阳性反应的时间是在小儿受结核感染
 - A. <4 周
 - B. 4 ~ 8 周后
 - C. 9 ~ 13 周后
 - D. 14 ~ 18 周后
 - E. 19 ~ 23 周后
 答案：B
7. 卡介苗接种后所致结核菌素阳性反应是指硬结直径
 - A. $<5\text{mm}$
 - B. $5 \sim 9\text{mm}$, 3 ~ 5 天后反应消失
 - C. $10 \sim 15\text{mm}$, 1 周后留有色素
 - D. $15 \sim 20\text{mm}$
 - E. $>20\text{mm}$
 答案：B
8. 早产儿的胎龄应是
 - A. >25 周至 <37 足周
 - B. >26 周至 <37 足周
 - C. >27 周至 <38 足周
 - D. >28 周至 <37 足周
 - E. >28 周至 <38 足周
 答案：D
9. 成年病人因失血致意识模糊、血压测不到，估计失血量
 - A. $>800\text{ml}$
 - B. $>1000\text{ml}$
 - C. $>1200\text{ml}$
 - D. $>1400\text{ml}$
 - E. $>1600\text{ml}$
 答案：E
10. n 足够大， P 不接近于 0 或 1，样本率与总体率比较，统计量 u 为
 - A. $|P - \pi| / Sp$
 - B. $|P_1 - P_2| / \sigma p$
 - C. $|P_1 - P_2| / Sp$
 - D. $|P - \pi| / \sigma$
 - E. $|P - \pi| / \sigma p$
 答案：E
11. 糖尿病的诊断是糖尿病症状加上随机血糖
 - A. $\geq 7.1\text{mmol/L}$
 - B. $\geq 9.1\text{mmol/L}$
 - C. $\geq 10.1\text{mmol/L}$
 - D. $\geq 11.1\text{mmol/L}$

E. $\geq 12.1 \text{ mmol/L}$

答案：D

12. 在一项队列研究中，非暴露组 150 名中 15 人患高血压，暴露组 200 人中 30 人患高血压，归因危险度为

A. 0.15
B. 0.1
C. 1.5
D. 0.05
E. 0.25

答案：D

13. 成人血清钠检测值为 125 mmol/L ，估计每公斤体重缺氯化钠的量为

A. $0.25 \sim 0.45 \text{ g}$
B. $0.50 \sim 0.75 \text{ g}$
C. $0.80 \sim 1.00 \text{ g}$
D. $1.05 \sim 1.25 \text{ g}$
E. $1.30 \sim 1.50 \text{ g}$

答案：B

14. 治疗心力衰竭时硝普钠的最大用量是

A. $0.3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$
B. $0.5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$
C. $5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$
D. $10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$
E. $20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$

答案：C

15. 足月儿每日钠的需要量约是

A. $0.5 \sim 0.9 \text{ mmol/kg}$
B. $1 \sim 2 \text{ mmol/kg}$
C. $3 \sim 4 \text{ mmol/kg}$
D. $5 \sim 6 \text{ mmol/kg}$
E. $7 \sim 8 \text{ mmol/kg}$

答案：B

16. 女，1 岁。发热伴咳嗽 3 天，口周稍青紫。用鼻前庭导管吸氧，氧流量应为

A. $0.5 \sim 1 \text{ 升/分}$
B. $1.5 \sim 2 \text{ 升/分}$
C. $2.5 \sim 3 \text{ 升/分}$
D. $3.5 \sim 4 \text{ 升/分}$
E. $4.5 \sim 5 \text{ 升/分}$

答案：A

17. 配置 2:1 等张含钠液 120 ml 需

A. $0.9\% \text{ NaCl } 80 \text{ ml}$ ， $5\% \text{ NaHCO}_3 \text{ } 40 \text{ ml}$
B. $0.9\% \text{ NaCl } 80 \text{ ml}$ ， $1.8\% \text{ NaHCO}_3 \text{ } 40 \text{ ml}$

C. $0.9\% \text{ NaCl } 80 \text{ ml}$ ， $10\% \text{ GS } 40 \text{ ml}$

D. $0.9\% \text{ NaCl } 40 \text{ ml}$ ， $5\% \text{ NaHCO}_3 \text{ } 80 \text{ ml}$

E. $0.9\% \text{ NaCl } 80 \text{ ml}$ ， $1.4\% \text{ NaHCO}_3 \text{ } 40 \text{ ml}$

答案：E

18. 男，18 岁。左下肢跛行 15 年，查体发现左侧马蹄内翻足畸形，胫前肌有轻度肌收缩，但不能产生关节运动，其肌力为

A. 0 级
B. 1 级
C. 2 级
D. 3 级
E. 5 级

答案：B

19. 某弱酸性药物的 pKa 是 3.4，在血浆中的解离百分率约为

A. 1%
B. 10%
C. 90%
D. 99%
E. 99.99%

答案：E

20. 成人右手占体表面积的

A. 1%
B. 2.5%
C. 3%
D. 3.5%
E. 5%

答案：B

21. 心房颤动患者服用华法林，凝血酶原时间的国际标准化率 (INR) 应控制在

A. $1.0 \sim 1.9$
B. $2.0 \sim 3.0$
C. $3.1 \sim 3.5$
D. $3.6 \sim 4.0$
E. >4.0

答案：B

22. 8 个月男婴 II 度烧伤时每 1% 面积、公斤体重额外丢失补液量为

A. 1.0 ml
B. 1.5 ml
C. 2.0 ml
D. 2.5 ml
E. 3.0 ml

答案：C

23. 孕40周新生儿, 出生时由口鼻排出部分肺内液体, 其余经血管及淋巴管吸收的肺液约占
A. 1/4
B. 1/3
C. 1/2
D. 2/3
E. 3/4
答案: D
24. 应用皮质激素治疗感染性休克时, 其使用量为常规用量的
A. 1/4
B. 1/2
C. 2倍
D. 5倍
E. 10倍以上
答案: E
25. 早产儿鼻管喂养减量的依据是残留奶占前次奶量的
A. 1/8
B. 1/6
C. 1/5
D. 1/4
E. 1/3
答案: E
26. 深Ⅱ度烧伤创面处理不正确的是
A. 1:2000 氯已定清洗创面, 去除异物
B. 去除水疱皮
C. 油质纱布包扎创面
D. 面部创面不包扎
E. 创面使用抗菌素预防全身感染
答案: B
27. 应用全胃肠外营养时, 氮和热量之比应为
A. 1:50 ~ 80kcal
B. 1:100 ~ 120kcal
C. 1:150 ~ 200kcal
D. 1:210 ~ 240kcal
E. 1:250kcal 以上
答案: C
28. 全胃肠外营养液中必需氨基酸和非必需氨基酸的比例一般应为
A. 1:1
B. 1:2
C. 1:3
D. 2:1
E. 3:1
答案: B
29. 维生素D缺乏性佝偻病发生颅骨软化的年龄多见于
A. 1~2个月
B. 3~6个月
C. 7~9个月
D. 10~12个月
E. 1~2岁
答案: B
30. 麻疹出疹一般在发热后的
A. 1~2天
B. 3~4天
C. 5~6天
D. 7~8天
E. 9~10天
答案: B
31. 婴儿从母体获得的抗体开始消失的月龄是
A. 1~2月以后
B. 3~4月以后
C. 5~6月以后
D. 7~8月以后
E. 9~10月以后
答案: C
32. 小儿末梢血中性粒细胞和淋巴细胞的比例相等的时间分别是
A. 1~3天和1~3岁
B. 4~6天和4~6岁
C. 7~9天和7~9岁
D. 10~12天和10~12岁
E. 13~15天和13~15岁
答案: B
33. 骨巨细胞瘤的好发年龄是
A. 1~5岁
B. 6~10岁
C. 11~15岁
D. 16~20岁
E. 21~30岁
答案: E
34. 男, 60岁, 食管癌术后行放射治疗, 血小板 $90 \times 10^9/L$, 此时决定治疗是否停止的指标是白细胞计数低于
A. $1 \times 10^9/L$
B. $2 \times 10^9/L$

C. $3 \times 10^9/L$

D. $4 \times 10^9/L$

E. $5 \times 10^9/L$

答案：C

35. 迅速出血后出现休克症状。表明至少已丢失全身总血量的

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

E. 30%

答案：C

36. 一般的择期手术病人的静息能量消耗值(REE)约增加

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

E. 50%

答案：A

37. 女，2岁。因智力低下就诊，查染色体核型为46, XX, -21, +t(21q21q)，其母亲核型为45, XX, -21, -21, +t(21q21q)，若再生育，其下一代发生本病的风险为

A. 10%

B. 25%

C. 50%

D. 75%

E. 100%

答案：E

38. 神经胶质瘤占全部颅内肿瘤的

A. 10% ~ 15%

B. 20% ~ 30%

C. 40% ~ 50%

D. 60% ~ 70%

E. 70% ~ 80%

答案：C

39. 60岁男性急性肾功能衰竭病人，血钾5.6mmol/L，下列治疗措施有原则性错误的是

A. 10%氯化钾20ml静脉滴注

B. 口服钠型树脂15g，一日三次

C. 山梨醇5g，每2小时口服一次

D. 碳酸氢钠溶液100ml，缓慢静脉滴注

E. 25%葡萄糖溶液加胰岛素(3~5g:lu)

200ml，缓慢静脉滴注

答案：A

40. 45岁女性，严重骨盆骨折，24小时尿量200ml，血钾5.9mmol/L，二氧化碳结合力13mmol/L，血尿素氮27mmol/L，下列治疗措施不正确的是

A. 10%葡萄糖酸钙溶液20ml，缓慢静脉注射

B. 11.2%乳酸钠溶液60ml，缓慢静脉注射

C. 口服钠型树脂10g，每日三次

D. 血液透析

E. 输同型库存血200ml

答案：E

41. 完全性葡萄胎的恶变率，国内外报道有异，我国为

A. 10.5%

B. 14.5%

C. 20.5%

D. 30.5%

E. 35%

答案：B

42. 急性心肌梗死静脉滴注硝酸甘油的起始剂量是(μg/min)

A. 10~20

B. 30~40

C. 50~70

D. 80~90

E. 100~200

答案：A

43. 小儿重度脱水有明显周围循环障碍，扩容液输注时间为

A. 10~20分钟

B. 30~60分钟

C. 70~90分钟

D. 100~120分钟

E. 130~150分钟

答案：B

44. 足月妊娠时的羊水量约为

A. 1000ml

B. 800ml

C. 600ml

D. 400ml

E. 300ml

答案：B

45. 新生儿生后4~6月时，体重每日增加

- A. 100g~200g
- B. 300g~400g
- C. 500g~600g
- D. 700g~800g
- E. 900g~1000g

答案: C

46. 1个月男婴, II度烧伤面积10%, 体重10公斤, 额外丢失液量为

- A. 100ml
- B. 150ml
- C. 200ml
- D. 250ml
- E. 300ml

答案: C

47. 惊厥性全身性癫痫持续状态静脉注射苯妥英钠时, 每1~2分钟注射速度最多不应大于

- A. 10mg
- B. 20mg
- C. 50mg
- D. 70mg
- E. 100mg

答案: C

48. 新生儿溶血病换血治疗的指征, 血清胆红素在足月儿至少应大于

- A. 10mg/dl
- B. 15mg/dl
- C. 20mg/dl
- D. 25mg/dl
- E. 30mg/dl

答案: B

49. 成人出现大便隐血阳性时, 消化道出血量至少大于

- A. 10ml
- B. 9ml
- C. 8ml
- D. 6ml
- E. 5ml

答案: E

50. 补钾速度一般每小时不宜超过

- A. 10mmol
- B. 20mmol
- C. 30mmol
- D. 40mmol
- E. 50mmol

答案: B

51. 某村发生一起民居垮塌事故, 重伤者9人, 急送乡卫生院抢救。市中心血站根据该院用血要求, 急送一批无偿献血的血液到该院。抢救结束后, 尚余900ml血液, 该院却将它出售给另一医疗机构。根据《献血法》规定, 对于乡卫生院的这一违法行为, 县卫生局除了应当没收其违法所得外, 还可以对其处以罚款

- A. 10万元以下
- B. 5万元以下
- C. 3万元以下
- D. 1万元以下
- E. 5千元以下

答案: A

52. 慢性肾小球肾炎患者, 当蛋白尿大于1g/d时, 血压控制的理想水平是

- A. 120/80mmHg 以下
- B. 125/75mmHg 以下
- C. 130/80mmHg 以下
- D. 140/90mmHg 以下
- E. 135/85mmHg 以下

答案: B

53. 二期处理火器伤延期缝合应在清创处理后的

- A. 12小时~1天
- B. 2~3天
- C. 4~7天
- D. 8~14天
- E. 14天以后

答案: C

54. 猩红热的皮疹出现在发热后

- A. 12小时之内
- B. 12~48小时
- C. 49~60小时
- D. 61~72小时
- E. 大于72小时

答案: B

55. 成人术前需要应用降压药的血压(mmHg)指标是超过

- A. 130/90
- B. 140/90
- C. 150/100
- D. 160/100
- E. 170/110

答案: D

56. 女性，25岁，心悸、甲状腺肿大，并伴有轻度呼吸不畅，压迫感，首次妊娠2月余，诊为原发性甲亢，最有效的治疗方法是

- A. ^{131}I 治疗
- B. 抗甲状腺药物治疗
- C. 终止妊娠
- D. 甲状腺大部切除术
- E. 普萘洛尔（心得安）治疗

答案：D

57. 诊断成年女性贫血的标准为血红蛋白浓度低于

- A. 140g/L
- B. 130g/L
- C. 120g/L
- D. 110g/L
- E. 100g/L

答案：D

58. 病人发生甲状腺功能亢进时，其 ^{131}I 摄取率2小时至少超过

- A. 15%
- B. 20%
- C. 25%
- D. 30%
- E. 35%

答案：C

59. 心室颤动电除颤应首选直流电

- A. 150J 非同步除颤
- B. 200~300J 同步除颤
- C. 200~300J 非同步除颤
- D. 360J 同步除颤
- E. 360J 非同步除颤

答案：A

60. 丙酸睾酮治疗子宫肌瘤的每月总量不应超过

- A. 150mg
- B. 200mg
- C. 250mg
- D. 300mg
- E. 350mg

答案：D

61. 真菌性脑膜炎时脑脊液氯化物浓度应低于 (mmol/L)

- A. 160
- B. 150
- C. 140
- D. 130

E. 120

答案：E

62. 乳儿每日水的需要量是

- A. 170ml/kg
- B. 150ml/kg
- C. 120ml/kg
- D. 100ml/kg
- E. 80ml/kg

答案：B

63. 胆汁酸合成的限速酶是

- A. 1- α -羟化酶
- B. 12- α -羟化酶
- C. HMG CoA 还原酶
- D. HMG CoA 合酶
- E. 7- α -羟化酶

答案：E

64. T_1 乳腺癌其肿块最长径不超过

- A. 1cm
- B. 2cm
- C. 3cm
- D. 4cm
- E. 5cm

答案：B

65. 新生儿溶血症的换血量约为婴儿全血量的

- A. 1倍
- B. 1.5倍
- C. 2倍
- D. 2.5倍
- E. 3倍

答案：C

66. 正常儿童新鲜尿沉渣镜检时，每高倍视野下红细胞数应少于

- A. 1个
- B. 2个
- C. 3个
- D. 4个
- E. 5个

答案：C

67. 早产儿使用铁剂预防贫血起始的月龄是

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 4个月
- E. 5个月

答案: B

68. 肩周炎是自限性疾病, 一般恢复时间需要

A. 1 个月左右
B. 3 个月左右
C. 1 年左右
D. 2 年左右
E. 3 年左右

答案: C

69. 残胃癌发生在因良性病变施行胃大部切除术后至少

A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 4 年
E. 5 年

答案: E

70. 黄某 2001 年 10 月因医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚, 2002 年 9 月向当地卫生行政部门申请重新注册。卫生行政部门经过审查决定对黄某不予注册, 理由是黄某的行政处罚自处罚决定之日起至申请注册之日止不满

A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 4 年
E. 5 年

答案: B

71. 残胃癌发生在胃良性病变施行胃大部切除术后至少

A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 4 年
E. 5 年

答案: E

72. 一正常小儿身高 90cm, 前囟门已闭, 头围 48.5cm, 乳牙 20 枚, 血压是 86/55mmHg。此小儿的年龄最大的可能是

A. 1 岁半
B. 2 岁
C. 3 岁
D. 4 岁
E. 5 岁

答案: C

73. 医疗机构对其医疗废物暂时贮存的时间不得超过

A. 1 天
B. 2 天
C. 3 天
D. 4 天
E. 5 天

答案: B

74. 初产妇第一产程活跃期停滞是指进入活跃期后宫口不再扩张超过

A. 1 小时
B. 1 小时 30 分
C. 2 小时
D. 2 小时 30 分
E. 3 小时

答案: C

75. 阑尾周围脓肿非手术治疗治愈, 择期行阑尾切除的时间是治愈后

A. 1 周
B. 2 周
C. 1 个月
D. 2 个月
E. 3 个月

答案: E

76. 小儿急性肾小球肾炎起病前常有皮肤感染, 其前驱期多为

A. 1 周以内
B. 1~2 周
C. 2~3 周
D. 3~4 周
E. 4~5 周

答案: C

77. 原始骨痂形成一般需要

A. 1 周左右
B. 2~3 周
C. 4~8 周
D. 9~10 周
E. 11~12 周

答案: C

78. 成年人腹股沟管的长度应为

A. 2~3cm
B. 4~5cm
C. 6~7cm
D. 8~9cm

E. 10~12cm

答案：B

79. 小儿初次感染结核菌至产生变态反应的时间是

- A. 2~3 天
- B. 4~6 天
- C. 7~12 天
- D. 2~3 周
- E. 4~8 周

答案：E

80. 男，2 岁。发热伴咳嗽。诊断为链球菌肺炎，用抗生素治疗的疗程应持续至体温正常后

- A. 2~4 天
- B. 5~7 天
- C. 8~10 天
- D. 11~13 天
- E. 14~16 天

答案：B

81. 中毒型细菌性痢疾多见于

- A. 2~7 岁体格健壮的小儿
- B. 3~6 个月体格健壮的婴幼儿
- C. 低出生体重儿
- D. 8~10 岁营养状况较差的儿童
- E. 12~14 岁青春期儿童

答案：A

82. 细胞外液占成人体重的

- A. 20%
- B. 25%
- C. 30%
- D. 35%
- E. 40%

答案：A

83. 足月儿生后第 1 小时内呼吸频率是

- A. 20~30 次/分
- B. 40~50 次/分
- C. 60~80 次/分
- D. 90~100 次/分
- E. 100~110 次/分

答案：C

84. 月经周期规则，末次月经 2002 年 1 月 28 日，预产期应是

- A. 2002 年 11 月 1 日
- B. 2002 年 11 月 2 日
- C. 2002 年 11 月 3 日
- D. 2002 年 11 月 4 日

E. 2002 年 11 月 5 日

答案：D

85. 月经周期规则，末次月经第一日是 2005 年 4 月 18 日，推算预产期应是

- A. 2006 年 1 月 22 日
- B. 2006 年 1 月 23 日
- C. 2006 年 1 月 24 日
- D. 2006 年 1 月 25 日
- E. 2006 年 1 月 27 日

答案：D

86. 四肢出血，使用止血带最长不能连续超过

- A. 20 分钟
- B. 30 分钟
- C. 1 小时
- D. 1.5 小时
- E. 2 小时

答案：C

87. 我国颁布的“母婴保健法”规定在新生儿期进行筛查的遗传代谢内分泌疾病是

- A. 21-三体综合征，苯丙酮尿症
- B. 先天性甲状腺功能减低症，苯丙酮尿症
- C. 先天性甲状腺功能减低症，21-三体综合征
- D. 先天性甲状腺功能减低症，半乳糖血症
- E. 21-三体综合征，半乳糖血症

答案：B

88. 男性，25 岁。烧伤后 2 小时入院，Ⅲ°烧伤面积共约 40%，体重约 60 公斤。第一个 24 小时，应输入的液体总量约为

- A. 2400ml
- B. 3600ml
- C. 4600ml
- D. 5600ml
- E. 6500ml

答案：D

89. 持续性房颤是指难以自动转复为窦性心律的房颤发作持续

- A. 24 小时（或 48 小时）以上
- B. 72 小时以上
- C. 1 个月以上
- D. 3 个月以上
- E. 6 个月以上

答案：A

90. 肾病综合征最重要的诊断依据是

- A. 24 小时尿蛋白 $>3.5\text{g}$, 血浆白蛋白 $<30\text{g/L}$
 B. 血浆白蛋白 $<30\text{g/L}$, 血胆固醇及甘油三酯升高
 C. 24 小时尿蛋白 $>3.5\text{g}$, 双下肢凹陷性水肿
 D. 24 小时尿蛋白 $>3.5\text{g}$, 血胆固醇及甘油三酯升高
 E. 血胆固醇及甘油三酯升高, 双下肢凹陷性水肿

答案: A

91. 急性颅内压增高, 有脑疝征象时: 应立即使用下列哪种药物最佳

- A. 25% 山梨醇
 B. 20% 甘露醇
 C. 50% 葡萄糖
 D. 50% 甘油
 E. 激素

答案: B

92. 急性肾功能衰竭少尿期结束的标志, 是指 24 小时尿量至少增加至

- A. 250ml
 B. 300ml
 C. 350ml
 D. 400ml
 E. 500ml

答案: E

93. 判断休克已纠正除血压正常外, 尿量每小时至少应稳定在

- A. 25ml 以上
 B. 30ml 以上
 C. 40ml 以上
 D. 50ml 以上
 E. 60ml 以上

答案: B

94. 2 岁女孩, 突发喘息 1 天, 查体: 体温正常。稍气促, 两肺广布哮鸣音。母有哮喘史。给予沙丁胺醇气雾剂吸入后, 肺部哮鸣音逐渐消失, 按评分法该患儿评分是

- A. 2 分
 B. 3 分
 C. 4 分
 D. 5 分
 E. 6 分

答案: E

95. 各种补体成分浓度达到成人水平的年龄是

- A. 2 个月
 B. 3 个月
 C. 4 个月
 D. 5 个月
 E. 6 个月

答案: E

96. 单侧隐睾手术治疗应在

- A. 2 岁以前
 B. 3~6 岁
 C. 7~10 岁
 D. 青春期
 E. 婚后影响生育时

答案: A

97. 受血者配血试验的血标本必须是输血前

- A. 2 天之内的
 B. 3 天之内的
 C. 4 天之内的
 D. 5 天之内的
 E. 6 天之内的

答案: B

98. 因抢救急危患者, 未能及时书写病历的, 有关医务人员应当在抢救结束后据实补记, 并加以注明, 其时限是

- A. 2 小时内
 B. 4 小时内
 C. 6 小时内
 D. 8 小时内
 E. 12 小时内

答案: C

99. 组成核酸分子的碱基主要有

- A. 2 种
 B. 3 种
 C. 4 种
 D. 5 种
 E. 6 种

答案: D

100. 乳酸脱氢酶同工酶有

- A. 2 种
 B. 3 种
 C. 4 种
 D. 5 种
 E. 6 种

答案: D

101. 判断抗精神病药是否有效, 需在足剂量下使

用至少

- A. 2 周
- B. 3 周
- C. 4 周
- D. 5 周
- E. 6 周

答案：E

102. 女，30 岁。化脓性阑尾炎术后一周，切口红肿硬结，但拆线后未见脓性分泌物，切口愈合类型应记为

- A. II/乙
- B. II/丙
- C. III/甲
- D. III/乙
- E. III/丙

答案：D

103. 男，18 岁，因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术，术后 3 天切口红肿，有脓性分泌物，将缝线拆除后引出 20ml 脓液，10 天后再次缝合而愈合，该病人切口愈合类型应记为

- A. II/乙
- B. II/丙
- C. III/甲
- D. III/乙
- E. III/丙

答案：E

104. 化脓性阑尾炎行阑尾切除术，术后 3 天切口红肿，有脓性分泌物，10 天后再次缝合而愈合，切口愈合类型应记为

- A. II/乙
- B. II/丙
- C. III/甲
- D. III/乙
- E. III/丙

答案：E

105. 成人双手占体表面积的

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 9%
- E. 12%

答案：B

106. 急性胰腺炎假性囊肿形成的时间一般是病后

- A. 3~4 小时

- B. 24 小时

- C. 3~4 天

- D. 3~4 周

- E. 3~4 月

答案：D

107. 正常小儿后囟闭合的时间一般于生后

- A. 3~5 周

- B. 6~8 周

- C. 9~11 周

- D. 12~14 周

- E. 15~18 周

答案：B

108. tRNA 含有

- A. 3'CCA-OH

- B. 帽子 m⁷Gppp

- C. 密码子

- D. 3'-末端的多聚腺苷酸结构

- E. 大、小两个亚基

答案：A

109. 短时记忆存储的信息量为

- A. 3 ± 2

- B. 5 ± 2

- C. 7 ± 2

- D. 9 ± 2

- E. 11 ± 2

答案：C

110. 肝脏的血液供应来自门静脉的约占

- A. 30%~35%

- B. 40%~45%

- C. 50%~55%

- D. 60%~65%

- E. 70%~75%

答案：E

111. 男孩，1 岁半，其基础代谢所需热量占总热量的比例为

- A. 30% 以下

- B. 30%~40%

- C. 50%~60%

- D. 70%~80%

- E. 80% 以上

答案：C

112. 产后出血是指阴道流血量在胎儿娩出后 24 小时内超过

- A. 300ml

- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 600ml
- E. 700ml

答案: C

113. 重度营养不良患儿调整饮食, 每日开始供给的热量应是

- A. 30kcal/kg
- B. 40kcal/kg
- C. 50kcal/kg
- D. 60kcal/kg
- E. 70kcal/kg

答案: B

114. 1 周岁小儿的胸围应约为

- A. 34cm
- B. 38cm
- C. 42cm
- D. 46cm
- E. 50cm

答案: D

115. 35 周婴儿, 出生体重 1.5kg, 生后 3 天体温不升, 需置暖箱, 该暖箱适宜的温度是

- A. 35℃
- B. 34℃
- C. 33℃
- D. 32℃
- E. 31℃

答案: B

116. 出生时新生儿的头围约

- A. 35cm
- B. 34cm
- C. 33cm
- D. 32.5cm
- E. 31cm

答案: B

117. 生后第 1 年身高增长约

- A. 35cm
- B. 32cm
- C. 30cm
- D. 21cm
- E. 25cm

答案: E

118. 正常新生儿生后第一年中身高增长约

- A. 35cm

- B. 32cm
- C. 30cm
- D. 27cm
- E. 25cm

答案: E

119. 重度主动脉瓣狭窄的跨主动脉瓣平均压力阶差至少应大于

- A. 35mmHg
- B. 40mmHg
- C. 45mmHg
- D. 50mmHg
- E. 55mmHg

答案: D

(二) 极端或者特殊的点要特别注意

“最先、最后、最好、最坏、最大、最小、最高、最低”。常考例子如下, 请牢记:

1. 抢救由心室颤动引起的心脏骤停时, 最有效的方法是

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 皮下注射肾上腺素
- C. 植入心脏起搏器
- D. 非同步电击复律
- E. 口对口人工呼吸

答案: D

2. 诊断感染性心内膜炎的最重要方法是

- A. 免疫学检查
- B. 心电图检查
- C. X 线检查
- D. 血培养
- E. 常规生化检查

答案: D

3. 全身骨与关节结核中发病率最高的是

- A. 髋关节结核
- B. 膝关节结核
- C. 脊柱结核
- D. 肘关节结核
- E. 肩关节结核

答案: C

4. 发现早期直肠癌最有意义的方法是

- A. 直肠镜
- B. 钡灌肠
- C. B 超
- D. 大便潜血检查

E. CT

答案：A

5. 最常见的子宫肌瘤变性是

- A. 囊性变
- B. 玻璃样变
- C. 红色变
- D. 肉瘤变
- E. 钙化

答案：B

6. 法洛四联症最早且主要的表现是

- A. 蹲踞
- B. 青紫
- C. 突然晕厥
- D. 杵状指（趾）
- E. 活动耐力下降

答案：B

7. 确诊肿瘤最可靠的方法是

- A. CT 检查
- B. DSA 检查
- C. B 超检查
- D. 肿瘤标记物检查
- E. 病理学检查

答案：E

8. 肾病综合征最基本的表现是

- A. 尿蛋白定量 $>3.5\text{g}/24\text{h}$
- B. 尿颗粒管型
- C. 血浆白蛋白 $<35\text{g/L}$
- D. 高度水肿
- E. 高脂血症

答案：A

9. 对原发性慢性肾上腺皮质功能减退症的诊断最有意义的血检结果是

- A. 醛固酮
- B. 血糖下降
- C. 血钠下降
- D. 皮质醇下降
- E. ACTH 下降

答案：D

10. 复苏后治疗，保证一切复苏措施奏效最重要的是

- A. 维持良好的呼吸功能
- B. 确保循环功能的稳定
- C. 防治肾功能衰竭
- D. 脑复苏

E. 防治感染

答案：D

11. 腹部闭合性损伤 X 线检查发现右膈肌抬高，活动受限，最可能的损伤是

- A. 胃破裂
- B. 脾破裂
- C. 肝破裂
- D. 十二指肠破裂
- E. 结肠肝曲破裂

答案：C

12. 引起牙周脓肿最常见的病原菌是

- A. 甲型溶血性链球菌
- B. 类白喉杆菌
- C. 无芽胞厌氧菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 白色念珠菌（白假丝酵母菌）

答案：A

13. 体内 CO_2 分压最高的部位是

- A. 静脉血液
- B. 毛细血管血液
- C. 动脉血液
- D. 组织液
- E. 细胞内液

答案：D

14. 易位型 21 - 三体综合征最常见的核型是

- A. 46, XY, -13, +t (13q21q)
- B. 46, XY, -21, +t (21q21q)
- C. 46, XY, -22, +t (21q22q)
- D. 46, XY, -14, +t (14q21q)
- E. 46, XY, -15, +t (15q21q)

答案：D

15. 洋地黄中毒最常见的心电图表现是

- A. 心房颤动
- B. 室性期前收缩
- C. 房性期前收缩
- D. ST-T 缺血性改变
- E. 房室传导阻滞

答案：B

16. 鉴别水肿型和出血坏死型胰腺炎最有价值的是

- A. 上腹剧痛向左腰部放射
- B. 黄疸
- C. 发热
- D. Cullen 征
- E. 呕吐