

238.95

S 329  
643

江西地方誌農產資料匯編

江西人民出版社  
《江西地方誌農產資料匯編》編輯委員會編

江西人民出版社

《江西地方誌農產資料滙編》編輯委員會編

江西地方誌農產資料滙編

下冊

(內部發行)

**江西地方誌农产資料汇编**

(内部发行)

《江西地方誌农产資料汇编》

編輯委员会編

\*

江西人民出版社出版

(南昌市三緯路11号)

江西省書刊出版业營業許可証出字第一号

江西印刷公司印刷 江西省新华书店发行

\*

書号: 02219

开本: 850 × 1168  $\frac{1}{32}$  · 印張: 32 $\frac{1}{3}$  · 字数: 500,000

1964年3月第一版

1964年3月第一版第一次印刷

印数: 1—1,100

統一書号: 17110·7

定价: 五元五角



## 临川县沿革紀要

临川：「汉」豫章郡南城县地。「东汉」永元八年（九六年）初立临汝县，以地临汝水也，属豫章郡。「隋」改临汝县曰临川县，为撫州州治。当时总管杨武道奉使安撫，因以撫为州名。「唐」仍之。「五代」时为撫州昭武军治。「宋」为撫州州治。「元」为撫州路治。「明」「清」为撫州府治。「民国」初年属豫章道，后属第七行政区。

中华人民共和国成立后，属撫州专区，并于一九五四年划临川县城关区設撫州市。



麦

有大麦。詩謂之牟。有小麦。詩謂之來。二麦。秋下种（按习惯一般都是农曆十月种麦）。冬出土。春始秀。至夏而熟。凡历四时。故麦为五穀之貴。然地气下湿。不逮北方。亦不为恆食。又有蕎麦。味甘滑。性寒。别为一

菽

种。菽。即豆。也。

菽之属

（菽音叔。豆之总名。）

菽

有黄豆。有春豆。有黑豆。有花豆。有豌豆。有赤豆。有綠豆。諸豆惟黄豆刈禾后种諸田間。春豆多取山地种之。

杂谷之属

粟

有黄白二种。有金釵粟。狗尾粟。性鹹寒。养脾胃。补丹田（道家称人身脐下三寸为丹田）。陈者尤良。

其他

藟

有掌藟。有紫藟。亦名山药。

芋

又名土芝。俗謂之蹲鴟。音存痴。大者名芋魁。

茨

（鸡头菜）。

苦株

（实可取粉）

甜株

（实可取粉）

楮

子

（实可煎食。并可作腐）。

蕨

根粉可采食。

蕘稗

生五穀中。謂之莠。

粟

茅粟

蓮实

百合



蒸而生，下有瓣，鲜美可食，无瓣者，食之杀人，中毒，掘地豨饮之可解，有薑，宜湿，覆以棚，夏至后货（卖也）者，谓之母薑，霜降后货者谓之子薑，有藕，城西濠藕九孔，城内金凤湖藕尤胜，有豇豆，有扁豆，二种，一名羊眼，一名羊角。

### 瓜果类

#### 瓜之属

##### 瓜

有数种，有瓠（音户），有瓠（音劄），最早熟者曰黄瓜，似黄瓜而色白曰白瓜，皮青而长尺余，棘（音求，弯曲之貌）然而角曰梢瓜，青如梢瓜而子黑多瓢曰丝瓜，谓之紡綫，亦以其瓢类綫云，色青瓢厚子黄曰南瓜。

瓢厚而子有红黑曰西瓜，比西瓜長大曰东瓜，小而瓜尖在地曰土瓜，西瓜出丁家洲者胜。

#### 果之属

##### 果

有梅，有梨，早熟曰青消梨，晚熟曰黄土梨，有柿，有桃，有李，有枣，有橘，有火橘，有蜜橘，有金橘，多柑，有橙，有柚，有枇杷，有梧桐子，有银杏，有楊梅，有櫻桃，有石榴，有葡萄，有山查，有薏苡，有菱，有金粟，按宏

治志云，橘产于城西二十里間，今城东南三十里，灵谷山之阳，嵩湖之濱，比城西为多。

鹿角

鹿茸

鹿鞭

鹿尾

鹿胎

鹿血

鹿骨

土特产类

鹿蹄

鹿尾

鹿茸

鹿鞭

鹿尾

鹿胎

鹿血

鹿骨

灯心草

出县南营山，楼榭，取  
利甚多，楼榭产尤胜。

毛笔

(李渡镇  
最多)

江清纸

火纸

以新竹稻草  
漚而为之

牛舌

纸

甘蔗

梨食类

鹿耳

玉西商号，总会编四香(湖川县)

高宜... (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十)

翻卷一



麦之属

青麦 青麦一類一葉其叶淋潤其性寒涼其味甘澀百種皆青麥中又或名青麥(或青麥)一葉  
立冬播种 次  
年四月穫

大麦

春分播种 四月可穫 处暑播  
种 九月可穫 高下田均宜

蕎麦

菽之属

黄豆

大暑后种 霜降后收 可榨油  
造豆腐 豆皮 豆豉 酱油

烏豆

大暑后种 霜降后收 食味較黃  
豆美 制造亦如黄豆 榨油

綠豆

穀雨前后种者 小  
暑时可摘 小暑后

种者 处暑可摘 園  
圍墻畔燥地皆宜

其他

薯

春分后秧种 蔓生既盛 即可移栽  
有大暑后栽者 霜降前后收

芋

春分后种 八月取食 若霜降取出愈大  
子多 亩田种六百余株 可产二千斤

油类

芝麻

有一二月及大暑前种者 早种白露  
结实 迟种秋分结实 宜高燥地

油菜

一名芸台 九十月  
种 次年三月收

落花生

清明后栽种 小暑开  
花 八九月可收 宜燥

瘠夾沙地，不用肥料。

### 烏柏

春日播种，次年移栽，三四年后，四月开花，七月结实，十月纔（同週）收。

### 花桐

立春后种，六七年后，清明試花，霜降后收。

### 草桐

形似草麻。

子，每年二月栽，冬时结实，每石淨子，可榨油二十八斤。

### 楂樹子

小者名寒露子，大者名霜降子，九月揚花，腊月结实，可以榨油。

## 棉麻絲类

### 白棉花

夏种，秋收。

### 苧麻兜

冬时远方購者，随至随栽，自有者，夏至前分栽，每年四月六月九月三次剝取，每亩可栽千五百株，每季可剝麻百斤，織布制繩。

### 銀絲

（即蚕絲），穀雨收蠶，小滿成茧取絲。

## 蔬菜类

### 白蘿蔔

白露秋分种，大雪时结实，續种者冬至后结实，次年开花，花結子，留种子半升，可种亩田，可收蘿蔔四千余斤。

### 蓮藕

春分前后，以藕节生嫩芽者，种浅水塘内，每亩可种五十余株。

五六月开花，花落则实，名曰蓮蓬，初种之地，三年后方可取藕，埤雅云，芙蕖行藕（蘗音巨，芙蕖，荷的别名），如竹之行鞭，节生一叶一花，花叶相偶，故謂之藕，其味甘脆，可解暑渴，方書中又取为散血之用（方書即医方一类）。

的書。

### 瓜果類

#### 瓜之屬

##### 雪瓜

穀雨下種。夏至結實。每畝可種七八十株。每個實重二十余觔(同斤)。

##### 西瓜

三月種。六月結實。南宋洪忠宣云。西瓜種以牛糞。則結實可大如斗。

#### 果之屬

##### 橘

隨時可種。五年后成樹。四月揚花后結實。九十月可收。

##### 柑

春分播種。六七年成樹。四月揚花后結實。九十月可收。

##### 荸薺

六月栽。十月穫。

### 土特產類

甘蔗  
藍子  
灯芯



附录二

江西农业

(第二卷第一期) 民国二十九年(一九四〇年)三月版

临川西瓜

产区

临川西瓜夙負盛名，主产地为该县之东边，綿亘百数个村庄(綿亘音棉梗，连接不断之意)，其总面积約为一千七百三十余亩。

品种

据考察所得，約可分为五  
种，即厚皮青花皮种，薄皮

青花皮种，厚皮白花皮种，薄皮白花皮种，烏皮种等，就中栽培最多者，厥为厚皮青花皮种，而薄皮  
青花皮种次之，至厚皮白花皮种，薄皮白花皮种及烏皮种等则甚少，以下各就其特征而記載之。

(一) 厚皮

青花皮种

瓜为長椭圆形，大者五十余斤，小者十数斤，瓜面有条溝十八九道，溝之地色为黃白色，溝与溝之  
間則隆起为龟背形，滿布小指头大之綠色斑点，濃淡相間，綴成点紋，故有青花皮之名，惟背日光

之面者，其色多呈黃白色，而无花紋，皮厚二公分，瓤音嚶色黃，其接近果中心部分处，則有如砂粒狀之物，味  
甚甜，俗称砂粒，粗大而味甘，水分多，种子黑色，每瓜有六七百粒以上，因其皮厚，故于运输时虽积压数层，亦不  
至压潰，极适于运往外埠，  
因此栽培本种者特多。

(二) 薄皮青花皮种

本种亦为椭圆形，大者四十余斤，瓜面平滑，未具条溝(俗  
称不开面——原註)，皮色背阳面者为黃白色，无点紋，而

当太阳之面者，亦有浓淡相间之指头大斑点，满布瓜面，皮薄，通常为二公分强，瓜瓤黄色，砂粒粗，味甜，种子黑色，每瓜有七八百粒以上，因皮薄不耐运输，故仅供临川零卖切瓜之用，惟本种以瓜板易长，故售价虽略低，仍有一部分农民栽植之。

### (三) 厚皮白花皮种

本种瓜形椭圆形，大者四十余斤，瓜面有条沟，沟与沟之间亦隆起为龟背形，地色为绿黄色，有白色花纹，不甚鲜明，皮厚二公分。

瓤为黄色，砂粒细，甜味，每瓜有种子八九百粒，虽耐贮藏，然栽培者不多。

### (四) 薄皮白花皮种

瓜形亦为椭圆形，大者三十余斤，瓜面无鲜明之条沟，皮薄，通常为二公分，地色为绿黄色。

色，花纹白色，不鲜明，瓤色黄，种子黑色，有七八百粒，砂粒粗，甜味，味美，不耐运输，祇适于切开零食之用。

### (五) 乌皮瓜

瓜形细长，椭圆形，皮为黑绿色，而在其色黑绿，故有乌皮瓜之称，大者三十余斤，小者十余斤，瓜面有条沟十二三道，皮薄，通常为二公分，瓤色有黄红两种，红者少而黄者多，黄瓤者砂粒粗，纤维多，瓤之组织至为疏松，味甜，水分不多，种子黑色，约六百粒。

### 浸种及播种

于清明穀雨间，将前年收藏种子，取出浸水，经一晝夜，则用布包裹好置之灶头，上盖以碗，尔后每日浇水二次，经二三日后即行出芽，出芽之后，则行播种，播种之法，有直播与移植二种。

移植法当种子出芽后，点播于盛有细土之平盆或粪箕内，每隔一寸，播子一粒，其深以不见种子为度，上铺稻草，置之背风处，天气晴暖，酌给清水，经一週左右，子叶发出，子叶出后，仍留原处，生长至本叶发生二三枚，始行定植。

### 定植

瓜田整地之后，即作成长方形之小畦（音希，田一区谓之畦），其宽概为四尺，长则不定，每小畦间，有沟一道，宽约一尺，深亦尺余，定植距离，行间四尺（因每小畦仅种一行，一原註），株间一丈，故每株所占

面积为四十方尺。

### 施肥

西瓜苗幼时，则施用撮水之人粪尿于其周围，及其幼苗成长至一尺许，则于幼苗之周围，掘以深沟，施用芝麻饼粉末于其中，其量每株为二斤，多者三四斤不等，据多人言，用量愈多，

则瓜愈大，瓜愈大则味愈甜。

### 中耕·铺草

瓜定植后，经一个月左右，即行中耕，中耕之后，即制取山上枯草，平铺畦上，厚达二三寸，如是则泥漿不致弹于瓜果上，同时可保持土中适量之水分也。