



高等院校经济类系列教材

经济数学基础

线性代数

王 宏 主编

中

辽宁大学出版社

高等院校经济类系列教材

经济数学基础 (中)
——线性代数

王 宏 主编

辽宁大学出版社

目 录

第一章 行列式.....	1
§ 1.1 行列式的定义	1
§ 1.2 行列式的性质	5
§ 1.3 行列式按一行 (列) 展开.....	12
§ 1.4 克莱姆法则.....	25
习题一	30
第二章 矩阵	38
§ 2.1 矩阵的概念.....	38
§ 2.2 矩阵的运算.....	41
§ 2.3 矩阵的初等变换.....	58
§ 2.4 分块矩阵.....	71
§ 2.5 矩阵的秩.....	80
习题二	85
第三章 n 维向量空间	91
§ 3.1 n 维向量空间的基本概念	91
§ 3.2 向量间的线性关系.....	96
§ 3.3 向量组的秩	102
§ 3.4 线性空间与线性变换	113
习题三.....	126
第四章 线性方程组.....	130
§ 4.1 线性方程组解的判定	130

§ 4.2 消元法	140
§ 4.3 线性方程组解的结构	148
习题四	167
第五章 矩阵的特征值 矩阵的对角化	175
§ 5.1 特征值及特征向量	175
§ 5.2 相似矩阵及矩阵的对角化	183
§ 5.3 实对称矩阵的对角化	189
§ 5.4 约当标准形	195
习题五	197
第六章 二次型	202
§ 6.1 二次型及其标准形	202
§ 6.2 化二次型为标准形	205
§ 6.3 正定二次型	215
习题六	219
习题参考答案	222
后记	235

第一章 行列式

行列式是线性代数中的一个基本工具,也是其他数学分支中的一个重要工具。本章介绍行列式的概念、计算方法及在解线性方程组中的应用。

§ 1.1 行列式的定义

一、排列及其逆序数

将自然数 $1, 2, \dots, n$ 按某种次序排成一列,称为一个 n 阶排列,记为: $j_1 j_2 \dots j_n$ 。例如 $132, 3214, 12345$ 是 3 阶, 4 阶, 5 阶排列。由 $1, 2, 3$ 这三个数组成的所有的 3 阶排列有: $123, 132, 213, 231, 312, 321$ 这 $6 = 3!$ 种不同的情况,对应一种情况就是一个排列。一般地,一个 n 阶排列有 $n!$ 个。如果 n 个数按照从小到大的自然顺序排列 $123 \dots (n-1)n$, 我们说这是一个标准排列。

在一个排列 $j_1 j_2 \dots j_n$ 中,如果有某个较大的数 j_i 排在了较小的数 j_l 的前面,称这两个数 j_i 与 j_l 构成了一个逆序。例如在排列 3214 中, 3 与 2 , 3 与 1 , 2 与 1 都构成了逆序。一个排列 $j_1 j_2 \dots j_n$ 中所有逆序的总数叫做这个排列的逆序数,记作 $\tau(j_1 j_2 \dots j_n)$ 。例如 $\tau(3214) = 3, \tau(n(n-1) \dots 321) = (n-1) + (n-2) + \dots + 3 + 2 + 1 = (n-1)n/2$ 。

逆序数是奇数的排列叫做奇排列;逆序数是偶数的排列叫做偶排列。例如由 $\tau(312) = 2$ 知 312 是偶排列,由 $\tau(321) = 3$ 知 321

是奇排列,容易看到 1,2,3 这 3 个数所构成的 6 个排列中,有 3 个奇排列和 3 个偶排列。

在一个排列 $j_1 \cdots j_i \cdots j_l \cdots j_n$ 中,将 j_i 与 j_l 两个数的位置对调,得到另一个排列 $j_1 \cdots j_l \cdots j_i \cdots j_n$,这样的变换称为一个对换。

定理 1.1 一个排列中的任意两个元素对换,排列改变奇偶性。

证明:首先讨论两个元素处于相邻位置的情形:

设排列为 $j_1 j_2 \cdots j_i j_{i+1} \cdots j_{n-1} j_n$, 对换 j_i 与 j_{i+1} 得到新排列 $j_1 j_2 \cdots j_{i+1} j_i \cdots j_{n-1} j_n$, 显然,除 j_i 与 j_{i+1} 外其余元素的逆序数没有改变,只有 j_i 与 j_{i+1} 的逆序数发生了变化,当 $j_i < j_{i+1}$ 时,对换后的逆序数增加了一个,而当 $j_i > j_{i+1}$ 时对换后的逆序数减少了一个,所以排列 $j_1 j_2 \cdots j_i j_{i+1} \cdots j_{n-1} j_n$ 与排列 $j_1 j_2 \cdots j_{i+1} j_i \cdots j_{n-1} j_n$ 的奇偶性不同。

再讨论一般情况,排列为 $j_1 j_2 \cdots a j_{i+1} j_{i+2} \cdots j_{i+t} b \cdots j_{n-1} j_n$, 对换 a, b 得新排列 $j_1 j_2 \cdots b j_{i+1} j_{i+2} \cdots j_{i+t} a \cdots j_{n-1} j_n$, 此新排列可以通过一系列相邻两个元素的对换来实现,即 $j_1 j_2 \cdots a j_{i+1} j_{i+2} \cdots j_{i+t} b \cdots j_{n-1} j_n$ 经 t 次对换得到 $j_1 j_2 \cdots j_{i+1} j_{i+2} \cdots j_{i+t} a b \cdots j_{n-1} j_n$, 此排列再经 $t+1$ 次对换得到 $j_1 j_2 \cdots b j_{i+1} j_{i+2} \cdots j_{i+t} a \cdots j_{n-1} j_n$, 于是总计经过 $2t+1$ 次对换使原排列换为新排列,所以两个排列的奇偶性相反。

推论 1 任一 n 阶排列都可以经过一系列对换与 n 阶标准排列互变,且对换的次数与这个 n 阶排列的奇偶性相同。

推论 2 全部 $n!$ 个 n 阶排列中,偶排列和奇排列各占一半,均为 $n!/2$ 个。

二、 n 阶行列式的定义

为了得出 n 阶行列式的定义,我们先研究三阶行列式的结构:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

可以看出三阶行列式的特点：

(1) 它是一个含有 $3! = 6$ 项的代数和；(2) 它的每一项都是 3 个元素的乘积，且这 3 个元素取自于不同行不同列；(3) 它的每一项的符号由当行标为标准排列时，列标排列的奇偶性来确定。根据这三个特点，三阶行列式的定义如下：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

仿此，给出 n 阶行列式的定义。

定义 1 n^2 个数 a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 组成的 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有的 n 阶排列求和，共有 $n!$ 项，每一项

$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 是取自于不同行不同列元素的乘积； $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 表示当行标为标准排列时，列标排列的逆序数。

例 1 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

$$= a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

这种主对角线下方的元素全为零的行列式称为上三角形行列式，此例表明上三角形行列式的值等于主对角线上元素的乘积。类似的有下三角形行列式（主对角线上方的元素全为零的行列式）

的值等于主对角线上元素的乘积。主对角线以外的元素全为零的行列式称为对角形行列式，由定义可以得出对角形行列式的值等于主对角线上元素的乘积。

在行列式的定义中，每一项的符号是由当行标按标准排列时，列标排列的逆序数确定的，实际上由于对换乘积中两个元素的次序，行标排列和列标排列同时作了相应的对换，则行标排列和列标排列的逆序数之和的奇偶性并不改变，所以当列标为标准排列时，可由行标的逆序数确定每一项的符号，即

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

所以 n 阶行列式的定义也可以表示为：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

例 2 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2(n-1)} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} & a_{(n-1)n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

$$= (-1)^{\tau(n(n-1) \cdots 321)} a_{n1} a_{(n-1)2} \cdots a_{1n} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{n1} a_{(n-1)2} \cdots a_{1n}$$

由于数的乘法具有交换律，所以行列式中每一项里 n 个元素的次序可以任意排列： $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$ 可以证明这项所带的符号为： $(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$ 。

§ 1.2 行列式的性质

用定义去计算行列式计算量很大,是非常麻烦的,为简化计算,下面来介绍行列式的一些基本性质。

$$\text{若 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \text{ 称 } D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

为行列式 D 的转置行列式。

性质 1 行列式经转置后其值不变。即 $D^T = D$

性质 2 若行列式的某一行(或列)元素全为零,则此行列式值为零。

上述两条性质由行列式定义即可推得

性质 3 交换行列式的两行(或两列),行列式的值变号

$$\text{证明: 设 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

交换 s, t 两行得

$$D_0 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_1 \cdots j_t \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{tj_t} \cdots a_{rj_r} \cdots a_{nj_n}$$

$$D_0 = \sum (-1)^{\tau(1 \cdots t \cdots r \cdots n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_t \cdots j_r \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{tj_t} \cdots a_{rj_r} \cdots a_{nj_n}$$

比较 D 与 D_0 可知, 在 D 中行标按标准排列, 在 D_0 中仅仅交换元素 a_{tj_t} 与 a_{rj_r} 元素的行序, 故乘积不变, 即 $a_{1j_1} \cdots a_{tj_t} \cdots a_{rj_r} \cdots a_{nj_n} = a_{1j_1} \cdots a_{rj_r} \cdots a_{tj_t} \cdots a_{nj_n}$, 下面来看符号, 由排列性质可知, 进行一次对换就改变排列的奇偶性。

$$\text{故 } (-1)^{\tau(1 \cdots t \cdots r \cdots n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_t \cdots j_r \cdots j_n)} = -(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_t \cdots j_t \cdots j_n)}$$

符号相反, 即 $D_0 = -D$

性质 4 若行列式的某两行(或两列)对应元素相同, 则此行列式值为零。

证明: 将这相同的两行(或两列)互换, 有 $D = -D$, 故 $D = 0$ 。

性质 5 行列式中某一行(或列)的所有元素的公因子可以提到行列式符号外面(或者说一个数乘一个行列式相当于把这个数乘到行列式的某一行(或列)的所有元素上)

$$\text{证明: } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{r1} & ka_{r2} & \cdots & ka_{rn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots k a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\
&= k \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\
&= k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

性质 6 若行列式的某两行(或两列)元素对应成比例,则此行列式值为零。

此性质可由性质 5 及性质 4 推出。

性质 7 若行列式 $D = |a_{ij}|$ 的某行(或列)的元素都是两个数的和,如: $a_{i1} = b_{i1} + c_{i1}, a_{i2} = b_{i2} + c_{i2}, \cdots, a_{in} = b_{in} + c_{in}$, 则 D 可写成两个行列式的和: $D = D_1 + D_2$ 其中:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明: 由行列式定义

$$D = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots (b_{ij_i} + c_{ij_i}) \cdots a_{nj_n}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} \dots b_{ij_1} \dots a_{nj_n} \\
&\quad + \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} \dots c_{ij_1} \dots a_{nj_n} \\
&= D_1 + D_2
\end{aligned}$$

此性质可推广到某一行(或某一列)都是 $m(m > 2)$ 个数和的情形。

性质 8 若将行列式的某行(或列)的所有元素同乘一个数加到另一行(或列)的对应元素上,则行列式的值不变。

证明: 设把行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{sn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

的第 s 行的每个元素同乘 k 加到第 r 行对应的元素上得

$$D_0 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{s1} + ka_{s1} & a_{s2} + ka_{s2} & \dots & a_{sn} + ka_{sn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{性质 7}} D + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{性质 6}} D + 0 = D$$

利用行列式的上述性质,可以化简行列式的计算。

例 3 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & a-2 \\ b & 1 & b-2 \\ c & 1 & c-2 \end{vmatrix}$$

解:方法一:用性质 8,把第 1 列的所有元素乘 (-1) 加到第 3 列的对应元素上,即

$$D \xrightarrow{\text{①} \times (-1) + \text{③ 列}} \begin{vmatrix} a & 1 & -2 \\ b & 1 & -2 \\ c & 1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{性质 6}} 0$$

方法二:

$$D \xrightarrow{\text{性质 7}} \begin{vmatrix} a & 1 & a \\ b & 1 & b \\ c & 1 & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 1 & -2 \\ b & 1 & -2 \\ c & 1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{性质 4 或 6}} 0 + 0 = 0$$

在前面的例 1 中,我们很容易地用定义求出了三角形行列式的值,对一般的行列式,我们可以通过利用行列式的性质将其化为三角形行列式的方法来计算它。

例 4 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 7 & -5 & -2 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\text{解: } D \xrightarrow[\text{①} \times 1 + \text{④ 行}]{\text{①} \times (-2) + \text{③ 行}} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{交换 ②④ 列}} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= -[1 \times 3 \times (-1) \times 4] = 12$$

例 5 计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

解: 把所有列乘 1 都加到第 1 列上, 得

$$D = \begin{vmatrix} x + (n-1)a & a & a & \cdots & a \\ x + (n-1)a & x & a & \cdots & a \\ x + (n-1)a & a & x & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x + (n-1)a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{\text{性质 5}} [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 1 & x & a & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{其它行上去}]{\text{①行} \times (-1) \text{加到}} \\
& [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 0 & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix} \\
& = [x + (n-1)a](x-a)^{n-1}
\end{aligned}$$

例 6 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}, \text{其中 } a_i \neq 0 (i = 0, 1, 2, \cdots, n)$$

解: 从第二行起, 每一行都提出 $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$

$$D = a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \frac{c_1}{a_1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{c_2}{a_2} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{c_n}{a_n} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{n+1列} \times (3 - \frac{c_n}{a_n}) + \text{①列}]{\text{②列} \times (-\frac{c_1}{a_1}) + \text{①列}}$$

$$\begin{aligned}
& a_1 a_2 \cdots a_n \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{b_i c_i}{a_i} & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
&= a_1 a_2 \cdots a_n (a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{b_i c_i}{a_i})
\end{aligned}$$

§ 1.3 行列式按一行(列)展开

一般地,低阶行列式的计算要比高阶行列式的计算简便,因此,我们要研究行列式计算中的降阶问题。

一、子式、余子式、代数余子式

在一个 n 阶行列式 D 中,任意选定 k 行 k 列,把这些行和列相交处的元素,按其原有的相对位置排成一个 k 阶行列式 N_k ,称 N_k 为 D 的一个 k 阶子式;在 D 中将这 k 行 k 列元素划去,剩下的元素按原有相对位置,又排成一个 $n-k$ 阶子式记为 M_k ,称 M_k 为 N_k 的余子式;自然 N_k 也可以叫做 M_k 的余子式,可以说 M_k 与 N_k 是行列式 D 的一对互余的子式。

$$\text{例如: } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix} \quad \text{中,第二、三行和第四、}$$

五两列交叉处的四个元素按原有顺序可组成一个二阶子式

$$N_2 = \begin{vmatrix} a_{24} & a_{25} \\ a_{34} & a_{35} \end{vmatrix} \quad \text{它的余子式为} \quad M_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} \end{vmatrix}$$

行列式的一阶子式就是它的一个元素,我们把每个一阶子式的余子式叫做对应元素的余子式,例如 a_{ij} 的余子式记作 M_{ij} 即 n 阶行列式 D 去掉元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列的元素后,余下的元素所构成的 $n-1$ 阶行列式

$$M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j-1} & a_{i-1j+1} & \cdots & a_{i-1n} \\ a_{i+11} & \cdots & a_{i+1j-1} & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{i+1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$$

假设 k 阶子式 N_k 位于序号为 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 的各行及序号为 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 的各列上,则称 $A_k = (-1)^{(i_1+i_2+\dots+i_k)+(j_1+j_2+\dots+j_k)} M_k$ 为 N_k 的代数余子式,上例中子式 N_2 的代数余子式为

$$A_2 = (-1)^{(2+3)+(4+5)} M_2 = M_2$$

元素 a_{ij} 的代数余子式为 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

例1 设三阶行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

求 M_{11}, M_{23}, M_{31} 及 A_{11}, A_{23}, A_{31}

$$\text{解: } M_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1 \quad A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = -1$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \quad A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -2$$