

世界名珍识认



名樹名花

辽宁少年儿童出版社

世界名珍识认

名 树 名 花

郝 勇 编

辽 宁 少 年 儿 童 出 版 社

1991年·沈阳

世界名珍识认·名树名花

郝 勇 编

辽宁少年儿童出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

责任编辑:高洪波 封面设计:王 跃

开本787×1092毫米¹/32·印张2 ·字数30,000

1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷

印数1—3,000

ISBN 7—5315—0845—1/K·34 定价:3.20 元

目 录

- | | |
|---------|---------|
| 1 木瓜树 | 16 假山毛榉 |
| 2 吴茱萸 | 17 绿山楂 |
| 3 冷杉 | 18 英国栎树 |
| 4 木兰 | 19 瓶树 |
| 5 花楸 | 20 炮弹树 |
| 6 榉树 | 21 金紫薇树 |
| 7 雪松 | 22 旃檀树 |
| 8 槭树 | 23 樱花 |
| 9 乌桕树 | 24 大百合 |
| 10 香榧 | 25 月季花 |
| 11 猴面包树 | 26 瓜叶菊 |
| 12 红树 | 27 玫瑰 |
| 13 红杉 | 28 冬青 |
| 14 丁香树 | 29 黄蔷薇 |
| 15 云杉 | 30 扶桑 |

31 梅 花
32 罌 粟
33 郁金香
34 君子兰
35 仙人掌
36 大丽菊
37 山茱萸
38 鹤望兰
39 曼陀罗
40 令箭荷花
41 荷包牡丹
42 玉 兰
43 朱顶兰
44 鸢 尾
45 牡 丹

46 杜鹃花
47 芍 药
48 老虎花
49 万代兰
50 永久花
51 大花草
52 雏 菊
53 羽扇豆
54 延龄草
55 秋海棠
56 荷 花
57 海 芋
58 紫罗兰
59 蜡 菊
60 蝴蝶花



mù guā shù
木 瓜 树
Chinese Flowering Quince



木瓜树也称“榎櫨”。为蔷薇科，落叶小乔木。树叶呈椭圆状卵形，嫩叶背面被绒毛。春末、夏初开花，花淡红色。果实秋季成熟，长椭圆形，淡黄色，味酸涩，有香气。我国长江流域以南地区有栽培。树供观赏；果经蒸煮后可食用。中医学上以果实入药，名“光皮木瓜”，性温，有舒筋、祛湿等功能。



wú zhū yú
吴 茱 萸
Evodia



吴茱萸是芸香科，落叶小乔木。叶对生，奇数羽状复叶，小叶呈卵状长椭圆形，全缘，有肉眼可见的透明腺点。嫩枝和叶均被软毛。夏季开花，果实红紫色。产于我国中部及朝鲜。中医学上以未成熟的果实入药，性热、味苦辛，主治胃寒疼痛、腹痛等症。

lěng

冷

shān

杉

Fir



冷杉为松科。常绿乔木。小枝平滑，有圆形叶痕。叶呈线形，扁平，上面中脉凹下。球果单生叶间，体形大，直立，多为圆柱状，熟时脱落。冷杉耐阴性强，耐寒，喜凉润气候，多为产地造林树种。此树木材质地较软，可供建筑、造纸、火柴杆等用材，又为观赏树。



mù lán
木 兰

Lily Magnolia



木兰也称“辛夷”。
木兰科。为落叶小乔木或灌木。叶子为倒卵形或倒卵状长椭圆形。早春先叶开花，花被片九，每轮三片，最小一轮较小，其余两轮大，矩圆状倒卵形，长8至10厘米，内为白色。木兰产于我国中部，久经栽培，供观赏。中医学上以干燥的花蕾入药，主治头痛等症。

huā qiū
花 楸
Mountain ash



花楸又称“水榆”、“水榆花楸”。属蔷薇科。落叶乔木。单叶，互生，卵形至椭圆状。初夏开花，花白色，果实为红色或黄色。生于山坡、山沟或山顶混交林或灌木丛中。产于朝鲜和日本。叶子秋令变红色，可供观赏；木材可制车辆、器具等；果可食，树皮可提制栲胶。



jǔ
榉

shù
树


Beech



榉树属榆科，为落叶乔木，高可达25米。小枝很细。叶片互生，排为两列，呈椭圆状，边缘有单锯齿，叶柄很短。春季开花，杂性同株或雌雄同株。坚果小，上部歪，直径约4毫米。榉树喜光，喜温暖气候及肥沃湿润土壤。木材坚实，耐水湿，为优良家具用材，又可供造船、桥梁等用。

xuě sōng
雪 松
Cedar White Pine


雪松属松科。为常绿大乔木。它高达50米。枝轮生，横展，小枝下垂。叶在长枝上散生，在短枝上多枚簇生，针形，有三棱角，刚强，尖锐。球果为椭圆形，长7—12厘米，直立，二年成熟。雪松产于我国喜马拉雅山，为著名观赏植物。其木材坚实致密，耐久用，有广泛用途。种子可榨油，供工业用。



qī
槭

shù
树

Maple



槭树属双子叶植物纲。乔木或灌木，通常落叶。主要特征为具对生叶和双翅果。槭树品种很多，较著名的有三角槭，也称“三角枫”，叶常三裂，见于我国中部、东部至日本。为当地林区中重要阔叶树种。入秋叶片变红色，为观赏植物之一。此树木材坚实，用途广泛。

wū jù shù
乌 柏 树

Chinese Tallow Tree;

Chinese Sapium



乌柏树属大戟科。
落叶乔木，高达15米。
叶互生，为菱状卵形，
叶柄细长。夏季开花。
此树产于我国山东以南
各地区。喜光，喜湿，
在酸性土、微钙质土上
均能生长。木材细致，
色白而坚，供细木工用。




xiāng


fěi

香 榧

Chinese Torreya



香榧属红豆杉科。常绿乔木，高达25米。叶线状披针形，质地坚硬，先端有凸起的刺状短尖头。春末开花，翌年秋季果子成熟。种子核果状，广椭圆形，初为绿色，后紫褐色。香榧性耐荫，宜温暖湿润气候。为我国特有树种。木材可造船，种子可食用或入药，也可榨油供食用。



hóu miàn bāo shù

猴 面 包 树

Monkey - bread Tree; Baobab

猴面包树属木棉科。一般高达15米，具有较短的树干，干直径可达9米，为世界上最粗的树木。分枝展开也可达9米。掌状复叶。花大，白色。果皮木质，为长椭圆形。果中柔软部分，味美可食。猴子喜欢食此果，因而得名。树皮的纤维可制纸或织物。此树产于非洲热带草原地区，树龄长达五千余年，为最长寿的树木之一。


hóng

红

shù

树

Mangrove



红树为常绿灌木至小乔木，有支柱根。单叶，对生，草质，长椭圆形；叶柄较厚、扁。花为黄白色，两朵并生，花瓣四枚，无毛。种子一枚，于果实离母树前发芽，胚根呈长棒状。红树分布于热带亚洲至澳大利亚。一般生长在海岸泥滩上。树皮含丰富的单宁，为浸染皮革和渔网的重要原料。