



四川农业害虫及其天敌名录



四川科学技术出版社

四川农业
害虫及其天敌
——名 录——

四川省农科院植保所
西南农学院植保系 主编
四川省农牧厅植保站

四川科学技术出版社

一九八六年·成都

责任编辑：黄灼章
封面设计：曹辉禄
版面设计：翁宜民

四川农业害虫及其天敌名录

出版：四川科学技术出版社
印刷：四川新华印刷厂
发行：四川省新华书店
开本：787×1092毫米 1/16
印张： 11 插页： 5
字数： 255千
印数： 1—3,000
版次：1986年12月 第一版
印次：1986年12月 第一次印刷
书号： 16298·243
定价： 3.20元

LIST ON AGRICULTURAL PEST INSECTS AND THEIR NATUR- AL ENEMIES OF SICHUAN CHINA

Edited by

Institution of Plant Protection, Sichuan Academy of Agricu-
ltural Science

Dept. of Plant Protection, Southwestern Agricultural College

Experiment Station of Plant Protection of Sichuan Prov.

**SICHUAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL
PUBLISHING HOUSE**

工 作 单 位

主持单位：四川省农科院植保所

西南农学院植保系

四川省农牧厅植保站

协作单位：四川农学院农学系

中国农科院柑桔研究所

四川省农科院棉花研究所

四川省农科院茶叶研究所

四川省内江地区农科所

四川省渡口市农科所

四川省甘孜州农科所

四川省农科院果树研究所

四川省宜宾地区园艺科学研究所

四川省凉山州热带作物所

四川省成都市农科所

四川省农牧厅植保站主持十八个有代表性的县、区农业局植保站：**长寿、北碚、米易、永川、开县、酉阳、资阳、泸县、江安、珙县、筠连、峨眉、新津、广元、射洪、岳池、万源、荣经。**

标本鉴定单位

四川省农科院植保所、西南农学院植保系、四川农学院农学系、中国农科院柑桔研究所、四川省农科院棉花研究所。

中国科学院动物所、浙江农业大学、湖南师范学院、吉林医科大学、华南农学院、福建农学院、华中农学院、广东昆虫所等有关专家先后鉴定部分标本。

标本存放单位

四川省农业害虫及其天敌资源标本馆（设在四川省农科院植保所）。同时西南农学院，四川省农牧厅植保站，四川农学院，中国农科院柑桔研究所，四川省农科院棉花研究所、果树研究所、茶叶研究所，四川省内江地区农科所，四川省渡口市农科所，四川省甘孜州农科所，四川省宜宾地区园科所，四川省成都市农科所，四川省凉山州热带作物研究所以及18县的植保站分别保存有关标本。

前 言

开展农业害虫及其天敌资源的调查, 是对农业害虫实施综合治理和保护利用天敌资源的一项基础工作。我省幅员广阔, 地形复杂, 气候温暖, 植被丰富, 昆虫种类繁多, 各种农作物的害虫甚为复杂, 抑制害虫的天敌资源亦极为丰富。查明我省农作物害虫及其天敌资源, 为我省植保区划和综合防治害虫规划的制订提供依据, 并为研究不同农作物生态型地区、害虫与其天敌的消长、预测发展趋势、开展生物防治以及科学管理害虫提供科学根据, 在原农业部开展农业害虫天敌资源普查工作通知精神的指导下, 四川省科学技术委员会于1980年将四川省农业害虫及其天敌资源调查列为重点课题之一, 以我省主要粮食作物与经济作物的害虫及主要害虫的天敌资源为调查对象。自1980~1982年, 由四川省农科院与西南农学院主持13个科研、教学单位, 四川省农牧厅主持18个试点县、区的植保站组成“四川省农业害虫及其天敌资源调查协作组”, 在四川省科学技术委员会的统一领导下协同进行工作。三年来, 各协作单位根据分工承担的任务, 调查主要害虫及其天敌资源的原则, 采取普查与系统调查结合、田间调查与室内饲养观察结合和边调查边整理鉴定等方法, 工作按计划进行, 于1982年基本完成调查任务, 在此基础上编写《四川省农业害虫及其天敌名录》。参加此项调查工作的人数十三个单位及十八个县、区每年在百人左右, 采集标本总计二十余万号。各县标本, 由县作初步整理, 分片集中, 四川省农科院植保所与西南农学院组织力量, 整理鉴定; 各单位标本, 由单位作初步整理鉴定, 并请省内专家鉴定; 部分标本请国内专家鉴定, 最后集中进行统一整理, 复查鉴定, 编写名录。在此, 谨向参加标本鉴定和审定的专家们表示衷心感谢。二十余万号标本中, 尚有10~30%未能鉴定属种, 据统计: 农业害虫经鉴定属种编入名录的昆虫10目117科1090种, 蛴螬目6科21种, 软体动物4科5种, 总计1116种; 天敌经鉴定属种编入名录的昆虫纲81科746种, 蛛形纲32科193种, 真菌7种, 病毒5种, 线虫3种, 总计947种。水稻: 害虫210种, 天敌370种; 小麦: 害虫132种, 天敌105种; 玉米: 害虫171种, 天敌220种; 青稞: 害虫36种, 天敌20种; 甘薯: 害虫70种; 棉花: 害虫147种, 天敌259种; 甘蔗: 害虫171种, 天敌83种; 茶树: 害虫166种, 天敌230种; 油菜: 害虫45种, 天敌20种; 柑桔: 害虫263种, 天敌171种; 梨、苹落叶果树: 害虫354种, 天敌143种; 龙眼、荔枝: 害虫43种, 天敌44种; 芒果: 害虫41种, 天敌72种; 蔬菜: 害虫268种, 天敌234种。在天敌资源调查中, 发现国内新记录21种。通过三年工作调查采集了大量标本, 积累了大量资料, 初步摸清我省主要粮食作物和经济作物害虫及害虫天敌的种类分布和经济重要性, 找到了一些天敌的优势种, 为我省农业害虫综合防治及保护利用天敌资源和我省植保科研、植保现代化奠定了基础。由于此项调查时间短, 人力少, 调查地区、调查作物不够全面, 加之我们水平有限, 资料贫乏, 鉴定可能不确切或有错误, 小部分标本尚未能鉴定, 极待今后继续努力, 名录中错漏之处, 敬请批评指正。

四川省农业害虫及其天敌资源调查协作组

1984年

目 录

一、农业害虫名录	1	蚜科	Aphididae.....	11
弹尾目 COLLEMBOLA	1	珠蚧科	Margarodidae	13
棘跳虫科 Onychiuridae.....	1	粉蚧科	Pseudococcidae	13
等翅目 ISOPTERA.....	1	壶蚧科	Cerococcidae.....	14
犀白蚁科 Rhinotermitidae	1	蚧科	Coccidae	14
白蚁科 Termitidae.....	1	盾蚧科	Diaspididae	14
直翅目 ORTHOPTERA	1	半翅目 HEMIPTERA.....	10	
蝗科 Acrididae	1	土蝽科	Cydnidae... ..	16
菱蝗科 Tetrigidae	3	龟蝽科	Plataspidae	16
螽斯科 Tettigoniidae.....	3	盾蝽科	Scutelleridae.....	16
蟋蟀科 Gryllidae	4	蝽科	Pentatomidae	16
蝼蛄科 Gryllotalpidae	4	缘蝽科	Coreidae.....	16
蚤蝼科 Tridactylidae	4	盲蝽科	Miridae	19
同翅目 HOMOPTERA	4	红蝽科	Pyrrhocoridae	21
蝉科 Cicadidae	4	长蝽科	Lygaeidae	22
角蝉科 Membracidae	5	网蝽科	Tingidae.....	22
沫蝉科 Cercopidae.....	5	缨翅目 THYSANOPTERA	22	
狭叶蝉科 Euscelidae.....	5	蓟马科	Thripidae	22
小叶蝉科 Typhlocybidae.....	6	管蓟马科	Phloeothripidae	23
大叶蝉科 Tettigellidae	7	鞘翅目 COLEOPTERA	23	
叶蝉科 Jassidae	7	萤科	Lampyridae	23
离脉叶蝉科Coelidiidae.....	8	郭公虫科	Cleridae	23
耳叶蝉科 Ledridae.....	8	叩头虫科	Elateridae	23
铲头叶蝉科Hecalidae	8	吉丁虫科	Buprestidae	24
飞虱科 Delphacidae	8	露尾甲科	Nitidulidae.....	24
蜡蝉科 Fulgoridae.....	9	扁甲科	Cucujidae	24
麦蜡蝉科 Cixiidae	9	瓢虫科	Coccinellidae.....	24
粒脉蜡蝉科Meenoplidae.....	9	芫菁科	Meloidae.....	24
象蜡蝉科 Dictyopharidae	9	伪叶甲科	Lagriidae	25
长翅蜡蝉科 Derbidae	9	长蠹科	Bostrychidae	25
蛾蜡蝉科 Flatidae	9	金龟子总科	Scarabaeoidea.....	25
广翅蜡蝉科Ricanidae	10	锹甲科	Lucanidae	28
木虱科 Chermidae.....	10	天牛科	Cerambycidae	28
粉虱科 Aleyrodidae	10	叶甲科	Chrysomelidae.....	31
根瘤蚜科 Phylloxeridae	11	豆象科	Bruchidae	36
绵蚜科 Eriosomatidae	11	长角象虫科	Anthribidae	36

象虫科	Curculionidae	36
小蠹科	Scolytidae	39
鳞翅目	LEPIDOPTERA	39
透翅蛾科	Aegeriidae	39
麦蛾科	Gelechiidae	40
尖翅蛾科	Cosmopterygidae	40
织叶蛾科	Oecophoridae	40
木蛾科	Xyloryctidae	40
巢蛾科	Yponomeutidae	40
细蛾科	Gracilariidae	40
潜蛾科	Lyonetiidae	41
叶潜蛾科	Phyllocnistidae	41
菜蛾科	Plutellidae	41
木蠹蛾科	Cossidae	41
举肢蛾科	Heliodinidae	41
豹蠹蛾科	Zeuzeridae	41
蓑蛾科	Psychidae	41
刺蛾科	Limacodidae (Euclidae, Cochliidiidae)	42
斑蛾科	Zygaenidae	42
蛀果蛾科	Carposinidae	43
小卷叶蛾科	Olethreutidae	43
卷叶蛾科	Tortricidae	43
窗蛾科	Thyrididae	44
螟蛾科	Pyralidae	44
枯叶蛾科	Lasiocampidae	46
大蚕蛾科	Saturniidae	47
蚕蛾科	Bombycidae	47
尺蛾科	Geometridae	47
天蛾科	Sphingidae	48
舟蛾科	Notodontidae	49
鹿蛾科	Amatidae	49
灯蛾科	Arctiidae	49
苔蛾科	Lithosiidae	50
瘤蛾科	Nolidae	50
夜蛾科	Noctuidae	50
毒蛾科	Lymantriidae	55
弄蝶科	Hesperiidae	57
蛱蝶科	Nymphalidae	57
眼蝶科	Satyridae	58
灰蝶科	Lycaenidae	58
粉蝶科	Pieridae	59
凤蝶科	Papilionidae	59

双翅目	DIPTERA	60
大蚊科	Tipulidae	60
尖眼蕈蚊科	Sciaridae	60
瘿蚊科	Cecidomyiidae	60
毛蚊科	Bibionidae	61
粪蝇科	Cordyluridae	61
实蝇科	Trypetidae	61
水蝇科	Ephydriidae	61
黄潜蝇科	Oscinidae	61
潜蝇科	Agromyzidae	62
膜翅目	HYMENOPTERA	62
叶蜂科	Tenthredinidae	62
茎蜂科	Cephidae	62
胡蜂科	Vespidae	62
蜱螨目	ACARINA	63
跗线螨科	Tarsonemidae	63
真足螨科	Eupodidae	63
叶螨科	Tetranychidae	63
须螨科	Tenuipalpidae	63
瘿螨科	Eriophyidae	64
前翼甲螨科	Pelopidae	64
有肺目	PULMONATA	64
巴蜗牛科	Bradybaenidae	64
大蜗牛科	Helicidae	64
蛞蝓科	Limacidae	64
嗜粘液蛞蝓科	Philomycidae	64

二、农业害虫天敌名录	65	
膜翅目	HYMENOPTERA	65
姬蜂科	Ichneumonidae	65
茧蜂科	Braconidae	72
蚜茧蜂科	Aphidiidae	77
旗腹姬蜂科	Evanidae	78
小蜂科	Chalcididae	78
长尾小蜂科	Torymidae	79
广肩小蜂科	Eurytomidae	79
扁股小蜂科	Elasmidae	80
姬小蜂科	Eulophidae	80
金小蜂科	Pteromalidae	82
蚜小蜂科	Aphelinidae	82
跳小蜂科	Encyrtidae	84
旋小蜂科	Eupelmidae	85
缨小蜂科	Mymaridae	85

纹翅小蜂科 (赤眼蜂科)	Trichogrammatidae	86	猎蝽科	Reduviidae	105
缘腹卵蜂科	Scelionidae	87	花蝽科	Anthocoridae	106
分盾细蜂科	Ceraphronidae	88	盲蝽科	Miridae	106
细蜂科	Proctotrupidae	88	跳蝽科	Saldidae	107
广腹细蜂科	Platygasteridae	89	蝎蝽科	Nepidae	107
螫蜂科	Dryinidae	89	长蝽科	Lygaeidae	107
肿腿蜂科	Bethylidae	89	宽尾蝽科	Velidae	107
青蜂科	Chrysididae	90	尺蝽科	Hydrometridae	107
土蜂科	Scoliidae	90	脉翅目	NEUROPTERA	107
蚊科	Formicidae	90	齿蛉科 (鱼蛉科)	Corydalidae	107
胡蜂科	Vespidae	90	褐蛉科	Hemerobiidae	108
螺赢科	Eumenidae	91	草蛉科	Chrysopidae	108
泥蜂科	Sphecidae	91	粉蛉科	Coniopterygidae	108
蛛蜂科	Pompilidae	91	蝶角蛉科	Ascalaphidae	108
双翅目	DIPTERA	91	蚊蛉科	Myrmeleontidae	109
寄蝇科	Tachinidae	91	捻翅目	STREPSIPTERA	109
麻蝇科	Sarcophagidae	93	附螋科	Elenchidae	109
长足寄蝇科	Dexiidae	93	栉螋科	Halictophagidae	109
斑腹蝇科	Chamaemyiidae	93	蜻蜓目	ODONATA	109
食蚜蝇科	Syrphidae	93	蜻科	Libellulidae	109
头蝇科	Pipunculidae	95	蜓科	Aeshnidae	109
蚤蝇科	Phoridae	95	箭蜓科	Gomphidae	109
沼蝇科	Sciomyzidae	95	螳科	Coenagriidae	109
瘿蚊科	Cecidomyiidae	95	山螳科	Megapodagriidae	110
长足虻科	Dolichopodidae	95	扁螳科	Platystictidae	110
食虫虻科	Asilidae	95	螳螂目	MANTODEA	110
蜂虻科	Bombyliidae	95	螳螂科	Mantidae	110
鞘翅目	COLEOPTERA	95	花螳科	hymenopodidae	110
瓢虫科	Coccinellidae	95	革翅目	DERMAPTERA	110
步甲科	Carabidae	100	蠹螂科	Labiduridae	110
虎甲科	Cicindelidae	103	缨翅目	THYSANOPTERA	111
方头甲科	Cybocephalidae	104	蓟马科	Thripidae	111
隐翅甲科	Staphylinidae	104	管蓟马科	Phloeothripidae	111
芫菁科	Meloidae	104	纹蓟马科	Aeolothripidae	111
皮蠹科	Dermestidae	104	直翅目	ORTHOPTERA	111
长角象科	Anthribidae	104	螽斯科	Tettigoniidae	111
棒角甲科	Paussidae	104	蜘蛛类	ARANEIDA	111
蚁形甲科	Anthicidae	104	地蛛科	Atypidae	111
半翅目	HEMIPTERA	105	拟壁钱科	Oecobiidae	111
蝽科	Pentatomidae	105	暗蛛科	Amaurobiidae	111
姬猎蝽科	Nabidae	105	卷叶蛛科	Dictynidae	111
			疣蛛科	Uloboridae	111

花皮蛛科	Sicariidae	112
幽灵蛛科	Pholcidae	112
壁钱科	Urocteidae	112
圆蛛科	Araneidae	112
蠕蛛科	Tetragnathidae	115
球腹蛛科	Theridiidae	116
皿网蛛科	Linyphiidae	117
微蛛科	Erigonidae	117
漏斗蛛科	Agelenidae	118
栅蛛科	Hahniidae	118
狼蛛科	Lycosidae	118
盗蛛科	Pisauridae	119
猫蛛科	Oxyopidae	120
平腹蛛科	Gnaphosidae	120
扁蛛科	Platoridae	120
管巢蛛科	Clubionidae	120
帚足蛛科	Ctenidae	121
巨蟹蛛科	Heteropodidae	121

拟扁蛛科	Selenopidae	121
蟹蛛科	Thomisidae	121
跳蛛科	Salticidae	122
蜱螨目	ACARINA	124
植绥螨科	Phytoseiidae	124
长须螨科	Stigmaeidae	124
大赤螨科	Anystidae	124
绒螨科	Trombididae	124
蒲螨科	Pyemotidae	124
真菌类	FUNGI	124
病毒类	VIRUS	125
线虫类	NEMATODE	125
三、农业害虫中名索引		126
四、农业害虫学名索引		136
五、农业害虫天敌中名索引		150
六、农业害虫天敌学名索引		159

一、农业害虫名录

弹尾目 COLLEMBOLA

棘跳虫科 Onychiuridae

【麦拟跳虫】*Onychiurus sp.*

寄主：小麦、豌豆、甘薯、萝卜、莴苣。
分布：全省。

等翅目 ISOPTERA

犀白蚁科 Rhinotermitidae

【家白蚁】*Coptotermes formosanus* Shiraki

寄主：柑桔、甘蔗、树木。
分布：北碚、巴县、江津、合川、万县、泸县。

【黑胸散白蚁】*Reticulitermes chinensis* Snyder

寄主：甘蔗。
分布：米易。

白蚁科 Termitidae

【黑翅土白蚁】*Odontotermes formosanus* Shiraki

寄主：小麦、甘蔗、梨、苹、柑桔、芒果、荔枝、茶。
分布：全省。

直翅目 ORTHOPTERA

蝗科 Acrididae

【剑角蝗】*Acrida cinerea* (Thunb.)

寄主：水稻、玉米、棉花、甘蔗、甘薯、大豆、烟草、茶。

分布：全省。

【花胫绿纹蝗】*Aiolopus tamulus* (Fabricius)

寄主：水稻、小麦、玉米、甘薯、棉花、甘蔗、大豆、茶。

分布：全省。

【短翅负蝗】*Atractomorpha crenulata* (Fabricius)

寄主：棉花、玉米、甘蔗、大豆。

分布：全省。

【短额负蝗】*Atractomorpha sinensis* Bolivar

寄主：水稻、玉米、甘薯、大豆、花生、高粱、棉花、马铃薯、烟、蔬菜、茶、甘蔗、柑桔。

分布：全省。

【短星翅蝗】*Calliptamus abbreviatus* (Ikonnikov)

寄主：棉花、小麦、胡麻、荞麦、牧草。
分布：江津、万县、涪陵、泸县、绵阳、温江、雅安、达县等地。

【红褐斑腿蝗】*Catantops pinguis* (Stål)

寄主：水稻、小麦、棉花、甘薯、桑、茶。
分布：永川、涪陵、内江、宜宾、乐山、万县、雅安、重庆等地区。

【青脊竹蝗】*Ceracris nigricornis* Walker

寄主：竹、玉米、水稻、高粱。
分布：永川、万县、宜宾、涪陵、温江、内江、绵阳、达县、雅安等地区。

【棉蝗】*Chondracris rosea rosea* (De Geer)

寄主：棉花、水稻、玉米、甘蔗、高粱、苧麻、柑桔、茶。

分布：全省。

【云斑车蝗】*Gastrimargus marmoratus*
Thunberg

寄主：棉花、水稻、小麦、玉米、高粱、甘蔗、柑桔。

分布：全省。

【芋蝗】*Gesonula punctifrons* (Stål)

寄主：芋、水稻、玉米、高粱、甘蔗。

分布：成都、绵阳、内江、简阳。

【二色翼蝗】*Gonista bicolor* (Haan)

寄主：水稻。

分布：仁寿、崇庆、大邑、金堂、新津、铜梁、綦江、内江。

【方异距蝗】*Heteropternis respondens*
(Walker)

寄主：水稻、甘蔗、茶。

分布：温江、成都、重庆、涪陵、万县、绵阳、西昌、乐山等地区。

【斑角蔗蝗】*Hieroglyphus annulicornis*
(Shiraki)

寄主：甘蔗、棉花、水稻、玉米、高粱。

分布：全省。

【东亚飞蝗】*Locusta migratoria manilensis*
(Meyen)

寄主：水稻、小麦、玉米、高粱等作物及禾本科植物。

分布：永川、渡口、宁南、西昌。

飞蝗是我国历史性的害虫，常造成巨大危害，但我省仅在个别地区偶而采到零星的散居型标本。

【黄胫小车蝗】*Oedaleus infernalis infernalis*
Saussure

寄主：水稻、玉米、高粱、甘蔗、小麦、大豆、麻、马铃薯。

分布：全省。

【红胫小车蝗】*Oedaleus manjuius* Chang

寄主：水稻、小麦、玉米、高粱。

分布：资阳、成都。

【山稻蝗】*Oxya agavisa* Tsai

寄主：水稻。

分布：成都。

【中华稻蝗】*Oxya chinensis* (Thunberg)

寄主：水稻、玉米、高粱、小麦、甘薯、马铃薯、豆类、棉花、亚麻、甘蔗、柑桔。

分布：全省。

【小稻蝗】*Oxya intricata* (Stål)

寄主：水稻、玉米、甘蔗、小麦、茶。

分布：全省。

成虫、若虫食害叶子，卵产于土下，外包暗褐色胶囊，少数可产在叶面或叶鞘上。

【短翅稻蝗】*Oxya japonica* Willemse

寄主：水稻。

分布：万县。

【华二齿和蝗】*Oxyina sinobidentata*
(Hollis)

寄主：水稻。

分布：永川。

【日本黄脊蝗】*Patanga japonica*
(Bolivar)

寄主：水稻、玉米、高粱、小麦、甘蔗、大豆、棉花、油菜、蔬菜、柑桔、苹果、茶。

分布：全省。

【印度黄脊蝗】*Patanga succincta* (Johan.)

寄主：水稻、小麦、甘薯、甘蔗。

分布：温江、永川、万县、内江、宜宾、绵阳、达县、西昌、乐山、重庆等地区。

【江苏瑞箴蝗】*Rammeacris kiangsu* (Tsai)

寄主：竹、水稻、玉米、甘蔗、甘薯、大豆。

分布：万县、涪陵、永川、宜宾、达县、内江、温江。

【寨木乌背蝗】*Shirakiacris shirakii*
(I. Bolivar)

寄主：甘蔗。

分布：成都、温江、绵阳、内江。

【米青狭腿蝗】*Stenocatantops mjtshenkoi*
F. Willemse

寄主：水稻、小麦、玉米、高粱、大豆、棉花、甘蔗、茶。

分布：涪陵、永川、内江、宜宾、乐山、西昌。

【疣蝗】*Trilophidja annulata annulata*
(Thunberg)

寄主：甘蔗、甘薯。

分布：温江、永川、重庆、万县、涪陵、内江、宜宾、绵阳、雅安、西昌、乐山等地区。

【短角异腿蝗】*Xenocatantops humilis brach-
erus* (Willemse)

寄主：水稻、麦、玉米、棉花、花生、茶。

分布：温江、大邑、合川、巫山、简阳、绵阳、绵竹、梓潼。

【褐异腿蝗】*Xenocatantops humilis humilis*
(Serville)

寄主：水稻、玉米、甘薯、茶、桑。

分布：万县、涪陵、重庆、永川、内江、宜宾、乐山、雅安。

菱蝗科 Tetrigidae

【长翅菱蝗】*Paratettix histricus*(Stål)

寄主：水稻、玉米。

分布：温江、永川、重庆、万县、涪陵、宜宾、达县、绵阳、雅安、乐山等地区。

【长菱蝗】*Paratettix indicus* Bolivar

寄主：四季豆。

分布：成都。

【小菱蝗】*Tetrix japonicum* Bolivar

寄主：水稻、小麦、甘薯、甘蔗、黄瓜、茄。

分布：全省。

蝈蝈科 Tettigoniidae

【斑翅草蝈】*Conocephalus maculatus*

(Le Guillon)

寄主：水稻、玉米、高粱、甘蔗、大豆、花生、棉花、梨、柿、竹。

分布：成都、温江、永川、重庆、万县、内江、绵阳、雅安等地区。

【黑足蝈蝈】*Ducetia japonica* Thunberg

寄主：棉花。

分布：简阳、绵阳、达县。

【青蝈蝈】*Ducetia thymifolia* (Fabricius)

寄主：水稻、玉米、棉花、柑桔、豆类、瓜类。

分布：简阳、剑阁、广元、金堂。

【圆锥头蝈蝈】*Euconocephalus varius*
(Walker)

寄主：水稻、小麦、甘蔗、花生、茶。

分布：成都、温江、涪陵、万县、乐山、内江、宜宾、绵阳、雅安、西昌等地区。

【蝈蝈】*Hexacentrus* sp.

寄主：水稻、玉米、大豆。

分布：成都、温江、永川、重庆、内江、宜宾、绵阳、乐山等地区。

【日本蝈蝈】*Holochlora japonica* Bremer
von Wattenwyl

寄主：柑桔、梨、苹果、荔枝、杏、梅、甘蔗。

分布：内江、泸县、江安。

成虫产卵危害枝梢。

【褐足蝈蝈】*Homorocoryphus fuscipes*
Redtenbacher

寄主：水稻、玉米。

分布：成都、温江、重庆、涪陵、内江、达县、南充等地区。

【角蝈（尖头草蝈）】*Homorocoryphus
lineosus* Walker

寄主：甘蔗。

分布：内江。

【纺织娘】*Mecopoda elongata* (Linnaeus)

寄主：玉米、棉花、甘蔗、茶、豆类、瓜类。

分布：全省。

【镰螽】*Phaneroptera falcata* Poda

寄主：甘蔗、水稻。

分布：内江。

蟋蟀科 Gryllidae

【梨蛴蛉（绿蛴蛉）】*Calyptotrypeus*

hibinonis Matsu-
mura

寄主：水稻、玉米、麦类、花生、柿、梨、苹、
葡萄、桃、李、樱桃、枣、山楂、大
豆、绿豆、菜豆、豌豆、扁豆。

分布：秀山。

【油葫芦】*Gryllus testaceus* Walker

寄主：麦类、稻、高粱、甘薯、甘蔗、花生、
芝麻、烟草、茶、苹果、梨、桃、瓜
类、蔬菜、柑桔。

分布：全省。

【小蟋蟀】*Gryllus* sp.

寄主：麦、甘薯、豆类、花生、蔬菜。

分布：成都、简阳、金堂、双流、温江。

【大黑油葫芦】*Ligogryllus* sp.

寄主：麦、甘薯、棉花、麻、蔬菜。

分布：金堂。

【扁头蟋蟀】*Loxoblemmus doenitzii* Stein

寄主：麦、水稻、豆类、棉花、甘蔗、烟
草。

分布：成都。

【斗蟀】*Scapsipedus micado* Saussure

寄主：甘蔗。

分布：西昌、米易。

蝼蛄科 Gryllotalpidae

【非洲蝼蛄】*Gryllotalpa africana* Palisot
de Beauvois

寄主：水稻、麦、玉米、高粱、甘薯、马铃
薯、棉花、甘蔗、花生、麻、桑、
烟、茶、柑桔、梨、苹、葡萄、白菜、
萝卜、茄子、瓜类。

分布：全省。

为我省重要地下害虫。

蚤蝼科 Tridactylidae

【日本蚤蝼】*Tridactylus japonicus* (De
Haan)

寄主：水稻、甘蔗、棉花、白菜。

分布：内江、合川、宜宾、渡口。

同翅目 HOMOPTERA

蝉科 Cicadidae

【黑蚱蝉】*Cryptotympana atrata* Fabricius

寄主：柑桔、果树、棉花。

分布：全省。

成虫在枝条上产卵，破坏组织，能使
枝条枯死。

【黄蚱蝉】*Cryptotympana mandarina*
Distant

寄主：苹果、胡桃。

分布：什邡、大邑、郫县、广汉、蒲江、
江津、合川、璧山、江北、铜梁。

【黑翅红娘子】*Huechys sanguinea*
philaemata Fabricius

寄主：石榴。

分布：剑阁、广元、昭化、巴中。

【草螽】*Mogannia hebes* Walker

寄主：稻、甘蔗、桑、茶、棉花、多种果树。

分布：全省。

【鸣鸣蝉（绍螽）】*Oncotympana*
maculaticollis
Motschulsky

寄主：梨、苹、杏。

分布：灌县、江津、巫山、资中、资阳、珙
县、德阳、平武、万源。

【螳螂】*Platypleura kaemperi* Fabricius

寄主：柑桔、梨、苹、茶。

分布：全省。

角蝉科 Membracidae

【黑角蝉】*Gargara genistae* Fabricius

寄主：柑桔、柿、桑。

分布：全省。

【双短角蝉】*Tsunozemia mojiensis*
Matsumura

寄主：苹果。

分布：冕宁。

沫蝉科 Cercopidae

【尖头稻沫蝉】*Abidama sexmaculata*
Calaemaud

寄主：水稻。

分布：酉阳。

【横带沫蝉】*Aphrodes bifasciatus* Linne

寄主：苹果。

分布：西昌、芦山。

【葡萄沫蝉】*Aphrophora vitis* Matsumura

寄主：葡萄、柑桔。

分布：大足、德昌。

【稻赤斑黑沫蝉（雷火虫）】*Callitettix*
versicolor Fabricius

寄主：水稻、玉米、高粱、苹果及其他禾本科植物。

分布：涪陵、重庆、永川、宜宾、绵阳、达县、温江等地区。

成虫刺吸寄主汁液，被害叶现黄斑，生长受阻，延迟成熟，秕粒增多。丘陵低山区发生较重。1年1代，以卵越冬。

【白带沫蝉】*Cercopis intermedia* Uhler

寄主：梨、苹果、李、柑桔、葡萄。

分布：全省。

【条纹花斑沫蝉】*Clovja conifer* Walker

寄主：玉米、水稻。

分布：崇庆、南川、武隆、内江、安县、荣经、营山。

【两点隐条沫蝉】*Clovja puncta* Walker

寄主：玉米。

分布：南川、宜宾、梓潼。

【桃赤沫蝉】*Cosmoscarta bispecularis*
White

寄主：桃、桑、茶、咖啡。

分布：邛崃。

【背斑饰沫蝉】*Cosmoscarta dorsimacuta*
Walker

寄主：玉米。

分布：峨眉、北川、荣经。

【大黑斑沫蝉】*Cosmoscarta exultana*
Walker

寄主：玉米、向日葵。

分布：崇庆、平武、雅安、荣经。

【红纹沫蝉】*Cosmoscarta* sp.

寄主：玉米。

分布：重庆、永川。

【短头沫蝉】*Paphnutius* sp.

寄主：玉米、小麦。

分布：峨眉、雅安、天全。

【无常沫蝉】*Peraphora maritima*
Matsumura

寄主：苹果。

分布：冕宁。

殃叶蝉科 Euscelidae

【黑角顶带叶蝉】*Exitianus atkinsoni*
Distant

寄主：水稻。

分布：成都、乐山、西昌、内江、宜宾。

【甘蔗叶蝉】*Exitianus indicus* Distant

寄主：甘蔗。

分布：米易、宁南、宜宾。

【绿脉二室叶蝉】*Balclutha graminea*
Merino

寄主：花生、甘蔗。

分布：内江、资中、宜宾。

【二纹角顶叶蝉】*Deltocephalus ceylonensis* Baker

寄主：水稻。

分布：成都。

【角顶叶蝉】 *Deltocephalus sp.*

寄主：甘蔗。

分布：宜宾、犍为。

【菱纹叶蝉】 *Hishimonus sellatus*
(Uhler)

寄主：水稻、桑、茶、果树、柑桔、棉花。

分布：米易、成都。

【稻斑叶蝉】 *Inemadara oryzae*
(Matsumura)

寄主：甘蔗、水稻、麦、粟。

分布：成都、涪陵、宜宾、西昌、乐山、重庆等地区。

【黑带田叶蝉】 *Limotettix striolus*
(Fallén)

寄主：水稻、稗、禾本科植物、甘薯。

分布：成都。

【二点叶蝉】 *Macrosteles fasciifrons*
(Stål)

寄主：水稻、麦、燕麦、高粱、玉米、甘蔗、棉花、葡萄。

分布：全省。

【四点叶蝉】 *Macrosteles quadrimaculatus*
(Matsumura)

寄主：水稻、麦、茶。

分布：重庆、江津、万县、纳溪、成都。

【六点叶蝉】 *Macrosteles sexnotata*
(Fallén)

寄主：青稞、小麦及其他禾本科植物。

分布：甘孜、九龙、炉霍。

【黑尾叶蝉】 *Nephotettix cincticeps*
(Uhler)

寄主：水稻、麦、粟、甘蔗、蔬菜、豆类、茶、看麦娘、稗、禾本科植物。

分布：全省。

是我省水稻的重要害虫，并且是传播水稻病毒的重要传毒害虫。涪陵地区的酉、秀、黔、彭及渡口、米易等地

经常发生危害。成虫、若虫刺吸水稻汁液，严重时全田成片枯萎。梗稻田易受害。

【二条黑尾叶蝉】 *Nephotettix nigropictus*
(Stål)

寄主：水稻、麦、粟、稗、甘蔗、棉花。

分布：米易、宁南、盐边、西昌、巫山、江北、乐山。

是传播水稻病毒病的传毒害虫。

【二点黑尾叶蝉】 *Nephotettix virescens*
(Distant)

寄主：水稻、麦、甘蔗、柑桔。

分布：米易、乐山、广元。

【条沙叶蝉】 *Psammotettix striatus*
(Linnaeus)

寄主：麦、水稻、青稞、马铃薯、茄。

分布：马尔康、甘孜、康定、九龙、成都。

【电光叶蝉】 *Recilia dorsalis* (Motschulsky)

寄主：水稻、麦、粟、甘蔗、柑桔、茶。

分布：成都、涪陵、永川、温江、宜宾、达县、绵阳、乐山等地区。

成虫、若虫刺吸稻叶组织，受害叶不现白斑，能传播水稻病毒病。一年发生5代，世代重叠，以成虫在绿肥田和沟边杂草上越冬。

小叶蝉科 Typhlocybidae

【棉叶蝉】 *Empoasca biguttula* Shiraki

寄主：棉花、茄、豆类、蔬菜。

分布：全省。

【箭纹小绿叶蝉】 *Empoasca boninensis*
(Matsumura)

寄主：水稻、芋麻。

分布：成都。

【小绿叶蝉】 *Empoasca flavescens* Fabricius

寄主：麦、高粱、粟、玉米、甘蔗、甘薯、豆类、麻、桑、果树、棉花、蔬菜。

茶、水稻。
分布：全省。
是茶树的重要害虫。成虫、若虫吸食汁液，受害茶树芽叶萎缩、硬化，叶缘叶尖枯焦，以夏茶受害最大。

【血点斑叶蝉】*Erythroneura arachisi*
(Matsumura)

寄主：花生、豆类、葡萄。
分布：绵阳。

【双纹斑叶蝉】*Erythroneura limbaia*
Matsumura

寄主：水稻、麦类、甘蔗。
分布：成都。

【黑唇斑叶蝉】*Erythroneura maculifrons*
(Motschulsky)

寄主：水稻、甘蔗。
分布：成都。

【桑斑叶蝉】*Erythroneura mori* Matsumura
寄主：桑、桃、李、梅、柑桔、葡萄。
分布：成都。

【白翅叶蝉】*Thaia rubiginosa* Kuoh
寄主：水稻、玉米、高粱、麦、粟、甘蔗、茭白、紫云英、游草、芦苇、大豆。
分布：全省。

成虫、若虫刺吸汁液，被害叶初现白色小点，后变白色条斑，日久成锈色，严重者整丛死亡，轻者影响结实，6~9月发生最盛，一年发生2~3代，以成虫在茭白、小麦及沟边禾本科杂草上越冬。

大叶蝉科 Tettigellidae

【白边大叶蝉】*Kolla albomarginata*
(Sigroret)

寄主：水稻、甘蔗、棉花、桑、苹果、茶、柑桔、葡萄、樱桃。
分布：成都、温江、涪陵、万县、内江、宜宾、绵阳、雅安、西昌。

【绿斑大叶蝉】*Tettigoniella differentialis*

Baker

寄主：水稻。
分布：开县。

【黑尾大叶蝉】*Tettigoniella ferruginea*
(Fabricius)

寄主：棉花、水稻、玉米、高粱、大豆、柑桔、甘薯、黄瓜、辣椒、向日葵。
分布：简阳、金堂、开县、奉节、剑阁、梓潼、达县、巴中、平昌、重庆、芦山。

【白大叶蝉】*Tettigoniella spectra*
(Distant)

寄主：水稻、麦、高粱、甘蔗、灯心草及其他禾本科植物。
分布：成都、温江、涪陵、永川、万县、内江、宜宾、达县、雅安、重庆等地区。

【青大叶蝉】*Tettigoniella viridis* Linnaeus
寄主：玉米、水稻、甘蔗、棉花、茄、高粱、小麦、大豆、马铃薯、茶、油菜、梨、苹、柑桔等39科160种植物。

分布：全省。
寄主繁多，危害甘蔗等。成虫产卵于蔗叶主脉内，切口处易生赤腐病。

【黑条黑尾叶蝉】*Tettigoniella sp.*

寄主：梨、苹。
分布：冕宁、西昌。

叶蝉科 Jassidae

【浅绿短头叶蝉】*Batracomorphus viridulus*
(Meilichar)

寄主：水稻。
分布：南川。

【青头叶蝉】*Bythoscopus mandus* Uhler
寄主：水稻。

分布：温江、永川、涪陵、内江、乐山、绵阳等地区。

【黄绿短头叶蝉】*Iassus indicus* Lethierry
寄主：水稻。
分布：成都。