



● ● ● ● 本书编写组

宠物的繁殖 和饲养技术

中国农业出版社

快速脱贫养殖技术丛书

宠物的繁殖和饲养技术

本书编写组

中国农业出版社

**快速脱贫养殖技术丛书
宠物的繁殖和饲养技术**

本书编写组

* * *

责任编辑 潘建光 李少先

中国农业出版社出版(北京市朝阳区农展馆北路2号)
新华书店北京发行所发行 北京市密云县印刷厂印刷

787×1092mm32开本 4.5印张 98千字

1995年9月第1版 1995年9月北京第1次印刷

印数 1—6,500册 定价 6.60元

ISBN 7-109-03814-9/S·2408

编 者 话

养殖业是农民脱贫致富的一大重要门路。特别是在养殖业越来越多地采用现代科学技术之后，传统养殖项目，如猪牛羊鸡等，品种得到了优化，技术得到了改进和更新，经济前景诱人；而新的养殖项目，如狐、貂、鳖、蝎等，从野生走向家养，技术趋于成熟，养殖规模迅速扩大，经济效益可观。在这种形势下，广大农村中从事养殖业的农民，对切实可行的技术的需要量日益急增。

本丛书正是针对这一渴求新技术信息的广大市场而编写的。它具有技术新且操作性强；既简单又实用。如优良新品种，饲养管理新技术，饲料配制新方法，疾病防治的新药方，舍栏建造新构思，快速、高产、优质新经验，其投资少、经济效益显著。

本丛书语言通俗，针对性强，积一些科研成果、实践、力求农民易懂所编写，是广大农民脱贫致富必不可少的技术用书。此书由张农、刘旭主编，参加人员有钟民、王惠君、耕夫、石钟山、王保和、欧阳志贤、苏玉青、史连美、史兰、刘和平、钱少兰、宫琴、郭仕学、刘煜学。

编 者
1995年7月

目 录

观赏狗的饲养技术	1
观赏猫的饲养	32
金鱼的饲养与繁殖	55
笼养鸟的饲养	70
百灵鸟的人工驯养	76
鹦鹉的饲养技术	79
金丝鸟的人工饲养	82
八哥的饲养与调教	85
相思鸟的饲养	92
观赏鸽的饲养	94
绿毛龟的饲养	103
巴西翠龟的养殖	110
蝴蝶的人工养殖与加工	115
蟋蟀的饲养与捕捉	122
附一：鱼虫的人工培养	126
附二：黄粉虫的饲养	128
附三：蚯蚓的培养	133
附四：蝇蛆养殖	136

~~观赏狗的饲养技术~~

观赏狗是一种在室内饲养的小体型犬，外观小巧玲珑，逗人喜爱，若加以适当的训练，可以表演各种动作，深受人们的青睐。家庭养狗已成热门。据报道，一条乖巧的正宗哈巴狗可卖到数千元到上万元。所以，饲养观赏狗是一项致富新门路。

一、品种

1. 哈巴狗 原产我国，身体呈正方形，是肌肉发育良好、饱满紧凑的小型狗。该品种眼大突出，面部较大并有深的皱纹。毛短、柔软、美丽，毛色有银杏色、杏色。口、鼻、颊、耳部为黑色。前额有菱形花纹。尾向背上卷曲。

2. 北京犬 起源于中国，自唐朝以来一直在皇宫作皇帝的圣狗，1860年传入英国。早先的北京狗，体形甚大，象一头狮子，因此中国古代称为“狮狗”，后来经过改良成为现在袖珍型的北京狗。身高20厘米左右，体重可达7千克，被毛长而丰满，质软，头毛粗糙。身体结实，头骨粗，脸扁平，眼睛突出又大又亮。前身比后身重，前腿弯曲，尾巴多毛举在背上。是最受人欢迎的观赏玩要狗。

3. 马耳他犬 原产马耳他岛，是欧洲最古老的玩赏犬。雪白的长毛洁净而松软，身体强壮，警戒心强，好运动，活泼可爱。无体臭，适宜室内饲养。鼻和眼的周围有小黑点点缀，很漂亮。

4. 松狮犬 原产我国。具有华丽的长毛，美丽的体态，勇敢、活泼，喜爱儿童。头盖大而平，口鼻部相当长，唇下垂，耳小尖而直立，尾向背侧卷曲。毛色为黑、黄、灰、白等色。

5. 贵妇犬 原产德国，是一种长毛卷曲的狮子狗，其厚毛常剪成各种各样，举止特别优美，是客厅专用的豪华犬，聪明易训练。毛色有黑色、白色、咖啡色、杏黄色、银色等。

6. 齐花花 原产墨西哥。头部呈苹果型，口鼻小而突出，眼鼓起，耳大直立稍倾斜。长毛种体重1~3千克，短毛种体重2.5千克。毛色一般为深红色和黄褐色的混合色。

7. 沙皮狗 原产于我国广东省南海市。体型中等身材。成年狗体重在12.5千克上下，身高46~56厘米，整个身躯呈正方型。皮肤多皱褶，无绒毛，刚毛短粗而坚挺，像毛刷子；吻部宽阔而肥厚，呈圆筒形。

8. 西施犬 西施犬又称中国狮子犬，“西施”是英文的中译名，是产于我国的一种长毛犬。其祖先是由拉萨狮子犬与北京狮子犬杂交繁育而成。西施犬的特点概括为：聪明、活泼、敏捷、气质好，虽体型很小，却充满旺盛的精力，是个魅力十足的犬种，它的仪态、风采均富有贵族气息。西施犬的被毛分上下两层，毛长丰满且略带波浪状，毛色多变化，以白、黑、金黄色为好，也有棕色、褐色、咖啡色、米色或灰色，而头部中央及尾端的白色更是重要的认定标准。成年犬体重为4.5~8千克，身高不超过27厘米。

9. 中国冠毛犬 中国冠毛犬也称中国裸犬，中国无毛犬。是仅有的几个无毛品种之一。中国冠毛犬全身大部分无毛，只是在头、尾和四肢下部有少量饰毛。皮肤光滑、柔软，无皱褶，手触有温暖感，肤色多为粉红底色加上深色斑块，斑块多为蓝色或咖啡色，这是该犬的一大特点。头部较长，额

部稍圆，颊部干瘦，显现出口鼻部较长，鼻端颜色同皮肤斑块颜色相映。眼为栗色或黄色，带有紫红色或淡红色眼圈。头部饰毛较粗硬，呈贴伏、竖立或下垂状，以蓬松稠密为最好。耳大，多直立，有饰毛。前肢长而直，后肢弯曲明显，饰毛稀疏。尾下 $2/3$ 有饰毛，稍弯但不卷曲。体高23~35厘米，体重3~5千克。

10. 拉萨狮子犬 源于我国西藏，被饲养在喇嘛庙内作为看门狗。拉萨狮子犬全身披有华丽的长毛，毛直而硬，略带波纹状，毛色有黑、白、褐、金黄和蓝灰色。头盖骨窄，额宽适中，鼻端黑色，头部饰毛长而密，常将眼遮住，胡须长。眼大小适中，暗色。耳下垂，有饰毛，末梢毛黑色。体长大于体高，背腰水平，线条流畅。前腿直，后肢肌肉发达，四肢布满厚厚的长毛。尾向上卷至背上，尾饰毛散落于一侧。体高25厘米左右。拉萨狮子犬性情活泼，对主人十分忠实、信赖，成年犬易主难以驯服。

11. 日本狆 又称日本跳狗。产地日本。是一种袖珍型的长毛玩赏犬，被毛长而丰厚，不弯曲，毛色为白色底，带黑色或栗色斑块，斑块颜色越艳越好，斑块以在耳、身、面、尾根左右对称者为佳。头较大而圆，头骨平坦，吻短，鼻尖缩至两眼之间，几乎与眼同齐。眼大而凸出，呈杏仁状，色暗，看上去似乎眼泪汪汪。身材呈方形，胸腔结实，背短，腹微收。前肢垂直，骨骼细，有大量饰毛，脚小而整齐，呈卵圆形，趾间有长毛。尾高位，弯向背侧，饰毛丰富。体高20~30厘米，体重2~5千克，以体重2.3~3.2千克者最为理想。日本狆优雅高傲，看人时常常歪头斜视，显得活泼乖巧。喜散步与奔跑，爱爬高。日本狆以小取胜，因此，仔犬发育阶段不能放任其奔跑，以免肌肉过于发达。

12. 蝴蝶犬 又称蝶耳犬或巴比伦犬。产自欧洲南部。蝴蝶犬被毛丰满，呈长绸缎状，有光泽，不卷曲，无下毛。毛色以白色为底色，且身体大部分为白色，部分有红色、黑色、褐色、栗色等斑点。颅部两耳间略呈圆形，口鼻部尖，鼻端黑色，眼大，呈杏仁状，色暗。耳大向外侧竖立，呈 45° 角，饰毛丰密。该犬最大的特点是头部色彩多样，而且左右对称，加上两只酷似蝴蝶双翼的耳朵，整个头部就像一只美丽的花蝴蝶，故此而得名，身躯稍长，胸深背直，腹部微收。四肢有饰毛，前肢垂直，后肢细小。尾长，饰毛丰满，尾尖卷至背上，不卷曲，尾毛下垂如羽饰，也很漂亮。体高不超过28厘米，体重2.5~5千克。蝴蝶犬胆大灵敏，有感情，外观灵巧、漂亮，是良好的玩赏及伴侣犬。饲养条件要求不高，但被毛需经常梳理，以保持美丽的外貌。

13. 约克夏梗 约克夏梗又称约瑟犬或约瑟泰利犬，是一种小型玩赏犬。产于英国约克夏郡。幼犬被毛为黑色，1~1.5岁被毛才长成，颜色固定。成年犬被毛浓密，长而直，从不卷曲，呈绸缎状，从头至尾分缝，毛向两侧垂落，毛色躯干至尾呈铁青色，四肢呈深褐色，头部为鲜艳华丽的棕黄色长毛。被毛的颜色和长度是评定该品种犬的重要标志。颅部小而平，口鼻部不长，鼻尖为黑色。眼色暗，有黑边。耳小，呈倒“V”字形，直立或半直立，并有浅褐色短毛。躯短而矮，背短而平。前肢垂直，后肢长短适度，被厚毛覆盖。尾应修剪掉一半，使尾能上举于背，尾毛蓝色。体高20~23厘米，体重3.5千克以下。约克夏梗好动，动作敏捷、轻快。为保持其典雅、尊贵的姿容，被毛需经常梳理、洗澡、抹油才能显示其丝绸般的光彩。

14. 博美犬 音译为波美拉尼亚犬或波美拉犬，因其外

貌很像松鼠故又称松鼠犬。被毛直而松散，没有波纹状或卷曲的毛，颈下和大腿毛长，四脚有饰毛，毛色有黑色、棕色、红色、白色、蓝色和橙黄色，以橙黄色最好。头圆，吻小而尖，唇薄而紧，眼大而圆，呈暗色，耳小直立，面部毛短。四肢挺直，体态匀称。尾根高，向背部翘起，尾毛稀而长，散落于臀部。体高20厘米左右，体重1.5~3千克。博美犬从6月龄开始长长毛，至2~3岁时才能达到最佳状态，为了保持其美观，必须经常用硬毛刷子梳理（每周两次较合适），不然容易引起饰毛的缠结和长虱子，甚至引起皮炎。

二、观赏犬的选择

1. 犬种的选择 观赏犬的品种很多，每一品种都有自己的优势和缺点。因此，要根据个人的喜好和不同的目的以及饲养条件来确定选择对象。就目前我国喂养玩赏犬的趋势看，以小型或超小型犬为主，如北京犬、贵妇犬、西施犬、蝴蝶犬等。这些小型犬食量小、体尺短、体重较轻，连小孩都能将其抱在怀里，很受妇女和小孩的欢迎。

2. 犬的年龄选择 以幼龄犬为佳，最好是断奶不久就抱养。因幼龄犬的适应性强，能很快适应新环境，与主人建立起牢固的友谊，易于调教和训练。选择幼犬的最适当年龄是生后2月龄，因此时幼犬的个性开始表现出来，可看出身体发育的好坏。未满两月龄的幼犬，个性不明显，超过3月龄时，幼犬身体发展过快，体型好坏难以判断。不足的是幼龄犬独立生活能力差，开始阶段需要精心照顾，需花费较多的调教和训练时间。

3. 性别的选择 就感情、忠实和性情而言，决定的因素是犬的品种，而不是犬的性别。不过，在同一品种内，公犬一般性情刚毅，活泼好斗，勇敢威武，体力强壮，因而训练

时要比母犬花更多的时间。母犬较温顺，易于训练调教，但每年的怀孕产仔会增添许多麻烦。因此，有人喜欢阉割后的犬，不但易于驯养，同时也减少了每年春秋发情时的麻烦。

4. 选择方法

(1) 最好选择纯种犬 分析品种是否纯正的重要依据应是血统证书，但在我国目前情况下很难办到，只有靠自己对纯种犬的知识，从外形上识别犬的优劣。此外，应了解其父系和母系品种的优劣，以分析幼犬的优劣。

(2) 检查健康状况 有病或有某些缺陷的犬，品种再好也不能选留。健康状况的检查应注意以下几方面：

①精神状态：健康犬活泼好动，反应灵敏，情绪稳定，喜欢亲近人，愿与人玩耍，而且机灵，警觉性高。凡胆小畏缩而怕人，精神不振，低头呆立，对外界刺激反应迟钝，甚至不予理睬，或对周围的事物过于敏感，表现惊恐不安，或对人充满敌意，喜欢攻击人，不断狂吠或盲目活动，狂奔乱跑等均属精神状态不良。

②眼：从犬的眼神即可分辨其健康状况。健康犬眼结膜呈粉红色，眼睛明亮不流泪，无任何分泌物，两眼大小一致，无外伤或疤痕。病犬常见眼结膜充血，甚至呈蓝紫色，患贫血病则可视粘膜苍白，眼角附有眼屎，两眼无光或羞明流泪。

③鼻：健康犬鼻端湿润，发凉，无浆液性或脓性分泌物，如果鼻端干燥，甚至干裂，则表明犬可能患有热性传染病。

④口腔：健康犬应口腔清洁湿润，粘膜粉红色，舌鲜红色，无舌苔，无口臭。让犬嘴闭合，观察有无闭合不全和流涎。

⑤皮肤：健康犬皮肤柔软而有弹性，皮温不凉不热，手感温和，被毛蓬松有光泽。病犬皮肤干燥，弹性差，被毛粗

硬杂乱，如有体外寄生虫，还可见斑秃、痴皮和溃烂。

⑥肛门：健康犬肛门紧缩，周围清洁无异物。当犬患有下痢等消化道疾病时，常见肛门松弛，周围污秽不洁，有时可见炎症和溃疡。

⑦四肢：令犬来回跑动，以观察四肢是否正常，如出现跛行、两前肢向内拼拢（O形腿）或向外岔开（X形腿）都属不正常。

通过上面各项检查，基本上可将病犬检出。如有条件应请兽医检验部门作布鲁氏菌病、弓形虫病等传染性疾病的检验。

（3）进一步选优去劣 经上述内容的检查，可选出健康的犬，但为了能适合饲养目的（玩赏或伴侣）和技巧训练，应对犬的体质和机灵性作进一步的检查。为此，需作以下检查：

第一，为了测试所选幼犬的反应性是否敏捷，可先让测试犬看一下某物体（手绢或塑料玩具），然后将该物体轻轻向上抛起，如果犬的视线紧盯着跌下的物体，则属正常，如果对跌下物毫不关心，则属精神涣散或迟钝。

第二，用手提起幼犬时，以不叫不挣扎者为良好。若挣扎，发出悲鸣，死不肯就范地反抗，则属神经质类型，属“难教”的品类。

第三，注意观察有无遗传性毛病。纯种犬往往为了保留其品种优势，常因近亲繁殖（血统太相近）而出现一些遗传性毛病。如沙皮犬、松狮犬以及北京犬、贵妇犬容易发生眼睫毛倒生，尤其是沙皮犬更多见。另一种遗传性毛病是脾性和情绪，凡是神经质或情绪不稳定的犬，行为难于预测，多数是遗传或人为行为（常无故踢它）所引起。若上一代有咬人史的犬，其下一代也可能遗传。这类犬即使品种纯正，外

形美观，也不能留作种用，必须淘汰。

第四，身体各部分要匀称，合比例。鼻、肛门周围及脚底等处，色素要足够。各方面合乎标准。

第五，了解是否预防接种过（特别是犬瘟热及狂犬病疫苗），包括疫苗的种类、接种的时间等。

（4）犬的年龄判断 狗的寿命一般为10~20年，最长可活到30年，而狗的最佳繁殖年龄是1~3岁，欲要选购一条称心如意的好狗，必须准确地判断其年龄，可通过五看作出判断。

①看牙齿：狗出生后满4个月龄开始换牙，6月龄换完永久齿，以后随着年龄的增长，牙齿出现磨损、磨平、磨短、牙髓外露、磨损面陡立、牙齿脱落等现象。但牙齿变化也与饮食有关，经常啃硬骨头的狗，其牙齿就磨损得严重。

②看面部：1~2岁年青狗，面部活跃，眼睛有神，好运动，精神振奋，愿与人亲近，而老年狗则反之。

③看体态：青年狗运动轻巧灵活，3~5岁时活动开始转缓，但很稳当，10岁以上老年狗则举止迟钝，脊背弯曲，行动缓慢。

④看被毛：老狗新生灰白毛，先从口唇、下颌发生，4~5岁时只生出少数几根白毛，以后明显增多，后来向背、鼻周围、眼睑、肩毛等处扩展，一直扩展到额部及外耳也长出白毛，甚至整个头部毛色变白。超过10岁时额部、眼睑及头部都有白毛。但对白毛狗判断不准确。

⑤看眼神：青年狗眼有神，反应迅速，明亮，在7~8岁时眼白内障发生率增多，在10岁以上的狗，几乎都有白内障，早期白内障水晶体呈蓝绿色环。典型的白内障发生在眼球中央，晶体混浊，呈灰白色，伴有明显的绿色折光反射。个别

狗1~2岁时，亦患有白内障。

三、饲养管理

观赏狗一般都在室内饲养，所以卫生很重要，应调教爱犬在室外排便。狗体常分泌出一种蜡样的分泌物，皮肤及颈圈上散发出一种难闻的气味。因而每日要刷洗一次，保持狗的皮肤清洁。刷洗时，用药皂或肥皂，从头部开始刷洗，洗净全身后，用专用毛巾将毛擦干，以免狗受凉感冒。夏季可在室外阳光下晒干。冬季可用滑石粉干洗。要定期修剪趾甲。适当运动可使狗的体格发达，具有持久力，培养训练其敏捷性，扩大步幅和弹跳力。

犬的日粮，指的是犬在1昼夜内所采食的各种饲料的总量。简言之，即犬一天需要吃的饲料。

玩赏犬又称宠物，俗称伴侣动物，是家庭饲养的主要犬类。此类犬个体偏小，食量不大，是目前城市养犬量最多的犬种，也是人们最喜爱的犬种。饲养较多的为北京犬、狮子犬、哈巴犬、吉娃娃犬、贵妇犬等。此类犬食量虽不多，但对饲料要求较高，单靠残羹剩饭是养不好的。这类犬的日粮配制比例和结构是：肉类（也可搭配一些鱼）40%，谷物类40%，青菜20%，每条犬外加5~10克盐，鱼肝油5~8克，酵母5克，骨粉15克（可用骨头代替）。

按日粮结构比例求出数量，熟制加工成团状，青菜需切碎洗净，食盐、鱼肝油、骨粉等待饲料快起锅前一起加入，搅拌均匀后，离火，时间要短，防止维生素破坏。

为了狗的正常发育，给狗以全价营养的饲料是非常必要的。狗是杂食性动物，饲料分为动物性饲料和植物性饲料以及调味饲料。狗食的温度一般在40℃较好，避免过冷过热。如利用剩饭菜喂狗，最好不要加盐。喂狗要定时、定量、定点。

一般成狗日喂2次，一岁内的狗日喂3次，三个月内的狗日喂4次。食具用后要清洗干净，定期消毒。不要把霉变的食物喂狗。喂食前后不应进行剧烈运动。水盆要放在固定的位置，充分饮水，并要保持水的清洁。

犬日粮估算表（干燥型饲料）

犬体重 (千克)	维持营养需要量		生长营养需要量	
	每千克体重 (克)	每条犬 (千克)	每千克体重 (克)	每条犬 (千克)
2.3	40	0.09	80	0.18
4.5	33	0.15	66	0.30
6.8	28	0.19	56	0.38
9.1	27	0.25	54	0.49

四、犬各个时期的饲喂

1. 新生仔犬的饲喂 仔犬一生出来，立刻会吸奶。应让仔犬躺在母犬身边，以便吮乳。如果一胎生仔较多，应将最后生出的仔犬（通常体质瘦小、较弱）放到后两对奶头上吮乳，反复数次后，每只仔犬就会有固定的奶头。要让初生仔犬吃到足够的初乳，因为初乳中含有丰富的蛋白质和维生素，还含有较高的镁盐、抗氧化物及酶、激素等，具有缓泻和抗病作用，有利于胎便的排出；初乳的酸度较高，有利于促进消化道的活动；初乳中的各种营养物几乎可全部吸收，这对增强仔犬体质，产生热量维持体温极为有利。更值得一提的是，初乳中含有母犬的多种抗体（母源抗体），使仔犬获得抗病能力，因此，应尽早地（0.5~1小时内）让新生仔犬吃到初乳。

2. 幼龄犬的饲喂 幼龄时期是生长发育的主要阶段，身体增长迅速，因而必须供给充足的营养。一般出生后头3个

月主要增长躯体和体重，4~6个月主要是增加体长，7个月后主要长体高。因此，应按不同的发育阶段，配制不同的日粮。断奶后的幼犬，由于生活条件的突然改变，往往显得不安，食欲不振，容易生病，这时所选的饲料要适口性好，易于消化。3个月内的幼犬每天至少喂4次。对于食欲差的犬可采用先喂次的，后喂好的，少添勤喂的方法。先次后好可保持犬的食欲旺盛，少添勤喂可使犬总有不饱之感，不至于厌倦、挑食。4~6月龄的幼犬，食量增大，体重增加很快，每日所需饲料量也随之增多，每天至少喂3次。6月龄后的犬，每天喂2次即可。

幼犬的食谱，应先按原犬主的食谱喂，逐渐转换。对3个月以内的幼犬应喂以稀饭、牛奶或豆浆并加入适量切碎的鱼、肉类以及切碎煮熟的青菜。为了降低饲料成本而又不影响幼犬的营养，可将猪、牛肺脏之类的脏器煮熟切碎后，与青菜、玉米面等熟食混匀后喂犬，这样既经济，犬又爱吃。

有人认为，如给犬全部喂肉类，可使犬长得健壮，其实是错误的做法。全吃肉类不仅不能使犬健壮，反而因消化不良，难以吸收而使多数犬发生腹泻。肉类中蛋白质虽多，但维生素A，维生素D，维生素E和碘较少，同时肉类中钙少磷多，长期吃肉，易造成幼犬体内因钙、磷比例失调而骨骼形成障碍，易于断裂或出现跛行。

幼犬的饲养中，水是绝对不可少的东西，应经常放一盆清水于固定的场所，以便它在吃食及运动前后任意饮用。如果犬从小能饮足够的清洁水，就可使其发育正常，胃肠健康。尤其在夏秋季节，天气炎热，体内水分蒸发很快，特别是爱活动的幼犬，如不及时补充水分，常易引起组织内缺水，甚至引起脱水而影响犬的健康，最好在每次日常运动后，让犬

喝些葡萄糖水（1~2 汤匙葡萄糖粉，加入适量的清洁水）。

幼犬的饲养中应补充钙粉和维生素，这对牙齿和骨骼的生长都是必需的。通常 1 岁以下成长中的幼犬，每日补钙粉的量为每 2 千克体重约需 1 茶匙钙粉，随着年龄的增长，应按比例增加钙粉的剂量。至 1 岁后，由于犬已进入成熟期，牙齿和骨骼的生长已趋稳定，钙粉的需要量相对减少，其用量为每 4.5 千克体重，每日约需 1 茶匙钙粉即够。但每日应有适当量的室外运动，经过紫外线的照射，以便于钙质的吸收。钙粉太多反而有害无益。

要特别防止少数幼犬霸食暴食，使其他幼犬吃不饱、吃不着。每日每只犬的食量应随犬的大小而定，这要靠饲养者的观察确定。一般来说，从犬采食的表现就可以看出其饱或饥的程度来。如果犬采食迅速，大口吞咽，说明食欲没有问题；采食后，食盆中剩留饲料，表明喂多了，可能过饱；如果犬在空的食盆上继续用舌头舐舔，或用期待的眼光望着主人，说明没有吃饱。对幼犬不宜喂得过饱，以七八成饱为最好。

3. 妊娠和哺乳期母犬的饲喂 配种后直至分娩前的母犬称为妊娠期母犬，即怀孕母犬。

妊娠初期母犬饲喂是指配种怀孕后 25 天之内的母犬。此阶段的母犬，由于胎儿生长较慢，对营养需要增加不多，可以按平时的饲喂量饲喂，但应给予维生素含量丰富的饲料，以维持母犬旺盛的生理机能。

妊娠后期母犬的饲喂是指妊娠 25 天至 60 天左右的母犬。此阶段母犬新陈代谢旺盛，胎儿生长发育加快，需要供给胎儿生长的营养物质增多。因此，此阶段的母犬，不仅喂给的饲料数量要增加，而且质量要提高，在日粮配方上要提