

漫谈钓鲤鱼

肖文生 编著
沈阳出版社



目 录

第一章 漫话鲤鱼	1
一、普通野鲤	2
二、乌原鲤	5
三、岩原鲤	6
四、柏氏鲤	8
五、云南鲤	9
六、中鲤	10
七、荷包红鲤	11
八、元江鲤	12
九、荷元鲤	13
十、散鳞镜鲤	14
十一、丰鲤	15
十二、岳鲤	16
十三、其它亚种	16
第二章 饵料选配	18
一、诱饵	19
二、钓饵	22
第三章 钓具	34
一、钓鲤鱼用钩	34
二、海竿	42
三、手竿	48
四、拉砣	53
五、自动钓竿	56

六、辅助用具.....	57
第四章 钓鲤鱼的战术技巧.....	67
一、漫谈选钓窝.....	67
二、架钓竿.....	76
三、操竿技巧的基本要求.....	78
四、海竿甩窝.....	80
五、钓点布局.....	82
六、提竿时机.....	84
七、遛鱼.....	85
八、抄鱼.....	89
附录.....	
全国各大城市日出日没时刻表.....	91

第一章 漫话鲤鱼

鲤鱼在我国是分布最广、资历最老的一种鱼。据史料记载，我国远在公元前11世纪的殷末周初，已有了养鱼事业，而那时人工饲养的就是鲤鱼。故鲤鱼可称之为我国鱼类养殖的开业元老。

“鲤鱼跳龙门”的传说，早已为众所周知。据《注引卒氏三秦记》所载：“河津一名龙门，水险不通，鱼鳖之属莫能上，上则为龙也。”鲤鱼素有跃波之能，每当春季在此险要河段腾跃。传说跳过龙门者即可成龙，失败者仍旧是鱼。

“鲤鱼跳龙门”的传说便由此而来，至今数千年，久传不衰。

在我国民间，自古把鲤鱼看作吉祥的象征，古年画中的《年年有鱼（余）》、《吉庆有鱼（余）》，都以金鳞闪闪的大鲤鱼为标志。封年过节馈赠亲友，或者新郎回访岳父母时，都常以红毛鲤子为上等礼品。祭奉祖宗的供品桌上，总是一条扬首翘尾的大鲤鱼居中。待宾会友、红白喜事的家宴上，都少不了红烧鲤鱼这盘美味佳肴。就连正月十五闹花灯时，也少不了鲤鱼型花灯伴龙嬉舞。

鲤鱼历来是垂钓的主要对象之一，尤其是钓大的主攻对象。至今钓鱼人也常以钓获多么大的鲤鱼而夸耀其钓技之不凡，洋洋自得其运气颇佳。

由于我国幅员辽阔、各地气候差别甚大，而使鲤鱼因地理分布的不同而发生类群差别，这些不同类群，就是鲤鱼的亚种，其中有人工选育的，也有自然形成的，还有从国外引

进的。就目前已查到有文字记载的,我国鲤亚种鱼类已达 5 属 23 种之多,其中大都具有地区性。各种鲤鱼由于生活的地理环境、气候及水系的不同,其体形外貌各有特色,生活习性和食性也不尽相同。为便于读者因鱼施钓,这里根据有限的资料,就主要品种摘要介绍如下:

一、普通野鲤

地方名: 鲤子、鲤鱼、鲤拐子。

它是我国众多鲤鱼之中资格最老、适应性最强、分布最广的正宗鲤鱼。在我国,从四季常青的南方到林海雪原的北疆;从江河、湖泊、水库、溪流、沼泽、池塘到稻田地,几乎一切有水生生物的水体中,都有它的踪迹。

1. **形态特征:** 体长,侧扁而腹圆,背部在背鳍前部稍隆起。口端位,呈马蹄型。有触须 2 对,后对为前对的两倍长。鳞大,侧线 33~39 片,侧线上下鳞各 5—6 片。背鳍和臀鳍均有强大的硬刺,其后缘呈锯齿状。身体背部呈黑灰色,腹膜白色。尾鳍基部微黑,下叶金黄色。雄鱼尾鳍和臀鳍呈桔红色,繁殖期间格外鲜艳(图 1)。




图 1 普通野鲤

2. 生活习性：鲤鱼为典型的底层鱼类。多栖息于各种水体松软底质和水草丛生处。善于运用它那坚硬而能伸缩的吻部掘取泥土中的食物，因此常使水底形成洞穴，使水质处于混浊状态。适应性强，水温在 15°C — 30°C 范围内能很好的生长，但也能忍受一切不良环境。在春季生殖后，转入育肥期，大量摄取食物，直至入冬前均为食欲旺盛期。冬季游入深水底层潜伏越冬，寡食少游，在北方寒冷地区尤其如此。春暖花开时转趋活跃。

3. 食性：鲤鱼属杂食性，荤素兼食。但在不同年龄段、不同季节、不同地区和水体所摄食物有变化、有差别。

在鱼苗阶段以浮游动物为主食，如轮虫、甲壳类等。体长达20毫米时，转食底栖小型无脊椎动物，如丝蚯蚓、昆虫幼虫之类。成鱼之后，则以底栖动物为主要食料，如螺蛳、蚬、蚌、摇蚊幼虫、水蚯蚓、小鱼、虾等。但同时也吃相当数量的水生植物，如水草、丝状藻类、植物果实及腐殖质。

鲤鱼对食物要求并不严格，也非一成不变，它的食物构成有一定的季节性。春、夏季一般以植物性食物为主，但同时也不放过动物性食物，尤其当水中天然食物尚不丰盛的春季，更有饥不择食之势。秋季以动物食物为主，同时又大量摄食植物种子和果实。

鲤鱼在不同地区，甚至同一地区的不同水体所摄食物常有差别，这可能与当地的水陆特产、陆岸植被等生态环境有关。这是需要钓者注意的问题。

鲤鱼食欲的盛衰，随气候的演变而变化。春季当水温达 10°C 以上时，陆续开始摄食，随着温度的不断升高，食欲逐渐增强。进入繁殖季节，亲鱼排卵时，暂时停止摄食，而产后食欲大振，形成第一个食欲高峰。这么说在繁殖期内是否

因暂停摄食而不宜垂钓呢？不是的，因为各亲鱼产期有提前推后、参差不齐现象，所以，就鲤鱼整体而言，繁殖期间是钓鲤鱼的良好时机。时入金秋，天气日渐凉爽，鲤鱼同其它鱼类一样，出自为越冬而育肥、积蓄脂肪的生理需要，又开始大量摄食，于是出现第二个食欲高峰。这就是所谓钓鱼的黄金季节。冬季游回深水后，长江以北的广大地区的鲤鱼，很少游动和摄食。

4. 繁殖：鲤鱼繁殖期随其所处地区的不同而有迟早，东北地区比较寒冷，5月下旬至6月初，才自南向北地先后开始产卵。黄河流域一般在4~5月间产卵。长江流域有些地区如浙江、四川等地，在清明前后即有产卵，4~5月进入盛产期。而海南岛及珠江流域，因气候温和，2月底或3月初即开始产卵。

个体性成熟年龄及大小也因地区、气候不同而有差异。东北地区就辽宁而言，雌鱼3冬龄达性成熟，此时体长在300毫米以上，体重1公斤以上。雄鱼比雌鱼提早一年性成熟。长江和黄河流域最小性成熟年龄为2冬龄，但雌性体长必须达到300毫米，雄性240毫米。海南岛及珠江流域最小性成熟年龄为1冬龄，体长仅180毫米左右。

鲤鱼的怀卵量是随年龄的增长而增加的，2—3公斤的雌鱼，怀卵量为20~30万粒。最大的可达100万粒。

鲤鱼在各种水体中都能产卵，产卵时所要求的水温一般在17℃以上。分期分批产卵，年产2~3次。卵带黄色，具粘性，常粘附在水草上。可见产卵场多在水草丛生的水域。排卵时间以黎明时为盛。受精卵在水温25℃左右，经3~4昼夜即可孵化成鱼。

5. 年龄和生长：鲤鱼的生长速度也因地区而异，同一

年龄组的鱼群，在海南岛就比在东北地区大得多。总的看来，鲤鱼的生长虽不及草、鲢、鳙鱼，但还算是比较迅速的。在辽宁1龄鱼体长可达110毫米以上，体重可达92克；2龄鱼体长可达220毫米以上，体重可超过330克；以3~4龄生长最快，3龄体长可达300毫米以上，体重1公斤以上。长江流域的1龄鱼体长达115~189毫米时，体重为65~150克；2龄鱼体长在207~390毫米时，体重为200~1250克；3龄鱼体长在330~490毫米时，体重为0.8~2.2公斤；4龄鱼体长为540~590毫米时，体重为3.4~4.5公斤；5龄鱼体长在580~700毫米时，体重为3.9~7公斤；6龄鱼体长为550~740毫米时，体重为3.3~8.8公斤；8龄鱼体重可达13公斤。我国鲤鱼最大体重超过40公斤。

二、乌原鲤

地方名：乌鲤鱼、墨鲤鱼、乌鲫鱼、乌钩。

1. **形态特征：**体侧扁，呈菱形，背部隆起，腹部平直。唇很厚，表面有许多显著而细小的乳状突起。吻较长，为眼后头部的1.3倍左右。触须2对，后对较前对长。下咽齿3行，细长，外侧两裂呈圆柱状，顶端略成钩形。鳃耙20~22。鳞中等大，侧线鳞42~44。背鳍有强大的硬刺，其后缘呈锯齿状，背鳍起点与腹鳍起点相对，各鳍均为深黑色。（图2）。

2. **生活习性：**为中下层鱼类，多栖息于流水深处有岩石的水体，也能生活于流速较缓慢的水体底部。有短长距离的洄游，冬季产卵后逆江上游，洪水期顺江向下游动。

3. **食性：**为杂食性鱼类，常吸食岩石表面的底栖动植物，如小形螺蛳和蚌蚬、水生昆虫的幼虫、水蚯蚓和藻类，也吃少量小鱼和虾。




图2 乌原鲤

4. **生殖：**每年冬季产卵，产卵期约在11~12月，也有1月份产的。分期产卵，卵呈黄色。产卵场多在石边、沙滩多青苔处。卵沉性，并具有一定的粘性。一般需过三龄始达性成熟。

5. **年龄和生长：**生长速度较慢，通常1龄鱼体长约为143毫米，2龄鱼约为200~230毫米，3龄约为270毫米，4龄约为370毫米。最大个体可达5~8公斤。

6. **分布：**西江上游干支流，广西的百色、桂平、柳州等地均产此鱼。

三、岩原鲤

地方名：岩鲤、黑鲤、岩鲤肥、墨鲤、乌头鱼。

1. **形态特征：**体成菱形，腹部圆，背部隆起。口端位，呈马蹄型，唇厚，表面的乳头突起不明显，小鱼则完全没有。触须2对，后对比前对略长，约与眼径等长。眼大。下咽齿3行，齿呈锥形，顶端呈钩状。鳃耙24~25，短小，披针形。鳞中等大，侧线鳞44~45。背鳍硬刺特别强大，后缘有锯齿。头部及背部微黑色，腹部银白色，每一鳞片的后部有

一黑色斑点，这样就联成体侧12~13道条纹。各鳍均为灰黑色，尾鳍后缘有一黑色边缘（图3）。




图3 岩原鲤

2. 生活习性：岩原鲤多栖息在江河水流急的水体中，而且生活在底质多岩石的深水层中，经常出没于岩石之间，冬季在河床的岩穴或深坑中越冬。2月份自下游向上游移动，10月份移回下游。

3. 食性：为杂食鱼类，因其生活于水体的底层，所以常以底栖性的动植物为主要食料，最常见的有摇蚊、蜉蝣目的幼虫，以及小螺和壳菜等软体动物，其次是寡毛类和腐烂的植物碎片。另外，偶而也可在肠管中发现有少量浮游动植物。其摄食强度在冬季最低，3~4月以后增高。肠长为体长的2.2~3.2倍。

4. 生殖：生殖期在长江中上游约为4~6月，在西江则较早些。多在沙滩流水处产卵。卵呈淡黄色、沉性，卵径为1.5~2.0毫米。最小的雌性的成熟个体之体长约为440毫米，体重在2公斤以上。3.5公斤的雌鱼怀卵量约为11~15万粒。在生殖期间雄鱼各鳍为深黑色，头部有珠星，雌鱼则

无。

5. **年龄和生长：**根据长江所采集的资料表明，通常2龄鱼重250克左右，3龄鱼约为500克，9龄鱼，体长590毫米时，体重为4公斤。岩原鱼为中型鱼类，最大可达10公斤。

6. **分布：**长江和西江的中上游干支流都产此鱼。

四、柏氏鲤

地方名：大头鱼、碌鱼。

1. **形态特征：**头大而宽，头的背部较平坦，头长大于体高。口大，端位，呈弧形，两口角的距离较吻长为长。眼大，位于头的两侧正上方，眼后头长较吻长为长。无触须。尾柄细长。下咽齿3行，呈臼齿状，下咽骨颇细长。鳞大，侧线鳞34~38。背鳍第三根不分枝，鳍条为锯齿形的硬刺。臀鳍短，向后延伸不达尾基，第三根不分枝鳍条为锯齿形的硬刺。体背部灰黑色，腹部银白（图4）。




图4 柏氏鲤

2. **生活习性：**据向渔民了解，柏氏鲤生活在湖泊的中央，水深而清的地方，若水质混浊则易死亡。游动迅速，性活跃，属中上层鱼类。不耐恶劣环境，离开水面也容易死

亡。金部某部，某部是某部市商站，白氏是不，某部当部，某

3. **食性：**柏氏鲤食物尚无记载可查考，据有关部门解剖少量标本检查结果，肠管内有机角类和桡足类残体，故推想以浮游动物为主要食料，有时也杂些藻类。另外根据其鳃耙构造推断，其食性也应是浮游生物为主。

4. **生殖：**产卵期在5~6月间。

5. **年龄和生长：**生长较其它鲤鱼为快。当年可长成商品鱼，第二年体重可达1~1.5公斤。

6. **分布：**产于云南的星云湖和杞麓湖（通海）。

五、云南鲤

地方名：白鱼、红尖嘴。

1. **形态特征：**体长而侧扁。头大，头长大于体高。吻尖而窄，向前突出。口上位，口裂倾斜，唇薄。触须1对或无。眼中等大，稍偏于头的上方。头背部窄而平。尾柄长大于高。鳞大，侧线鳞36~38。下咽齿3行，呈臼齿状。下咽骨细长。背鳍硬刺的后缘呈锯齿状。臀鳍硬刺后缘同样呈锯齿状。体背部灰黑色，腹部灰白色，尾鳍末端呈红色（图5）。




图5 云南鲤

2. **生活习性：**依据它的体形、食性推测，可能是生活于水草丛生处，多在水的中下层游动，摄取食物。行动迅

速，适应力强，不易死亡，故在市场常见盆装、桶装活鱼出售。

3. 食性：属杂食性鱼类。食物随年龄而变化。体长在150毫米以下的小鱼，以枝角类、小虾、水生昆虫的幼虫等动物性食料为主，也食少量的高等植物碎片和藻类。个体较大者则以植物性食料为主，如水植物的茎叶及其碎片等。在肠管内偶而发现有小鱼的残体。

4. 生殖：性腺发育较早，体长达130毫米的个体即达性成熟。产卵期在4~5月间，卵具粘性，常附着于水草上孵化。

5. 年龄和生长：成长速度依天然水体中食料的丰欠而有较大差异，一般2~3龄后，生长速度显著增加。根据云南（杞麓湖）的材料，当年能长到104毫米，1龄鱼体长132毫米。2龄鱼145~162毫米。3龄鱼217毫米。4龄鱼286毫米，5龄鱼可达362毫米。最大体重可达10公斤以上。

6. 分布：云南的杞麓湖、洱海均特产此鱼。

六、中 鲤

地方名：马边鱼、麻鱼、

1. 形态特征：体形似普通野鲤鱼，但其背部较平坦。幼鱼的头长约等于或大于体高。口端位，呈马蹄形，唇薄。触须2对，后对较前对为长，下咽齿3~4行。鳃耙18~20。鳞中等大，侧线鳞37~39。背鳍基部较普通野鲤短，其硬刺后缘呈锯齿状，起点与腹鳍起点相对。臀鳍后缘也呈锯齿形。腹膜微黑色，背部和头部深黑色，腹部及体侧下半部灰白色。背鳍灰黑色。尾鳍桔红色，其它各鳍灰白色。鳞片基部有一黑色斑点，其边缘亦有许多小的黑色斑点，组成体

侧上部5~6条纵行条纹和全面的网状斑纹(图6)。




图6 中 鲤

2. **生活习性**：多栖息于静水水体中，为中上层鱼类。

3. **食性**：中鲤的食性尚不太清楚，据有关部门解剖十多尾在9月份采得的标本，大部分肠管都是空的，少数个体中发现有一些藻类和昆虫的卵。可能为杂食性鱼类。

4. **生殖**：性腺发育较早，1957年9月有人在云南昆明湖所采得的标本中发现，雌性体长在90毫米时，卵巢已接近成熟，卵呈黄色。生殖期约在8~9月间。

5. **年龄和生长**：中鲤个体不大，生长速度也较慢。1龄鱼体长约为100毫米，2龄鱼约为120~145毫米，4龄鱼为215毫米左右。中鲤属中小型鱼类，最大个体重量不超过1公斤。

6. **分布**：云南各湖泊内均产此鱼。

七、荷包红鲤

荷包红鲤是经过长期的人工提纯选育的养殖品种之一。

1. **形态特征**：头小，尾短，背高体宽，背部隆起，腹部肥大，形似“荷包”，又因体呈红色或桔红色，故得名“荷包红鲤”。鳞较大，侧线鳞36~37(图7)。




图7 荷包红鲤

2. **生活习性：**荷包红鲤为人工选育的养殖品种，由于体短粗肥笨，行动迟缓，易受敌害袭击，故在天然水体不易存活。而在人工鱼塘其生活习性在很大程度上受人工摆布了。

3. **食性：**荷包红鲤和野鲤一样属杂食性鱼类。幼鱼时期以浮游动物为主要食料，成鱼以底栖动物或人工合成饵料为主，也吃菜叶和植物碎片。

4. **生殖：**荷包红鲤雄性1龄性成熟，雌性2龄性成熟，但以三龄性发育最好。产卵期稍早于野鲤，在湖北地区3月下旬至4月中旬为产卵盛期，东北地区大约5月（水温达到 18°C ）开始产卵。卵具粘性。可进行人工催产。

5. **年龄和生长：**荷包红鲤与其它鲤鱼相比较，1龄以前长的较快，2龄以后就显得慢了。在与其它鲤鱼同塘混养的情况下，因它争食力差，不及其它鲤鱼长得快。

6. **分布：**荷包红鲤原产江西省，现已推广到全国许多省市、自治区。

八、元江鲤

元江鲤产于云南省元江水系，是当地的养殖对象，现推

广到全国许多地区。

1. **形态特征：**体稍侧扁，头小，形似普通野鲤，但背部稍高。体色青灰，腹部乳白微黄。尾鳍桔红，下叶更鲜艳，故云南当地称之为“红尾鲤”。侧线鳞数量比野鲤少，一般为31~36（图8）。




图8 元江鲤

2. **生活习性：**性活跃，适应性广，生活力强。其生活习性近似普通野鲤。

3. **食性：**也与普通野鲤相似，同属杂食性。

4. **生殖：**雄鱼1龄性成熟，雌鱼2龄性成熟。体重1~1.5公斤的雌鱼，怀卵量在15万粒以上。在云南每年11月下旬或12月初开始产卵，一直延续第二年3月，其中以春节前的半月左右为盛期。分批产卵，时间多在夜晚。产卵场多在河湾或江水回流的浅滩处。在湖北地区，产期与当地鲤鱼相同。

5. **年龄和生长：**在云南当地，由于水温较高，而且常年生长，故长势较快。1龄鱼一般可达0.5~1公斤，2龄可达1.5~2.5公斤。在其它地区表现生长速度也比较快。

九、荷元鲤

这是以荷包红鲤为母本，以元江鲤为父本的杂交第一

代，取名荷元鲤。素有“肥鲤”之称。

1. **形态特征：**其体形界于双亲之间，较偏于母本荷包红鲤，但有头小、背高、体厚的特点。背部显著隆起，背鳍末端至尾柄处呈弧形下降，尾柄长小于高。体色为青灰色。（图9）。




图9 荷元鲤

2. **生活习性 & 食性：**均与荷包红鲤和元江鲤相同。

3. **生殖与生长：**杂交鲤鱼性腺发育正常，一般雄鱼1龄，雌鱼2龄性成熟。但它自交所得第二代有蜕化表现。因此，杂交鲤一般需要每年杂交制种，只利用第一代。一代杂交生长特别快，多年试验表明，荷元鲤夏花鱼种饲养6个月左右，当年平均体重可达0.8~1.4公斤。成鱼个体增重率比荷包红鲤高百分之41.8~62.8，比元江鲤高百分之30.0~55.2。在一般饲养条件下，养5个月，个体可达0.5公斤，够商品鱼规格。

十、散鳞镜鲤

又称三道鳞，因自苏联传入我国，所以又叫苏联鲤鱼。

1. **形态特征：**体形比普通野鱼头部稍小，背部较高。