

1981-1985

全国硕士学位研究生入学考试
物理试题精选详解

(下)

量子力学
电动力学
固体物理
热力学与统计
物理
金属物理与晶
体X射线学

吉林科学技术出版社

1981~1985

全国硕士学位研究生入学考试
物理试题精选详解

(下)

吉林大学

董庆德 朱耀银 何岚鹰 编
吴家琨 滕凤恩

吉林科学技术出版社

1981—1985
全国硕士学位研究生入学考试
物理试题精选详解
(下)

吉林大学 董庆德 朱耀银 何岚鹰 编
吴家琨 滕凤恩

*

吉林科学技术出版社出版 吉林省新华书店发行
长春市第五印刷厂印刷

*

787×1092毫米16开本 25.125印张 619,000字

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

印数：1—2,950册

统一书号：13376·51 定价：4.70元

目 录

第六部分 量子力学	(1)
一、算符与力学量	(1)
二、一维势阱(垒)	(36)
三、简谐振子	(53)
四、角动量·自旋·跃迁	(68)
五、中心力场·电磁场	(99)
六、定态微扰	(111)
七、全同粒子	(136)
八、散射	(143)
第七部分 电动力学	(152)
一、电磁现象的基本规律	(152)
二、静电场与稳恒电磁场	(160)
三、电磁波的传播	(184)
四、电磁波的辐射	(200)
五、狭义相对论	(214)
六、带电粒子和电磁场的相互作用	(235)
第八部分 固体物理	(246)
一、晶体结构	(246)
二、晶体结合	(260)
三、晶格振动	(265)
四、固体电子论	(284)
五、晶体缺陷	(310)
六、半导体·磁性·超导体	(313)
七、其它	(316)
第九部分 热力学与统计物理	(319)
一、热力学	(319)
二、玻耳兹曼统计	(334)
三、量子统计	(356)
四、系综及其它	(369)
第十部分 金属物理与x射线晶体学	(385)

第六部分 量子力学

一、算符与力学量

1. 试述线性厄米算符本征值与本征函数所具有的性质。为什么可观测量要用线性厄米算符描写? (北京大学 1979年)

答: 厄米算符 $\hat{A}$ 的定义是:

$$\int d^3x \varphi^*(x) \hat{A} \psi(x) = \int d^3x (\hat{A} \varphi)^* \psi(x) \quad (1)$$

其中 $\varphi(x)$ 、 $\psi(x)$ 是所有变量 x 的任意(平方可积)波函数。由于算符厄米性是用线性运算的积分算符来定义的, 所以厄米算符一定是线性的。

厄米算符的本征值与本征函数有如下性质。

(1) 厄米算符的本征值是实数。证明如下:

设厄米算符 $\hat{A}$ 的本征方程为:

$$\hat{A} \varphi_n = a_n \varphi_n \quad (2)$$

取其复数共轭, 有

$$\hat{A}^* \varphi_n^* = a_n^* \varphi_n^* \quad (3)$$

假定本征函数 φ_n 已归一化, 即 $\int d^3x \varphi_n^* \varphi_n = 1$ 。用 $\int d^3x \varphi_n^*$ 作用(2)式两边, 得:

$\int d^3x \varphi_n^* \hat{A} \varphi_n = a_n$, 用 $\int d^3x \varphi_n$ 作用(3)式两边得: $\int d^3x \varphi_n \hat{A}^* \varphi_n^* = a_n^*$ 。由 $\hat{A}$ 的厄米性可知: $\int d^3x \varphi_n^* \hat{A} \varphi_n = \int d^3x \varphi_n \hat{A}^* \varphi_n^*$, 所以 $a_n = a_n^*$ 。

实际上, 厄米算符 $\hat{A}$ 在任意态 $\varphi(x)$ 上的平均值也是实数。因为:

$$\begin{aligned} \overline{A} &= \int d^3x \varphi^*(x) \hat{A} \varphi(x) = \int d^3x \varphi(x) (\hat{A} \varphi)^* \\ &= \left\{ \int d^3x \varphi^*(x) \hat{A} \varphi(x) \right\}^* = \overline{A}^* \end{aligned}$$

所以厄米算符 $\hat{A}$ 在其本征态 $\varphi_n(x)$ 上的平均值 $\overline{A} = a_n$ 。因此, 厄米算符的“本征态”就是厄米算符取确定值——实本征值的态。

(2) 厄米算符相应不同本征值的本征函数彼此正交。因为: $\int d^3x \varphi_n^* \hat{A} \varphi_m = a_m$

$\int d^3x \varphi_n^* \varphi_m$, $\int d^3x \varphi_n (\hat{A} \varphi_m)^* = a_n \int d^3x \varphi_n^* \varphi_m$, 所以 $(a_n - a_m) \int d^3x \varphi_n^* \varphi_m = 0$ 。当 $a_n \neq$

a_n 时, $\int d^3x \varphi_n^* \varphi_n = 0$, φ_n 与 φ_n 正交。

量子力学中, 通常都对所有本征函数实施“正交、归一化”手续, 使其成为态空间的基底。一般而言, 还假定厄米算符的本征函数集合是完备的, 即假定对任意波函数均有如下唯一的展式:

$$\psi(x) = \sum_n c_n \varphi_n(x), \quad c_n = \int d^3x \varphi_n^*(x) \psi(x)$$

还可利用“封闭关系”表示其本征矢 $|\varphi_n\rangle$ 的完备性:

$$\sum_n |\varphi_n\rangle \langle \varphi_n| = 1$$

由于厄米算符的平均值和本征值都是实数, 所以它可用来描述只取实数的可观测量。因此, 量子力学中假设: 力学量的一个可观测量对应着相应厄米算符的一个本征值; 力学量的所有可能取值就是相应厄米算符的本征值谱。

2. 证明:

(1) 若线性厄米算符 $\hat{A}$ 没有负的本征值, 则对任意波函数 ψ , $\overline{A} \equiv \int dx \psi^* \hat{A} \psi \geq 0$, 反之亦然。

(2) 若 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 均为线性厄米算符, 则 $\hat{A}^2 + \hat{B}^2$ 也是线性厄米算符且无负的本征值。

(吉林大学 1981年)

证明 (1) 设 $\hat{A}$ 的本征函数集合 $\{\varphi_n\}$ 是正交、归一的,

$$\hat{A} \varphi_n = a_n \varphi_n, \quad \int dx \varphi_m^* \varphi_n = \delta_{nm}$$

其完备性假设指出有唯一的展式:

$$\psi = \sum_n c_n \varphi_n$$

即有唯一的一组系数 $\{c_n\}$ 。

$$\begin{aligned} \overline{A} &= \sum_{n,m} c_n^* c_m \int dx \varphi_n^* \hat{A} \varphi_m \\ &= \sum_{n,m} a_m c_n^* c_m \delta_{nm} = \sum_n a_n |c_n|^2 \end{aligned}$$

因为 $|c_n|^2$ 对一切 n 都是非负的, 且 a_n 按假定也是非负的, 所以

$$\overline{A} = \int dx \psi^* \hat{A} \psi \geq 0$$

反之, 如果对于任意 ψ , 即对任意 c_n ,

$$\overline{A} = \sum_n a_n |c_n|^2 \geq 0$$

因为任意 $|c_n|^2$ 对一切 n 是非负的, 所以 a_n 对一切 n 也是非负的。否则, 如果 $a_n < 0$, 对特定的 $\{c_n\}$, $\overline{A} < 0$, 与题设矛盾。

由此可见, 如果厄米算符在任意态上的平均值都是非负的, 则其本征值也是非负的。

按线性算符 $\hat{A}$ 的厄米性定义:

$$\begin{aligned}\int d^3x \varphi^* \hat{A} \psi &= \int d^3x \psi \hat{A}^* \varphi^* \\ &= \int d^3x \varphi^* \tilde{\hat{A}}^* \psi \quad (\tilde{\hat{A}} \text{ 表示 } \hat{A} \text{ 的转置}) \\ &= \int d^3x \varphi^* \hat{A}^+ \psi\end{aligned}$$

即 $\hat{A} = \hat{A}^+$, 所以厄米算符又称自共轭算符。

共轭运算规则有:

$$(\hat{G} + \hat{F})^+ = \hat{G}^+ + \hat{F}^+ \quad (1)$$

$$(\hat{G}\hat{F})^+ = \hat{F}^+ \hat{G}^+ \quad (2)$$

$$(c \hat{F})^+ = c^* \hat{F}^+ \quad (c \text{ 为常数}) \quad (3)$$

由 (2) 式可知, 厄米算符的任意次幂仍然是厄米算符, 因为, 例如:

$$(\hat{A}^2)^+ = (\hat{A} \hat{A})^+ = \hat{A}^+ \hat{A}^+ = \hat{A}^2$$

所以 $\hat{A}^2$ 与 $\hat{B}^2$ 均为厄米算符。再由 (1) 可知 $(\hat{A}^2 + \hat{B}^2)$ 也是厄米的。

现设 $(\hat{A}^2 + \hat{B}^2)$ 相应本征值 d_* 的本征函数为 ψ_* , 即有:

$$(\hat{A}^2 + \hat{B}^2) \psi_* = d_* \psi_*$$

$$\text{因为 } (\hat{A}^2 + \hat{B}^2) \psi_* = \hat{A}^2 \psi_* + \hat{B}^2 \psi_* = a_*^2 \psi_* + b_*^2 \psi_* = (a_*^2 + b_*^2) \psi_*$$

$$\text{所以 } d_* = a_*^2 + b_*^2 \geq 0 \quad (\text{因为 } a_*, b_* \text{ 均为实数})$$

其中 ψ_* 只要是 $\hat{A}$ 相应本征值 a_* 的本征函数 φ_* 与 $\hat{B}$ 相应本征值 b_* 的本征函数 φ_* 之积即可。

3. 证明: 任意算符 $\hat{F}$ 总可以写作 $\hat{F} = \hat{A} + i\hat{B}$ 。式中 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 是厄米算符。若算符 $\hat{G}$ 是厄米算符, 问在什么条件下 $\hat{G}^2$ 是厄米算符? (天津大学 1985年)

证明: 对任意线性算符 $\hat{F}$, 总有恒等式:

$$\hat{F} = \frac{1}{2} (\hat{F} + \hat{F}^+) + \frac{1}{2} (\hat{F} - \hat{F}^+)$$

成立, 若假定 $\hat{F} = \hat{A} + i\hat{B}$, 则有:

$$\hat{A} = \frac{1}{2} (\hat{F} + \hat{F}^+) \quad \hat{B} = \frac{1}{2i} (\hat{F} - \hat{F}^+)$$

而 $\hat{A}^+ = \frac{1}{2} (\hat{F}^+ + \hat{F}) = \hat{A}$ $\hat{B}^+ = \frac{-1}{2i} (\hat{F}^+ - \hat{F}) = \frac{1}{2i} (\hat{F} - \hat{F}^+) = \hat{B}$

即 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 均是厄米的。

由上述命题可知, 对任意线性非厄米算符 $\hat{G}$ 总可分解为: $\hat{G} = \hat{A} + i\hat{B}$, 其中 $\hat{A} = \frac{1}{2} (\hat{G} + \hat{G}^+)$ 和 $\hat{B} = \frac{1}{2i} (\hat{G} - \hat{G}^+)$ 都是厄米算符。而

$$\hat{G}^2 = \hat{A}^2 - \hat{B}^2 + i(\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A})$$

因为 $(\hat{A}^2 - \hat{B}^2)^+ = \hat{A}^2 - \hat{B}^2$ $(\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A})^+ = (\hat{B}^+\hat{A}^+ + \hat{A}^+\hat{B}^+) = (\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A})$

但 $i(\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A})$ 不是厄米算符, 因此只有在 $\hat{G} = \hat{A} + i\hat{B}$ 中的 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 反交换, 即 $\hat{A}\hat{B} = -\hat{B}\hat{A}$ 时 $\hat{G}^2$ 才是厄米算符。这里要明确 $\hat{G}$ 首先应是线性算符, 否则谈不上怎样才能成为厄米算符。

4. 求 $\hat{P}_x + \alpha\hat{x}$ 的本征函数。其中 α 为有量纲的常数, $\hat{P}_x$ 和 $\hat{x}$ 分别是一维 (x) 空间的动量和位置算符。 (北京大学 1984年)

解: 这是个求厄米算符本征函数的问题。

在坐标表示下, 厄米算符 $(\hat{P}_x + \alpha\hat{x})$ 的本征方程为:

$$(-i\hbar \frac{d}{dx} + \alpha x) \varphi_\lambda(x) = \lambda \varphi_\lambda(x)$$

即 $\frac{d\varphi_\lambda}{dx} = \frac{-i\alpha}{\hbar} (x - \frac{\lambda}{\alpha}) \varphi_\lambda(x)$

积分上式得:

$$\varphi_\lambda(x) = A_\lambda e^{-\frac{i\alpha}{\hbar} (\frac{x^2}{2} - \frac{\lambda}{\alpha} x)}$$

其中 A_λ 是与 x 无关的常数。因为本征值 λ 不受限制, 可连续取值, 从而 $\varphi_\lambda(x)$ 是不能“归一”的, 但可“规格化”为 δ -函数。

$$\begin{aligned} \delta(\lambda - \lambda') &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \varphi_{\lambda'}^*(x) \varphi_\lambda(x) = A_{\lambda'}^* A_\lambda \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(\lambda' - \lambda) \frac{x}{\alpha}} \\ &= A_{\lambda'}^* A_\lambda (2\pi\hbar) \delta(\lambda' - \lambda) = |A_\lambda|^2 (2\pi\hbar) \delta(\lambda' - \lambda) \end{aligned}$$

即 $A_\lambda = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$, $\varphi_\lambda(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i\alpha}{\hbar} (\frac{x^2}{2} - \frac{\lambda}{\alpha} x)}$

5. 求下列算符的本征值和本征函数:

(1) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, (2) $-\frac{d^2}{dx^2}$, 已知 $x=0, l$ 时 $\varphi(x)=0$ 。(辽宁大学 1985年)

解: 由于量子力学的数学基础是线性矢量空间理论, 算符是定义在一定的线性空间中

的, 所以厄米算符在给定空间中表现为一个(方)矩阵。因此, 量子力学中的本征值问题就有算符和矩阵两种形式, 它们构成了量子力学中最基本的问题。为把矩阵形式的本征值问题说透, 我们将补充一个例子(见题6)。

先回答(2)。厄米算符 $-\frac{d^2}{dx^2} = \left(i \frac{d}{dx}\right) \left(i \frac{d}{dx}\right)$, 是厄米算符 $\left(-i \frac{d}{dx}\right)$ 的平方, 其本征值 E 是非负的(见题2), 其本征方程为:

$$-\frac{d^2}{dx^2} \varphi_x(x) = E \varphi_x(x)$$

令 $E = k^2$,

则有 $\varphi_x'' + k^2 \varphi_x = 0$

其基本解为 $e^{\pm ikx}$ 或 $\sin kx$ 与 $\cos kx$ 。

一般解可写为:

$$\psi_x(x) = A \sin(kx + \delta)$$

当 $x = 0$ 时, $\psi_x(0) = A \sin \delta = 0$, 选 $\delta = 0$, 则

$$\psi_x(x) = A \sin kx$$

当 $x = l$ 时, $\psi_x(l) = A \sin kl = 0$, 所以

$$kl = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(n 不取 0, 因为 $n = 0$ 时 $\psi_x(x) \equiv 0$, 不是波函数, n 不取负整数, 因为取负整数时给出的波函数与 n 取正整数时的波函数线性相关, 描述同一状态。)从而算符 $-\frac{d^2}{dx^2}$ 在条件: $x = 0, l$ 时 $\varphi(x) = 0$ 之下的本征值和本征函数分别是:

$$E_n = k_n^2 = \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 n^2 \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \quad 0 \leq x \leq l$$

实际上, 本题与宽为 l 的无限深势阱中粒子能量本征值问题相当(如令 $\frac{\hbar^2}{2m} = 1$)。

现在回答(1)。

由于矩阵 $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 是实对称的, 是厄米矩阵, 相当于厄米算符在二维空间中的具体表示。矩阵形式的本征方程为:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (1)$$

其本征值由相应久期方程（即齐次代数方程组有非零解的条件——系数行列式为零）：

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (2)$$

决定。解（2）得： $\lambda = -1, 4$ 。

由（1）式给出：

$$3a + 2b = \lambda a, \quad 2a = \lambda b$$

两者是相容的，可任取其一： $b = \frac{2}{\lambda}a$ 。

当 $\lambda = -1$ 时， $b = -2a$ ，经归一化得：

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 4$ 时， $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$ ，归一化得：

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由
$$\psi_1 + \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} (1, -2) - \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} (2 - 2) = 0$$

可见厄米矩阵与厄米算符一样，不同本征值的本征函数一定正交。

下面我们补充一个有简并本征值的厄米矩阵本征值问题。

6. 若厄米算符 $\hat{\Omega}$ 在正交归一基矢 $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ 张成的三维空间中取如下矩阵形式：

$$(\hat{\Omega}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求其本征值和本征矢。

解：由于 $\hat{\Omega}$ 的矩阵为厄米矩阵，它有实数本征值 ω ，矩阵形式的本征方程为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad (1)$$

相应的久期方程为：

$$\begin{vmatrix} 1-\omega & 0 & 1 \\ 0 & 2-\omega & 0 \\ 1 & 0 & 1-\omega \end{vmatrix} = 0 \quad (2)$$

由本征方程（1）得系数关系：

$$\left. \begin{aligned} a + c &= \omega a \\ 2b &= \omega b \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

解 (2) 式得本征值 $\omega_1 = 0$, $\omega_2 = \omega_3 = 2$ 。

先求无简并本征值 $\omega_1 = 0$ 相应的本征矢。由 (3) 式得: $c = -a$, $b = 0$, 归一化本征函数为:

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

在给定的空间 $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ 中, ψ_1 相应的本征矢为:

$$|\omega_1 = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|u_1\rangle - |u_3\rangle) \quad (4)$$

其次求两度简并的本征值 $\omega_2 = \omega_3 = 2$ 相应的本征矢。在 $\omega_2 = 2$ 时, (3) 式中 $c_2 = a_2$, 而 b_2 可取任意值, 不确定, 所以简并本征值的本征矢不能“唯一”确定下来。可任选 b_2 , 例如令 $b_2 = 0$, 则因 $c_2 = a_2$ 可得:

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{相当于 } |\omega_2 = 2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|u_1\rangle + |u_3\rangle). \quad (5)$$

为给出简并本征值 2 的另一本征函数 ψ_3 , 可要求简并本征值的不同本征函数彼此正交, 即要求 (因为 (3) 式 当 $\omega_3 = 2$ 时, $a_3 = c_3$)

$$\psi_2 + \psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1) \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \\ a_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (a_3 + a_3) = 0$$

所以 $a_3 = c_3 = 0$, 故有:

$$\psi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\omega_3 = 2\rangle = |u_2\rangle \quad (6)$$

这样给出的三个本征矢一定两两正交, 但不是唯一的, 可有许多种选法。例如, 选 $b_2 = 1$ 时, 有:

$$\psi_2' = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

再按正交要求可由 ψ_2' 确定出: $b_3' = -2a_3'$, $\psi_3' = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。这三个本征函数 ψ_1 、

ψ_2' 和 ψ_3' 也一定两两正交。

事实上, 对简并本征值的本征矢集合有无限多种选法。因为在与无简并本征值 $\omega_1 = 0$ 的本征矢 $|\omega_1 = 0\rangle$ 相垂直的平面上彼此正交的矢量有无限多组, 它们都与 $|\omega_1 = 0\rangle$ 相垂直 (正交)。因此, 对于简并本征值, 先选定一个本征矢, 然后再按正交要求确定另外的本征

矢，它们同属于简并本征值子空间中的两个正交矢量。

7. 在由正交归一基矢 $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ 所张的三维态矢空间中考虑一物理体系，算符 $\hat{H}$ 和 $\hat{B}$ 的定义如下：

$$H = \hbar\omega_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = b \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

式中 ω_0 和 b 为常数。(1) $\hat{H}$ 和 $\hat{B}$ 是否是厄米算符，(2) 证明 H 和 B 可对易，(3) 求 H 和 B 的共同本征矢。
(北京工业大学 1982年)

解：这是两个厄米矩阵同时对角化的问题。

(1) 因为矩阵 H 和 B 是实对称的，所以它们是厄米矩阵，相应的算符为厄米算符。

(2) 由于

$$HB = BH = \hbar\omega_0 b \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 H 与 B 对易，从而存在共同本征矢集合。

(3) 我们知道，若两个厄米算符彼此对易，且一个算符的所有本征值均无简并，则该算符的本征矢集合就一定是它们的共同本征矢集合；如果其中一个算符的某一本征值有简并，则相应的本征矢有任意性（如题6），任选的本征矢未必是另一算符的本征矢。因此，求两厄米矩阵共同本征矢的“同时对角化过程”要分两步作。

第一步，先求一个矩阵的本征值和本征矢，在自身表象中该矩阵已对角化，对角元为本征值，

第二步，在一个矩阵对角化的表象中，另一个与该矩阵对易的矩阵一定表现为“块状”对角化，所以这步只要“分块”对角化这另一矩阵即可。

本题中， H 在 $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ 中已对角化，可知其无简并本征值 $E_1 = \hbar\omega_0$ 相应的本征矢为：

$$|E_1 = \hbar\omega_0\rangle = |u_1\rangle$$

而简并本征值 $E_2 = E_3 = -\hbar\omega_0$ 相应的本征矢，与 $|u_2\rangle$ 和 $|u_3\rangle$ 有关，可以是它们的任意线性组合，不确定。在该三维空间中， B 确实是块状对角的：

$$B = b \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{0 & 1} \\ 0 & \boxed{1 & 0} \end{pmatrix}$$

由于 $|u_1\rangle$ 是 H 无简并本征值 E_1 的本征矢，所以它一定是 B 相应本征值 $\lambda_1 = b$ 的本征矢。因此，余下的问题是在 H 本征值为 $E_2 = -\hbar\omega_0$ 的简并子空间 $\{|u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ 中对角化

$$B_2 = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

即可。解其久期方程，得本征值 $\lambda_2 = b$, $\lambda_3 = -b$ ，相应的本征矢分别为，

$$|\lambda_2 = b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u_2\rangle + |u_3\rangle)$$

$$|\lambda_3 = -b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u_2\rangle - |u_3\rangle)$$

由于 $\{|u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ 是 H 的不变子空间，所以 $|\lambda_2\rangle$ 和 $|\lambda_3\rangle$ 也一定是 H 相应本征值 $(-\hbar\omega_0)$ 的两个本征矢。如果用 $|q_1\rangle$ 、 $|q_2\rangle$ 和 $|q_3\rangle$ 表示 H 和 B 的共同本征矢，就有如下关系。

共同本征矢	H 的本征值	B 的本征值
$ q_1\rangle = u_1\rangle$	$\hbar\omega_0$	b
$ q_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_2\rangle + u_3\rangle)$	$-\hbar\omega_0$	b
$ q_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_2\rangle - u_3\rangle)$	$-\hbar\omega_0$	$-b$

由上表可见，在 $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ 中 H 和 B 都有简并本征值，但对 H 和 B 的本征值组而言，是无简并的，三组不同的本征值，有三个确定的共同本征矢。因此， H 和 B 构成了该三维空间中的力学量完全集。

8. (1) 若算符 $\hat{A}$ 的本征方程为： $\hat{A}|n\rangle = a_n|n\rangle$ ，试证 $\hat{A}$ 的算符函数 $F(\hat{A})$ 在 $\hat{A}$ 表象中是对角的，即：

$$F(\hat{A})|n\rangle = F(a_n)|n\rangle$$

(2) 试证力学量矩阵之迹与表象选择无关，即：

$$\sum_i \langle u_i | \hat{A} | u_i \rangle = \sum_j \langle t_j | \hat{A} | t_j \rangle \quad (\text{吉林大学 1982年})$$

证明：(1) 要证明的结果，可称为算符函数定理。算符函数可按函数的泰勒（麦克劳林）展开来定义，算符 $\hat{A}$ 的任意函数 $F(\hat{A})$ 定义为：

$$F(\hat{A}) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k \hat{A}^k \quad f_k = \frac{F^{(k)}(0)}{k!} = \frac{1}{k!} \left(\frac{d^k}{d\hat{A}^k} F(\hat{A}) \right) \Big|_{\hat{A}=0}$$

按此定义，当 $F(\hat{A})$ 是 $\hat{A}$ 的实函数时，若 $\hat{A}$ 为厄米算符 $\hat{A} = \hat{A}^+$ ，则 $F(\hat{A}) = F^+(\hat{A})$ ，即 $F(\hat{A})$ 仍是厄米的。例如， $e^{\hat{A}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \hat{A}^k$ ，当 $\hat{A} = \hat{A}^+$ 时， $e^{\hat{A}}$ 仍是厄米的。上述定义，只对单个算符有意义，不宜推广到多个算符的算符函数情形，因为在算符彼此不对易时展式中各项因子的次序是至关重要的了。

现在来证明, 若 $|n\rangle$ 为 $\hat{A}$ 相应本征值 a_n 的本征矢, 则它也是 $\hat{A}$ 的任意函数 $F(\hat{A})$ 相应本征值 $F(a_n)$ 的本征矢。

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad F(\hat{A})|n\rangle &= \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{F^{(k)}(0)}{k!} \hat{A}^k \right\} |n\rangle \\ &= \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{F^{(k)}(0)}{k!} a_n^k \right\} |n\rangle = F(a_n) |n\rangle \end{aligned}$$

此结果的意义在于, 如果厄米算符 $\hat{A}$ 的本征值问题解决了, 那么 $\hat{A}$ 的任意实函数 $F(\hat{A})$ 的本征值问题也随之知道了。特别是它把算符的函数关系与本征值 (与表象选择无关) 的函数关系联系起来了——两者满足同样的函数关系。因此, 知道其中之一的具体关系, 就可给出另一个满足的关系。

例如, 在 $\hat{\sigma}_z$ 表象中, $(\hat{\sigma}_z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $(\sigma_z = \pm 1)$ 。算符函数 $e^{\hat{\sigma}_z}$ 在该表象中的矩阵为,

$$(e^{\hat{\sigma}_z}) = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & e^{-1} \end{pmatrix}$$

显然, 在 $\hat{A}$ 表象中 $F(\hat{A})$ 是对角的,

$$(F(\hat{A}))_{nn} = F(a_n) \delta_{nn}$$

(2) 算符的迹, 定义为算符在给定基底中矩阵对角元之和, 用符号 Tr 表示,

$$\text{Tr} \hat{A} = \sum_i \langle u_i | \hat{A} | u_i \rangle$$

迹与基底选择无关。因为, 如有另一基底 $\{|t_j\rangle\}$, 有封闭关系 $\sum_j |t_j\rangle \langle t_j| = 1$, 把它“插入”定义式, 就有:

$$\begin{aligned} \sum_i \langle u_i | \hat{A} | u_i \rangle &= \sum_{i,j} \langle u_i | \hat{A} | t_j \rangle \langle t_j | u_i \rangle \quad (\text{因为内积 } \langle t_j | u_i \rangle \text{ 是一个数}) \\ &= \sum_{i,j} \langle t_j | u_i \rangle \langle u_i | \hat{A} | t_j \rangle \quad (\text{因为 } \sum_j |u_i\rangle \langle u_i| = 1) \\ &= \sum_j \langle t_j | \hat{A} | t_j \rangle \end{aligned}$$

利用算符的迹与基底选择无关这一结果, 选用 $\hat{A}$ 自身表象时,

$$\begin{aligned} \text{Tr} \hat{A} &= \sum_{n,\alpha} \langle n, \alpha | \hat{A} | n, \alpha \rangle \quad (\text{假定 } \hat{A} | n, \alpha \rangle = a_n | n, \alpha \rangle, \alpha = 1, \dots, f_n) \\ &= \sum_n a_n \sum_{\alpha=1}^{f_n} \langle n, \alpha | n, \alpha \rangle \quad (\text{当 } \langle n, \alpha | n, \alpha \rangle = 1 \text{ 时}) \\ &= \sum_n a_n f_n \end{aligned}$$

在 $\hat{A}$ 的本征值无简并时($f_n = 1$), $\text{Tr} \hat{A} = \sum_n a_n$, 即 $\hat{A}$ 的迹为 $\hat{A}$ 的本征值之和。

算符乘积的迹, 在算符顺次轮换下保持迹不变。因为

$$\begin{aligned}\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}) &= \sum_i \langle u_i | \hat{A}\hat{B} | u_i \rangle = \sum_{i,j} \langle u_i | \hat{A} | t_j \rangle \langle t_j | \hat{B} | u_i \rangle \\ &= \sum_{i,j} \langle t_j | \hat{B} | u_i \rangle \langle u_i | \hat{A} | t_j \rangle = \sum_j \langle t_j | \hat{B} \hat{A} | t_j \rangle \\ &= \text{Tr}(\hat{B}\hat{A})\end{aligned}$$

重复应用上式就有: $\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \text{Tr}(\hat{B}\hat{C}\hat{A}) = \text{Tr}(\hat{C}\hat{A}\hat{B})$

9. 试证: $\det A = e^{\text{Tr} \ln A}$, 其中 A 为可对角化矩阵。 (清华大学 1981年)

证明: 设 $A = e^B$, 在 B 表象中 A 为对角矩阵, 对角元为本征值 $a_n = e^{b_n}$ 。如果简并度为 f_n , 则

$$\det A = \prod_n a_n^{f_n} = \prod_n e^{f_n b_n} = e^{\sum_n f_n b_n} = e^{\text{Tr} B},$$

所以

$$\det A = e^{\text{Tr} \ln A}$$

上述证明中是在 A 已对化的情况下进行的, 但可以证明 A 的行列式值在 A 对角化过程中保持不变, 因为 A 的对角化过程即实行一么正变换 $S^{-1} = S^+$:

$$\begin{aligned}\det(S^+AS) &= \det(S^+) \det(AS) \\ &= \det(AS) \det(S^+) = \det(ASS^+) \\ &= \det(A)\end{aligned}$$

所以上述证明是普遍有效的。

10. 已知:

$$\ln A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & i\sqrt{3} \\ 7 & 0 & -5 \\ -i\sqrt{3} & -5 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{求 } A \text{ 的行列式 } \det A = ?$$

(华中师范学院 1981年)

解: 矩阵 $\ln A$ 是厄米的, 可令: $\ln A = B$, $A = e^B$ 。由于迹与基底选择无关, 可知 $\text{Tr} B = 1$, 按上题

$$\det A = e^{\text{Tr} B} = e$$

11. 求 $(1 + \hat{\sigma}_x)^{1/2}$, $\hat{\sigma}_x$ 为泡利矩阵的 x 分量。 (北京师范大学 1983年)

解: 这是个未加定义过的分数次幂的算符问题。为了求得本题的解答, 我们先来证明如下关系式:

$$(\hat{A} - a_1)(\hat{A} - a_2) \cdots (\hat{A} - a_n) = 0 \quad (1)$$

其中 a_n 为 $\hat{A}$ 的本征值 (暂且假定其为有限个), 相应的本征方程为:

$$(\hat{A} - a_n)|u_n\rangle = 0 \quad (2)$$

同时按量子力学的一般假设认为 $\hat{A}$ 的本征矢集合 $\{|u_n\rangle\}$ 是完备的, 任意态矢 $|\psi\rangle$ 有唯一的展式: $|\psi\rangle = \sum_n c_n |u_n\rangle$, 所以

$$\begin{aligned} & (\hat{A} - a_1)(\hat{A} - a_2) \cdots (\hat{A} - a_n) |\psi\rangle \\ &= c_1 (\hat{A} - a_2)(\hat{A} - a_3) \cdots (\hat{A} - a_n) (\hat{A} - a_1) |u_1\rangle \\ &+ c_2 (\hat{A} - a_1)(\hat{A} - a_3) \cdots (\hat{A} - a_n) (\hat{A} - a_2) |u_2\rangle \\ &+ \cdots + c_n (\hat{A} - a_1)(\hat{A} - a_2) \cdots (\hat{A} - a_n) |u_n\rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

考虑到 $|\psi\rangle$ 的任意性, 就有 (1) 式成立, 且可推广到 a_n 有无限多个的情况。

$$\text{设: } \hat{P} = (1 + \hat{\sigma}_x)^{1/2}$$

因为 $\sigma_x = \pm 1$, 所以 $P = 0, \sqrt{2}$, 因此 $\hat{P}(\hat{P} - \sqrt{2}) = 0$,

$$\text{即 } \hat{P} = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{P}^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + \hat{\sigma}_x),$$

$$\text{故得: } (1 + \hat{\sigma}_x)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + \hat{\sigma}_x)$$

由此可见, 利用 (1) 式, 在算符本征值已知的情况下, 可直接给出算符关系。

12. (1) 证明对易关系 $[x, f(\hat{p}_x)] = i\hbar \frac{\partial f}{\partial \hat{p}_x}$, 其中 f 为可微函数; (2) 证

$$\text{明: } e^{i\hat{p}_x a/\hbar} x e^{-i\hat{p}_x a/\hbar} = x + a$$

(天津大学 1985年)

证明: (1) 这是个证明含算符函数的对易关系, 可把算符函数展成泰勒级数, 利用 $[x, \hat{p}_x] = i\hbar$ 来证明。现按同样步骤证明更一般的含算符函数的对易关系。如果 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 不对易, 但 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 都与它们的对易子 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 对易, 即 $[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$, 则有:

$$[\hat{A}, F(\hat{B})] = [\hat{A}, \hat{B}] \frac{\partial F}{\partial \hat{B}} \quad (1)$$

$$\text{因为 } [\hat{A}, F(\hat{B})] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{F^{(k)}(0)}{k!} [\hat{A}, \hat{B}^k]$$

$$\text{由 } [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$$

用数学归纳法可以证明:

$$[\hat{A}, \hat{B}^n] = \sum_{k=0}^{n-1} \hat{B}^k [\hat{A}, \hat{B}] \hat{B}^{n-k-1} \quad (2)$$

在 $\hat{B}$ 与 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 对易的条件下, (2)式变为:

$$[\hat{A}, \hat{B}^n] = n[\hat{A}, \hat{B}] \hat{B}^{n-1}$$

所以

$$\begin{aligned} [\hat{A}, F(\hat{B})] &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{F^{(k)}(0)}{k!} k[\hat{A}, \hat{B}] \hat{B}^{k-1} \\ &= [\hat{A}, \hat{B}] \frac{\partial F}{\partial \hat{B}} \end{aligned}$$

(1)式得证。

因为 $[x, \hat{p}_x] = i\hbar$, 作为(1)式的特例, 可直接写出要证的关系:

$$[x, f(\hat{p}_x)] = i\hbar \frac{\partial f}{\partial \hat{p}_x} \quad (3)$$

实际上, 利用(1)式还能给出如下对易关系:

$$[x, \hat{p}_x^n] = ni\hbar \hat{p}_x^{n-1}, \quad [\hat{p}_x, f(x)] = -i\hbar \frac{\partial f}{\partial x}$$

$$[x, e^{a\hat{p}_x}] = i\hbar a e^{a\hat{p}_x}$$

(2) 利用(1)式或(3)式, 有:

$$[x, e^{-i\hat{p}_x a/\hbar}] = a e^{-i\hat{p}_x a/\hbar}$$

即

$$x e^{-i\hat{p}_x a/\hbar} = e^{-i\hat{p}_x a/\hbar} (x + a)$$

所以

$$e^{i\hat{p}_x a/\hbar} x e^{-i\hat{p}_x a/\hbar} = e^{i\hat{p}_x a/\hbar} e^{-i\hat{p}_x a/\hbar} (x + a) = (x + a)$$

实际上, $e^{-i\hat{p}_x a/\hbar}$ 是空间平移算符。因为对任意波函数 $\varphi(x)$, 可定义空间平移算符 $\hat{T}_a$ 使:

$$\hat{T}_a \varphi(x) = \varphi(x - a)$$

按 $\varphi(x - a)$ 在 x 点的展开式:

$$\begin{aligned} \varphi(x - a) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-a)^k}{k!} \varphi^{(k)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-a \frac{d}{dx}\right)^k \varphi(x) \\ &= e^{-a \frac{d}{dx}} \varphi(x) = e^{-i\hat{p}_x a/\hbar} \varphi(x) \end{aligned}$$

由 $\varphi(x)$ 的任意性得: $\hat{T}_a = e^{-i\hat{p}_x a/\hbar}$

它与算符函数 $f(\hat{x})$ 有如下交换关系:

$$e^{-i\hat{p}_x a/\hbar} f(\hat{x}) = f(\hat{x} - a) e^{-i\hat{p}_x a/\hbar}$$