

最新版

执业护士

历年真题与解析

专家编写组 编

题库光盘

- 真题智能组卷
- 限时强化练习

真题重现

- 解读出题思路
- 笑傲护士考场



辽宁科学技术出版社

执业护士

历年真题与解析

【真题精选】

2013—2018年真题
2019—2021年真题

【真题解析】

2013—2018年真题
2019—2021年真题



中国医药出版社

执业护士历年真题与解析

专家编写组 编

辽宁科学技术出版社

沈阳

图书在版编目(CIP)数据

执业护士历年真题与解析 / 专家编写组编. —沈阳:
辽宁科学技术出版社, 2009.6
ISBN 978-7-5381-5861-8

I. 执… II. 专… III. 护士 - 资格考核 - 解题
IV. R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 023038 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳市第三印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 28.75

字 数: 450 千字

印 数: 1~3000

出版时间: 2009 年 6 月第 1 版

印刷时间: 2009 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 倪晨涵 郭敬斌 陈 刚

封面设计: 袁 舒

版式设计: 袁 舒

责任校对: 李 霞

书 号: ISBN 978-7-5381-5861-8

定 价: 65.00 元 (赠光盘)

联系电话: 024-23280336

邮购热线: 024-23284502

E-mail: guojingbin@126.com

<http://www.lnkj.com.cn>

编写人员

孙 谏	刘洪慧	张小利	黄兴利	穆 含
朱 磊	陈 俊	罗 飞	赵 珏	鲁 怡
赵思佩	薛 骞	刘祚汝	吴苗君	贾维茜
张碧莹	杨 丽	苑宗焕	张 磊	郑祥波
张 辰	房 蕊	杨 蕊	曹丹丹	刘艳花
夏小雨	汪 欢	李 源	仲肇基	李 沛
陈 浩	郭晶岩	刘利梅	萧 湘	

目 录

第一部分 历年真题

护理基础学	1
内科学	25
外科学	100
妇科学	158
儿科学	206

第二部分 历年真题解析

护理基础学	251
内科学	271
外科学	328
妇科学	376
儿科学	419

第一部分 历年真题

护理基础学

A1 型题

1. 国际护士节定于 ()
A. 4月12日 B. 5月1日 C. 5月4日 D. 5月12日 E. 9月10日
2. 护理学是 ()
A. 研究人文的科学
B. 研究医学的科学
C. 研究护理技术的科学
D. 研究社会的科学
E. 与社会、自然、人文科学相互渗透的一门综合性应用科学
3. 现代医学模式为 ()
A. 生物—社会医学模式 B. 生物—心理医学模式 C. 生物—医学模式
D. 生物—生理—社会医学模式
E. 生物—心理—社会医学模式
4. 世界卫生组织对健康的定义不包括下列哪项 ()
A. 躯体没有疾病 B. 有完整的生理状态 C. 有完整的心理状态
D. 有一定的劳动力 E. 有社会适应能力
5. 除下列哪项外都是护士必须具备的素质 ()
A. 反应敏捷 B. 关怀体贴 C. 勇于实践
D. 情绪始终愉快 E. 遇烦心事要忍耐
6. 以下哪项不是护士的职业角色功能 ()
A. 提供护理的角色 B. 教师的角色 C. 母亲的角色
D. 管理协调者的角色 E. 科研的角色
7. 按照马斯洛的“人的基本需要层次论”，生理需要满足后，则应满足 ()
A. 社交需要 B. 安全需要 C. 爱的需要
D. 自尊需要 E. 自我实现的需要
8. 以下哪项不属于压力源中的心理社会因素 ()
A. 人际关系紧张 B. 迁居 C. 离婚
D. 怀孕 E. 考试
9. 与患者交谈过程中，可引起沟通障碍的是 ()
A. 与交谈者经常保持目光接触 B. 交谈过程中适当沉默
C. 用复述强调患者陈述的关键内容 D. 交谈过程中随意改换话题
E. 适时轻轻抚摸患者
10. 当个体经受某种压力时，调整自己的态度去认识和处理情况，属于 ()
A. 生理适应 B. 心理适应 C. 文化适应 D. 社会适应 E. 技术适应
11. 当个体发生疾病时采取的第三线防卫是 ()
A. 正确对待问题 B. 正确对待情感 C. 向朋友寻求帮助
D. 减少压力的生理性影响 E. 寻求医护人员的帮助

12. 自我照顾模式是由谁提出的 ()
A. 纽曼 B. 佩普劳 C. 汉斯·席尔 D. 马斯洛 E. 奥瑞姆
13. 有关护理程序概念的解释哪项不妥 ()
A. 是指导护士工作及解决问题的工作方法
B. 其目标是增进或恢复服务对象的健康
C. 是以系统论为理论框架
D. 是有计划、有决策与反馈功能的过程
E. 是由估计、诊断、计划、实施 4 个步骤组成
14. 组成护理程序的框架理论是 ()
A. 人的基本需要论 B. 系统论 C. 方法论
D. 信息交流论 E. 解决问题论
15. 下列收集的资料哪项属于客观资料 ()
A. 头痛 B. 咽部充血 C. 感到头晕
D. 睡眠不好, 多梦 E. 感到恶心
16. 护理诊断指出护理方向, 有利于 ()
A. 收集客观资料 B. 制定护理措施 C. 实施护理措施
D. 进行护理评估 E. 修改护理计划
17. 属于护理程序计划阶段内容的是 ()
A. 分析资料 B. 提出护理诊断 C. 确定护理目标
D. 实施护理措施 E. 评价患者反应
18. 不属于护理理论 4 个基本概念的是 ()
A. 人 B. 健康 C. 保健 D. 环境 E. 护理
19. 对病人进行心理社会评估采用的最主要方法是 ()
A. 体格检查 B. 交谈和观察 C. 心理社会测试
D. 阅读相关资料 E. 使用疼痛评估工具
20. 下列哪种沟通形式不属于非语言性沟通 ()
A. 面部表情 B. 手势 C. 身体运动 D. 身体姿势 E. 健康宣教资料
21. 在护患关系建立初期, 护患关系发展的主要任务是 ()
A. 对病人收集资料 B. 确定病人的健康问题 C. 为病人制订护理计划
D. 与病人建立信任关系 E. 为病人解决健康问题
22. 属于主观方面的健康资料是 ()
A. BP 122/80mmHg B. 头昏脑涨 C. 骶尾部皮肤破损 1cm × 2cm
D. 膝关节红肿、压痛 E. 肌张力 3 级
23. 保持病区环境安静, 下列措施哪项不妥 ()
A. 推平车进门, 先开门后推车 B. 医务人员讲话应附耳细语
C. 轮椅要定时注润滑油 D. 医务人员应穿软底鞋
E. 病室门应钉橡胶垫
24. 病人休养适宜的环境是 ()
A. 气管切开病人, 室内相对湿度为 30%
B. 中暑病人, 室温应保持在 4℃ 左右
C. 普通病室, 室温以 18 ~ 24℃ 为宜

- D. 产妇休养室, 须保暖不宜开窗
E. 破伤风病人, 室内应保持光线充足
25. 为了使病人舒适, 利于观察病情应做到 ()
A. 病室内光线充足 B. 病室内放花卉 C. 提高病室温度
D. 注意室内通风 E. 注意室内色调
26. 不符合铺床节力原则的是 ()
A. 备齐用物, 按序放置 B. 身体靠近床沿 C. 上身前倾, 两膝直立
D. 下肢稍分开, 保持稳定 E. 使用肘部力量, 动作轻柔
27. 铺麻醉床, 错误的操作步骤是 ()
A. 换铺清洁被单
B. 按要求将橡胶单和中单铺于床头、床中部
C. 盖被纵向三折于门同侧床边
D. 枕横立于床头, 开口背门
E. 椅子置于门对侧床边
28. 下列哪项描述的是一种宁静、安详、无焦虑及无拘无束的状态 ()
A. 舒适 B. 休息 C. 睡眠 D. 活动 E. 放松
29. 一般病人入病区后的初步护理, 应首先 ()
A. 介绍住院规章制度 B. 扶助上床休息, 护士自我介绍
C. 测量生命体征 D. 通知医生, 协助体检
E. 填写住院病历有关栏目
30. 护士对前来门诊的患者, 首先应进行的工作是 ()
A. 健康教育 B. 卫生指导 C. 预检分诊 D. 查阅病案 E. 心理安慰
31. 门诊发现肝炎病人, 护士应立即 ()
A. 安排提前就诊 B. 转急诊治疗 C. 转隔离门诊治疗
D. 给予卫生指导 E. 问清病史
32. 对一位须住院的心力衰竭病人, 住院处的护理人员首先应 ()
A. 卫生处置 B. 介绍医院的规章制度 C. 立即护送病人入病区
D. 通知医生作术前准备 E. 了解病人有何护理问题
33. 一般病人入院, 值班护士接住院处通知后, 应先 ()
A. 准备病床单元 B. 迎接新病人 C. 填写入院病历
D. 通知医生 E. 通知营养室
34. 下列哪项不属于急诊留观室的护理工作 ()
A. 住院登记, 建立病历 B. 填写各种记录单 C. 及时处理医嘱
D. 做好心理护理 E. 做好晨晚间护理
35. 出院护理的卫生指导, 下列哪项概念的陈述不妥 ()
A. 单纯普及卫生常识 B. 包括饮食指导 C. 包括休息指导
D. 包括复诊指导 E. 必要时给予功能锻炼指导
36. 对传染病患者出院时的终末消毒处理, 错误的是 ()
A. 患者洗澡, 换清洁衣裤 B. 个人用物经消毒方可带出病区
C. 被服及时送洗衣房清洗 D. 室内空气可用喷洒消毒
E. 病床、桌椅可用喷洒消毒

52. 热力消毒灭菌法的原理是 ()
- A. 干扰细菌酶的活性 B. 破坏细菌膜的结构 C. 使菌体蛋白发生光解变性
D. 抑制细菌代谢和生长 E. 使菌体蛋白及酶变性凝固
53. 煮沸消毒时为提高沸点, 可加入 ()
- A. 氯化铵 B. 亚硝酸钠 C. 碳酸钠 D. 碳酸氢钠 E. 碳酸铵
54. 用煮沸法消毒物品, 正确的是 ()
- A. 水沸后放橡胶管 B. 组织剪刀打开轴节
C. 水沸后放入玻璃物品 D. 大小相同的治疗碗可重叠
E. 煮沸中途加入物品应从加入开始即计时
55. 为检验高压蒸汽灭菌效果, 目前常用的方法是 ()
- A. 温度计监测 B. 灭菌包中试纸变色
C. 灭菌包中明矾熔化 D. 术后病人是否有切口感染
E. 灭菌后物品细菌培养
56. 紫外线灯管消毒, 应从灯亮后几分钟开始计时 ()
- A. 1~3 B. 3~5 C. 5~7 D. 7~9 E. 9~11
57. 不属于物理消毒灭菌的方法是 ()
- A. 燃烧法 B. 臭氧灭菌灯消毒法 C. 微波消毒灭菌法
D. 浸泡法 E. 生物净化法
58. 使用化学消毒剂的注意事项中, 下列哪一项是错误的 ()
- A. 严格掌握药物的有效时间和浓度 B. 浸泡前要打开器械的轴节
C. 物品应全部浸没在消毒液中 D. 消毒液容器要盖严
E. 使用前用 3% 盐水冲净, 以免药液刺激组织
59. 用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是 ()
- A. 0.5% 过氧乙酸 B. 2% 戊二醛 C. 0.1% 苯扎溴铵
D. 3% 漂白粉澄清液 E. 70% 乙醇
60. 某房间长 4m、宽 3m、高 3m, 用食醋熏蒸消毒空气, 食醋用量为 ()
- A. 100mL B. 120mL C. 140mL D. 160mL E. 180mL
61. 配制 0.1% 苯扎溴铵 4000mL, 需用 5% 苯扎溴铵 ()
- A. 50mL B. 60mL C. 80mL D. 90mL E. 100mL
62. 对肝炎病人用过的票证最好的消毒方法是 ()
- A. 氯胺喷雾 B. 紫外线照射 C. 高压蒸汽灭菌
D. 甲醛小柜熏蒸 E. 过氧乙酸浸泡
63. 过氧乙酸不能用于 ()
- A. 手的消毒 B. 空气消毒 C. 浸泡金属器械
D. 擦拭家具 E. 浸泡搪瓷类物品
64. 浸泡纤维胃镜的消毒液宜用 ()
- A. 0.1% 苯扎溴铵 B. 0.2% 过氧乙酸 C. 70% 乙醇
D. 2% 戊二醛 E. 碘伏
65. 能够对纱布有吸附性而致药效降低的消毒剂为 ()
- A. 乙醇 B. 苯扎溴铵 C. 消毒灵
D. 戊二醛 E. 碘伏

66. 使用无菌持物钳, 下列哪项不正确 ()
- A. 应浸泡在盛有消毒液的大口容器内
B. 液面浸没轴节以上 2~3cm
C. 每个容器只能放 1 把
D. 取钳应将钳端闭合
E. 可用于夹取消毒的油纱布
67. 取用无菌溶液, 正确的是 ()
- A. 取用前首先检查溶液性状
B. 手指触及瓶盖内面
C. 倒溶液时溶液瓶口触碰无菌容器
D. 将无菌敷料直接伸入瓶内蘸溶液
E. 溶液未用完注明开瓶日期和时间
68. 无菌包被无菌等渗盐水浸湿应 ()
- A. 立即使用完
B. 4h 用完
C. 24h 用完
D. 烘干后使用
E. 重新灭菌
69. 铺无菌盘时哪项是错误的 ()
- A. 用无菌持物钳夹取治疗巾
B. 注意使治疗巾边缘对齐
C. 治疗巾开口部分及两侧返折
D. 有效期不超过 6h
E. 避免潮湿和暴露过久
70. 下列哪项符合无菌技术操作原则 ()
- A. 手持无菌镊的 1/2 处
B. 持无菌容器时手指触及容器边缘
C. 将无菌敷料伸进无菌溶液瓶内蘸取溶液
D. 将无菌盘的盖巾扇形折叠时, 开口边向外
E. 戴无菌手套的手触及另一手套返折部的外侧面
71. 在传染病区使用口罩, 符合要求的是 ()
- A. 口罩应遮住口部
B. 污染的手只能触摸口罩外面
C. 取下口罩后外面向外折叠
D. 口罩潮湿应晾干再用
E. 脱下口罩后勿挂在胸前
72. 穿脱隔离衣时要避免污染的部位是 ()
- A. 腰带以下
B. 腰带
C. 领子
D. 袖子后面
E. 胸前、背后
73. 执行隔离技术, 下列哪项步骤是错误的 ()
- A. 取下口罩, 将污染面向内折叠
B. 从指甲至前臂顺序刷手
C. 隔离衣挂在走廊里, 清洁面在外
D. 从页面抓取避污纸
E. 隔离衣应每天更换消毒
74. 使用手提式高压蒸汽灭菌器, 下述哪项是错误的 ()
- A. 隔层器内加水 2000mL
B. 布类物品放在搪瓷物品下面
C. 物品之间要有间隙
D. 要驱除灭菌器内的冷空气
E. 灭菌毕要待压力降至“0”再开盖
75. 用紫外线灯管消毒物品, 下列哪项是错误的 ()
- A. 照射前应清扫尘埃
B. 物品距灯管 50~60cm
C. 灯管用无水乙醇纱布擦拭
D. 灯亮开始计时
E. 关灯后冷却 3~4min 再开
76. 发生青霉素过敏性休克时, 临床最早出现的症状是 ()
- A. 烦躁不安、血压下降
B. 四肢麻木、头晕眼花
C. 腹痛、腹泻
D. 意识丧失、尿便失禁
E. 喉头水肿、呼吸道症状

77. 防止血标本溶血, 下列哪项是错误的 ()
- A. 选用干燥注射器和针头
B. 避免过度震荡血标本
C. 采血后带针头沿管壁将血液注入
D. 标本应及时送检
E. 需全血标本时, 应采用抗凝管
78. 关于护理程序的论述, 正确的概念是 ()
- A. 是一种护理工作的分工类型
B. 是一种护理工作的简化形式
C. 是一种系统的解决护理问题的方法
D. 是一种技术操作的程序
E. 是一种护理活动的循环过程
79. 关于医嘱种类的解释, 下列哪项不对 ()
- A. 长期医嘱有效时间在 24h 以上
B. 临时医嘱一般只执行 1 次
C. 临时备用医嘱有效时间在 24h 以内
D. 长期医嘱医生注明停止时间后失效
E. 长期备用医嘱须由医生注明停止时间后方为失效
80. 为昏迷病员作口腔护理, 下列哪项是错误的 ()
- A. 张口器从白齿处放入
B. 用血管钳夹紧棉球擦洗
C. 取下活动假牙, 刷净后浸泡在冷水中
D. 用等渗盐水漱口
E. 局部溃疡用冰硼酸涂布
81. 配制灭头虱液, 下列哪组是正确的 ()
- A. 10g 百部酊、30% 乙醇 60mL
B. 20g 百部酊、40% 乙醇 80mL
C. 30g 百部酊、50% 乙醇 100mL
D. 40g 百部酊、60% 乙醇 120mL
E. 50g 百部酊、70% 乙醇 140mL
82. 给一位左上肢病人床上擦浴, 下述哪项是正确的 ()
- A. 由外眦向内眦擦拭眼部
B. 脱上衣时先脱左肢
C. 擦毕按摩骨突处
D. 穿上衣时先穿右肢
E. 擦洗动作要轻慢
83. 发生压疮的最主要原因是 ()
- A. 局部组织受压过久
B. 病原微生物侵入皮肤
C. 机体营养不良
D. 用夹板时衬垫不平
E. 皮肤受潮湿、摩擦刺激
84. 压疮的易发部位不包括 ()
- A. 侧卧位——踝部
B. 仰卧位——髂前上棘
C. 半坐卧位——骶尾部
D. 俯卧位——膝部
E. 头高足低位——足跟
85. 压疮瘀血红润期的典型表现是 ()
- A. 受压皮肤呈紫红色
B. 局部皮肤出现红、肿、热、痛
C. 局部皮下产生硬结
D. 皮肤上出现水疱
E. 皮肤破损, 有渗出液
86. 压疮瘀血红润期的主要护理措施是 ()
- A. 除去病因, 定时翻身
B. 局部使用抗生素, 避免感染
C. 厚层滑石粉包扎, 减少摩擦
D. 清洁创面, 除腐生新
E. 红外线照射, 干燥创面
87. 描述炎性浸润期压疮, 下列哪项不正确 ()
- A. 皮肤呈紫色
B. 皮下硬结
C. 有大、小水疱
D. 水疱表皮剥脱, 露出湿润的创面

- A. 睡眠不佳 B. 寒冷环境 C. 高热环境 D. 兴奋 E. 精神紧张
104. 使血压测量值相对准确的措施不包括 ()
- A. 被测者坐位时, 肱动脉平第 4 肋软骨 B. 缠袖带松紧以放入一指为宜
C. 重测血压必须使汞柱降至“0” D. 偏瘫患者在健侧肢体测量
E. 须密切观察血压的患者, 应固定测量者
105. 成人生命体征测值在正常范围内的一组是 ()
- A. T 37℃, P 102/min, R 22/min, BP 120/75mmHg
B. T 38℃, P 98/min, R 24/min, BP 113/68mmHg
C. T 36℃, P 88/min, R 20/min, BP 128/83mmHg
D. T 35.8℃, P 58/min, R 15/min, BP 105/64mmHg
E. T 36.5℃, P 70/min, R 18/min, BP 143/98mmHg
106. 关于血压的生理性变化, 错误的叙述是 ()
- A. 小儿血压低于成年人 B. 中年以前女性血压低于男性
C. 清晨血压低于傍晚 D. 上肢血压低于下肢
E. 寒冷环境血压低于高温环境
107. 为了准确观察病人的血压, 测量时应尽量做到“四定”, 即 ()
- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计
B. 定时间、定部位、定血压计、定人员
C. 定时间、定部位、定体位、定记录格式
D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器
E. 定时间、定体位、定部位、定袖带
108. 一般体检测量脉搏的方法中, 正确的是 ()
- A. 可用拇指诊脉
B. 病人剧烈活动后立即测量
C. 有脉搏短绌, 应两人同时分别测量心率、脉率
D. 测量部位只有桡动脉
E. 测量前不必做解释工作
109. 1999 年 WHO/ISH 对 1 级高血压的诊断标准是 ()
- A. 收缩压 <120mmHg, 舒张压 <80mmHg
B. 收缩压 <130mmHg, 舒张压 <85mmHg
C. 收缩压 140 ~ 159mmHg, 舒张压 90 ~ 99mmHg
D. 收缩压 130 ~ 139mmHg, 舒张压 85 ~ 89mmHg
E. 收缩压 160 ~ 179mmHg, 舒张压 100 ~ 109mmHg
110. 病人不宜长期使用流质饮食的原因是 ()
- A. 影响消化吸收 B. 影响营养供给 C. 影响食欲
D. 影响休息 E. 进食次数过多
111. 腹泻病人应选择 ()
- A. 少渣饮食 B. 高脂肪饮食 C. 高膳食纤维饮食
D. 低盐饮食 E. 低胆固醇饮食
112. 急性胰腺炎病人禁食脂肪的目的是 ()
- A. 防止呕吐 B. 减轻腹痛 C. 减少腹胀

- D. 减少胃液分泌 E. 减少胰液分泌
113. 下列饮食中用于治疗的是 ()
- A. 普通饮食 B. 高脂肪饮食 C. 低蛋白饮食 D. 忌碘饮食 E. 半流质饮食
114. 一般不选用低盐饮食的疾病是 ()
- A. 心力衰竭 B. 贫血 C. 高血压 D. 急性肾炎 E. 肝硬化腹水
115. 大便隐血试验前, 饮食中可选择 ()
- A. 肉类 B. 肝类 C. 动物血 D. 豆制品、冬瓜 E. 绿色蔬菜
116. 测量鼻饲管插入长度的方法为 ()
- A. 耳垂到鼻尖的长度 B. 鼻尖到胸骨的长度 C. 鼻尖到耳垂到剑突的长度
- D. 鼻尖到剑突的长度 E. 口唇到剑突的长度
117. 对鼻饲患者的护理, 下述不妥的是 ()
- A. 每次灌注前回抽胃液 B. 每次鼻饲量 500mL
- C. 每次灌注流质后应注入温开水 D. 每日进行口腔护理
- E. 每周更换鼻饲管
118. 插入鼻饲管至会厌部时, 托起病人头部, 使其下颌靠近胸骨柄的目的是 ()
- A. 使鼻道通畅 B. 避免咽后壁刺激
- C. 加大咽喉部通道的弧度 D. 使喉肌放松便于胃管通过
- E. 使食管第一狭窄消失
119. 插管操作结束后, 为证实鼻饲管是否在胃内, 进行检查时错误的方法是 ()
- A. 注入少量空气, 同时听胃部有无气过水声
- B. 抽吸出胃液
- C. 注入少量温开水, 同时听胃部有无气过水声
- D. 鼻饲管末端放入水杯有无气体溢出
- E. 抽吸出液体用 pH 试纸测试
120. 鼻饲操作错误的是 ()
- A. 每日作口腔护理 B. 每次喂食间隔时间 $\geq 2h$
- C. 注入少量温开水证实胃管是否在胃内 D. 药片应研碎后再灌入
- E. 拔管时应夹紧胃管末端快速拔出
121. 不需要记入排出量的内容是 ()
- A. 呕吐物 B. 胸水和腹水 C. 胃肠减压液 D. 胆汁 E. 汗液
122. 下列哪类病人应给予鼻饲饮食 ()
- A. 婴幼儿 B. 经常呕吐者 C. 拒绝进食者 D. 食欲低下者 E. 拔牙者
123. 热坐浴的禁忌证是 ()
- A. 肛门部充血 B. 外阴部炎症 C. 痔疮手术后
- D. 肛门周围感染 E. 妊娠后期痔疮疼痛
124. 属热疗适应证的是 ()
- A. 急性阑尾炎 B. 鼻翼旁疖肿 C. 牙痛
- D. 急性乳腺炎 E. 软组织挫伤 10h 内
125. 为病人保暖解痉最简便的方法是 ()
- A. 热水袋 B. 热坐浴 C. 热湿敷 D. 温水浴 E. 红外线照射
126. 有创面的部位作湿热敷, 尤其应注意的是 ()

- A. 床单上垫橡胶单 B. 皮肤涂凡士林 C. 保持合适的水温
D. 严格执行无菌操作 E. 及时更换敷料
127. 冷疗的目的不包括 ()
A. 促进炎症的消散 B. 减轻出血 C. 减轻疼痛
D. 降低体温 E. 减轻局部充血
128. 不可用冷疗的病情是 ()
A. 鼻出血 B. 头皮下血肿的早期 C. 中暑
D. 压疮 E. 牙痛
129. 酒精擦浴时, 禁擦的部位是 ()
A. 侧颈、上肢 B. 腋窝、腹股沟 C. 前胸、腹部
D. 臀部、下肢 E. 背部、肘窝
130. 为降温作温水擦浴, 水温宜选用 ()
A. 56~60℃ B. 45~50℃ C. 40~45℃ D. 37~40℃ E. 32~34℃
131. 下列病人使用热水袋时, 水温可以是 60~70℃的是 ()
A. 昏迷病人 B. 瘫痪病人 C. 婴幼儿病人
D. 老年病人 E. 神志清醒的青年人
132. 为病人进行热疗时, 下列说法正确的是 ()
A. 温水擦浴时水温应为 27~37℃
B. 麻醉未清醒的病人应用热水袋温度为 50~60℃
C. 温水坐浴时水温为 50~60℃
D. 温热敷时水温为 60~70℃
E. 局部浸泡时水温应为 50℃
133. 多尿指昼夜尿量至少超过 ()
A. 2000mL B. 2300mL C. 2500mL D. 2800mL E. 3000mL
134. 阻塞性黄疸病人的尿液呈 ()
A. 鲜红色 B. 乳白色 C. 黄褐色 D. 酱油色 E. 淡黄色
135. 解除尿潴留的措施中哪一项是错误的 ()
A. 嘱病人坐起排尿 B. 让其听流水声 C. 口服利尿剂
D. 轻轻按摩下腹部 E. 用温水冲洗会阴
136. 女病人导尿, 下列步骤中哪项是错误的 ()
A. 严格无菌操作 B. 病人取仰卧屈膝位 C. 插管动作宜轻慢
D. 导管插入尿道 4~6cm E. 导管误插入阴道, 应立即拔出用原管重插
137. 为男性病人导尿出现导尿管插入受阻, 应该 ()
A. 拔出导尿管重新插入 B. 嘱病人忍耐, 用力插入
C. 稍停片刻, 嘱病人深呼吸再缓慢插入 D. 更换金属导尿管
E. 行局部麻醉后, 再插入导尿管
138. 下列哪种情况不需留置导尿管 ()
A. 膀胱镜检查 B. 子宫切除术 C. 尿道修补术
D. 大面积烧伤 E. 前列腺肥大尿潴留
139. 关于留置导尿管的护理措施, 下列哪一项是正确的 ()
A. 随时倾倒尿液, 并提高引流管 B. 每日更换留置导尿管