



工业和信息化“十三五”规划教材

# 高等数学

## 习题全解与学习指导

### 上册

张弢 殷俊锋 © 编

传承经典，演绎数学之美  
配录微课，共享精品资源  
紧扣大纲，符合考研需求



中国工信出版集团



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS



工业和信息化部“十二五”规划教材

# 高等数学

## 习题全解与学习指导

### 上册



人民邮电出版社  
北京

## 图书在版编目(CIP)数据

高等数学习题全解与学习指导. 上册 / 张弢, 殷俊  
锋编. — 北京: 人民邮电出版社, 2018. 12  
ISBN 978-7-115-48636-3

I. ①高… II. ①张… ②殷… III. ①高等数学—高  
等学校—题解 IV. ①O13-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第123917号

## 内 容 提 要

本书是与同济大学数学系编写的《高等数学(上册)》(ISBN 978-7-115-42277-4, 人民邮电出版社出版)配套的学习指导书. 本书是按照教育部大学数学教学指导委员会的基本要求, 充分吸取当前优秀高等数学教材辅导书的精华, 并结合数年来的教学实践经验, 针对当今学生的知识结构和习惯特点编写的. 全套书分为《高等数学(上册)》《高等数学(下册)》及对应的学习指导书. 本书为上册的指导书, 一共有四章, 主要内容包括函数、极限与连续, 一元函数微分学及其应用, 一元函数积分学及其应用, 微分方程. 每章包含知识结构、归纳总结、例题解析与习题详解四个部分.

本书具有相对的独立性, 可供高等院校理工类和其他非数学专业的学生提供解题指导, 也可供准备报考硕士研究生的人员复习高等数学时参考使用. 例题解析和习题详解还可供讲授高等数学的老师在习题课时选用.

- 
- ◆ 编 张 弢 殷俊锋  
责任编辑 许金霞  
责任印制 焦志炜
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号  
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn  
网址 <http://www.ptpress.com.cn>  
固安县铭成印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16  
印张: 13.25 2018 年 12 月第 1 版  
字数: 315 千字 2018 年 12 月河北第 1 次印刷
- 

定价: 38.00 元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316  
反盗版热线: (010) 81055315  
广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

# 前 言

本书是同济大学数学系编写的《高等数学(上册)》(ISBN 978-7-115-42277-4,人民邮电出版社出版)的配套用书,是按照教育部大学数学教学指导委员会的基本要求,以指导学生理解基本概念和掌握基本解题方法为目的而编写的.本书主要是为学习高等数学的读者提供解题指导的参考书,也可以作为复习高等数学准备报考硕士研究生的人员的辅助用书,还可供讲授高等数学的教师在高等数学习题课和批改作业时参考.

全套书分为《高等数学(上册)》《高等数学(下册)》以及对应的配套学习指导书,内容按照《高等数学》的章节顺序设计,本书为上册的配套辅导书,共有四章,主要内容包括函数、极限与连续,一元函数微分学及其应用,一元函数积分学及其应用,微分方程.下册共有四章,主要内容包括空间解析几何,多元函数微分学,多元函数积分学,无穷级数.本书每章包含知识结构、归纳总结、例题解析与习题详解四个部分.第一部分通过结构图来帮助读者熟悉每章的基本内容、概念关系,使读者明确要求,抓住重点;第二部分总结了本章概念和基本计算中具有一般意义的解题方法;第三部分给出了经典例题及其分析精准的解题过程,使读者能够了解概念中的难点和容易误解的疑点;第四部分是《高等数学(上册)》的习题全解,包括各章的习题和章节测试.

本书由同济大学张弢、殷俊锋编写,由张弢统稿.本书在编写和统稿过程中得到了同仁和学生的大量帮助,并提出了许多宝贵意见,谨在此表示衷心的感谢.

编 者  
2018年10月


# 目 录

第一章 函数、极限与连续 .....	1
一、知识结构 .....	1
二、归纳总结 .....	2
三、例题解析 .....	2
四、习题详解 .....	7
习题 1-1 集合与函数 .....	7
习题 1-2 数列极限的定义与计算 .....	10
习题 1-3 函数极限的定义与计算 .....	14
习题 1-4 极限的证明与性质 .....	17
习题 1-5 两个重要极限 .....	19
习题 1-6 无穷小与无穷大 .....	23
习题 1-7 函数的连续性及其性质 .....	27
章节测试一 .....	33
第二章 一元函数微分学及其应用 .....	37
一、知识结构 .....	37
二、归纳总结 .....	37
三、例题解析 .....	38
四、习题详解 .....	46
习题 2-1 导数的概念及基本求导公式 .....	46
习题 2-2 导数的计算法则 .....	51
习题 2-3 微分的概念与应用 .....	64
习题 2-4 微分中值定理与应用 .....	70
习题 2-5 泰勒中值定理 .....	75
习题 2-6 函数的性质与图形 .....	77
习题 2-7 微分学的实际应用 .....	89
章节测试二 .....	98

<b>第三章 一元函数积分学及其应用</b> .....	102
<b>一、知识结构</b> .....	102
<b>二、归纳总结</b> .....	102
<b>三、例题解析</b> .....	105
<b>四、习题详解</b> .....	113
习题 3-1 不定积分的概念与性质 .....	113
习题 3-2 不定积分的换元法与分部法 .....	116
习题 3-3 有理函数的不定积分 .....	129
习题 3-4 定积分的概念与性质 .....	134
习题 3-5 微积分基本定理 .....	137
习题 3-6 定积分的换元法和分部法 .....	142
习题 3-7 定积分的几何应用与物理应用 .....	149
习题 3-8 反常积分 .....	159
<b>章节测试三</b> .....	162
<b>第四章 微分方程</b> .....	167
<b>一、知识结构</b> .....	167
<b>二、归纳总结</b> .....	167
<b>三、例题解析</b> .....	169
<b>四、习题详解</b> .....	174
习题 4-1 微分方程的基本概念 .....	174
习题 4-2 一阶微分方程 .....	177
习题 4-3 二阶微分方程 .....	186
习题 4-4 微分方程的实际案例 .....	199
<b>章节测试四</b> .....	202

# 第一章 函数、极限与连续

## 一、知识结构



## 二、归纳总结

### 1. 函数的定义域的确定

在实际问题中, 根据问题的实际背景确定函数的定义域. 不考虑函数的实际背景, 而抽象地研究用算式表达的函数时, 函数的定义域就是自变量所能取得的使算式有意义的一切实数的集合.

### 2. 极限问题

(1) 若  $f(x)$  是基本初等函数, 则它在定义域内的每个点  $x_0$  处均有  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

(2) 讨论分段函数在分段点的极限时, 注意结论:

函数  $f(x)$  当  $x \rightarrow x_0$  时极限存在的充分必要条件是  $f(x)$  在  $x_0$  处的左、右极限都存在且相等, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x_0^-) = f(x_0^+) = A.$$

(3) 考虑  $x \rightarrow \infty$  时的函数极限, 则注意运用结论:

函数  $f(x)$  当  $x \rightarrow \infty$  时极限存在的充分必要条件是极限  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  及  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  都存在且相等, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

(4) 分子、分母的极限均为零时, 注意下列方法:

首先, 观察所讨论的函数, 是否可做恒等变换, 是否可消去公因子, 是否在分子、分母同乘一个因子时使其分母的极限不为零; 其次, 注意是否可利用等价无穷小做替换, 并注意正确运用下列结论:

(I) 两个重要极限:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$  及由它们推出的各类极限;

(II) 有限个无穷小的和、差及积是无穷小, 局部有界量和无穷小的积是无穷小;

(III) 常见的等价无穷小: 当  $x \rightarrow 0$  时,

$$\begin{aligned} \sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x, \\ \ln(1+x) \sim x, e^x - 1 \sim x, \sqrt{1+x} \sim \frac{1}{2}x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

### 3. 函数连续性的判断

(1) 判断函数在一点处是否连续, 主要看函数在该点处是否有定义、是否有极限, 该点处的极限与函数值是否相同; 对于分段函数分段点处的连续性, 要分别讨论其左右极限.

(2) 可去间断点及跳跃间断点的共同特点是函数在间断点处的左、右极限均存在, 它们是第一类间断点; 无穷间断点是第二类间断点.

## 三、例题解析

**例 1** 求函数  $f(x) = \ln \ln \ln x + \sqrt{100 - x^2}$  的定义域.

**解**  $\ln \ln \ln x$  要有定义, 即  $\ln \ln x > 0$ , 从而  $\ln x > 1$ , 需满足  $x > e$ ;



$\sqrt{100-x^2}$  要有定义, 需满足  $x^2 \leq 100$ ,  $|x| \leq 10$ , 即  $-10 \leq x \leq 10$ .

因此,  $f(x)$  的定义域为  $(e, 10]$ .

**例 2** 设  $f(x) = e^{x^2}$ ,  $f[\varphi(x)] = 1-x$ , 且  $\varphi(x) \geq 0$ , 求  $\varphi(x)$  并写出它的定义域.

**解** 由  $f[\varphi(x)] = e^{[\varphi(x)]^2} = 1-x$ , 得  $\varphi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$ . 由  $\ln(1-x) \geq 0$  得  $1-x \geq 1$ , 即  $x \leq 0$ . 所以,  $\varphi(x)$  的表达式为

$$\varphi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}, \quad x \leq 0.$$

**例 3** 设  $a \neq 0$ ,  $|r| < 1$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a + ar + \cdots + ar^{n-1})$ .

**解** 利用等比数列的前  $n$  项和公式, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a + ar + \cdots + ar^{n-1}) = a \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-r^n}{1-r} = \frac{a}{1-r}.$$

**例 4** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 2x - 3}$ .

**解** 先利用有理式因式分解法消去零因子, 再利用极限的四则运算法则进行计算.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{x+3} = -\frac{1}{4}.$$

**例 5** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x+5}-3}$ .

**解** 先将无理式有理化, 消去零因子, 再利用极限的四则运算法则进行计算.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x+5}-3} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}{(\sqrt{x+5}-3)(\sqrt{x+5}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}{x-4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x+5}+3) = \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x+5} + 3 = 6. \end{aligned}$$

**例 6** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$ .

**解** 利用立方差公式  $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ , 先将无理式有理化, 消去零因子, 再利用极限的四则运算法则进行计算.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) - (1-x)}{x[(\sqrt[3]{1+x})^2 + (\sqrt[3]{1+x})(\sqrt[3]{1-x}) + (\sqrt[3]{1-x})^2]} = \frac{2}{3}.$$

**例 7** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+3x}}{x^2 + \sin 2x}$ .

**解** 先将分子有理化, 再利用第一重要极限的结论进行计算.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+3x}}{x^2 + \sin 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{1+3x})(1 + \sqrt{1+3x})}{(x^2 + \sin 2x)(1 + \sqrt{1+3x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+3x)}{(x^2 + \sin 2x)(1 + \sqrt{1+3x})} \end{aligned}$$



例题解析

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 + \sin 2x} \\
 &= -\frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x + \frac{\sin 2x}{x}} = -\frac{3}{4}.
 \end{aligned}$$

**例 8** 已知  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2}{1+x} - ax - b \right) = 0$ , 求常数  $a, b$ .

**解法一** 由已知极限存在且  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \frac{\frac{x^2}{1+x}}{x} - a - \frac{b}{x} \right) = 0$ ,

知  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{\frac{x^2}{1+x}}{x} - a - \frac{b}{x} \right) = 0$ , 故  $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{1+x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x} = 1$ ,  $b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2}{1+x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{1+x} = -1$ .

**解法二** 由已知极限存在知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^2 - a(1+x)x - b(1+x)}{1+x} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{(1-a)x^2 - (a+b)x - b}{1+x} \right] = 0,$$

故  $\begin{cases} 1-a=0, \\ a+b=0, \end{cases}$  即  $\begin{cases} a=1, \\ b=-1. \end{cases}$

**例 9** 讨论极限  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+a^{\frac{1}{x}}}$  ( $a > 0$ ).

**解** 由  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( -\frac{1}{x} \right) = +\infty$  可知,

$0 < a < 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} a^{-\frac{1}{x}} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} a^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{a^{-\frac{1}{x}}} = \infty$ , 故  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+a^{\frac{1}{x}}} = 0$ ;

$a = 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+a^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ ;

$a > 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} a^{-\frac{1}{x}} = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} a^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{a^{-\frac{1}{x}}} = 0$ , 故  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+a^{\frac{1}{x}}} = 1$ .

所以,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+a^{\frac{1}{x}}} = \begin{cases} 0, & 0 < a < 1, \\ \frac{1}{2}, & a = 1, \\ 1, & a > 1. \end{cases}$

**例 10** 当  $x \rightarrow 0$  时,  $4x \tan^3 x$  与  $\tan x - \sin x$  哪个是高阶无穷小?

**解** 由于  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x \tan^3 x}{x^4} = 4 \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan x}{x} \right)^3 = 4$ , 故当  $x \rightarrow 0$  时,  $4x \tan^3 x$  为  $x$  的四阶无穷小.

而  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \right) = \frac{1}{2}$ , 所以  $\tan x - \sin x$  为  $x$  的三



例题解析



例题解析



例题解析

阶无穷小.

故当  $x \rightarrow 0$  时,  $4x \tan^3 x$  为  $\tan x - \sin x$  的高阶无穷小.

例 11 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-x)}{x}, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \\ \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x > 0. \end{cases}$$

在点  $x=0$  处的连续性.

$$\begin{aligned} \text{解 } f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(1-x)^{\frac{1}{x}} \\ &= \ln \lim_{x \rightarrow 0^-} (1-x)^{\frac{1}{x}} = \ln e^{-1} = -1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{x(\sqrt{1+x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

故  $f(0^-) \neq f(0^+)$ , 因而  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在, 故  $f(x)$  在点  $x=0$  处不连续.

例 12 设函数  $f(x)$  在  $[0, 2a]$  上连续, 且  $f(0)=f(2a)$ , 证明至少存在一点  $\xi \in [0, a]$  使  $f(\xi)=f(a+\xi)$ .

证明 设  $F(x)=f(x)-f(a+x)$ ,  $F(x)$  在  $[0, a]$  上连续, 且

$$F(0)=f(0)-f(a), F(a)=f(a)-f(2a)=f(a)-f(0)=-[f(0)-f(a)].$$

若  $f(0)=f(a)$ , 则  $\xi=0$  或  $\xi=a$  即为所求;

若  $f(0) \neq f(a)$ , 则  $F(0)F(a) < 0$ , 由零点定理知至少存在一点  $\xi \in (0, a)$ , 使  $F(\xi)=0$ , 即  $f(\xi)=f(a+\xi)$ .

综上, 至少存在一点  $\xi \in [0, a]$ , 使  $f(\xi)=f(a+\xi)$ .

例 13 选择题:

1. (考研真题: 2017 年数学一、二、三) 若函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连

续, 则 \_\_\_\_\_.

A.  $ab = \frac{1}{2}$

B.  $ab = -\frac{1}{2}$

C.  $ab = 0$

D.  $ab = 2$

解 选 A.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x}{ax} = \frac{1}{2a}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b = f(0),$$

要使函数在  $x=0$  处连续, 必须满足  $\frac{1}{2a} = b \Rightarrow ab = \frac{1}{2}$ .



例题解析



例题解析

2. (考研真题: 2016 年数学二) 设  $\alpha_1 = x(\cos\sqrt{x} - 1)$ ,  $\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$ ,  $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$ , 当  $x \rightarrow 0^+$  时, 以上三个无穷小量按从低到高阶排序是\_\_\_\_\_.

- A.  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$       B.  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$       C.  $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$       D.  $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$   
解 选 B.

当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $\alpha_1 \sim x \cdot \left[-\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2\right] = -\frac{1}{2}x^2$ ,  $\alpha_2 \sim \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{\frac{5}{6}}$ ,  $\alpha_3 \sim \frac{1}{3}x$ .

3. (考研真题: 2015 年数学二) 函数  $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$  在  $(-\infty, +\infty)$  内\_\_\_\_\_.

- A. 连续      B. 有可去间断点  
C. 有跳跃间断点      D. 有无穷间断点

解 选 B.

$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t \cdot x^2}{t}} = e^x, x \neq 0$ , 故  $f(x)$  有可去间断点  $x=0$ .

4. (考研真题: 2014 年数学一) 下列曲线有渐近线的是\_\_\_\_\_.

- A.  $y = x + \sin x$       B.  $y = x^2 + \sin x$       C.  $y = x + \sin \frac{1}{x}$       D.  $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$

解 选 C.

只需要判断哪个曲线有斜渐近线即可.

对于  $y = x + \sin \frac{1}{x}$ , 可知  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1$  且  $\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0$ , 所以有斜渐近线  $y = x$ .

5. (考研真题: 2003 年数学一) 设  $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$  均为非负数列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$ , 则必有\_\_\_\_\_.

- A.  $a_n < b_n$  对任意  $n$  成立.      B.  $b_n < c_n$  对任意  $n$  成立.  
C. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$  不存在.      D. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$  不存在.

解 选 D.

本题考查极限概念, 极限值与数列前面有限项的大小无关, 可立即排除 A 和 B; 而极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$  是  $0 \cdot \infty$  型未定式, 可能存在也可能不存在, 举反例:

取  $a_n = \frac{2}{n}, c_n = \frac{1}{2}n (n=1, 2, \dots)$ ;

极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$  属  $1 \cdot \infty$  型, 必为无穷大, 即不存在.

例 14 (考研真题: 2016 年数学三) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_,  $b =$ \_\_\_\_\_.

解 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$ , 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot (\cos x - b) = 0$ , 所以

$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = 0$ , 得  $a = 1$ . 极限化为

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} (\cos x - b) = 1 - b = 5$ , 得  $b = -4$ .

因此,  $a = 1, b = -4$ .



例 15 (考研真题: 2006 年数学一)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

解 本题为  $\frac{0}{0}$  未定式极限的求解, 利用等价无穷小代换即可.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{\frac{x^2}{2}} = 2.$$

#### 四、习题详解

##### 习题 1-1 集合与函数

1. 设  $A, B$  分别为下列两个给定的集合:

(1)  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{2, 4, 6, 8\};$

(2)  $A = \mathbb{Z}^+, B = \mathbb{N};$

(3)  $A = \{x | 3 < x < 5\}, B = \{x | x > 4\};$

(4)  $A = \{x | x^2 + x - 6 < 0\}, B = \{x | x^2 - 2x - 3 \leq 0\};$

试求  $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$ .

解 (1)  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}, A \cap B = \{2, 4\}, A \setminus B = \{1, 3, 5\}, B \setminus A = \{6, 8\};$

(2)  $A \cup B = \mathbb{N}, A \cap B = \mathbb{Z}^+, A \setminus B = \emptyset, B \setminus A = \{0\};$

(3)  $A \cup B = \{x | x > 3\}, A \cap B = \{x | 4 < x < 5\}, A \setminus B = \{x | 3 < x \leq 4\}, B \setminus A = \{x | x \geq 5\};$

(4)  $A = \{x | -3 < x < 2\}, B = \{x | -1 \leq x \leq 3\}, A \cup B = \{x | -3 < x \leq 3\}, A \cap B = \{x | -1 \leq x < 2\},$   
 $A \setminus B = \{x | -3 < x < -1\}, B \setminus A = \{x | 2 \leq x \leq 3\}.$

2. 设  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, A = \{2, 3, 4\}, B = \{3, 6, 7\}$ , 求  $A^c, B^c, A^c \cap B^c, (A \cup B)^c$ .

解  $A^c = \{1, 5, 6, 7\}, B^c = \{1, 2, 4, 5\}, A^c \cap B^c = \{1, 5\}, (A \cup B)^c = \{1, 5\}.$

3. 设  $A, B$  都是集合  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  的子集, 且  $A^c \cap B^c = \{1, 3, 7, 9\}$ , 试求  $A \cup B$ .

解  $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ , 则  $A \cup B = \{2, 4, 5, 6, 8\}.$

4. 用区间表示适合下列不等式的变量  $x$  的变化范围:

(1)  $2 < x \leq 6;$  (2)  $|x| < 3;$  (3)  $|x-2| < \frac{1}{10};$

(4)  $|x| > 100;$  (5)  $0 < |x-1| < 0.01;$  (6)  $0 < |x-2| \leq 5.$

解 (1)  $x \in (2, 6];$  (2)  $x \in (-3, 3);$  (3)  $x \in (1.9, 2.1);$

(4)  $x \in (-\infty, -100) \cup (100, +\infty);$  (5)  $x \in (0.99, 1) \cup (1, 1.01);$

(6)  $x \in [-3, 2) \cup (2, 7].$

5. 设  $x \in U(1, \delta)$  时,  $|2x-2| < \varepsilon$ , 当  $\varepsilon$  分别等于 0.1 和 0.01 时, 求领域半径  $\delta$  各等于多少?

解  $\varepsilon = 0.1$  时,  $|2x-2| < 0.1$ , 即  $|x-1| < 0.05$ , 则  $\delta = 0.05$ ;

$\varepsilon = 0.01$  时,  $|2x-2| < 0.01$ , 即  $|x-1| < \frac{0.01}{2} = 0.005$ , 则  $\delta = 0.005$ .

6. 求下列函数的定义域:

$$(1) y = \frac{x+3}{\sqrt{x^2-5x+6}};$$

$$(2) y = 4\sqrt{3x+2} + 2\arcsin \frac{x-1}{2};$$

$$(3) y = \sqrt{x} + \sqrt[3]{\frac{1}{x-2}};$$

$$(4) y = \ln \frac{1}{1-x} + \sqrt{x+2};$$

$$(5) y = \frac{2}{|x|-x} + \sqrt{\ln(3+x)};$$

$$(6) y = \frac{1}{[x+1]};$$

$$(7) y = f(x^2+1), \text{ 其中 } f(x) \text{ 的定义域是 } [1, 2];$$

$$(8) y = f(\sin x) + f(\ln x), \text{ 其中 } f(x) \text{ 的定义域是 } [0, 1).$$

解 (1)  $\begin{cases} \sqrt{x^2-5x+6} \neq 0, \text{ 即 } x^2-5x+6 > 0, (x-3)(x-2) > 0, \text{ 则 } x \in (-\infty, 2) \cup (3, +\infty); \\ x^2-5x+6 \geq 0, \end{cases}$

$$(2) \begin{cases} 3x+2 \geq 0, \\ -1 \leq \frac{x-1}{2} \leq 1, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} x \geq -\frac{2}{3}, \\ -1 \leq x \leq 3, \end{cases} \text{ 则 } x \in \left[-\frac{2}{3}, 3\right];$$

$$(3) x \geq 0 \text{ 且 } x-2 \neq 0, \text{ 则 } x \in [0, 2) \cup (2, +\infty);$$

$$(4) 1-x > 0 \text{ 且 } x+2 \geq 0, \text{ 则 } x \in [-2, 1);$$

$$(5) |x|-x \neq 0 \text{ 且 } \ln(3+x) \geq 0, \text{ 即 } x < 0, 3+x \geq 1, \text{ 则 } x \in [-2, 0);$$

$$(6) [x+1] \neq 0, \text{ 即 } x+1 < 0 \text{ 或 } x+1 \geq 1, \text{ 则 } x \in (-\infty, -1) \cup [0, +\infty);$$

$$(7) 1 \leq x^2+1 \leq 2, \text{ 即 } 0 \leq x^2 \leq 1, \text{ 则 } x \in [-1, 1];$$

$$(8) 0 \leq \ln x < 1 \text{ 且 } 0 \leq \sin x < 1, \text{ 即 } 1 \leq x < e, 2k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ 或 } \frac{\pi}{2} + 2k\pi < x \leq \pi + 2k\pi,$$

$$\text{则 } x \in \left[1, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, e\right).$$

$$7. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \sin x, & -2 < x < 0, \\ 1+x^2, & 0 \leq x < 2, \end{cases} \text{ 求 } f(1), f\left(\frac{\pi}{2}\right), f\left(-\frac{\pi}{4}\right), f(-3).$$

解 因为  $1 \in [0, 2)$ , 所以对应的函数表达式为  $f(x) = 1+x^2$ , 故  $f(1) = 2$ ;

同理,  $\frac{\pi}{2} \in [0, 2)$ , 所以对应的函数表达式为  $f(x) = 1+x^2$ , 故  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + \frac{\pi^2}{4}$ ;

而  $-\frac{\pi}{4} \in (-2, 0)$ , 所以对应的函数表达式为  $f(x) = \sin x$ , 故  $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ;

因为函数的定义域为  $(-2, 2)$ , 而  $-3 \notin (-2, 2)$ , 故  $f(-3)$  不存在.

$$8. \text{ 设 } f(x) = \sqrt{\sin x} + 2 \cos^2 x, \text{ 求 } f\left(\frac{\pi}{2}\right), f\left(-\frac{\pi}{2}\right).$$

解 因为  $\sin x \geq 0$ , 所以定义域为  $2k\pi \leq x \leq (2k+1)\pi, k \in \mathbf{Z}, \frac{\pi}{2} \in [2k\pi, (2k+1)\pi],$

故  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{\sin \frac{\pi}{2}} + 2 \cos^2 \frac{\pi}{2} = 1, -\frac{\pi}{2} \notin [2k\pi, (2k+1)\pi],$  故  $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$  不存在.

9. 设  $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ ,  $g(x) = \sqrt{1 - x^2}$ , 求  $f[g(x)]$ ,  $g[f(x)]$ .

解  $f[g(x)] = f(\sqrt{1 - x^2}) = \sqrt{(\sqrt{1 - x^2})^2 - 1} = \sqrt{-x^2}$ ,  $x \in \{0\}$ ;

$$g[f(x)] = g(\sqrt{x^2 - 1}) = \sqrt{1 - (\sqrt{x^2 - 1})^2} = \sqrt{2 - x^2}, x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}].$$

10. 设  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  ( $x \neq 0, x \neq 1$ ), 求  $f[f(x)]$  和  $f\{f[f(x)]\}$ .

解  $f[f(x)] = f\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{1-x}} = \frac{x-1}{x}$  ( $x \neq 0$ );

$$f\{f[f(x)]\} = f\left(\frac{x-1}{x}\right) = \frac{1}{1 - \frac{x-1}{x}} = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

11. 设  $f\left(\frac{1-x}{x}\right) = \frac{1}{x} + \frac{x^2}{2x^2 - 2x + 1} - 1$  ( $x \neq 0$ ), 求  $f(x)$ .

解法一  $f\left(\frac{1-x}{x}\right) = \frac{1}{x} + \frac{x^2}{2x^2 - 2x + 1} - 1 = \frac{1-x}{x} + \frac{1}{2 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1-x}{x} + \frac{1}{\left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} + 1\right) + 1} = \frac{1-x}{x} +$

$$\frac{1}{\left(\frac{1-2x+x^2}{x^2}\right) + 1} = \frac{1-x}{x} + \frac{1}{\left(\frac{1-x}{x}\right)^2 + 1}, \text{ 则 } f(x) = x + \frac{1}{x^2 + 1}.$$

解法二 令  $\frac{1-x}{x} = t$ , 则有  $x = \frac{1}{1+t}$ , 代入原等式有

$$f(t) = 1+t + \frac{\left(\frac{1}{1+t}\right)^2}{2 \cdot \left(\frac{1}{1+t}\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{1+t} + 1} - 1, \text{ 整理得 } f(t) = t + \frac{1}{1+t^2},$$

故有  $f(x) = x + \frac{1}{x^2 + 1}$ .

12. 设  $f(x) = 3x^2 + 4x$ ,  $\varphi(t) = \lg(1+t)$ , 求  $f[\varphi(t)]$ ,  $\varphi[f(x)]$  及其定义域.

解  $f[\varphi(t)] = f[\lg(1+t)] = 3[\lg(1+t)]^2 + 4\lg(1+t) = \lg(1+t)[3\lg(1+t) + 4]$ , 定义域为  $\{t | t > -1\}$ ;

$\varphi[f(x)] = \varphi(3x^2 + 4x) = \lg(1 + 3x^2 + 4x)$ ,  $1 + 3x^2 + 4x > 0$ , 则定义域为  $(-\infty, -1) \cup \left(-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ .

13. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x < 2, \\ 4-x, & 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$

(1) 写出  $f(x)$  的定义域, 画出函数  $f(x)$  的图形;

(2) 求  $f(0)$ ,  $f(1.2)$ ,  $f(3)$ ,  $f(4)$ .

解 (1) 定义域为  $[0, 4]$ , 作图略;

$$(2) f(0) = 0^2 = 0, f(1.2) = 1, f(3) = 4 - 3 = 1, f(4) = 4 - 4 = 0.$$

$$14. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} 1+x, & x < 0, \\ e^x, & x \geq 0, \end{cases} \text{ 求复合函数 } f[f(x)].$$

$$\text{解 } f[f(x)] = \begin{cases} 1+f(x), & f(x) < 0, \\ e^{f(x)}, & f(x) \geq 0. \end{cases}$$

由  $f(x) < 0$  可知, 即当  $x < 0$  时,  $1+x < 0 \Rightarrow x < -1$ ; 当  $x \geq 0$  时,  $e^x < 0 \Rightarrow x \in \emptyset$ ;

由  $f(x) \geq 0$  可知, 即当  $x < 0$  时,  $1+x \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$ ; 当  $x \geq 0$  时,  $e^x \geq 0 \Rightarrow x \in R$ ;

$$\text{则 } f[f(x)] = \begin{cases} 2+x, & x < -1, \\ e^{1+x}, & -1 \leq x < 0, \\ e^{e^x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

15. 试将函数  $f(x) = 2|x-2| + |x-1|$  表示成分段函数, 并画出它的图像.

解 对于绝对值函数来说, 不同的定义域区间, 函数的表达式不同, 要分段讨论.

$$\text{因为 } |x-2| = \begin{cases} x-2, & x \geq 2, \\ 2-x, & x < 2, \end{cases} \quad |x-1| = \begin{cases} x-1, & x > 1, \\ 1-x, & x \leq 1, \end{cases}$$

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} 2(2-x) + (1-x), & x \leq 1, \\ 2(2-x) + (x-1), & 1 < x < 2, \\ 2(x-2) + (x-1), & x \geq 2. \end{cases}$$

$$\text{从而, } f(x) = \begin{cases} 5-3x, & x \leq 1, \\ 3-x, & 1 < x < 2, \\ 3x-5, & x \geq 2. \end{cases}$$

作图略.

### 习题 1-2 数列极限的定义与计算

1. 下列各题中, 哪些数列收敛, 哪些数列发散? 对于收敛数列, 通过观察得出数列的极限, 并试着用数列的极限定义证明得到的结果.

$$(1) x_n = \frac{1}{a^n} (a > 1); \quad (2) x_n = 2^{\frac{1}{n}}; \quad (3) x_n = (-1)^n n; \quad (4) x_n = \frac{n+2}{n+3};$$

$$(5) x_n = \frac{n}{2^n}; \quad (6) x_n = \ln \frac{1}{n}; \quad (7) x_n = \frac{n}{n^2+1}; \quad (8) x_n = \frac{\sqrt{n^2+1}}{n};$$

$$(9) x_n = 0.\underbrace{999\dots 9}_n; \quad (10) x_n = \frac{\sin n}{(n+1)^n}.$$

解 (1) 数列收敛于 0.

对于任意  $\varepsilon > 0$ , 不妨设  $\varepsilon < 1$ . 要使  $|x_n - 0| = \left| \frac{1}{a^n} - 0 \right| < \varepsilon$ , 只需  $|a|^n > \frac{1}{\varepsilon}$ , 即  $n > \log_a \frac{1}{\varepsilon}$ , 取

$N = \left\lceil \log_a \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ , 当  $n > N$  时, 则有  $|x_n - 0| < \varepsilon$ , 所以该数列收敛到 0.

(2) 数列收敛于 1.

对于任意  $\varepsilon > 0$ , 要使  $|x_n - 1| = |2^{\frac{1}{n}} - 1| < \varepsilon$ , 只要使  $\log_2(1-\varepsilon) < \frac{1}{n} < \log_2(1+\varepsilon)$ , 即  $n >$



$\frac{1}{\log_2(1+\varepsilon)}$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\log_2(\varepsilon+1)} \right]$ , 当  $n > N$  时, 则有  $|x_n - 1| < \varepsilon$ , 所以该数列收敛于 1.

(3) 数列发散.

(4) 数列收敛于 1.

对于任意  $\varepsilon > 0$ , 要使  $|x_n - 1| = \left| \frac{n+2}{n+3} - 1 \right| = \frac{1}{n+3} < \varepsilon$ , 只需  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ , 即  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ ,

取  $N = \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right]$ , 当  $n > N$  时, 则有  $|x_n - 1| < \varepsilon$ , 所以该数列收敛到 1.

(5) 数列收敛于 0.

由二项式定理可知,  $2^n = (1+1)^n > 1+n+\frac{n(n+1)}{2} > \frac{n(n+1)}{2}$

对于任意  $\varepsilon > 0$ , 要使  $|x_n - 0| = \left| \frac{n}{2^n} \right| < \varepsilon$ , 只需  $\frac{n}{n(n+1)} = \frac{2}{n+1} < \frac{2}{n} < \varepsilon$ , 即

$n > \frac{2}{\varepsilon}$ , 取  $N = \left[ \frac{2}{\varepsilon} \right]$ , 当  $n > N$  时, 则有  $|x_n - 0| < \varepsilon$ , 所以该数列收敛到 0.

(6) 数列发散.

(7) 数列收敛于 0.

对于任意  $\varepsilon > 0$ , 要使  $|x_n - 0| = \left| \frac{n}{n^2+1} \right| < \varepsilon$ , 只需  $\frac{n}{n^2+1} < \frac{1}{n} < \varepsilon$ , 即

$n > \frac{1}{\varepsilon}$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right]$ , 当  $n > N$  时, 则有  $|x_n - 0| < \varepsilon$ , 所以该数列收敛到 0.

(8) 数列收敛于 1.

对于任意  $\varepsilon > 0$ , 要使  $|x_n - 1| = \left| \frac{\sqrt{n^2+1}-n}{n} \right| < \varepsilon$ , 只需  $\left| \frac{\sqrt{n^2+1}-n}{n} \right| = \left| \frac{1}{n(\sqrt{n^2+1}+n)} \right| <$

$\frac{1}{n} < \varepsilon$ , 即  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right]$ , 当  $n > N$  时, 则有  $|x_n - 1| < \varepsilon$ , 所以该数列收敛到 1.

(9) 数列收敛于 1.

对于任意  $\varepsilon > 0$ , 不妨设  $\varepsilon < 1$ .  $x_n = 1 - \frac{1}{10^n}$ , 要使  $|x_n - 1| = \left| \frac{1}{10^n} \right| < \varepsilon$ , 只需  $10^n > \frac{1}{\varepsilon}$ , 即

$n > \lg \frac{1}{\varepsilon}$ , 取  $N = \lceil -\lg \varepsilon \rceil$ , 当  $n > N$  时,  $|x_n - 1| < \varepsilon$ .

(10) 数列收敛于 0.

对于任意  $\varepsilon > 0$ , 要使  $|x_n - 0| = \left| \frac{\sin n}{(n+1)^n} \right| < \left| \frac{1}{(n+1)^n} \right| < \varepsilon$ , 只需

$\left| \frac{1}{(n+1)^n} \right| < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \varepsilon$ , 即  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right]$ , 当  $n > N$  时, 则有  $|x_n - 0| < \varepsilon$ , 所以该数列

收敛到 0.