



国家执业医师资格考试



直通车系列

2018

(第二版)

中西医结合 执业助理医师资格考试 考点难点解析

主编 刘乾生 唐梓涵

- ▶ **高含金量** 高频考点全覆盖，含历年真题
- ▶ **高针对性** 常见考点难点深度剖析
- ▶ **高附加值** 附赠3套押题卷，网络试题免费试做
- ▶ **高含金量+高针对性+高附加值=高通过率**

中国医药科技出版社

2018

(第二版)

编委 (按姓氏笔画排序)

组织者 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《2018 中西医结合执业助理医师资格考试考点难点解析》严格按照实际考试的题型分布进行编写,能够有效地帮助考生考前自测、考查和反馈复习成果,对考生应试有较强的针对性和指导性。本书依托于考试大纲、历年常考知识点、重难点进行选题,每道试题都有详细的解析,全面的分析考点、答题思路和方法,帮助考生尽快理解、掌握知识点和举一反三。特别是包含了部分历年真题中的重点、难点试题,供考生参考复习。

图书在版编目(CIP)数据

2018 中西医结合执业助理医师资格考试考点难点解析/刘乾生,唐梓涵主编. —2 版. —北京:中国医药科技出版社,2018. 1

(国家执业医师资格考试直通车系列)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9805 - 1

I. ①2… II. ①刘… ②唐… III. ①中西医结合 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R2 - 031

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 297099 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010 - 62227427 邮购:010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 889 × 1194mm¹/₁₆

印张 16¹/₄

字数 438 千字

初版 2017 年 3 月第 1 版

版次 2018 年 1 月第 2 版

印次 2018 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9805 - 1

定价 36.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话:010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的考试。医师资格考试包括实践技能和医学综合笔试两部分。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，特组织有关专业教师编写了《2018 中西医结合执业助理医师资格考试考点难点解析》。《2018 中西医结合执业助理医师资格考试考点难点解析》严格按照实际考试的题型分布进行编写，能够有效的帮助考生考前自测、考查和反馈复习成果，对考生应试有较强的针对性和指导性。本书依托于考试大纲、历年常考知识点、重点难点进行选题，每道试题都有详细的解析，全面的分析考点、答题思路和方法，帮助考生尽快理解、掌握知识点，做到举一反三。特别是本书包含了部分历年真题中的重点、难点试题，对考生应试有较强的针对性和指导性。

本书亮点：

1. 专业的编写团队。编写专家组成员由在高校和医院任职的一线教师和一线医护人员组成，对医师考试有着长达十几年的教学、培训和研究经验。其中特别感谢陕西中医药大学及广西科技大学等单位的各位老师。

2. 试题的含金量高。紧扣考试大纲，精选历年常考知识点、重点、难点。还包含历年真题、冲刺试题。

3. 解析全面详细、举一反三。

4. 网络增值服务赠送《考试宝典》体验卡。更多试题、讲解视频免费听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活、免费使用。

最后预祝各位考生在本“直通车系列”保驾护航下，顺利通过考试。

编 者

2018 年 1 月

目 录

第一章 传染病学	1
第二章 方剂学	9
第三章 卫生法规	21
第四章 药理学	43
第五章 医学伦理学	54
第六章 针灸学	61
第七章 诊断学基础	76
第八章 中西医结合儿科学	94
第九章 中西医结合妇产科学	111
第十章 中西医结合内科学	124
第十一章 中西医结合外科学	145
第十二章 中药学	179
第十三章 中医基础理论	197
第十四章 中医诊断学	227

第一章 传染病学

一、A1/A2 型题

1. 再燃是指 ()

- A. 在感染某种病原体基础上再次感染同一病原体
- B. 传染病患者进入恢复期后, 已稳定退热一段时间, 潜伏于组织内的病原体再度繁殖, 使发热等初发症状再度出现
- C. 传染病患者在恢复期, 体温未稳定下降至正常, 又再度升高
- D. 人体同时感染两种或两种以上的病原体
- E. 传染病痊愈以后再次发病

2. 感染病原体后机体仅发生特异性免疫应答而无明显症状, 此种表现属于

- A. 病原携带状态
- B. 潜伏性感染
- C. 显性感染
- D. 病原体被清除
- E. 隐性感染

3. 下列各项, 不属传染源的是 ()

- A. 患者
- B. 病原携带者
- C. 隐性感染者
- D. 易感者
- E. 受感染的动物

4. 传染病流行过程的基本条件是

- A. 散发、流行、暴发流行
- B. 传染源、传播途径、易感人群
- C. 患者、病原携带者、受感染的动物
- D. 病原体、人体、外环境
- E. 自然因素、社会因素

5. 确定传染病隔离期的主要依据是 ()

- A. 最短潜伏期
- B. 平均潜伏期
- C. 最长潜伏期
- D. 前驱期
- E. 传染期

6. 下列肝炎病毒属 DNA 病毒的是

- A. 甲型
- B. 乙型
- C. 丙型
- D. 丁型
- E. 戊型

7. 下列感染形式中, 没有传染性的是

- A. 隐性感染
- B. 潜伏性感染
- C. 显性感染症状明显期
- D. 病原携带状态
- E. 显性感染潜伏期

8. 有关丙型肝炎, 下列哪项是正确的

- A. 丙型肝炎病毒只能通过输血传播
- B. 丙型肝炎极易演变为慢性
- C. 抗-HCV 属保护性抗体
- D. 丙型肝炎黄疸发生率较高
- E. 急性丙型肝炎的治疗不应使用干扰素

9. 下列关于急性甲型肝炎的治疗, 最主要的是

- A. 休息
- B. 调节免疫
- C. 抗病毒
- D. 保肝
- E. 降酶

10. 流感的传染源是

- A. 猪
- B. 马
- C. 禽类
- D. 隐性感染者
- E. 未接种流感疫苗者

11. 流感患者发病后 24 小时内出现高热、烦躁、呼吸困难、咳血痰和明显发绀, 并进行性加重, 应考虑流感类型是

- A. 单纯型
- B. 肺炎型
- C. 中毒型
- D. 胃肠型
- E. 脑炎型

12. 在传染病的流行期间, 为保护易感人群, 下列不属于主动免疫的是

- A. DNA 疫苗
- B. 减毒活疫 (菌) 苗
- C. 抗毒素
- D. 灭活疫 (菌) 苗
- E. 类毒素

13. 下列关于禽流感病毒的叙述, 不正确的是

- A. 属正黏病毒科

- B. 包括甲型流感病毒的全部亚型
C. 加热可灭活
D. 依据致病性分为高致病性、中致病性和低致病性三类
E. 人对其不易感
14. 感染性疾病和传染性疾病的主要区别是
A. 是否有病原体
B. 是否有传染性
C. 是否有感染后免疫
D. 是否有发热
E. 是否有毒血症症状
15. 下列感染 HIV 后的临床分期, 正确的是
A. 潜伏期、前驱期、艾滋病期、恢复期
B. 窗口期、艾滋病前期、典型艾滋病期
C. 急性感染期、无症状感染期、艾滋病期
D. 急性感染期、慢性感染期、机会性感染期
E. 急性感染期、慢性感染期、机会性感染期、恶性肿瘤期
16. 传染病的确诊必须有以下哪一项
A. 有病原学的证明 B. 有感染后免疫
C. 有流行病学特征 D. 有传染性的依据
E. 有病理学表现
17. AIDS 患者常见的恶性肿瘤是
A. 卡波西肉瘤 B. 直肠癌
C. 鼻咽癌 D. 结肠癌
E. 淋巴瘤
18. 对于传染病流行病学特征的描述, 哪项是错误的
A. 霍乱是外来性传染病
B. 发病率高于一般水平为流行
C. 流行范围超过国界或洲界时为大流行
D. 短时间内病例集中发生为暴发
E. 不同人群中的分布不属于流行病学特征
19. 下列有关流行性出血热的描述, 正确的是
A. 患者为主要传染源
B. 外周血白细胞常减少
C. 血小板常减少
D. 热退后症状减轻
E. 临床上都有五期经过
20. 下列有关流行性出血热多尿期的描述, 错误的是
A. 一般出现在病程的第 9 ~ 14 日
B. 可发生休克
C. 多尿早期尿毒症症状加重
D. 移行期血中 BUN 和 Cr 开始下降
E. 每日尿量可多达 15000ml
21. 下列关于流行性出血热的治疗, 正确的是
A. 发热期可用解热镇痛剂退热
B. 病程早期可抗病毒治疗
C. 低血压休克期的治疗应以血管活性药物为主
D. 无尿者可大量使用甘露醇静推以促进利尿
E. 可用肝素抗凝预防 DIC
22. 下列关于乙脑流行病学的叙述, 不正确的是
A. 为自然疫源性疾病
B. 患者为主要传染源
C. 主要通过蚊虫叮咬传播
D. 猪的感染率高
E. 蝙蝠为储存宿主
23. 感染过程的五种表现在不同传染病中各有侧重, 一般最常见的是
A. 病原体被清除 B. 隐性感染
C. 显性感染 D. 潜伏性感染
E. 病原携带状态
24. HBsAg 阳性者 HBeAg 阳性常表示
A. 机体对 HBV 感染有抵抗力
B. 病毒复制活跃, 传染性强
C. 病情好转
D. HBV 既往感染
E. 病毒复制减慢, 传染性弱
25. 传染病的基本特征为 ()
A. 有传染性、免疫性和病原体
B. 有传染性、流行性、地方性和季节性
C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
D. 有传染性、传播途径和传染源
E. 有传染性、免疫性和流行性
26. 28 岁的流行性出血热患者, 出现烦躁, 浮肿, 脉洪大, 体表静脉充盈, 血压 180/100mmHg, 心率 129 次/分, 应考虑为

- A. 肺实质弥漫性出血早期
- B. 高血容量综合征
- C. 尿毒症
- D. 高血压脑病
- E. 高钠血症、高钾血症

27. 患者, 女性, 30 岁, 农民。突起畏寒、发热、周身酸痛 5 日, 于春节期间来诊, 伴恶心、呕吐, 近 2 日解小便时泡沫很多。查体: 体温 39.6°C , 眼睑浮肿, 左腋下可见搔抓样出血痕, 右腋下少许点状出血。血象: $\text{WBC} 34 \times 10^9/\text{L}$, $\text{Hb} 160\text{g}/\text{L}$, 异型淋巴细胞 0.16, $\text{NO.} 66$, $\text{LO.} 12$, $\text{PLT} 90 \times 10^9/\text{L}$ 。

- A. 急性病毒性肝炎
- B. 流行性出血热
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 传染性单核细胞增多症
- E. 特发性血小板减少性紫癜

28. 下列各项, 不属于普通型流行性脑脊髓膜炎典型表现的是

- A. 头痛
- B. 呕吐
- C. 巴宾斯基征阳性
- D. 皮肤黏膜出血点
- E. 抽搐

29. 流行性脑脊髓膜炎典型脑脊液外观是

- A. 血水样
- B. 毛玻璃样
- C. 绿色脓样
- D. 米汤样
- E. 稍混浊

30. 在同班同学患甲型肝炎后, 对一 10 岁小儿检查发现, 血清抗 - HAVIgM 阳性, 肝功能正常。此种情况属

- A. 显性感染
- B. 潜伏性感染
- C. 隐性感染
- D. 病原携带
- E. 易感者

31. 确诊伤寒的主要依据是

- A. 流行病学史
- B. 临床表现
- C. 外周血象
- D. 肥达反应
- E. 血培养

32. 下列各项中, 对伤寒的发病起着重要作用的是

- A. 菌体“O”抗原
- B. 鞭毛“H”抗原
- C. 细菌数量
- D. 内毒素

E. 外毒素

33. 肺癌患者化疗后出现带状疱疹。此种情况属

- A. 潜伏性感染
- B. 病原携带
- C. 显性感染
- D. 隐性感染
- E. 易感者

34. 细菌性痢疾的主要预防措施是

- A. 隔离及治疗现症患者
- B. 流行季节预防服药
- C. 切断传播途径
- D. 口服痢疾活菌苗
- E. 及时发现、治疗带菌者

35. 治疗霍乱首选抗菌药物为 ()

- A. 青霉素
- B. 黄连素
- C. 环丙沙星
- D. 复方磺胺甲噁唑
- E. 庆大霉素

36. 8 岁患儿, 春节期间因“上感”, 注射青霉素 40 万 U, 5 小时后出现高热, 头痛, 前胸有出血点, 血压低。下列哪项诊断的可能性最大

- A. 流感
- B. 细菌性痢疾
- C. 伤寒
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 青霉素过敏

37. 抢救霍乱休克病人首要的措施是

- A. 升压药
- B. 纠正水与电解质丢失
- C. 抗菌治疗
- D. 激素应用
- E. 输血

38. 下列有关消毒方法的叙述, 错误的是

- A. 新洁尔灭属高效消毒剂
- B. 高效消毒可杀灭一切微生物
- C. 通风换气属低效消毒法
- D. 异丙醇属中效消毒法
- E. 微波消毒属高效消毒法

39. 症状轻, 部分患者因出现肠穿孔就医而确诊的伤寒分型为

- A. 轻型伤寒
- B. 典型伤寒
- C. 迁延型伤寒
- D. 逍遥型伤寒
- E. 顿挫型伤寒

40. 有关医院感染的描述, 错误的是

- A. 有部分医院感染的发生与消毒隔离缺陷有关

- B. 标准预防是防控医院感染的重要措施
- C. 洗手是预防医院感染的重要措施
- D. 所有医院感染都是可以预防的
- E. 新生儿经产道获得的感染属医院感染

二、B 型题

(41~42 题共用备选答案)

- A. 隐性感染
- B. 病原体携带状态
- C. 潜伏性感染
- D. 病原体被消灭或排出体外
- E. 显性感染

41. 人体与病原体处于相持状态, 不出现临床症状, 不排出病原体, 属于

42. 感染病原体后不出现临床表现, 但产生了特异性免疫, 属于

(43~44 题共用备选答案)

- A. IgA
- B. IgD
- C. IgE
- D. IgG
- E. IgM

43. 常在传染病恢复期出现, 持续时间较长的抗体是

44. 感染过程中首先出现, 常为近期感染标志的抗体是

(45~46 题共用备选答案)

- A. 血常规
- B. 血培养
- C. 病毒分离
- D. 特异性抗体检测
- E. 影像学检查

45. 上述检查方法, 可确诊流感的是

46. 上述检查方法, 可确诊流脑的是

(47~48 题共用备选答案)

- A. 病原体被清除
- B. 隐性感染
- C. 潜伏性感染
- D. 病原体携带状态
- E. 显性感染

47. 感染过程的表现中最易识别的是 ()

48. 感染过程的表现中最常见是 ()

(49~50 题共用备选答案)

- A. 伤寒
- B. 乙脑
- C. 流脑
- D. 流感
- E. 人禽流感

49. 上述各传染病, 属细菌感染, 血常规检查白细胞减少的是

50. 上述各传染病, 属病毒感染, 血常规检查白细胞增高的是

(51~52 题共用备选答案)

- A. 初次感染某种病原体
- B. 在感染某种病原体基础上再次感染同一病原体
- C. 人体同时感染两种或两种以上的病原体
- D. 在感染某种病原体基础上又被其他病原体感染
- E. 原发感染后出现的病原体感染

51. 上述各项, 属重复感染的是 ()

52. 上述各项, 属继发感染的是 ()

(53~54 题共用备选答案)

- A. 发热, 腹痛, 腹泻, 洗肉水样大便
- B. 发热, 腹痛, 腹泻, 脓血便, 里急后重
- C. 腹泻, 呕吐, 水样大便, 无发热, 无腹痛
- D. 发热, 腹痛, 腹泻, 水样大便
- E. 低热, 腹痛, 腹泻, 果酱样大便

53. 霍乱典型表现为

54. 急性细菌性痢疾典型表现为

答案与解析

一、A1 型题

1. C. 此题主要考查关于传染病的几个基本概念: A 为重复感染; B 为复发; D 为混合感染; E 为干扰选项; 故选 C。

2. E. 隐性感染, 又称亚临床感染。是指病原体侵入人体后, 仅引起机体产生特异性的免疫应答, 不引起或只引起轻微的组织损伤, 因而在临床上不显出任何症状、体征, 甚至生化改变, 只能通过免疫学检查才能发现。

3. D. 本题主要考查传染源的概念。传染源是指体内有病原体生长、繁殖并能排出体外的人和动物。分为患者、隐性感染者、病原携带者、受感染的动物等；易感者是指对某一传染病缺乏特异性免疫力的人。故选 D。

4. B. 传染病流行过程的三个基本条件：(1) 传染源；(2) 传播途径；(3) 易感人群。

5. E. 传染病人有传染性的时期称为传染期，每一种传染病都有相对固定的传染期，是确定传染病患者隔离期的主要依据。故选 E。

6. B. DNA 病毒是专性活细胞内寄生物。它不可单独进行繁殖，必须在活细胞内才可进行繁殖，DNA 病毒很少，基本上都是 RNA 病毒，目前知道的有乙肝病毒、T₂ 噬菌体、天花病毒等，甲型肝炎属于小 RNA 病毒。丙型肝炎属于黄病毒。丁型肝炎属于一种缺陷的 RNA 病毒。戊型肝炎属于嗜肝病毒。

7. B. 潜伏性感染是指某些病毒经隐性或显性感染后，病毒基因长期存在于一定的组织或细胞中，但并不产生有感染性的病毒体。故选 B。

8. B. 丙型肝炎，是一种由丙型肝炎病毒 (HCV) 感染引起的病毒性肝炎，主要经输血、针刺、吸毒等传播。成人急性丙型肝炎病情相对较轻，多数为急性无黄疸型肝炎，ALT 升高为主，少数为急性黄疸型肝炎，黄疸为轻度或中度升高。在不进行抗病毒治疗干预的情况下，85% 的患者则发展为慢性丙型肝炎。抗-HCV 阳性是 HCV 感染的标志。急性丙型病毒性肝炎干扰素抗病毒效果好，90% 患者可获得完全应答而彻底痊愈；慢性丙型病毒性肝炎病情相对较乙型病毒性肝炎为轻，经标准抗病毒方案治疗，有机会清除病毒获得痊愈。故只有 B 项符合。

9. A. 甲型肝炎是自限性疾病，治疗以一般以支持治疗为主，辅以适当药物，避免饮酒、疲劳和使用损肝药物。强调早期卧床休息，至症状明显减退，可逐步增加活动，以不感到疲劳为原则。

10. D. 流感的传染源是患者和隐性感染者。猪、禽类等动物为储存宿主或中间宿主。

11. B. 流感是流感病毒引起的急性呼吸道感染，也是一种传染性强、传播速度快的疾病。其主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触传播。典型的临床症状是：急起高热、全身疼痛、显著乏力和轻度呼吸道症状。一般

秋冬季节是其高发期，所引起的并发症和死亡现象非常严重。可分为：单纯型流感、肺炎型流感、中毒型流感、胃肠型流感及特殊人群流感，依题干分析，可知选 B。

12. C. 在传染病流行期间为保护易感人群，提高特异性免疫力，接种疫苗、菌苗、类毒素等可提高人群的主动性特异性免疫，而接种抗毒素、丙种球蛋白或高效价免疫球蛋白可使机体获得被动特异性免疫。故选 C。

13. D. 根据致病性，禽流感病毒可分为高致病性、低致病性和非致病性三大类，其中 H5 和 H7 亚型为高致病型，又以 H5N1 致病性最强。目前感染人类的禽流感病毒亚型主要有 H5N1、H9N2、H7N7，其中感染 H5N1 亚型患者病情重，死亡率高。

14. B. 本题主要考查感染性疾病和传染性疾病的区别。传染病是由各种病原微生物和寄生虫感染人体后产生的有传染性的疾病。感染性疾病是由病原微生物和寄生虫侵入人体引起的疾病，较之传染病不同点在于感染性疾病包括传染病，但范围更广泛且不一定具有传染性。故选 B。

15. C. 从感染艾滋病病毒到发病有一个完整的自然过程，临床上将这个过程分为：急性感染期、潜伏期、艾滋病期。

16. A. 每一种传染病都是由特异性抗原引起的。所以病原学检查是传染病的确诊依据。故选 A。

17. A. 在典型艾滋病期由于严重的细胞免疫缺陷，发生各种致命性机会感染及各种恶性肿瘤，以卡波西肉瘤最常见。故选 A。

18. E. 传染病的流行病学特征主要指传染病的流行性、季节性和地方性，还包括在不同人群（年龄、性别、职业等）中的分布特点。B、C、D 均属于流行性范畴。故选 E。

19. C. 出血热即流行性出血热又称肾综合征出血热，是危害人类健康的重要传染病，是由流行性出血热病毒（汉坦病毒）引起的，以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。出血热潜伏期一般为 2~3 周。典型临床经过分为五期：发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期及恢复期。实验室检查：血常规早期白细胞总数正常或偏低，3~4 日后即明显增高；血小板明显减少，低血压及少尿期最低，并有异型、巨核血小板出现，多尿后期始恢复。体温开始下降时或退热后不久发展为低血压休克期，主要

为失血浆性低血容量休克的表现,患者出现低血压,重者发生休克。

20. D。流行性出血热多尿期,多数患者少尿期后进入此期,少数患者可由发热期或低血压期转入此期。多尿期一般出现在病程第9~14天,持续时间短者1天,长者可达数月之久,每日尿量可多达15000ml。此期为新生的肾小管重吸收功能尚未完善,加以尿素氮等潴留物质引起高渗性利尿作用,使尿量明显增加,致多尿早期尿毒症症状加重,重则出现休克。故D项错误。

21. B。流行性出血热治疗:早发现、早休息、早治疗和就地隔离治疗。病程早期可抗病毒治疗,发热期可用物理降温或肾上腺皮质激素等。发生低血压休克时应补充血容量,常用的有低分子右旋糖酐、平衡盐液和葡萄糖盐水、血浆、蛋白,补充血容量,纠正胶体渗透压和酸碱平衡,调整血管舒缩功能,消除红细胞、血小板聚集,防止DIC形成和微循环淤滞,维护重要脏器功能等。如有少尿可用利尿剂(如速尿等)静脉注射。多尿时应补充足够液体和电解质(钾盐),以口服为主。进入恢复期后注意防止并发症,加强营养,逐步恢复活动。

22. B。人感染后病毒血症期短暂,血中病毒含量少,不是主要的传染源。猪的感染率高,感染后血中病毒含量多,病毒血症期长,且猪的饲养范围广,更新快,是本病主要的传染源。

23. B。感染过程的五种表现中,隐性感染者多见,病原携带者次之,显性感染者比率最低,一旦出现最易识别。仅少数传染病存在潜伏性感染。故选B。

24. B。乙肝五项依次为:①乙肝表面抗原(HBsAg)、②乙肝表面抗体(抗-HBs)、③乙肝e抗原(HBeAg)、④乙肝e抗体(抗-HBe)、⑤乙肝核心抗体(抗-HBc)。其中第1、3项阳性,其余三项阴性,说明病毒复制活跃,传染性强。

25. C。传染病的基本特征包括病原体、传染性、流行病学特征和感染后免疫。流行病学特征又包括流行性、季节性和地方性。故选C。

26. B。伴有高血容量综合征者,脉搏充实有力,静脉怒张,血压进行性升高及血液稀释等。

27. B。根据流行性出血热流行病学资料,其发病以青壮年为主,有明显季节性,主要临床表现为发热、出血、肾功能损害三大主症及血常规检查结

果,不难做出正确诊断。

28. C。流行性脑脊髓膜炎简称流脑,可分轻型、普通型,其中普通型最常见,占全部病例的90%,前驱期可见低热、咽痛、咳嗽等上呼吸道感染症状;败血症期,可突发或前驱期后突然寒战、高热、伴头痛、肌肉酸痛、食欲减退及精神萎靡、皮疹,通常为瘀点或瘀斑;脑膜炎期,脑膜炎症状多与败血症期症状同时出现。在前驱期症状基础上出现剧烈头痛、频繁呕吐、狂躁以及脑膜刺激症状。巴彬斯基征是锥体束损害相当可靠的指征,多见于锥体束损伤,亦可见于深睡、深度麻醉、药物或酒精中毒、脊髓病变、脑卒中、癫痫发作后的Todd麻痹和低血糖休克等。故C项不符合。

29. D。流脑,脑脊液检查,病程初期仅有压力增高,外观正常。典型脑膜炎期,压力高达1.96kPa以上,外观呈混浊或脓样,白细胞数达每立方毫米数千至数万,以中性粒细胞为主,蛋白质含量显著增高,而糖含量明显减少,有时可完全测不出,氯化物降低,若临床有脑膜炎症状及体征而早期脑脊液检查正常。

30. C。患者无明显临床症状,只能通过免疫学检查发现,所以为隐性感染,又称亚临床感染,病原体只引起特异性免疫应答,不引起或只引起轻微的组织损伤。故选C。

31. E。伤寒杆菌造成之伤寒病,在伤寒流行季节和地区患者有持续性高热(40℃~41℃)为时1~2周以上,并出现特殊中毒面容,相对缓脉,皮肤玫瑰疹,肝脾肿大,周围血象白细胞总数低下,嗜酸性粒细胞消失,骨髓象中有伤寒细胞(戒指细胞)等,临床诊断:血培养是诊断的依据,病程早期即可阳性,第7~10日阳性率可达90%,第三周降为30%~40%,第四周时常阴性。

32. D。伤寒杆菌造成之伤寒病,在伤寒流行季节和地区患者有持续性高热(40℃~41℃)为时1~2周以上,并出现特殊中毒面容,相对缓脉,皮肤玫瑰疹,肝脾肿大,周围血象白细胞总数低下,嗜酸性粒细胞消失,骨髓象中有伤寒细胞(戒指细胞)等,伤寒杆菌只感染人类,在自然条件下不感染动物。此菌在菌体裂解时可释放强烈的内毒素,对本病的发生和发展起着较重要的作用,可引起寒战,发热不适和白细胞减少等。

33. C。患者感染后不但引起机体免疫应答,还导致组织损伤,引起病理改变和临床表现。即显性

感染, 又称临床感染, 即传染病发病。故选 C。

34. E。细菌性痢疾预防措施: 应采取以切断传播途径为主的综合措施。(1) 控制传染源: 早期发现, 早期隔离, 早期治疗。病人应及时隔离, 彻底治疗至粪便培养阴性。(2) 切断传播途径: 搞好饮食、饮水卫生, 搞好个人及环境卫生, 三管一灭: 管好水、粪、饮食, 消灭苍蝇。(3) 增进人体抵抗力, 保护易感人群。

35. C。霍乱抗菌治疗: 早期应用抗菌药物有助于缩短腹泻和排菌时间, 减少腹泻次数及排泄量, 降低病后带菌率等。目前常用药物为氟喹诺酮类, 如环丙沙星、多西环素等, 疗程均为 3 日。也可采用四环素、氨苄西林、红霉素或阿奇霉素、复方磺胺甲噁唑等。故选 C。

36. D。分析本题的主要表现及实验室检查, 突起高热, 皮肤黏膜瘀点或瘀斑, 与流行性脑脊髓膜炎临床表现较为相符。

37. B。大量呕吐引起水和电解质严重丢失是霍乱的主要病理生理改变。重症患者每日大便排出量可达 18000ml, 临床上呈现重度脱水、低血容量休克、低钾和代谢性酸中毒, 故霍乱休克病人首要的措施是纠正水与电解质丢失。故选 B。

38. A。高水平消毒, 杀灭一切细菌繁殖体包括分枝杆菌、病毒、真菌及其孢子和绝大多数细菌芽孢。达到高水平消毒常用的方法包括采用含氯制剂、二氧化氯、邻苯二甲醛、过氧乙酸、过氧化氢、臭氧、碘酊等以及能达到灭菌效果的化学消毒剂在规定的条件下, 以合适的浓度和有效的作用时间进行消毒的方法。中水平消毒常用的方法包括采用碘类消毒剂 (碘伏、氯己定碘等)、醇类和氯己定碘的复方、醇类和季铵盐类化合物的复方、酚类等消毒剂。新洁尔灭 (别名苯扎溴铵)、通风换气均属于低水平消毒。故错误的是 A。

39. D。逍遥型发热及毒血症症状轻微, 可照常工作。部分患者以肠出血或肠穿孔就医始被发现。故选 D。

40. D。医院感染是指住院病人在医院内获得的感染, 包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染。任何感染都是致病微生物与宿主在一定条件下相互作用而发生的一种病理过程。医院感染也不例外, 一方面, 病原体寻找一切机会和途径侵入人体, 并在其生长、繁殖过程中排出代谢产物, 损害宿主的细胞和组织; 另一方面, 人体

启动其各种免疫防御机制, 力图将侵入的病原体杀灭, 将其连同毒性产物排出体外。两者力量的强弱和增减, 决定着整个感染过程的发展和结局。医院内有各种疾病的病人, 其免疫防御功能都存在不同程度的损害和缺陷。故医院感染是不可以预防的, 故 D 项不符合。其余皆可。

二、B 型题

41~42. C A。潜伏性感染, 是指病原体感染人体后, 寄生在机体中某些部位, 由于机体免疫功能足以将病原体局限化而不引起显性感染, 但又不足以将病原体清除, 病原体便可长期潜伏下来, 待机体免疫功能下降时, 则可引起显性感染。隐性感染又称亚临床感染, 是指病原体侵入人体后, 仅引起机体产生特异性的免疫应答, 不引起或只引起轻微的组织损伤, 因而在临床上不显出任何症状、体征, 甚至生化改变, 只能通过免疫学检查才能发现。

43~44. D E。(1) IgG 一般是在传染病的恢复期出现, 且持续时间较长的抗体。故选 D。

(2) IgM 一般是在感染过程中首先出现, 且为近期感染标志的抗体。故选 E。

45~46. C B。流感病原学相关检查: 主要包括病毒分离、病毒抗原、核酸和抗体检测。病毒分离为实验室检测的“金标准”; 流脑检查, 血培养在流行性脑脊髓膜炎时阳性率较低。但血培养对普通型流行性脑脊髓膜炎败血症期、暴发型败血症及慢性脑膜炎球菌败血症诊断甚为重要, 故必须注意在应用抗菌药物前采血作细菌培养, 并宜多次采血送验。

47~48. E B。(1) 显性感染, 又称临床感染, 即传染病发病。感染后不但引起机体免疫应答, 还导致组织损伤, 引起病理改变和临床表现, 在感染过程中最易识别。故选 E。

(2) 隐性感染又称亚临床感染, 病原体只引起特异性免疫应答, 不引起或只引起轻微的组织损伤, 无临床症状, 只能通过免疫学检查发现, 在感染过程中最常见。故选 B。

49~50. A B。伤寒杆菌造成之伤寒病, 在伤寒流行季节和地区患者有持续性高热 ($40^{\circ}\text{C} \sim 41^{\circ}\text{C}$) 为时 1~2 周以上, 并出现特殊中毒面容, 相对缓脉, 皮肤玫瑰疹, 肝脾肿大, 周围血象白细胞总数低下, 嗜酸性粒细胞消失, 骨髓象中有伤寒细胞

(戒指细胞)等。流行性乙型脑炎(简称乙脑)是由嗜神经的乙脑病毒所致的大脑神经系统急性传染病。经蚊等吸血昆虫传播,流行于夏秋季,多发生于儿童。临床上急起发病,有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等,重型患者病后往往留有后遗症,属于血液传染病。血常规检查可见白细胞总数增高,中性粒细胞在80%以上。在流行后期的少数轻型患者中,血象可在正常范围内。脑脊液检查呈无色透明,压力仅轻度增高,白细胞计数增加。病毒分离:1周内死亡病例脑组织中可分离到乙脑病毒,也可用免疫荧光(IFIT)在脑组织中找到病毒抗原。从脑脊液或血清中不易分离到病毒。

51~52. B E。(1)在感染某种病原体基础上再

次感染同一病原体为重复感染。故选B。

(2)原发感染后出现的病原体感染称为继发感染。故选E。

53~54. C B。霍乱临床表现:泻吐期多以突然腹泻开始,继而呕吐。一般无明显腹痛,无里急后重感;脱水虚脱期患者的外观表现非常明显,严重者眼窝深陷,声音嘶哑,皮肤干燥皱缩、弹性消失,腹下陷呈舟状,唇舌干燥、口渴欲饮,四肢冰凉、体温常降至正常以下,肌肉痉挛或抽搐;急性细菌性痢疾,临床上以发热、腹痛、腹泻、里急后重及排含黏液、脓血的稀便为其主要症状。中毒型痢疾是细菌性痢疾的危重临床类型,起病急,发展快,病情严重,常发生惊厥及休克等。

第二章 方剂学

一、A1/A2 型题

1. 下列各项中不属于和法范畴的是 ()

- A. 透达膜原
- B. 舒肝和胃
- C. 分消上下
- D. 调和营卫
- E. 消食和胃

2. 具有益气解表功用的方剂是 ()

- A. 败毒散
- B. 银翘散
- C. 桑菊饮
- D. 麻杏石甘汤
- E. 九味羌活汤

3. 下列各项中, 不属于汗法治疗范畴的是

- A. 风湿在表
- B. 水肿
- C. 疮疡
- D. 疟疾初起
- E. 麻疹已透

4. 以辛凉宣泄、清肺平喘为功用的方剂是 ()

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 小青龙汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 九味羌活汤

5. 桑菊饮的功效是

- A. 辛凉宣泄, 清肺平喘
- B. 疏风清热, 宣肺止咳
- C. 辛凉透表, 清热解毒
- D. 疏风解毒, 清肺泄热
- E. 疏散风热, 清肝明目

6. 以辛凉透表、清热解毒为功用的方剂是 ()

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 小青龙汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 九味羌活汤

7. 小青龙汤中配伍芍药和五味子的意义是

- A. 佐制
- B. 佐助
- C. 引经
- D. 调和
- E. 反佐

8. 桑菊饮证的主要临床表现是 ()

A. 头痛身热, 微恶风寒, 有汗不多, 口渴咽干, 舌尖红, 脉浮数

B. 咳嗽, 身热不甚, 口微渴, 脉浮微数

C. 头痛, 发热, 汗出恶风, 苔薄白, 脉浮缓

D. 身热, 咳逆, 气急鼻塞, 苔薄黄, 脉滑数

E. 咳嗽咽痒, 微有恶寒发热, 苔薄白, 脉浮缓

9. 患者外感风寒, 头痛发热, 汗出恶风, 鼻鸣干呕, 口不渴, 脉浮缓。治疗应首选的方剂是

- A. 麻黄汤
- B. 桂枝汤
- C. 银翘散
- D. 桑菊饮
- E. 麻杏甘石汤

10. 由大承气汤化裁小承气汤属于

- A. 药味加减
- B. 药量加减
- C. 剂型加减
- D. 药味与药量加减变化的联合运用
- E. 药味加减与剂型更换变化的联合运用

11. 针对重要兼病或兼证治疗选用的药物是

- A. 君药
- B. 臣药
- C. 佐药
- D. 使药
- E. 引经药

12. 下列关于大承气汤的说法不正确的是

- A. 大承气汤以泻下为主, 行气为辅, 相辅相成
- B. 大承气汤可用于治疗里热实证之热厥、痉病、发狂等
- C. 大承气汤中的君药是大黄
- D. 大承气汤功用是峻下热结
- E. 大承气汤的煎药方法是先煎厚朴、枳实, 后下大黄, 再溶服芒硝

13. 大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义是

- A. 清热泻火, 导热下行
- B. 清泻瘀热, 分利二便
- C. 泻热除湿, 通肠逐瘀

- D. 荡涤肠胃，泄热泻结
E. 通肠泄热，以下代清

14. 某患者，就诊症状为大便硬而不出，小便频数，苔薄黄，脉沉涩。治疗应首选的方剂是

- A. 济川煎 B. 增液汤
C. 五仁丸 D. 麻子仁丸
E. 小承气汤

15. 下列各项中属于“反佐”范畴的是

- A. 寒因寒用，热因热用
B. 寒者热之，热者寒之
C. 形不足者，温之以气
D. 热药冷服，寒药热服
E. 壮水之主，以制阳光

16. 逍遥散中含有

- A. 生姜 B. 煨生姜
C. 干姜 D. 炮干姜
E. 生姜皮

17. 下列各项中不属于消法的是

- A. 活血化瘀 B. 消痞杀虫
C. 行气散滞 D. 通导大便
E. 化痰祛水

18. 银翘散的功效是

- A. 辛凉宣泄，清肺平喘
B. 疏风清热，宣肺止咳
C. 辛凉透表，清热解毒
D. 疏风解毒，清肺泄热
E. 疏散风热，清肝明目

19. 桂枝汤中桂枝与芍药的比例是

- A. 1:1 B. 1:2
C. 2:1 D. 2:3
E. 4:1

20. 败毒散的功用是

- A. 清热泻火，凉血解毒
B. 解毒消痈，化痰散结
C. 疏风清热，扶正败毒
D. 益气解表，祛风除湿
E. 扶正祛邪，脱毒透脓

21. 苦寒直折的代表方剂是

- A. 凉膈散 B. 犀角地黄汤

- C. 黄连解毒汤 D. 普济消毒饮
E. 龙胆泻肝汤

22. 桂枝汤中关于炙甘草的作用说法错误的是

- A. 炙甘草益气和中
B. 炙甘草合桂枝辛甘化阳
C. 炙甘草合芍药酸甘化阴
D. 炙甘草调和诸药
E. 炙甘草合生姜，升腾脾胃生发之气而调和营卫

23. 患者身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，脉数，舌绛而干。治疗应首选的方剂是

- A. 白虎汤 B. 清营汤
C. 犀角地黄汤 D. 当归六黄汤
E. 白虎加人参汤

24. 下列各项中，不属于九味羌活汤组成药物的是

- A. 防风、川芎 B. 苍术、细辛
C. 当归、陈皮 D. 白芷、生地黄
E. 黄芩、甘草

25. 大柴胡汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是

- A. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
B. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
C. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
D. 半夏、黄芩、柴胡、生姜、大枣
E. 柴胡、人参、黄芩、甘草、生姜

26. 大柴胡汤中配伍半夏意在

- A. 化痰止咳 B. 燥湿化痰
C. 温中散寒 D. 下气宽中
E. 降逆止呕

27. 桂枝汤倍芍药加饴糖组成的方剂是

- A. 小建中汤 B. 温经汤
C. 桂枝茯苓丸 D. 五苓散
E. 大建中汤

28. 慢性疾病的治疗宜选用

- A. 散剂 B. 硬膏剂
C. 汤剂 D. 针剂
E. 丸剂

29. 大柴胡汤中重用

- A. 黄芩 B. 半夏
C. 大黄 D. 柴胡
E. 生姜
30. 反佐药作用包括
A. 辅助君臣药之力 B. 防止病重邪甚拒药
C. 消除君臣药之毒 D. 监制君臣药之偏
E. 缓解君臣药之峻
31. 下列各项中不属于“八法”内容的是 ()
A. 汗法、吐法 B. 下法、清法
C. 宣法、通法 D. 清法、补法
E. 和法、温法
32. 下列各项中不属于“消法”范畴的是 ()
A. 消食导滞 B. 通导大便
C. 行气活血 D. 化痰利水
E. 消疮散痈
33. 大补阴丸的组成药物中不含有
A. 知母 B. 黄柏
C. 龟甲 D. 猪脊髓
E. 鹿角胶
34. 下列选项中, 不含有四君子汤的方剂是
A. 完带汤 B. 八珍汤
C. 归脾汤 D. 参苓白术散
E. 健脾丸
35. 甘温除热的代表方是
A. 参苓白术散 B. 归脾汤
C. 小建中汤 D. 炙甘草汤
E. 补中益气汤
36. 下列病证中不宜使用“下法”治疗的是 ()
A. 宿食 B. 结痰
C. 积水 D. 蓄血
E. 痞块
37. 下列各项中符合方剂组成要求的是 ()
A. 每方必须君、臣、佐、使俱全
B. 方中诸药均须有相应的针对症状
C. 方中必有一药专作引经之用
D. 君药的用量必须在全方总药量中所占比例最大
E. 方中诸药既须主次有序, 各司其职; 又须密切配合, 相与宣摄

38. 固冲汤的组成药物中不含有
A. 白术 B. 生黄芪
C. 五味子 D. 海螵蛸
E. 山萸肉
39. 下列各项中不符合方剂组成要求的是 ()
A. 辨证审因, 随证立法, 依法制方
B. 方中诸药, 主次有序, 分工合作
C. 不一定君臣佐使俱全, 但君药不可缺少
D. 君药的数量不宜过多, 药量相应较大
E. 君药的药量在全方总药量中所占比例最大
40. 天王补心丹组成药物中的“三参”是指
A. 党参、丹参、沙参 B. 人参、丹参、玄参
C. 党参、丹参、玄参 D. 人参、沙参、玄参
E. 党参、沙参、玄参
41. 下述各类药物中不属于“佐药”范畴的是 ()
A. 配合君臣药加强治疗作用的药物
B. 引导诸药至病所的药物
C. 用以消除或降低君臣药毒性的药物
D. 用以制约君臣药峻烈之性的药物
E. 针对次要兼证、兼病或某一症状发挥治疗作用的药物
42. 酸枣仁汤中配伍酸枣仁意在
A. 养血安神 B. 敛汗生津
C. 润肠通便 D. 补气安神
E. 清心安神
43. 某患者近日有失眠多梦、惊悸怔忡、心神烦乱, 诊其原因为心火亢盛, 阴血不足。治疗应首选的方剂是
A. 天王补心丹 B. 酸枣仁汤
C. 磁朱丸 D. 甘麦大枣汤
E. 朱砂安神丸
44. 下列各项中属于“使药”功用范畴的是 ()
A. 缓和君、臣药之峻烈
B. 消除或降低君、臣药之毒性
C. 协助君臣药治疗兼证
D. 针对某一症状发挥治疗作用
E. 引药至病所或特定部位
45. 决定方剂功用、主治的主要因素是 ()

- A. 药物 B. 配伍
C. 剂量 D. 剂型
E. 用法
46. 苏子降气汤的功用是
A. 温肺散寒, 降气平喘
B. 祛痰散结, 行气消痞
C. 通阳散结, 散寒止痛
D. 通阳散寒, 祛痰下气
E. 降气平喘, 祛痰止咳
47. 下列哪一项不是“丸剂”的特点 ()
A. 不易变质 B. 服用方便
C. 吸收缓慢 D. 药力持久
E. 适用于慢性虚弱性病证
48. 下列各项中属于“反佐”范畴的是 ()
A. 热因热用 B. 壮水制火
C. 以泻代清 D. 火郁发之
E. 寒药热服
49. 生化汤主治证的病机是
A. 下焦蓄血 B. 血虚受寒
C. 气虚血滞 D. 冲任虚损
E. 血瘀气滞
50. 温经汤中配伍半夏的主要用意是
A. 燥湿化痰而和胃 B. 和胃降逆而止呕
C. 降逆散结而消痞 D. 通降胃气而散结
E. 化痰开胃而行津
51. 具有逐瘀泻热功效的方剂是
A. 血府逐瘀汤 B. 复元活血汤
C. 槐花散 D. 十灰散
E. 桃核承气汤
52. 黄土汤中配伍黄芩的主要用意是
A. 制约温燥 B. 清热燥湿
C. 泻火坚阴 D. 清肠止血
E. 清热解毒
53. 下列各项中属于“反佐”范畴的是 ()
A. 寒因寒用, 热因热用
B. 寒者热之, 热者寒之
C. 热药冷服, 寒药热服
D. 形不足者, 温之以气
E. 壮水之主, 以制阳光

54. 大柴胡汤的功用是 ()

- A. 和解少阳, 内泻热结
B. 疏肝止痛, 清热泻结
C. 透邪解郁, 疏肝理脾
D. 解肌疏表, 清泻里实
E. 疏肝解郁, 健脾和营

55. 患者因稳定型心绞痛就诊, 自诉常觉胸骨后痛, 偶有心慌心悸, 其舌质黯红, 脉涩。治疗应首选的方剂是

- A. 生化汤 B. 温经汤
C. 桃核承气汤 D. 血府逐瘀汤
E. 小承气汤

56. 葛根芩连汤适应的病证是 ()

- A. 脾虚泄泻 B. 湿热血痢
C. 协热下利 D. 热毒血痢
E. 暑湿吐泻

57. 方药配伍中寓“清金制木”之义的是

- A. 桑菊饮 B. 泻白散
C. 凉膈散 D. 羚角钩藤汤
E. 镇肝息风汤

58. 川芎茶调散中, 善治少阳、太阳、阳明经头痛的药是

- A. 川芎、荆芥、防风
B. 川芎、羌活、白芷
C. 细辛、白芷、川芎
D. 羌活、薄荷、川芎
E. 白芷、防风、薄荷

59. 大柴胡汤与葛根芩连汤的药物组成中均有 ()

- A. 黄芩 B. 黄连
C. 生姜 D. 大枣
E. 芍药

60. 治疗风寒湿邪或痰湿瘀血留阻经络之痹证, 应首选的方剂是

- A. 小活络丹 B. 牵正散
C. 大秦艽汤 D. 独活寄生汤
E. 羌活胜湿汤

61. 以下哪药非小柴胡汤加减而成大柴胡汤 ()

- A. 大黄 B. 枳实
C. 黄连 D. 人参