



国家执业医师资格考试



直通车系列

2018

(第三版)

中医执业医师资格考试 易混易错 2000 题

(第三版)

主编 梁轶群 时 晓

- ▶ **高含金量** 高频考点全覆盖，含历年真题
- ▶ **高针对性** 2000个易混易错知识点深度剖析（含真题）
- ▶ **高附加值** 赠送《考试宝典》体验卡
- ▶ **高含金量+高针对性+高附加值=高通过率**

中国医药科技出版社

国家执业医师资格考试直通车系列

易混易错

国家执业医师资格考试直通车系列，是执业医师资格考试大纲规定的必考内容，也是执业医师资格考试的难点、重点。本书根据考试大纲的要求，结合历年考试真题，精心编写，力求做到重点突出、难点突破、易学易懂。本书可作为执业医师资格考试的复习用书，也可作为执业医师资格考试的考前冲刺用书。

前言

2018

本书是根据《国家执业医师资格考试大纲》的要求，结合历年考试真题，精心编写，力求做到重点突出、难点突破、易学易懂。本书可作为执业医师资格考试的复习用书，也可作为执业医师资格考试的考前冲刺用书。

中医执业医师资格考试 易混易错 2000 题

(第三版)

主 编 梁轶群 时 晓

编 委 (按姓氏笔画排序)

张 静 黄雅松

组织者 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书立足于考试大纲,依托于《考试宝典》海量题库和强大的后台数据,选取2000道考生易错考点或易混淆知识点,由专业导师对易错知识点进行了深度剖析,对易混淆的知识点进行了对比解析,能够让考生轻松掌握考试要点,特别是本书包含了部分历年真题中易混易错题,供考生参考复习。

图书在版编目(CIP)数据

2018 中医执业医师资格考试易混易错 2000 题/梁轶群,时晓主编.—3 版.—北京:中国医药科技出版社,2018.1

(国家执业医师资格考试直通车系列)

ISBN 978-7-5067-9812-9

I. ①2… II. ①梁… ②时… III. ①中医师-资格考试-习题集 IV. ①R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 298154 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 麦和文化

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm¹/₁₆

印张 14¹/₄

字数 366 千字

初版 2016 年 4 月第 1 版

版次 2018 年 1 月第 3 版

印次 2018 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-9812-9

定价 32.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试包括实践技能和医学综合笔试两部分。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，特组织有关专业教师编写了《2018 中医执业医师资格考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足于考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取前 2000 道考生易错试题 + 易混淆知识点试题，名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点！特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生参考复习。

本书亮点：

1. 专业的编写团队。编写专家组成员均是在高校任职并在中医院从事临床工作的一线教师或医师，对执业医师资格考试有着长达十几年的教学、培训经验。
2. 试题的含金量高。紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。
3. 解析全面详细、举一反三。
4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

最后预祝各位考生在本“直通车”系列的保驾护航下，顺利通过考试。

编者
2017 年 12 月

目 录

单元一	1
单元二	18
单元三	34
单元四	51
单元五	68
单元六	84
单元七	101
单元八	118
单元九	135
单元十	153
单元十一	170
单元十二	188
单元十三	205

单元一

一、A1/A2 型题

1. 根据传染病防治法, 下列疾病不属于按甲类传染病管理的是

- A. 肺炭疽
- B. 鼠疫
- C. SARS
- D. AIDS
- E. 霍乱

2. 五脏中“以升为健”的是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

3. 症见恶寒、发热、鼻塞、咳嗽、气喘、脉浮, 其证属

- A. 肺气失宣
- B. 肺气虚弱
- C. 脾虚及肺
- D. 肺肾两虚
- E. 肾气不足

4. “肾为气之根”主要是指肾的哪种功能

- A. 肾阴为一身阴气之根
- B. 肾阳为一身阳气之根
- C. 肾中精气为五脏之根
- D. 肾主纳气
- E. 肾主气化

5. 枳实消痞丸的用药特点是

- A. 消补并用, 补重于消
- B. 消补并用, 消重于补
- C. 消散结合, 以散为主
- D. 消散结合, 以消为主
- E. 只消不补

6. 中气不足, 清阳不升之眩晕治宜选用下列何方

- A. 补中益气汤
- B. 归脾汤
- C. 四君子汤
- D. 左归丸
- E. 右归丸

7. 蒿芩清胆汤不含有的药物是

- A. 陈皮、半夏
- B. 茯苓、黄芩
- C. 滑石、甘草
- D. 陈皮、茯苓
- E. 竹沥、枳实

8. 服用十枣汤或舟车丸治疗鼓胀, 药后会出现除下列哪项外的副作用

- A. 泛恶
- B. 呕吐
- C. 泻下
- D. 腹痛
- E. 头晕

9. 下列哪项主要是概括药物的药性和作用的

- A. 归经
- B. 四气五味
- C. 升降浮沉
- D. 毒性
- E. 配伍七情

10. 郁证实证治疗以何为主

- A. 行气化痰
- B. 行气活血
- C. 疏肝理气
- D. 消食行气
- E. 清肝泻火

11. 下列哪项不是厥之实证的特点

- A. 声高息促
- B. 眩晕昏厥
- C. 面红气粗
- D. 脉洪大有力
- E. 口噤握拳

12. 与尿液排泄关系密切的是气的哪种功能

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 固摄作用
- D. 防御作用
- E. 气化作用

13. 发病前有明显的情绪紧张、恐惧、疼痛或站立过久等诱发因素, 发作时眩晕昏仆, 面色苍白, 呼吸微弱, 汗出肢冷, 舌淡, 脉沉细微。治宜选

- A. 开窍顺气解郁
- B. 开窍化痰解郁
- C. 补气养血活血

- D. 开窍活血顺气
- E. 补气回阳醒神

14. 经络系统的组成是

- A. 十二经脉、奇经八脉、经筋、皮部
- B. 经脉、络脉、经筋、皮部
- C. 经脉、别络、经筋、皮部
- D. 经脉、经别、经筋、皮部
- E. 正经、奇经、经别、皮部

15. 下列不属于外感腰痛致病病邪的是

- A. 风
- B. 寒
- C. 湿
- D. 热
- E. 燥

16. 除下列哪项外，均为形成痿证的病机

- A. 肺热伤津
- B. 湿热浸淫
- C. 脾胃虚寒
- D. 脾胃虚弱
- E. 肝火犯肺

17. 下列哪项不是脾的生理功能

- A. 水谷的受纳和腐熟
- B. 水谷精微的转输
- C. 水液的吸收和转输
- D. 脏器位置的维系
- E. 血液的统摄

18. 下列不是腰痛病因的是

- A. 居处潮湿
- B. 劳作汗出当风
- C. 冒雨着凉
- D. 年老体衰
- E. 饮食不节

19. 属于相乘传变的是

- A. 肺病及脾
- B. 肺病及心
- C. 心病及肝
- D. 肝病及肺
- E. 脾病及肾

20. 血虚风燥的皮肤病可见

- A. 皮肤干燥、瘀斑、瘀点
- B. 丘疹、瘙痒、色素沉着
- C. 皮肤萎缩、色素沉着
- D. 瘙痒、干燥、脱屑、肥厚
- E. 结痂、肥厚、色素沉着

21. 关于证候的认识，不正确的是

- A. 是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括
- B. 病机是证候的外在反映
- C. 证候能够揭示病变的机制及发展趋势

- D. 证候可以反映疾病的阶段性本质
- E. 证候具有时相性和空间性特征

22. 下列以杨梅结毒为主要表现的是

- A. 一期梅毒
- B. 二期梅毒
- C. 三期梅毒
- D. 小儿遗毒
- E. 隐性梅毒

23. 关于支原体肺炎的下列说法中，错误的是

- A. 肺炎支原体肺炎占各种原因引起肺炎的 20%
- B. 肺炎支原体介于细菌和病毒之间
- C. 主要通过呼吸道传播
- D. 支原体肺炎以儿童及青年人居多
- E. 肺炎支原体具有厌氧性

24. 关于颅咽管瘤 CT 表现，错误的是

- A. 圆形或椭圆形低密度影
- B. 斑块样或蛋壳样钙化
- C. 常见瘤周水肿
- D. 位于脑外
- E. 可造成脑积水

25. COPD 患者家庭氧疗时鼻导管吸氧的氧流量是

- A. 根据患者意愿调整
- B. 尽量大于 3L/min
- C. 1~2L/min
- D. 不超过 1L/min
- E. 最好在 2~3L/min

26. 首次将咳嗽分为外感、内伤的医家是

- A. 叶天士
- B. 李东垣
- C. 刘河间
- D. 张景岳
- E. 李中梓

27. 蛛网膜下腔出血的主要 CT 表现是

- A. 侧脑室呈高密度影
- B. 三脑室呈高密度影
- C. 外侧裂池见高密度影
- D. 基底节区见高密度影
- E. 枕叶见高密度影

28. 服食毒物后，最长几小时内洗胃有效

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 24
- E. 12

29. 下列各项由国务院颁布的是

- A. 《中华人民共和国食品安全法》

- B. 《医疗机构管理条例实施办法》
 C. 《麻醉药品和精神药品管理条例》
 D. 《中华人民共和国人口与计划生育法》
 E. 《中华人民共和国传染病防治法》
30. 下列各项中, 哪种中毒不会引起中毒性溶血
 A. 硝基苯 B. 砷化氢
 C. 毒蕈 D. 苯胺
 E. 亚硝酸盐
31. 关于人体器官移植的伦理原则, 说法不正确的是
 A. 器官移植应坚持人道主义与功利主义原则相结合的原则
 B. 从尸体上摘取器官和组织无须经过院方及患者家属同意
 C. 器官移植手术, 应遵循知情同意原则
 D. 对接受移植的患者必须经过认真全面地评价其他疗法的可能性和有效性后, 才能决定是否进行器官移植
 E. 活体提供器官的一个最基本的伦理原则是不能危及供者生命
32. 生命伦理学吉汉宣言的内容不包括
 A. 在促进公正与团结原则的同时, 应该保证实行个人自主
 B. 每个人都有权利获得最佳的医疗保健
 C. 人类基因组是全人类的遗产
 D. 人体器官买卖应予禁止
 E. 禁止精子买卖
33. 偏历穴的特定穴属性是
 A. 原穴 B. 输穴
 C. 经穴 D. 郄穴
 E. 络穴
34. 严格执行药品管理法律法规, 科学指导合理用药这一行为规范的对象是
 A. 管理人员 B. 医师
 C. 护士 D. 药学技术人员
 E. 医技人员
35. 治疗目赤肿痛、羞明流泪应选的药物是
 A. 归肺经 B. 归心经
 C. 归肾经 D. 归脾经
 E. 归肝经

36. 肺癆以潮热骨蒸为主症时, 应首选下列何方

- A. 黄芪鳖甲散 B. 补天大造丸
 C. 柴胡清骨散 D. 当归六黄汤
 E. 知柏地黄丸

37. 近年来, 全国医疗卫生行业作风建设的成果得到体现的情况是

- A. 医疗服务质量
 B. 抗击“非典”的斗争
 C. 防病治病效果
 D. 控制医药费用
 E. 改善服务态度

38. 患者, 女, 30岁。干咳, 咳声短促, 痰中有时带血, 色鲜红, 午后手足心热, 皮肤干灼, 口干咽燥, 胸部隐隐闷痛。舌边尖红、苔薄, 脉细数。应诊为何型肺癆

- A. 阴虚火旺 B. 气阴两虚
 C. 肺阴亏损 D. 肺肾同病
 E. 阴阳两虚

39. 对违反规定收受临床促销费、开单费等回扣行为的医疗单位, 卫生行政部门可以给予以下处罚, 除了

- A. 没收违法所得
 B. 二、三级医院黄牌警告限期改正
 C. 取消非营利性医院资格
 D. 一级医院停业整顿
 E. 取消职工医疗保险定点单位资格

40. 《丹溪心法》认为怔忡的根本原因为

- A. 心血不足 B. 血虚与痰火
 C. 心阳不足 D. 肝火上扰
 E. 瘀血阻络

41. 下列各项, 哮的临床意义是

- A. 痰饮内伏, 复感外邪所诱发
 B. 风寒袭肺
 C. 燥邪犯肺
 D. 肺阴亏虚
 E. 肺肾阴虚

42. 关于惊悸和怔忡, 叙述不正确的是

- A. 怔忡每由内因引起, 惊悸常由外因而成
 B. 惊悸日久可发展为怔忡

- C. 怔忡常自觉心中惕惕,病来虽渐,但全身情况较差
D. 怔忡患者,又易受外惊所扰,使动悸加重
E. 惊悸以虚证为多,发则悸跃不能自控
43. 虚里按之弹手,洪大而搏,其临床意义是
A. 宗气内虚 B. 饮停心包
C. 心肺气绝 D. 宗气不守
E. 心气充盛
44. 尺肤诊病中,尺肤凉而脉细小者多属
A. 气虚证 B. 阴虚证
C. 血虚证 D. 温热证
E. 血燥证
45. 中医诊断小儿疾病最重要的诊法是
A. 按诊 B. 闻诊
C. 望诊 D. 问诊
E. 切诊
46. 大黄配芒硝,能增强攻下作用,其配伍属
A. 相使 B. 相须
C. 相反 D. 相畏
E. 相杀
47. 下列各项关于新产后的定义,正确的是
A. 产后 7 天 B. 产后 10 天
C. 产后 14 天 D. 产后 21 天
E. 产后 28 天
48. 下列各项中,不与附子相反的药物是
A. 白藜 B. 白及
C. 白芷 D. 贝母
E. 半夏
49. 患者咳嗽痰多,色白而黏,易于咯出,舌淡苔腻,其证候是
A. 风寒束肺 B. 寒邪犯肺
C. 痰浊阻肺 D. 燥邪犯肺
E. 痰饮停肺
50. 首先将头痛分为内伤和外感两大类的医著是
A. 《冷庐医话》 B. 《临证指南医案》
C. 《证治准绳》 D. 《丹溪心法》
E. 《东垣十书》

51. 患者,男,40 岁。平素有高血压病史,现眩晕耳鸣,面红头胀,腰膝酸软,失眠多梦,有时遗精或性欲亢进,舌红,脉沉弦数。其病机是
A. 阴虚内热 B. 阴损及阳
C. 阴虚阳亢 D. 阳损及阴
E. 阴虚火旺
52. 痰浊头痛的特征是
A. 头痛如裹 B. 头痛如裂
C. 头痛且空 D. 头痛且晕
E. 头痛昏蒙
53. 下列关于咳嗽的各项叙述中,错误的是
A. 有声无痰为咳
B. 有痰无声为嗽
C. 一般多为痰声并见,难以截然分开
D. 病位在肺,与其他脏腑无密切关系
E. 由于肺失宣降,肺气上逆作声导致
54. 患者,男,56 岁。食少纳呆,面色萎黄,口唇、指甲苍白,大便秘结难解。治疗应首选的药物是
A. 人参 B. 黄芪
C. 阿胶 D. 当归
E. 白芍
55. 治疗胁痛瘀血阻络证,首选的方剂是
A. 一贯煎 B. 柴胡疏肝散
C. 复元活血汤 D. 龙胆泻肝汤
E. 茵陈蒿汤
56. 患者,男,68 岁。咳嗽气喘,呼多吸少,腰膝酸软,体倦乏力。治疗应首选的药物是
A. 熟地黄 B. 何首乌
C. 补骨脂 D. 巴戟天
E. 淫羊藿
57. 黄疸的各种病理因素中,最重要的是
A. 湿邪 B. 热邪
C. 寒邪 D. 疫毒
E. 气滞
58. 患者脘腹阵痛,烦闷呕吐,时发时止,得食则呕,甚则吐蛔,手足厥冷。治疗应首选的方剂是
A. 乌梅丸 B. 小建中汤

- C. 真人养脏汤 D. 木香槟榔丸
E. 理中安蛔丸

59. 患者，女，72岁。反复咳喘18年。现咯吐涎沫，喘促短气，呼多吸少，动辄尤甚，唇面青紫，舌质暗红，脉虚而涩。其中医病证诊断是

- A. 肺痿，虚热证
B. 肺痿，肾虚血瘀证
C. 肺痿，虚寒证
D. 肺痿，上热下寒证
E. 肺胀，肺肾气虚证

60. 除下列哪项外，为肝气犯胃型胃痛的主症

- A. 胃脘胀满，攻撑作痛，脘痛连肋
B. 每因情志因素而痛作
C. 暖气频繁
D. 舌苔薄白
E. 脉象弦数

61. 患者，男，67岁。反复咳喘24年。现咯吐涎沫，喘促短气，咽干而燥，下利泄泻，形寒肢凉，舌淡红，苔薄白，脉细弱。其治疗应首选的方剂是

- A. 月华丸
B. 麦门冬汤合清燥救肺汤
C. 甘草干姜汤
D. 小青龙加石膏汤
E. 麻黄升麻汤

62. 治疗瘀血停滞兼阴血不足所致胃痛的主方是

- A. 调营敛肝饮 B. 复元活血汤
C. 加味四物汤 D. 当归补血汤
E. 桃仁红花煎

63. 患者，女，39岁。失眠多梦，易于惊醒，胆怯心悸，遇事善惊，气短乏力，舌淡，脉弦细。其治疗宜选用

- A. 酸枣仁汤 B. 琥珀多寐丸
C. 养心汤 D. 朱砂安神丸
E. 安神定志丸

64. 患者，男，57岁。心悸不宁，心烦少寐，口干，五心烦热，梦遗腰酸，治疗方剂最宜选用

- A. 归脾汤 B. 朱砂安神丸
C. 知柏地黄丸 D. 沙参麦冬汤
E. 六味地黄丸

65. 患者，男，19岁。煤气中毒后1个月，突发昏仆，肢体抽搐，口吐涎沫，约5分钟后神志转清，自述疲乏，舌苔白腻，脉象弦滑。该病例中医治法应为

- A. 理气化痰 B. 豁痰息风
C. 平肝息风 D. 化痰开窍
E. 化痰消饮

66. 患者，男，35岁。有胃痛病史，昨天因过食辛辣之品而诱发呕血，血色紫暗，夹有食物残渣，口臭，口干，大便色黑，舌红，苔黄腻，脉滑数。中医方剂应选用

- A. 龙胆泻肝汤合十灰散
B. 泻心汤合十灰散
C. 桃核承气汤合失笑散
D. 归脾汤加三七粉
E. 茵陈蒿汤合平胃散

67. 下列选项中，不属于心悸诊断依据的是

- A. 自觉心中悸动不安，心搏异常
B. 呈阵发性或持续不解
C. 伴有胸闷不舒，易激动
D. 伴有上下冲逆，发自少腹
E. 劳倦、饱食等因素可诱发

68. 患者，男，42岁。平素性情急躁，有胃溃疡病史。昨天因大怒，诱发呕血，吐血色红，伴有口苦咽干，胸胁疼痛，舌质红绛，脉象弦数。方剂宜选用

- A. 泻心汤合十灰散
B. 龙胆泻肝汤合十灰散
C. 化肝煎合十灰散
D. 犀角地黄汤
E. 玉女煎

69. 下列关于水肿阳水的各项叙述中，错误的是

- A. 发病急，病程短
B. 水肿多从头面开始，由上而下，继及全身
C. 肿处皮肤松弛，按之凹陷不易恢复
D. 兼有表证
E. 治疗以发汗、利水或攻逐为主

70. 某阳黄患者，经治黄疸消退后，症见脘腹作胀，胁肋隐痛，不思饮食，肢体困倦，大便时秘时溏，舌苔薄白，脉弦细。治疗宜用

- A. 香苏散 B. 四逆散

- C. 逍遥散 D. 柴胡疏肝散
E. 归脾汤

71. 患者，女，38 岁。因尿血反复发作 2 个月来院就诊，尿色淡红，无尿频、尿急，有轻度尿痛涩滞，感腰膝酸软，五心烦热，舌红苔少，脉细数。应诊为

- A. 尿血之虚证 B. 尿血之实证
C. 血淋之虚证 D. 血淋之实证
E. 石淋

72. 关于外科内治法的具体治法，下列哪项正确

- A. 解表，清热，通里
B. 温通，祛痰，理湿
C. 行气，和营，内托
D. 消肿，提脓，去肌
E. 补益，养胃

73. 患者，男，46 岁。全身水肿，皮肤绷紧光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，经予疏凿饮子治疗半个月，未见好转，肿势日趋严重，兼见气粗喘满，倚息不得卧，脉弦有力，应治以何方

- A. 血府逐瘀汤
B. 葶苈大枣泻肺汤合五苓散、五皮饮
C. 济生肾气丸
D. 十枣汤合苓桂术甘汤
E. 舟车丸

74. 引起发颐的主要原因是

- A. 外感风温 B. 热病余毒
C. 口腔慢性溃疡 D. 少阳郁滞
E. 胃热上攻

75. 患儿，3 岁，低热 2 天后于口腔、手足心出现疱疹，分布稀疏，疹色红润，疱液清亮，苔薄黄腻，脉浮数。诊断应为

- A. 麻疹 B. 幼儿急疹
C. 风疹 D. 水痘
E. 手足口病

76. 流行性乙型脑炎恢复期患儿，现发热时高时低，面白神疲，汗多不温，便溏溲清，舌淡，苔白，脉细弱。辨证应为

- A. 脾虚气弱 B. 肺虚不固
C. 肺脾气虚 D. 营卫不合
E. 正虚邪恋

77. 下列对特殊之毒致病的叙述，不正确的是

- A. 多为外来因素所致
B. 一般发病迅速
C. 有些具有传染性
D. 不同人对同一特殊之毒反应相同
E. 疫毒亦属特殊之毒

78. 患儿，1 岁，阵发性痉咳 10 天，日轻夜重，伴鸡鸣样回声。其治法应为

- A. 疏风清热 B. 疏风宣肺
C. 宣肺止咳 D. 泻肺镇咳
E. 肃肺降气

79. 其病因不属于典型血瘀为病的是

- A. 白疔 B. 痈肿
C. 脱疽 D. 漆疮
E. 肾岩

80. 患者，孕 31 周，小便频数，淋漓涩痛，量少色黄，午后潮热，手足心热，大便干结，颧赤唇红，舌红，少苔，脉细滑而数。治疗应首选的方剂是

- A. 导赤散 B. 知柏地黄丸
C. 龙胆泻肝汤 D. 萆薢渗湿汤
E. 沉香散

81. 卧时向外，躁动不安，属

- A. 阳证 B. 阴证
C. 寒证 D. 虚证
E. 虚寒证

82. 患者妊娠小便不通，小腹胀满而痛，坐卧不安，腰膝酸软，畏寒肢冷，舌淡，苔薄润，脉沉滑无力。其证候是

- A. 肾虚证 B. 气虚证
C. 气滞证 D. 寒湿证
E. 血虚证

83. 面色黧黑，肌肤甲错可见于

- A. 肾精久耗 B. 肾阳亏虚
C. 水饮内停 D. 寒湿带下
E. 血瘀日久

84. 患者妊娠期间，小便频数量少，小腹胀急疼痛，坐卧不安，神疲倦怠，头重眩晕，舌淡，苔薄白，脉虚缓滑。治疗应首选的方剂是

- A. 参苓白术散 B. 加味五淋散

- C. 益气导溺汤 D. 补中益气汤
E. 乌药汤

85. 小儿指纹达于命关提示

- A. 正常表现
B. 邪气入络, 邪浅病轻
C. 邪气入经, 邪深病重
D. 邪入脏腑, 病情严重
E. 病情凶险, 预后不良

86. 患者, 女, 20 岁。2 天前受风后出现左侧面部麻木, 额纹消失, 眼裂变大, 鼻唇沟变浅, 口角下垂垂向左侧, 舌淡, 苔薄白。针刺面部穴位应采用的针刺方法是

- A. 直刺深刺 B. 多穴重刺
C. 轻刺浅刺 D. 提插泻法
E. 电针强刺激

87. 反映脾胃病变的是

- A. 舌面 B. 舌尖
C. 舌中 D. 舌边
E. 舌根

88. 患者, 男, 33 岁。自服苯巴比妥钠 100 片, 神志障碍 20 小时入院。体格检查: 深昏, 呼吸不规则, 血压 90/60mmHg, 双肺呼吸音清晰, 心率 118 次/分, 律齐、无杂音。此时最重要的抢救措施是

- A. 利尿 B. 导泻
C. 洗胃 D. 血液透析
E. 大量输液

89. 心脾热盛, 热毒上壅时的舌象为

- A. 老舌 B. 嫩舌
C. 瘦舌 D. 红绛肿胀舌
E. 点刺舌

90. 患者, 女, 26 岁, 农民。突然起病, 畏寒、发热、全身疼痛、耳鸣 6 天, 伴腰痛、皮疹 1 天入院。体检: 体温 38.3℃, 血压 128/68mmHg, 心率 108 次/分, 颜面潮红, 球结膜充血, 胸背部可见散在性暗红色斑丘疹, 肝肋下未及, 脾肋下 1cm。血象: WBC $5.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.86, 尿常规正常 ALT 96U/L, AST 85U/L, TBIL 4mmol/L。外斐反应 OX19 凝集试验阴性。最可能的诊断是

- A. 伤寒 B. 地方性斑疹伤寒
C. 病毒性肝炎 D. 钩端螺旋体病

E. 肾综合征出血热

91. 普通型流行性脑脊髓膜炎用磺胺嘧啶治疗 1 天, 第 2 天临床病症无改善, 出现颅高压, 主要应采取下列哪项措施

- A. 改用青霉素加氯霉素
B. 加用激素
C. 肝素应用
D. 加强脱水治疗
E. 腰穿放脑脊液

92. 患者, 男, 19 岁。持续发热 20 天, 伴乏力, 腹胀, 食欲减退, 便秘, 右下腹隐痛。体查: T 39℃, P 73 次/分, 右下腹压痛, 无反跳痛, 脾脏左肋下 1cm, 血常规: WBC $3.4 \times 10^9/L$, N 0.68, 嗜酸性细胞计数为零, HBsAg 阳性, 大便华支睾吸虫卵阳性。该病例最主要的诊断可能是

- A. 伤寒 B. 慢性乙型肝炎
C. 败血症 D. 华支睾吸虫病
E. 急性阑尾炎

93. 在温病辨证中, 斑疹隐现属于

- A. 中焦证候 B. 气分证候
C. 卫分证候 D. 营分证候
E. 血分证候

94. 温脾汤与理中汤均含有的药物是

- A. 干姜、附子、白术
B. 干姜、人参、甘草
C. 干姜、人参、白术
D. 干姜、附子、甘草
E. 干姜、附子、人参

95. 药物寒热、温凉的依据是

- A. 神农尝百草的体会
B. 《素问》: “寒者热之, 热者寒之”
C. 《本经》: “疗寒以热药, 疗热以寒药”
D. 药物作用于人体的反应
E. 口尝的滋味

96. 患者, 男, 30 岁。慢性肾小球肾炎病史 10 年, 近 1 年病情加重, 实验室检查示: GFR 10ml/(min · 1.73m²), 分期诊断是

- A. 肾损伤 GFR 正常 B. GFR 轻度下降
C. GFR 中度下降 D. GFR 重度下降
E. 肾衰竭

97. 下列病证除哪项外, 均可用防风治疗

- A. 外感风寒, 头身疼痛
- B. 风寒湿痹, 肢体疼痛
- C. 肝脾不和, 腹痛泄泻
- D. 湿热痹证, 痉厥抽搐
- E. 破伤风证, 角弓反张

98. 肺癌患者化疗后出现带状疱疹, 此种情况属

- A. 显性感染
- B. 隐性感染
- C. 病原携带
- D. 潜伏性感染
- E. 易感者

99. 关于血清特异性抗体检测的概念, 下列哪项是错误的

- A. IgM 型抗体的检出有助于近期感染的诊断
- B. IgD 型抗体滴度升高提示既往感染
- C. 疾病早期抗体滴度低, 后期滴度显著升高
- D. 在疾病恢复期比早期抗体滴度升高 4 倍以上有诊断价值
- E. 回忆反应是由于既往感染或预防接种者再感染另一病原体时使原有抗体滴度升高所致

二、B 型题

(100 ~ 101 题共用备选答案)

- A. 数小时
- B. 1 ~ 3 天
- C. 不超过 6 天
- D. 1 ~ 3 个月
- E. 10 年

100. 狂犬病的潜伏期通常是

101. 狂犬病的兴奋期通常是

(102 ~ 103 题共用备选答案)

- A. 百会
- B. 气海、中脘
- C. 脾俞、足三里
- D. 曲池、内庭
- E. 内关、中脘

102. 治疗休息痢, 应加用的腧穴是

103. 治疗久痢脱肛, 应加用的腧穴是

(104 ~ 105 题共用备选答案)

- A. 行政行为
- B. 行政处分
- C. 行政处罚
- D. 行政复议
- E. 行政责任

104. 行政机关对违法公民、法人的制裁性处理是

105. 公民、法人对处理不服, 可以向上一级行政机关提出

(106 ~ 107 题共用备选答案)

- A. 滑
- B. 促
- C. 弦
- D. 涩
- E. 数

106. 胸痹心痛患者, 脉象多见

107. 心烦不寐患者, 脉象多见

(108 ~ 109 题共用备选答案)

- A. 藿香正气散
- B. 香薷饮
- C. 参苓白术散
- D. 六一散
- E. 桂苓甘露散

108. 感受暑湿, 身热烦渴, 小便不利或大便泄泻者, 治宜选用

109. 中暑受湿, 发热头痛, 烦渴引饮, 小便不利或呕吐泄泻者, 治宜选用

(110 ~ 111 题共用备选答案)

- A. 戴眼, 反折瘈瘲
- B. 耳聋百节皆纵, 目寰绝系
- C. 面黑, 齿长而垢, 腹胀闭
- D. 腹胀闭不得息, 善噫善呕
- E. 口目动作, 善惊妄言, 色黄

110. 太阳之经络气血衰竭, 可见

111. 少阴之经络气血衰竭, 可见

(112 ~ 114 题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

112. “后天之本”指的是

113. “先天之本”指的是

114. “气之主”为

(115 ~ 116 题共用备选答案)

- A. 壮水之主, 以制阳光
- B. 益火之源, 以消阴翳

- C. 损其有余
- D. 补其不足
- E. 阴阳双补

115. 阴病治阳的方法即

116. “寒者热之”的治法属于

(117~118 题共用备选答案)

- A. 120/70mmHg 以下
- B. 125/75mmHg 以下
- C. 130/80mmHg 以下
- D. 140/80mmHg 以下
- E. 140/85mmHg 以下

117. 慢性肾小球肾炎患者,尿蛋白 $\geq 1\text{g/d}$,血压应控制在

118. 慢性肾小球肾炎患者,尿蛋白 $< 1\text{g/d}$,血压应控制在

(119~121 题共用备选答案)

- A. 滋阴潜阳药
- B. 清热凉血药
- C. 温阳、益气、健脾药
- D. 行气和营药
- E. 苦寒泻下药

119. 除哪项外,均为止血药的常用配伍

120. 活血化瘀药治疗跌打损伤,宜配伍的药物是

121. 宿食积滞不下、郁而化热者,应选用与消食药配伍的药物是

(122~123 题共用备选答案)

- A. 清金化痰汤
- B. 苇茎汤
- C. 加減泻白散
- D. 定喘汤
- E. 加味桔梗汤

122. 治疗肺病咳唾浊痰,黄绿而味腥者,应首选

123. 治疗咳逆阵作,面赤咽干口苦,每随情绪波动而增减者,应首选

(124~125 题共用备选答案)

- A. 少量白细胞
- B. 畸形红细胞
- C. 白细胞管型
- D. 颗粒管型
- E. 透明管型

124. 多见于肾盂肾炎的尿液异常是

125. 见于慢性肾衰竭的尿液异常是

(126~127 题共用备选答案)

- A. 心悸烦躁,善惊痰多
- B. 心悸善惊,坐卧不安
- C. 惊悸眩晕,胸闷喘憋
- D. 心悸怵惕,心痛胸闷
- E. 虚烦而悸,耳鸣腰酸

126. 心悸心虚胆怯证的特点是

127. 心悸心血瘀阻证的特点是

(128~129 题共用备选答案)

- A. 少阴经
- B. 厥阴经
- C. 少阳经
- D. 阳明经
- E. 太阳经

128. 头痛部位在两侧,连及耳部,是何经头痛

129. 头痛部位在颠顶,连于目系,是何经头痛

(130~131 题共用备选答案)

- A. 胃苓汤
- B. 连理汤
- C. 芍药汤
- D. 桃花汤
- E. 驻车丸

130. 治疗寒湿痢应首选

131. 治疗虚寒痢应首选

(132~133 题共用备选答案)

- A. 沙参麦冬汤
- B. 麦门冬汤
- C. 益胃汤
- D. 玉女煎
- E. 一贯煎

132. 治疗胁痛肝阴不足证,应首选

133. 治疗呃逆胃阴不足证,应首选

(134~138 题共用备选答案)

- A. 血府逐瘀汤
- B. 丹参饮
- C. 乌头赤石脂丸合苏合香丸
- D. 瓜蒌薤白半夏汤
- E. 瓜蒌薤白白酒汤

134. 胸痹血瘀轻证治宜

135. 胸痹血瘀重证治宜

136. 胸痹痰浊壅塞证治宜
137. 胸痹阴寒凝滞轻证治宜
138. 胸痹阴寒凝滞重证治宜

(139~140 题共用备选答案)

- A. 二妙散 B. 八正散
C. 疏凿饮子 D. 程氏草薢分清饮
E. 薏苡仁汤

139. 治疗尿浊, 应首选
140. 治疗热淋, 应首选

(141~142 题共用备选答案)

- A. 肺、脾 B. 心、肝
C. 脾、肾 D. 心、肾
E. 肾、肝、肺

141. 血虚主要涉及的脏腑是
142. 气虚主要涉及的脏腑是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 祛邪和络 B. 清热利湿
C. 活血行瘀 D. 扶正补虚
E. 益气健脾

143. 痿证虚证的治疗原则是
144. 痿证实证的治疗原则是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 推疣法 B. 浸渍法
C. 针挑法 D. 挖除法
E. 结扎法

145. 寻常疣的外治, 应选用
146. 传染性软疣的外治, 应选用

(147~148 题共用备选答案)

- A. 四君子汤 B. 六君子汤
C. 人参五味子汤 D. 沙参麦冬汤
E. 贝母瓜蒌散

147. 百日咳恢复期肺阴亏虚证首选
148. 百日咳恢复期肺脾气虚证首选

(149~150 题共用备选答案)

- A. 胎漏 B. 滑胎

- C. 胎动不安 D. 小产
E. 堕胎

149. 孕早期, 感小腹胀痛, 腰酸, 阴道有少量出血者, 诊断为

150. 连续发生堕胎或小产 3 次以上者, 诊断为

答案与解析

一、A1/A2 型题

1. D. 甲类传染病属强制管理传染病, 包括鼠疫和霍乱两种。根据国务院卫生行政部门的规定, 乙类传染病中传染性非典型肺炎、肺炭疽和脊髓灰质炎等按甲类传染病报告和管理。故选 D。

2. C. 脾的生理特性之一为脾气上升, 指脾气具有向上运动以维持水谷精微的上输和内脏位置相对稳定的生理特性。故选 C。

3. A. 从恶寒、发热、脉浮推断为表证, 鼻塞、咳嗽是肺失宣肃的表现, 本证未见虚象, 可排除 B、C、D、E, 故选 A。

4. D. 《类证治裁·喘证》说: “肺为气之主, 肾为气之根, 肺主出气, 肾主纳气, 阴阳相交, 呼吸乃和。” 故选 D。

5. B. 本方中重用枳实、厚朴, 着重于行气消痞; 黄连用量大于干姜, 其病当属热多寒少之证, 消补兼施之时侧重于消, 处方用药消积不伤正, 扶正不助满, 以收祛邪扶正之功。故选 B。

6. A. 眩晕气血亏虚证治当补益气血、调养心神, 方用归脾汤加减; 若中气不足, 清阳不升, 兼见气短乏力, 纳少神疲, 便溏下坠, 脉象无力者选用补中益气汤。故选 A。

7. E. 蒿芩清胆汤的药物组成有青蒿、淡竹茹、半夏、赤茯苓、黄芩、枳壳、陈皮和碧玉散 (滑石、甘草、青黛)。故选 E。

8. E. 鼓胀患者病程较短, 正气尚未过度消耗, 而腹胀殊甚, 腹水不退, 脉实有力者, 可选用舟车丸、控涎丹、十枣汤等, 中病即止, 遵循“衰其大半而止”的原则, 以免损伤脾胃, 引起昏迷、出血之变。故选 E。

9. B. 四气, 即寒、热、温、凉四种药性, 它反映药物在影响人体阴阳盛衰、寒热变化方面的作用倾向, 是对药物治疗寒热病证作用的概括。五味, 即指药物因功效不同而具有辛、甘、酸、苦、

咸等味,其既是药物作用规律的高度概括,又是部分药物真实滋味的具体表示。故选B。

10. C。理气开郁、调畅气机、怡情易性是治疗郁证的基本原则。实证首当理气开郁,并应根据是否兼有血瘀、火郁、痰结、湿滞、食积等而分别采用活血、降火、祛痰、化湿、消食等方法。故选C。

11. B。厥证实证者表现为突然昏仆,面红气粗,声高息促,口噤握拳,或夹痰涎壅盛,舌红苔黄腻,脉洪大有力。故选B。

12. C。气的固摄作用指气对血、津液、精液及其他各种液态物质具有约束、固摄,防止其无故流失的功能。尿液的排泄依靠气固摄作用的调节。故选C。

13. E。发病前有明显的情绪紧张、恐惧、疼痛或站立过久等诱发因素,发作时眩晕昏仆,辨病为厥证。呼吸微弱,汗出肢冷,舌淡,脉沉细微,辨证为虚证,治当补气回阳醒神。

14. B。经络系统包括经脉、络脉、经筋和皮部。经脉包括十二正经、奇经八脉及十二经别。故选B。

15. E。腰痛基本病机为筋脉痹阻,腰府失养。内伤多责之于禀赋不足,肾亏腰府失养;外感为风、湿、寒、热诸邪痹阻经脉,或劳力扭伤,气滞血瘀,经脉不通而致腰痛。故选E。

16. E。痿证的基本病机为气血津液输布不畅,筋肉四肢失养而萎弱不用。病位在筋脉、肌肉,与肝、肾、肺、胃关系最为密切。肺热伤津、湿热浸淫、脾胃虚寒、脾胃虚弱均可导致痿证的发生。故选E。

17. A。脾的生理功能有:①主运化,包括运化水谷和运化水湿。②主升清,包括将水谷精微等营养物质上输于头目和维持内脏位置的相对恒定。③主统血,水谷的受纳和腐熟为胃的功能。故选A。

18. E。腰痛是指因外感、内伤或闪挫导致腰部气血运行不畅,或失于濡养,引起以腰脊或脊旁部位疼痛为主要症状的一种病症。外邪侵袭、体虚年衰、跌仆闪挫等是常见原因,饮食不节和腰痛没有直接关系。故选E。

19. E。五行相乘是指五行中一行对其所胜之行的过度制约或克制,五行相乘的顺序与五行相克的顺序相同,即肝乘脾,脾乘肾,肾乘心,心乘肺,肺乘肝。故选E。

20. D。血虚风燥会出现皮损色暗或色素沉着,

或皮损粗糙肥厚,剧痒难耐,突然脱发成片或皮损肥厚干燥有鳞屑,或呈苔藓样变。故选D。

21. B。证候是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括。一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。证候是病机的外在反映,病机是证候的内在本质。由于病机的内涵中包括了病变的部位、原因、性质和邪正盛衰变化,故证候能够揭示病变的机制和发展趋势。故选B。

22. C。三期梅毒亦称晚期梅毒,主要表现为杨梅结毒。此期特点为病程长,易复发,除皮肤黏膜损害外,常侵犯多个脏器。故选C。

23. A。支原体肺炎约占非细菌性肺炎的1/3以上,或各种原因引的肺炎的10%。故选A。

24. C。颅咽管瘤CT扫描显示为鞍区肿瘤改变,非增强扫描者实质性肿瘤表现为高密度或大牛股密度影像,钙化斑为高密度,囊性者因瘤内含胆固醇而呈低密度像,CT值为 $-40 \sim 10\text{Hu}$,囊壁为等密度。病变边界清晰,呈圆形、卵圆形或分叶状,两侧侧脑室司扩大,CT值增加 $12 \sim 14\text{Hu}$,囊性颅咽管瘤呈环状强化或多环状强化而中心低密度区无强化,少数颅咽管瘤不强化。一般具有钙化、囊腔及强化后增强三项变异的鞍区肿瘤。故选C。

25. C。COPD治疗应控制感染,同时维持呼吸道通畅,纠正缺氧和二氧化碳潴留,使用止喘、祛痰药,翻身、胸部叩击、雾化吸入等是保持气道通畅的重要措施。纠正缺氧通常采用低浓度、低流量持续给氧,流量 $1 \sim 2\text{L/min}$,24小时持续吸氧不间断,效果好。因此,COPD患者家庭氧疗时鼻导管吸氧的氧流量为 $1 \sim 2\text{L/min}$ 。故选C。

26. D。明·张景岳《景岳全书》首次将咳嗽分外感与内伤两类,曰:“咳嗽之要,止惟二证。何为二证,一曰外感,一曰内伤,而尽之矣。”故选D。

27. C。蛛网膜下腔出血的主要CT表现为脑底部脑池、脑沟及外侧裂的高密影。故选C。

28. C。一般在服毒后6小时内洗胃效果最好。安眠药、镇静剂等中毒,即使已超过6小时,洗胃也有必要。故选C。

29. C。由国务院直接发布或经国务院批准的卫生行政法规有:《医疗机构管理条例》《麻醉药品和精神药品管理条例》《中华人民共和国中医药条例》等。故选C。

30. E. 砷化氢、苯胺、硝基苯等中毒可引起溶血, 出现贫血和黄疸, 毒草中毒可出现剧烈腹痛、腹泻, 随后出现黄疸、凝血功能障碍等。亚硝酸盐中毒会出现发绀、胸闷、呼吸困难、呼吸急促、头晕等。故选 E。

31. B. 《人体器官移植条例》伦理原则第 1 条为知情同意原则, 即供体和受体都是出于自愿, 必须做到知情同意; 第 2 条为尊重原则, 即从事人体器官移植的医疗机构及其医务人员应当履行对捐献者知情同意、不会损害活体器官捐献人其他正常的生理功能、尊重死者捐献者的尊严。故选 B。

32. E. 2000 年生命伦理学吉汉宣言的内容第九条规定辅助生殖技术的基本目的是通过医疗解决人类不孕的后果, 可在其他医疗处理证明不适合或者无效时用来促进生育。辅助生殖技术也可用于诊断和处理遗传病以及用于核准的研究。而没有指出禁止精子买卖。A、B、C、D 项内容均是吉汉宣言内容。故选 E。

33. E. 偏历属于手阳明大肠经之络穴。此腧穴在前臂背面桡侧, 当阳溪与曲池连线上, 腕横纹上 3 寸。络穴是络脉在本经别出部位的腧穴, 十二经脉的络穴位于四肢肘膝关节以下。言脉气由此穴偏侧别出, 经过手阳明大肠经走向太阴之脉。故选 E。

34. D. 《药品管理法》规定药学技术人员必须严格执行药品管理法律法规, 科学指导合理用药。故选 D。

35. E. 肝开窍于目, 目赤肿痛、羞明流泪属于目疾, 所用药物应归属于肝经。故选 E。

36. C. 黄芪鳖甲散, 出自《卫生宝鉴》, 功用益气阴, 清虚热, 主治气阴两虚之劳热证。补天大造丸, 出自《奇方类编》, 主治诸虚百损, 五劳七伤。当归六黄汤功用滋阴泻火, 固表止汗, 主治阴虚火旺盗汗。知柏地黄丸功用滋阴降火, 主治肝肾阴虚、虚火上炎证。柴胡清骨散, 出自《医宗金鉴》, 主劳瘵热甚人强, 骨蒸久不痊。故选 C。

37. E. 作风建设最能体现的是医疗服务态度, 而 A、B、C、D 则是其他方面而非作风方面。故选 E。

38. C. 癆虫蚀肺, 损伤肺阴, 肺失滋润, 清肃失常, 故干咳, 咳声短促。肺络受损, 血溢脉外, 故见痰中有时带血, 色鲜红, 而胸部隐隐闷痛。阴虚生内热, 虚热内灼, 故见午后手足心热, 皮肤干灼, 口干咽燥。舌边尖红, 苔薄, 脉细数是阴虚有

热之象。辨为肺阴亏损型肺癆, 当滋阴润肺, 治以月华丸。故选 C。

39. C. 对违反规定收受临床促销费、开单费等回扣行为的医疗单位, 卫生行政部门可以给予以下处罚: ①没收违法所得; ②二、三级医院黄牌警告限期改正; ③一级医院停业整顿; ④取消职工医疗保险定点单位资格。故选 C。

40. B. 《丹溪心法》中论述: “怔忡者血虚, 怔忡无时, 血少者多, 有思虑便动, 属虚。时作时止者, 痰因火动, 瘦人多因是血少, 肥人属痰, 寻常者多是痰。”由此知怔忡根本原因是血虚和痰火。故选 B。

41. A. 哮喘发作时的基本病机为“伏痰”遇感引触, 痰随气升, 气因痰阻, 相互搏结, 壅塞气道, 气管痉挛, 通畅不利, 肺气宣降失常, 引动停极之痰, 而致痰鸣如吼, 气息喘促。故选 A。

42. E. 惊悸发病, 多与情绪因素有关, 可由骤遇惊恐, 忧思恼怒, 悲哀过级或过度紧张而诱发, 多为阵发性, 病来虽速, 病情较轻, 实证居多, 病势轻浅, 可自行缓解, 不发时如常人。而怔忡多由久病体虚、心脏受损所致, 无精神因素亦可发生, 常持续心悸, 心中惕惕, 不能自控, 活动后加重, 每属虚证, 或虚中夹实, 病来虽渐, 病情较重, 不发时亦可兼见脏腑虚损症状。故选 E。

43. C. 虚里按之弹手, 洪大而搏, 或绝而不应者, 是心肺气绝, 属于危候。故选 C。

44. A. 尺肤诊病中, 尺肤凉而脉细小者, 多为泄泻、少气。故选 A。

45. C. 小儿疾病的诊断方法, 与临床其他各科一样, 均运用望、闻、问、切 4 种不同的诊查手段进行诊断和辨证。因乳婴儿不会说话, 较大儿童虽已会说话, 但也不能正确叙述自己的病情, 加上就诊时常啼哭吵闹, 影响气息脉象, 故小儿诊法既主张四诊合参, 又特别重视望诊。故选 C。

46. A. 相使就是一种药物为主, 另一种药物为辅, 两药合用, 辅药可提高主药的功效。大黄配芒硝, 大黄为清热泻火、泻热通便的主药, 芒硝长于润燥通便, 可以增强大黄峻下热结、排除燥屎的作用。因此大黄配芒硝是相使。相须是两种功效类似的药物配合应用, 可以增强原有药物的功效。大黄与芒硝作用并不类似, 因此 B 错误。故选 A。

47. A. 产后 1 周称“新产后”; 产后 1 个月称“小满月”; 产后百日称“大满月”。故选 A。