

2018

**国家执业医师
资格考试指定用书**

协和临床执业助理医师资格考试 押题密卷

刘文娜 主编
程少贵

6套押题密卷，1800道考题，逐题解析

扫描封底二维码，免费
赠送40小时视频课程、
4000余个必备历年高频考点

阿虎医考
40小时视频课程
★
封底赠



中国协和医科大学出版社

2018 年

国家执业医师资格考试指定用书

协和临床执业助理医师 资格考试押题密卷

主 编 刘文娜 程少贵

副主编 程 畅 杨华楠 吴 迪 徐云兴 周长记
肖 辉 郑海珊 彭联印 刘 靖 刘 姝
刘宽浩 童 虎 王玉华 常利普 余 真
韩清晓 李红明 赵 莹 刘学晶 张昊晴
刘远征 王国俊

协和密卷 融合考点
六套试题 题题解析
精心编排 助力执考



中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

协和临床执业助理医师资格考试押题密卷. 2018 年 / 刘文娜, 程少贵主编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-5679-0972-4

I. ①协… II. ①刘… ②程… III. ①临床医学-资格考试-习题集 IV. ①R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 295219 号

国家执业医师资格考试指定用书
协和临床执业助理医师资格考试押题密卷 (2018 年)

主 编: 刘文娜 程少贵
责任编辑: 张 宇

出版发行: 中国协和医科大学出版社
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260431)

网 址: www.pumcp.com
经 销: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 三河市华晨印务有限公司

开 本: 850×1168 1/16 开
印 张: 19.5
字 数: 620 千字
版 次: 2018 年 1 月第 1 版
印 数: 2018 年 1 月第 1 次印刷
定 价: 51.00 元

ISBN 978-7-5679-0972-4

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

目 录

协和临床执业助理医师资格考试押题密卷 (一)	(1)
第一单元	(1)
A ₁ 型选择题	(1)
A ₂ 型选择题	(9)
B ₁ 型选择题	(20)
A ₃ /A ₄ 型选择题	(22)
第二单元	(26)
A ₁ 型选择题	(26)
A ₂ 型选择题	(34)
B ₁ 型选择题	(46)
A ₃ /A ₄ 型选择题	(48)
协和临床执业助理医师资格考试押题密卷 (二)	(51)
第一单元	(51)
A ₁ 型选择题	(51)
A ₂ 型选择题	(60)
B ₁ 型选择题	(72)
A ₃ /A ₄ 型选择题	(75)
第二单元	(78)
A ₁ 型选择题	(78)
A ₂ 型选择题	(87)
B ₁ 型选择题	(99)
A ₃ /A ₄ 型选择题	(102)
协和临床执业助理医师资格考试押题密卷 (三)	(106)
第一单元	(106)
A ₁ 型选择题	(106)
A ₂ 型选择题	(114)
B ₁ 型选择题	(125)
A ₃ /A ₄ 型选择题	(128)
第二单元	(131)
A ₁ 型选择题	(131)
A ₂ 型选择题	(139)
B ₁ 型选择题	(150)
A ₃ /A ₄ 型选择题	(153)



协和临床执业助理医师资格考试押题密卷 (四) (157)

第一单元 (157)

A₁ 型选择题 (157)A₂ 型选择题 (163)B₁ 型选择题 (173)A₃/A₄ 型选择题 (175)

第二单元 (182)

A₁ 型选择题 (182)A₂ 型选择题 (190)B₁ 型选择题 (201)A₃/A₄ 型选择题 (204)

协和临床执业助理医师资格考试押题密卷 (五) (208)

第一单元 (208)

A₁ 型选择题 (208)A₂ 型选择题 (219)B₁ 型选择题 (228)A₃/A₄ 型选择题 (231)

第二单元 (233)

A₁ 型选择题 (233)A₂ 型选择题 (243)B₁ 型选择题 (255)A₃/A₄ 型选择题 (258)

协和临床执业助理医师资格考试押题密卷 (六) (260)

第一单元 (260)

A₁ 型选择题 (260)A₂ 型选择题 (268)B₁ 型选择题 (278)A₃/A₄ 型选择题 (281)

第二单元 (284)

A₁ 型选择题 (284)A₂ 型选择题 (292)B₁ 型选择题 (302)A₃/A₄ 型选择题 (304)

协和临床执业助理医师资格考试 押题密卷 (一)

第一单元

A₁ 型选择题 (1~59 题)

答题说明

每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 胸骨后甲状腺肿的治疗首选

- A. 甲状腺手术
- B. 抗甲状腺药物
- C. 复方碘剂
- D. 放射性碘
- E. 普萘洛尔

【参考答案】A

【考点精炼】胸骨后甲状腺肿的治疗原则

【全真解析】记忆题。胸骨后甲状腺肿随甲状腺逐渐增大会出现多种压迫症状, 久病者可继发甲亢, 应选择甲状腺双侧次全切手术治疗。故选 A。

2. 脑梗死包括

- A. 脑栓塞和脑血栓形成
- B. 短暂性脑缺血发作和脑血栓形成
- C. 脑出血和蛛网膜下腔出血
- D. 脑栓塞和脑出血
- E. 脑出血和脑血栓形成

【参考答案】A

【考点精炼】脑梗死的病因病机

【全真解析】分析题。脑梗死又称缺血性卒中。系各种原因所致局部脑组织血液供应障碍, 导致脑组织缺血缺氧性坏死, 进而产生临床上对应神经功能缺失表现。脑梗死依据发病机制不同分为脑血栓形成、脑栓塞和腔隙性脑梗死等类型, 其中脑血栓形成是脑梗死最常见的类型, 约占全部脑梗死的 60%。故选 A。

3. 患者在空旷的操场上散步突然听到两个声音

为患者衣着是否暴露而争吵不休, 各说各理, 而此时周围并无他人, 这个症状是

- A. 思维化声
- B. 争论性幻听
- C. 评论性幻听
- D. 思维鸣响
- E. 命令性幻听

【参考答案】B

【考点精炼】幻听

【全真解析】分析题。本例患者在空旷的操场上散步突然听到两个声音为患者衣着是否暴露而争吵不休, 属于争论性幻听, 故选 B。

4. 下列关于幻觉的叙述, 最准确的是

- A. 错误的感知体验
- B. 虚幻的知觉体验
- C. 歪曲的知觉体验
- D. 歪曲的感觉体验
- E. 虚幻的感觉体验

【参考答案】B

【考点精炼】幻觉

【全真解析】记忆题。幻觉是指虚幻的知觉体验, 故选 B。

5. 关于胎膜早破, 正确的描述是

- A. 胎膜早破要立即剖宫产
- B. 双胎妊娠易发生胎膜早破
- C. 足月胎膜早破不需要任何处理
- D. 生殖道感染是其唯一原因

E. 指临产后发生的胎膜破裂

【参考答案】B

【考点精炼】胎膜早破的病因及处理

【全真解析】记忆题。胎膜在临产前自然破裂者称为胎膜早破。常见原因有①生殖道感染。②羊膜腔压力增加，如双胎妊娠、羊水过多、巨大胎儿。③胎膜受力不均，如胎位异常、头盆不称。④胎膜发育不良。⑤宫颈内口松弛。⑥机械性刺激，如创伤、妊娠晚期性交等。妊娠不足35周、不伴感染，羊水深度 $\geq 3\text{cm}$ 者考虑期待疗法。已临产、胎肺成熟、胎儿窘迫或继发感染应及时终止妊娠。因此A、C、D、E均有误，故选B。

6. 滴虫阴道炎的白带特点是

- A. 水样白带
- B. 白色稠厚呈凝乳或豆渣样
- C. 血性白带
- D. 均质、黏稠、有恶臭味
- E. 稀薄脓性泡沫状白带

【参考答案】E

【考点精炼】滴虫阴道炎发病特点

【全真解析】记忆题。滴虫阴道炎白带可呈稀薄脓性泡沫状，故选E。外阴阴道假丝酵母菌阴道病白带呈白色稠厚呈凝乳或豆渣样，细菌性阴道病白带均质、黏稠、有恶臭味。

7. 对于月经不规律的孕妇推算预产期相对准确的是

- A. 根据末次月经干净的日期
- B. 根据早孕反应开始的时间
- C. 根据末次月经来源的日期
- D. 根据胎动开始出现的时间
- E. 根据妊娠早期B超测得的胚胎大小

【参考答案】E

【考点精炼】推算预产期

【全真解析】记忆题。对于月经规则的孕妇推算预产期：可根据末次月经第1天时间，月份减3或加9，日期加7；如末次月经不清推算预产期以妊娠早期B超测得胚胎大小来推算最为准确。故选E。

8. 导致偏瘫的最常见的疾病是

- A. 吉兰-巴雷综合征
- B. 癫痫
- C. 急性脊髓炎
- D. 缺血性卒中
- E. 蛛网膜下腔出血

【参考答案】D

【考点精炼】偏瘫最常见的原因

【全真解析】记忆题。发病后出现明显偏瘫、失

语、脑神经麻痹等局部体征，常为缺血性脑卒中（脑血栓、脑栓塞）的主诉。故选D。

9. 苯丙酮尿症属于

- A. 常染色体隐性遗传病
- B. 性染色体显性遗传病
- C. 常染色体显性遗传病
- D. 性染色体隐性遗传病
- E. 常染色体畸变疾病

【参考答案】A

【考点精炼】苯丙酮尿症的病因

【全真解析】记忆题。苯丙酮尿症为常染色体隐性遗传病。故选A。

10. 早期子宫内膜癌首选的治疗方式是

- A. 内分泌治疗
- B. 中药治疗
- C. 化学药物治疗
- D. 放射治疗
- E. 手术治疗

【参考答案】E

【考点精炼】早期子宫内膜癌首选的治疗原则

【全真解析】记忆题。子宫内膜癌大多生长缓慢，局限于子宫内膜或子宫腔内时间较长，其治疗原则是以手术治疗为主。故选E。

11. 可以导致肾前性急性肾损伤的因素为

- A. 应用马兜铃酸类中药
- B. 应用庆大霉素
- C. 输尿管结石
- D. 大量丢失体液
- E. 前列腺增生

【参考答案】D

【考点精炼】肾前性急性肾损伤的发病因素

【全真解析】马兜铃酸类中药、庆大霉素具有肾毒性，可直接损害肾脏；输尿管结石和前列腺增生可致尿潴留，引起肾后性肾损伤；大量丢失体液导致肾缺血，是引起肾前性急性肾损伤的因素。故选D。

12. 尿相差显微镜检查示正常红细胞的情况最属于

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. Alport综合征
- E. 急进性肾小球肾炎

【参考答案】C

【考点精炼】血尿的病因

【全真解析】分析记忆题。肾小球源性血尿特征

即全程血尿、无痛性血尿、尿中无凝血,可见红细胞管型,以变形红细胞(>70%)为主。A、B、E均为肾小球疾病,可引起肾小球源性血尿。Alport综合征又称眼-耳-肾综合征,为遗传性肾炎中最常见的一种,临床表现似慢性肾小球肾炎。而肾盂肾炎尿中红细胞不经过肾小管,无变形改变。故选C。

13. 关于妊娠合并心脏病的描述,正确的是

- A. 均应剖宫产终止妊娠
- B. 所有孕妇均可母乳喂养
- C. 容易发生心力衰竭
- D. 有心力衰竭史者可以妊娠
- E. 最危险的时期是产褥期后2周

【参考答案】C

【考点精炼】妊娠合并心脏病的发病特点

【全真解析】分析记忆题。妊娠合并心脏病易发心衰时期为妊娠32~34周、分娩期及产后3日,最危险的时期是分娩期,尤其是第二产程。心功能I、II级者在医生严密监护下可以承担妊娠,亦可母乳喂养;心功能III、IV级或既往发生过心衰者终身不宜再生育。心功能I、II级的产妇,在产科情况无异常、胎儿安全的条件下可选择经阴道分娩。但是要注意休息,避免用腹压,采取阴道助产术尽量缩短第二产程。A、B、D、E均有误,故选C。

14. 小儿麻疹最常见的并发症是

- A. 结膜炎
- B. 喉炎
- C. 肺炎
- D. 脑炎
- E. 心肌炎

【参考答案】C

【考点精炼】小儿麻疹最常见的并发症

【全真解析】记忆题。小儿麻疹的并发症有喉、气管、支气管炎,麻疹,心肌炎,麻疹脑炎,营养障碍,结核病恶化等。其中最常见的并发症是肺炎。多见于5岁以下小儿,可发生于麻疹各期,中毒症状重,病死率高,占麻疹死因90%以上。故选C。

15. 葡萄糖耐量试验结果示空腹血糖5.5mmol/L,葡萄糖负荷后2小时血糖8.5mmol/L。诊断是

- A. 糖耐量减低
- B. 2型糖尿病
- C. 1型糖尿病
- D. 正常血糖
- E. 空腹血糖受损

【参考答案】A

【考点精炼】糖尿病的诊断

【全真解析】记忆题。空腹血糖(FPG)<6.0

mmol/L为正常,空腹血糖达6.1~7.0mmol/L为空腹血糖受损。葡萄糖耐量试验(OGTT):7.8mmol/L餐后2小时血糖<11.1mmol/L为糖耐量减低(IGT)。若空腹血糖 ≥ 7.00 mmol/L,和(或)餐后2小时血糖 ≥ 11.1 mmol/L即为糖尿病。故选A。

16. 我国诊断巨大胎儿的最低体重标准是

- A. 4000g
- B. 5000g
- C. 4500g
- D. 3000g
- E. 3500g

【参考答案】A

【考点精炼】巨大儿体重最低标准

【全真解析】记忆题。体重达到或超过4000g称为巨大儿,因此我国诊断巨大胎儿最低体重标准4000g,故选A。

17. 腕部正中神经损伤后出现

- A. 猿手畸形
- B. 伸指功能障碍
- C. 手指内收、外展障碍
- D. 垂腕畸形
- E. 爪形手畸形

【参考答案】A

【考点精炼】腕部正中神经损伤后的临床表现

【全真解析】记忆题。腕部正中神经损伤后,所支配的鱼际肌和蚓状肌麻痹及所支配的手部感觉障碍,临床表现主要有拇指对掌障碍和手的桡侧半感觉障碍(猿形手)。故选A。

18. 生殖道感染淋病奈瑟菌最常见的临床表现是

- A. 输卵管炎
- B. 盆腔腹膜炎
- C. 宫颈黏膜炎
- D. 子宫内膜炎
- E. 输卵管积液

【参考答案】C

【考点精炼】生殖道感染淋病奈瑟菌的临床表现

【全真解析】分析题(易错题)。淋病奈瑟菌绝大多数通过性交经黏膜感染,以宫颈管受感染最多见。宫颈黏膜炎表现为阴道脓性分泌物增多,外阴痒,故选C。上生殖道感染是淋病奈瑟菌上行感染盆腔脏器,可引起子宫内膜炎、输卵管炎、输卵管积液、盆腔腹膜炎,甚至形成输卵管卵巢脓肿,称为女性并发症淋病。

19. 不符合新生儿病理性黄疸特点的是

- A. 黄疸退而复现
- B. 每日血清胆红素升高 $>85\mu\text{mol/L}$ (5mg/dl)



- C. 生后 24 小时内出现黄疸
D. 黄疸持续时间 < 1 周
E. 血清胆红素 > 221 $\mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl)

【参考答案】D

【考点精炼】新生儿病理性黄疸的特点

【全真解析】理解记忆题。新生儿病理性黄疸的特点：①黄疸出现过早，常在生后 24 小时内出现。②黄疸程度过重，足月儿 > 221 $\mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl)，早产儿 > 257 $\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)，或每日上升 > 85 $\mu\text{mol/L}$ ；或血清结合胆红素 > 34 $\mu\text{mol/L}$ (5mg/dl)。③黄疸持续时间过长，足月儿 > 2 周，早产儿 > 4 周。④黄疸退而复现或进行性加重。⑤可伴有引起病理性黄疸的疾病表现。出现以上任何一项均可诊断新生儿病理性黄疸。故选 D。

20. 下列手术属于限期手术的是
A. 十二指肠球部溃疡穿孔修复术
B. 胃癌根治术
C. 可复性腹股沟疝修补术
D. 肠梗阻剖腹探查术
E. 背部脂肪瘤切除术

【参考答案】B

【考点精炼】限期手术适应证

【全真解析】分析记忆题。按照手术的时限性，外科手术分为 3 种：①急症手术，如外伤性肠破裂、肝脾破裂、十二指肠球部溃疡穿孔修复术、肠梗阻剖腹探查术，必须迅速实施手术。②限期手术，各种恶性肿瘤根治术应在尽可能短的时间内手术。③择期手术，可选择合适时机进行手术，如良性肿瘤切除术，腹股沟疝修补术等。胃癌根治术属于限期手术，故选 B。

21. 弹响指的基本病理改变是
A. 腱鞘炎
B. 筋膜炎
C. 滑囊炎
D. 滑膜炎
E. 肌腱末端炎

【参考答案】A

【考点精炼】弹响指的基本病理改变

【全真解析】记忆题。狭窄性腱鞘炎，多发生于拇短伸肌和拇长展肌腱鞘，患指表现为屈伸功能障碍。当弯曲患指时，突然停留在半弯曲位，像被突然“卡”住一样，用另一手协助扳动后，手指又能活动，产生像扳枪栓样动作及弹响，所以又被称为“扳机指”或“弹响指”，故选 A。

22. 下列处理中，不属于现场急救措施的是
A. 判断伤者意识情况

- B. 伤口清创缝合
C. 保持呼吸道通畅
D. 迅速将伤者送往附近医院
E. 制动骨折部位

【参考答案】B

【考点精炼】现场急救措施

【全真解析】记忆题。急救的目的是抢救生命，现场急救包括复苏、通气、止血、包扎、固定和后送等。B 项伤口清创缝合属于进一步救治，不属于现场急救。故选 B。

23. 与闭合性骨折比较，开放性骨折最大的危险是

- A. 皮下组织严重损伤
B. 骨与软组织感染
C. 皮肤破裂
D. 骨不愈合
E. 肌肉严重损伤

【参考答案】B

【考点精炼】开放性骨折最大的危险

【全真解析】分析记忆题。开放性骨折最大的危险是由于创口被污染，大量细菌侵入，并在局部迅速繁殖，导致骨与软组织感染，可致骨髓炎、软组织坏死和死骨形成，严重影响骨折愈合。故选 B。

24. 骨筋膜室综合征处理不当的严重后果是

- A. 缺血性骨坏死
B. 骨化性肌炎
C. 缺血性肌挛缩
D. 关节僵硬
E. 感染

【参考答案】C

【考点精炼】骨筋膜室综合征的严重后果

【全真解析】分析记忆题。骨筋膜室综合征即由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜室内肌肉和神经因急性缺血、缺氧而产生的一系列早期综合征。最多见于前臂掌侧和小腿。骨筋膜室综合征处理不当，短时间而程度较重的不完全缺血，恢复血供后由于大部分肌肉坏死，会形成挛缩畸形，严重影响肢体功能。故选 C。

25. 慢性失血性贫血的外周血实验室检查特点是

- A. 正细胞正色素性贫血
B. 小细胞低色素性贫血
C. 小细胞正色素性贫血
D. 大细胞正色素性贫血
E. 大细胞低色素性贫血

【参考答案】B

【考点精炼】慢性失血性贫血外周血检查特点



【全真解析】记忆题。慢性失血性贫血外周血实验室检查特点为小细胞性贫血。红细胞形态变化: $MCV < 80fl$, $MCH < 26pg$, $MCHC 32\% \sim 35\%$ 。故选 B。

26. 强迫障碍最有效的心理治疗是

- A. 咨客中心治疗
- B. 动力性心理治疗
- C. 认知行为治疗
- D. 结构式家庭治疗
- E. 人际心理治疗

【参考答案】C

【考点精炼】强迫障碍最有效的心理治疗

【全真解析】记忆题。认知行为治疗是强迫障碍最有效的心理治疗。故选 C。

27. 疟疾的传播途径是

- A. 蚊虫叮咬
- B. 蜱虫叮咬
- C. 尾蚴叮咬
- D. 体虱叮咬
- E. 跳蚤叮咬

【参考答案】A

【考点精炼】疟疾的传播途径

【全真解析】记忆题。蚊虫叮咬是疟疾的主要传播途径。故选 A。

28. 可导致继发性甲状腺功能减退症的疾病是

- A. 希恩综合征
- B. 萎缩性甲状腺炎
- C. 桥本甲状腺炎
- D. 产后甲状腺炎
- E. 亚急性甲状腺炎

【参考答案】C

【考点精炼】桥本甲状腺炎的发病特点

【全真解析】分析记忆题。慢性淋巴细胞性甲状腺炎(桥本甲状腺炎)多见于中年人。女性发病率显著高于男性,起病隐匿而缓慢。甲状腺肿大呈对称性,伴有锥体叶肿大,腺体表面可呈分叶状,质坚韧如橡皮,甲状腺功能多正常,但有的患者可伴有甲亢,见于年轻患者,称为桥本甲亢,后期可出现甲减症,少数呈黏液性水肿。故选 C。

29. 细菌性泌尿系感染最重要的诊断依据是

- A. 静脉尿路造影
- B. 尿频、尿急、尿痛
- C. 腰痛、发热
- D. 尿细菌培养和菌落计数
- E. 尿常规

【参考答案】D

【考点精炼】细菌性泌尿系感染重要的诊断依据

【全真解析】记忆题。尿细菌培养和菌落计数是细菌性泌尿系感染最重要的诊断依据,故选 D。

30. 子宫脱垂最主要的病因是

- A. 激素水平低落
- B. 盆底组织退行性改变
- C. 长期腹压增加
- D. 盆底组织发育不良
- E. 分娩损伤

【参考答案】E

【考点精炼】子宫脱垂最主要的病因

【全真解析】记忆题。子宫脱垂最主要的病因是分娩损伤,其他病因包括腹压增加、先天发育异常、营养不良及衰老等。故选 E。

31. 下列与子宫收缩过强无关的疾患是

- A. 羊水栓塞
- B. 急产
- C. 胎儿窘迫
- D. 产道裂伤
- E. 胎盘滞留

【参考答案】E

【考点精炼】子宫收缩过强的原因

【全真解析】分析题。子宫收缩过强可以引起急产、产道裂伤、胎儿窘迫以及羊水栓塞,但胎盘滞留则由于宫收缩乏力所致。故选 E。

32. 早期妊娠最具特异性的症状或体征是

- A. 乳房增大
- B. 停经 10 天以上
- C. 尿频
- D. 子宫增大变软
- E. 晨起呕吐

【参考答案】D

【考点精炼】早期妊娠的临床表现

【全真解析】记忆题。子宫增大变软,出现黑加征是早期妊娠最具特异性的体征。故选 D。

33. 盆腔炎性疾病的最低诊断标准是

- A. 血 C 反应蛋白升高
- B. 体温超过 $38.3^{\circ}C$
- C. 红细胞沉降率升高
- D. 宫颈脓性分泌物
- E. 宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛

【参考答案】E

【考点精炼】盆腔炎的诊断标准

【全真解析】记忆题。盆腔炎最低诊断标准即宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛。故选 E。附加标准:体温超过 $38.3^{\circ}C$ (口表);宫颈或阴道异常黏液脓性分泌物;阴道分泌物生理盐水涂片见大量白细



胞；红细胞沉降率升高；血C反应蛋白升高；实验室证实的宫颈淋病奈瑟菌或衣原体阳性。特异标准：子宫内膜活检证实子宫内膜炎；阴道超声或磁共振检查显示输卵管增粗、积液，伴有或不伴有盆腔积液；输卵管卵巢肿块等。

34. 脓性指头炎最常见的致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 变形杆菌
- C. 链球菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 拟杆菌

【参考答案】A

【考点精炼】脓性指头炎的致病菌

【全真解析】记忆题。脓性指头炎最常见的致病菌是金黄色葡萄球菌。故选A。

35. 流行性脑脊髓膜炎的典型体征是

- A. 末梢皮肤发凉
- B. 克氏征阳性
- C. 体温 $>40^{\circ}\text{C}$
- D. 颈强直阳性
- E. 皮肤瘀点、瘀斑

【参考答案】E

【考点精炼】流行性脑脊髓膜炎的典型体征

【全真解析】记忆题。流行性脑脊髓膜炎的特征有发热、惊厥、瘀点、瘀斑，故选E。

36. 属于有机磷杀虫药中毒的毒覃碱样症状（M样症状）是

- A. 头晕
- B. 皮肤水疱
- C. 瞳孔缩小
- D. 肌纤维颤动
- E. 昏迷

【参考答案】C

【考点精炼】有机磷杀虫药中毒的毒覃碱样症状（M样症状）

【全真解析】记忆题。有机磷杀虫药中毒的毒覃碱样症状（M样症状）主要因副交感神经末梢兴奋导致脏器平滑肌痉挛、腺体分泌增多和部分交感神经支配的汗腺分泌增多。表现为恶心呕吐、腹痛腹泻、瞳孔缩小、流涎流泪、多汗、心动过缓，严重者出现肺水肿。故选C。

37. 头皮裂伤可在24小时内清创缝合的原因是

- A. 头皮神经丰富
- B. 头皮具有垂直纤维带
- C. 头皮血供丰富
- D. 头皮坚韧

E. 头皮富有毛囊结构

【参考答案】C

【考点精炼】头皮裂伤的清创缝合

【全真解析】记忆题。头皮裂伤可在24小时内清创缝合的原因是头皮血供丰富。故选C。

38. 以下关于系统性红斑狼疮临床特点的描述，错误的是

- A. 育龄期妇女多见
- B. 盘状红斑为该病特异性皮疹之一
- C. 关节受累常表现为侵蚀性关节炎
- D. 常有光过敏
- E. 血清中可检测出多种自身抗体

【参考答案】C

【考点精炼】系统性红斑狼疮的临床特点

【全真解析】记忆题。80%系统性红斑狼疮患者有皮肤损伤，其中蝶形红斑和盘形红斑最具特征性，此外光过敏、网状青斑、口腔溃疡、脱发、雷诺现象也是常见表现；关节和肌痛亦是本病常见症状，关节痛多出现在手指、腕、膝、踝等关节，部分伴有肿胀，骨破坏少见。故选C。

39. 小儿腹泻病引起带泡沫豆腐渣样便的病原体是

- A. 轮状病毒
- B. 鼠伤寒沙门菌
- C. 致病性大肠埃希菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 白色念珠菌

【参考答案】E

【考点精炼】小儿腹泻的病因及特点

【全真解析】记忆题。白色念珠菌肠炎多发生于体弱、营养不良小儿，长期滥用广谱抗生素或肾上腺皮质激素者。口腔内常伴有鹅口疮。大便次数增多，色稀黄或发绿，泡沫较多，带黏液有时可见豆腐渣样细块（菌落），大便在镜下可见真菌孢子和假菌丝，做粪便真菌培养有助于鉴别。故选E。

40. 发热3天，热退出皮疹。最可能的诊断是

- A. 水痘
- B. 猩红热
- C. 麻疹
- D. 幼儿急诊
- E. 风疹

【参考答案】D

【考点精炼】幼儿急诊

【全真解析】记忆题。幼儿急诊特点即发热3~5天，热退疹出，多见于6~18个月小儿。故选D。

41. 鼻饲肠内营养时，最易发生的并发症是



- A. 急性胰腺炎
- B. 肠易激综合征
- C. 急性胆管炎
- D. 吸入性肺炎
- E. 急性胃肠炎

【参考答案】D

【考点精炼】鼻饲并发症

【全真解析】记忆题。鼻饲长的并发症不多。主要是误吸，由于患者年老体弱，昏迷或存在胃潴留，当通过鼻胃管输入营养液时，可因呃逆后误吸而导致吸入性肺炎。这是较严重的并发症。其他并发症包括腹胀、腹泻等，发生率较低。

42. 针对糖尿病患者的术前准备，下列正确的是
- A. 口服长效降糖药者，应在术前1天停药
 - B. 既往用胰岛素者，手术日晨也需要胰岛素
 - C. 既往仅饮食控制病情者，改用胰岛素控制
 - D. 禁食患者需要葡萄糖加胰岛素维持血糖值较低水平
 - E. 合并酮症酸中毒者，暂不实施择期手术

【参考答案】E

【考点精炼】糖尿病患者的术前准备

【全真解析】理解记忆题。糖尿病患者的术前准备：①仅以饮食疗法控制病情者，术前不需特殊准备。②口服降糖药者，应继续服用至手术前一天晚上，如服用长效降糖药，应在术前2~3天停药。③禁食患者需静脉注射葡萄糖加胰岛素，维持血糖轻度增高状态（5.6~11.2mmol/L）。④平素用胰岛素者，术前应以葡萄糖和胰岛素维持正常糖代谢，术日晨停用胰岛素。⑤伴有酮症酸中毒或高渗性昏迷患者，应为手术禁忌。需抢救治疗接受急诊手术者，应当尽可能纠正酸中毒、血容量不足、电解质失衡（特别是低钾血症）。故E正确。糖尿病患者术中应根据血糖水平静脉滴注胰岛素控制血糖。

43. 心电图表现为高尖T波的电解质紊乱是

- A. 高钙血症
- B. 低钙血症
- C. 高钾血症
- D. 低磷血症
- E. 低钾血症

【参考答案】C

【考点精炼】高钾血症心电图表现

【全真解析】记忆题。高钾血症心电图表现为高尖T波，QT间期缩短。故选C。

44. 膀胱癌最常见的症状是

- A. 尿潴留
- B. 尿痛

- C. 排尿困难
- D. 尿频、尿急
- E. 血尿

【参考答案】E

【考点精炼】膀胱癌最常见的症状

【全真解析】记忆题。膀胱癌最常见和最早出现的症状为间歇性无痛性全程肉眼血尿，故选E。

45. 急性尿潴留患者首选的处理方法是

- A. 膀胱穿刺造瘘
- B. 耻骨上膀胱穿刺抽吸尿液
- C. 热敷
- D. 针灸
- E. 导尿管导尿

【参考答案】E

【考点精炼】急性尿潴留的处理方法

【全真解析】记忆题。急性尿潴留患者首选的处理方法为导尿管导尿，故选E。

46. 常见贫血的临床表现不包括

- A. 面色苍白
- B. 活动后心悸
- C. 头晕
- D. 乏力
- E. 皮疹

【参考答案】E

【考点精炼】贫血的临床表现

【全真解析】记忆题。贫血的临床表现有面色苍白、头晕、疲乏无力、活动后心悸等，不包括皮疹。故选E。

47. 男性老年人急性尿潴留最常见的病因是

- A. 膀胱颈挛缩
- B. 尿道狭窄
- C. 前列腺癌
- D. 膀胱肿瘤
- E. 前列腺增生

【参考答案】E

【考点精炼】老年男性急性尿潴留的常见病因

【全真解析】记忆题。男性老年人急性尿潴留最常见病因是前列腺增生。故选E。

48. 唐氏综合征最常见的标准型染色体核型是

- A. 46, XX (或 XY), -21, +t (q21q21)
- B. 46, XX (或 XY), -22, +t (q21q21)
- C. 46, XX (或 XY), -14, +t (q14q21)
- D. 47, XX (或 XY), +21
- E. 46, XX (或 XY) / 47, XX (或 XY), +21

【参考答案】D

【考点精炼】唐氏综合征的标准型染色体核型



【全真解析】记忆题。唐氏综合征最常见的标准型染色体核型为 47, XX (或 XY), +21, 故选 D。

49. 对于无心脏炎的急性风湿热患儿抗风湿治疗首选的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 卡托普利
- C. 泼尼松
- D. 青霉素
- E. 甲泼尼龙

【参考答案】A

【考点精炼】急性风湿热患儿的抗风湿治疗

【全真解析】记忆题。心脏炎时宜早期使用糖皮质激素。无心脏炎的患儿可用非甾体抗炎药, 如阿司匹林, 每日 100mg/kg, 最大量 $\leq 3\text{g/d}$, 分次服用, 2 周后逐渐减量, 疗程 4~8 周。故选 A。

50. 治疗新生儿低体温的关键是

- A. 给氧
- B. 纠酸
- C. 补液
- D. 复温
- E. 利尿

【参考答案】D

【考点精炼】新生儿低体温的治疗

【全真解析】记忆题。治疗新生儿低体温的关键是复温, 故选 D。轻、中度 (肛温 $\geq 30^\circ\text{C}$) 患儿立即置入 30°C 暖箱内, 调节箱温 $30 \sim 34^\circ\text{C}$, 力争患儿 6~12 小时体温恢复正常。

51. 以下属于糖尿病急性并发症的是

- A. 急性心肌梗死
- B. 高渗高血糖综合征
- C. 脑血管意外
- D. 肾衰竭
- E. 糖尿病视网膜病变

【参考答案】B

【考点精炼】糖尿病急性并发症

【全真解析】分析题。糖尿病急性并发症包括糖尿病酮症酸中毒和高渗高血糖综合征。故选 B。

52. 关于子宫内膜周期性变化的叙述, 正确的是

- A. 子宫内膜从组织形态学上可分为增殖期、分泌期、月经期 3 个阶段
- B. 雌激素、孕激素撤退后增殖期子宫内膜脱落形成月经
- C. 在孕激素作用下子宫内膜出现增殖期变化
- D. 月经期子宫内膜基底层崩解脱落
- E. 在雌激素作用下子宫内膜出现分泌期变化

【参考答案】A

【考点精炼】子宫内膜的周期性变化

【全真解析】子宫内膜受卵巢激素影响发生周期性变化, 经历增殖期 (雌激素影响)、分泌期 (雌激素、孕激素影响)、月经期 (激素撤退) 3 个阶段, 故选 A。

53. 患者将一盏球形灯看成是一副娃娃脸的画面, 此现象是

- A. 视物变形
- B. 幻视
- C. 错视
- D. 非真实感
- E. 妄想

【参考答案】C

【考点精炼】错视

【全真解析】记忆题。错视, 又称视错觉, 意为视觉上的错觉。属于生理上的错觉, 特别是关于几何学的错视种类多。视错就是当人观察物体时, 基于经验主义或不当的参照形成的错误的判断和感知。视错是指观察者在客观因素干扰下或者自身的心理因素支配下, 对图形产生的与客观事实不相符的错误的感觉。患者将一盏球形灯看成是一副娃娃脸的画面, 此现象是错视。故选 C。

54. 伤后表现为“餐叉”样畸形的是

- A. Smith 骨折
- B. 尺神经损伤
- C. Colles 骨折
- D. 正中神经损伤
- E. 桡神经损伤

【参考答案】C

【考点精炼】Colles 骨折的临床特点

【全真解析】记忆题。Colles 骨折多为腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤。伤后可出现“餐叉样” (侧面观), “枪刺样” (正面观) 畸形, X 线拍片可见骨折远端向桡侧、背侧移位, 近段向远侧移位。故选 C。

55. 颅底骨折通常的诊断依据是

- A. 头颅 X 线平片
- B. 脑脊液鼻漏或耳漏
- C. 头颅常规 CT
- D. 昏迷
- E. 头痛伴呕吐

【参考答案】B

【考点精炼】颅底骨折的诊断依据

【全真解析】分析记忆题。颅底骨折累及脑膜、骨膜及鼓膜破裂, 可合并脑脊液鼻漏或耳漏, 是颅底骨折重要的诊断依据。故选 B。



56. 不具有明确手术指征的子宫肌瘤是

- A. 黏膜下肌瘤, 月经量增多
- B. 后壁肌瘤, 伴腹坠、便秘
- C. 多发性肌瘤, 无症状
- D. 肌瘤短期内增长较快
- E. 前壁肌瘤, 伴尿频、尿急

【参考答案】C

【考点精炼】子宫肌瘤手术指征

【全真解析】记忆题。子宫肌瘤手术指征: ①肌瘤较大达3个月妊娠大小者。②经血过多治疗效果不佳, 贫血较重者; 出现大、小便困难等压迫症状者; 肌瘤位置低或为子宫颈肌瘤或为阔韧带肌瘤, 已压迫输尿管致输尿管、肾盂出现水肿者。③黏膜下子宫肌瘤脱出子宫颈口发生感染者。④浆膜下肌瘤发生扭转者。⑤肌瘤增大迅速, 怀疑有恶变者。但不包括C项。故选C。

57. 新生儿生理性体重下降发生的时期是在出生后

- A. 1~2日内
- B. 8~10日内
- C. 5~7日内
- D. 11~15日内
- E. 3~4日内

【参考答案】E

【考点精炼】新生儿生理性体重下降

【全真解析】记忆题。生理性体重下降是指新生儿出生后2~4天体重下降6%~9%, 最多不超过

10%。足月儿出生后7天、早产儿出生后10天恢复至出生体重。故选E。

58. 关于酒精戒断综合征的处理, 正确的是

- A. 短期使用苯二氮草类药物进行代替治疗
- B. 常规使用抗癫痫药物预防癫痫发生
- C. 一般无需补充B族维生素
- D. 长期使用抗精神病药物预防震颤谵妄
- E. 常规使用抗精神病药物预防精神症状

【参考答案】A

【考点精炼】酒精戒断综合征的处理

【全真解析】记忆题。酒精戒断综合征主要表现为震颤、谵妄、抽搐、意识混乱、精神运动和自主神经过度兴奋。可短期使用苯二氮草类药物(镇静、催眠及抗惊厥)进行代替治疗, 病情稳定后逐渐减少药量以致停药。故选A。

59. 不符合化脓性脑膜炎脑脊液改变的是

- A. 白细胞总数 $\geq 1000 \times 10^6/L$
- B. 外观浑浊
- C. 糖和氯化物正常
- D. 蛋白增高
- E. 压力增高

【参考答案】C

【考点精炼】化脓性脑膜炎脑脊液的改变

【全真解析】记忆题。化脓性脑膜炎脑脊液的改变即压力增高、外观浑浊、蛋白增高, 白细胞数多 $> 1000 \times 10^6/L$, 以中性粒细胞为主, 糖和氯化物均降低, 涂片可找到致病菌。故C项有误。

A₂型选择题 (60~111题)

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的, 其下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

60. 男, 46岁。9年前体检时发现HBsAg阳性, ALT正常, 之后未定期复查。近4年ALT反复升高, 未予抗病毒治疗。3周前过劳后出现食欲下降, 尿黄, 明显乏力, 牙龈出血。经治疗上述症状无缓解, 且出现腹胀、尿量减少。近3天睡眠颠倒, 有时语无伦次。查体: 注射部位有瘀斑, 腹部移动性浊音阳性, 扑翼样震颤阳性。实验室检查: 血ALT 176U/L, TBil 432 $\mu\text{mol/L}$, 凝血酶原活动度30%。应诊断为

- A. 慢性重型乙型肝炎
- B. 亚急性重型乙型肝炎

- C. 慢性乙型肝炎急性发作
- D. 乙肝肝硬化, 活动期, 失代偿期
- E. 慢性乙型肝炎, 慢性重度

【参考答案】A

【考点精炼】慢性重型乙型肝炎的诊断

【全真解析】分析记忆题。慢性重型肝炎又称慢加急性肝衰竭, 是在慢性肝炎基础上发生的亚急性重型肝炎。患者有精神、神经症状; 肝炎症状急剧加重, 黄疸迅速加深胆红素 $\geq 171 \mu\text{mol/L}$ (10mg/dl), 出现出血、腹水等表现; 凝血酶原活动度低于40%。

本例乙肝患者病情变化及临床表现均符合慢性重型乙型肝炎的特征，故选A。

61. 女，35岁，G₃P₂。性交后出血2个月。妇科检查：外阴、阴道无异常，宫颈可见菜花样肿物，质地糟脆，直径2cm，触血(+)，子宫前位，正常大小，无压痛，双附件无异常。为明确诊断，首选的检查是

- A. HPV检查
- B. 宫颈锥切术
- C. 超声检查
- D. 宫颈活检
- E. 宫颈细胞学检查

【参考答案】D

【考点精炼】子宫颈癌的诊断

【全真解析】分析记忆题。根据患者临床表现，性交后出血，宫颈直径2cm菜花样肿物，质地糟脆，触血(+)，所以考虑子宫颈癌可能性大，为明确诊断应选择宫颈活检，故选D。

62. 男婴，4个月。发热、咳嗽伴喘息2天。查体：T 38.5℃，呼吸急促，可见明显三凹征，双肺可闻及明显哮鸣音，背部可闻及细湿啰音，心率140次/分，律齐，腹稍胀，肝肋下2.5cm。胸部X线片示肺气肿。其最可能的诊断是

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 支气管哮喘
- C. 腺病毒肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 呼吸道合胞病毒肺炎

【参考答案】E

【考点精炼】呼吸道合胞病毒肺炎

【全真解析】综合分析题。呼吸道合胞病毒肺炎是一种小儿常见的间质性肺炎，多发生于婴幼儿。潜伏期4~5天。初期可见咳嗽、鼻塞。2/3的病例有高热，热程为4~10天，轻症病例呼吸困难，神经症状不显著；中、重症者有较明显的呼吸困难、喘憋、口唇青紫及三凹征。胸部听诊多有细小或粗中湿啰音，叩诊一般无浊音，少数有过清音。重者可并发心力衰竭，呼吸功能衰竭。据题例分析患者临床表现符合呼吸道合胞病毒肺炎的诊断，故选E。

63. 男，46岁。发现镜下血尿伴蛋白尿2个月。查体：BP 120/70mmHg，双下肢无水肿。尿沉渣镜检红细胞25~30个/高倍视野，尿蛋白定量0.8g/d，血肌酐75 μmol/L，清蛋白41g/L。B超示双肾大小、形态正常。首先考虑的临床诊断为

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 无症状性血尿和蛋白尿

C. 急进性肾小球肾炎

D. 肾病综合征

E. 慢性肾小球肾炎

【参考答案】B

【考点精炼】无症状性血尿和蛋白尿

【全真解析】分析记忆题。无症状性血尿和(或)蛋白尿，既往国内称为隐匿型肾小球肾炎，系指无水肿、高血压及肾功能损害，而仅表现为肾小球源性血尿和(或)蛋白尿的一组肾小球疾病。本例患者发现镜下血尿伴蛋白尿2个月，血压正常，无水肿，B超示双肾大小形态正常，肾功能正常，符合无症状性血尿和蛋白尿的诊断，故选B。

64. 女，35岁，G₃P₁。放置宫内节育器时出现心悸伴明显腹痛。P 100次/分，BP 90/50 mmHg。为明确诊断，应采取最安全、简便的方法是

- A. 子宫输卵管造影术
- B. 盆腔X线检查
- C. 剖腹探查
- D. 宫腔镜探查术
- E. 盆腔B超检查

【参考答案】E

【考点精炼】放置宫内节育器的并发症

【全真解析】分析题。本例受术者在放置宫内节育器时出现心悸伴明显腹痛，P 100次/分，BP 90/50 mmHg，提示合并子宫穿孔的可能，应立即行B超盆腔检查以明确诊断。故选E。

65. 男，15岁。发热3天，嗜睡1天，于2月6日就诊。查体：T 39℃，P 110次/分，BP 100/70mmHg，下肢皮肤可见少量瘀点，颈抵抗(+)。实验室检查：脑脊液压力210mmH₂O，细胞总数5000×10⁶/L，多核0.90，糖2.2mmol/L，蛋白2g/L。最可能的诊断是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 隐球菌脑膜炎

【参考答案】B

【考点精炼】流行性脑脊髓膜炎的临床表现及诊断

【全真解析】综合分析题。据题意，患者有发热，皮肤瘀点，脑膜刺激征，脑脊液异常(压力增高、细胞数增多尤其中性粒细胞显著增多、蛋白增多、糖降低)，符合流行性脑脊髓膜炎的诊断。故选B。

66. 男，26岁。在工厂被锅炉高温蒸汽烫伤双上肢，伤处红肿明显，有大小不一的水疱形成，内含淡



黄色的澄清液体,创面红润、潮湿。对该患者病情描述正确的是

- A. 患处痛觉迟钝
- B. 愈后一般无色素沉着
- C. 如不感染,1~2周内愈合
- D. 未伤及皮肤的真皮层
- E. 愈后常有瘢痕增生

【参考答案】C

【考点精炼】烧伤的临床表现

【全真解析】综合分析题。患者被锅炉高温蒸汽烫伤双上肢,根据局部体征:患处红肿明显,有大小不一的水疱形成,内含淡黄色清液,创面红润、潮湿,应考虑浅Ⅱ度烧伤,仅伤及真皮浅层,一部分生发层健存,有剧痛和感觉过敏,皮温增高,2周可愈合,愈后不留瘢痕。故选C。

67. 男孩,6岁。右侧阴囊肿块2年。肿块表面光滑,有囊性感,无压痛。卧位时肿块消失,睾丸可触及,透光试验阳性。首先考虑的疾病是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 睾丸,精索鞘膜积液
- C. 睾丸鞘膜积液
- D. 精索鞘膜积液
- E. 交通性鞘膜积液

【参考答案】E

【考点精炼】交通性鞘膜积液

【全真解析】综合分析题。交通性鞘膜积液站立时阴囊肿大,卧位时积液流入腹腔,鞘膜囊缩小或消失,睾丸可触及。据题意分析,患儿右侧阴囊囊性肿块(卧位时肿块消失),透光试验阳性,睾丸可触及,符合交通性鞘膜积液的诊断,故选E。睾丸鞘膜积液,触不到睾丸和附睾;睾丸、精索鞘膜积液时睾丸亦摸不清;精索鞘膜积液,位于腹股沟或睾丸上方,积液的鞘膜囊与睾丸有明显分界;腹股沟斜疝疝块多不透光,不能触及睾丸。

68. 男,56岁。3个月前出现左侧肢体无力,经头颅CT检查,诊断为脑出血。高血压病史11年。查体:脉搏和呼吸正常, BP 150/94 mmHg,神志清,言语清晰,左侧肢体肌张力高,肌力4级,腱反射活跃,左侧 Babinski 征阳性。余神经系统无异常发现。下列长期药物治疗中,对此病有预防作用的是

- A. 他汀类降脂药
- B. 降压药
- C. 阿司匹林
- D. B族维生素
- E. 尼莫地平

【参考答案】B

【考点精炼】高血压并发症的预防

【全真解析】综合分析题。降压治疗的目的是降低高血压患者心脑血管病的发生率,防止并发症。本例患者高血压十余年,3个月前发生过脑出血,查体示脉搏和呼吸正常, BP 150/94 mmHg,神志清,言语清晰,左侧肢体肌张力高,肌力4级,腱反射活跃,左侧 Babinski 征阳性。为预防再发生脑出血,应长期使用降压药,合理控制血压。故选B。

69. 女,16岁。口干、多饮、多尿1周,神志模糊1天。查体: T 36.9℃, P 80次/分, R 26次/分, BP 120/80mmHg,呼吸深,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,呼气中有烂苹果味,心律齐,腹软,无压痛,病理反射阴性。治疗的关键是

- A. 纠正电解质紊乱
- B. 防治并发症
- C. 大量补液
- D. 皮下注射胰岛素
- E. 纠正酸中毒

【参考答案】C

【考点精炼】糖尿病酮症酸中毒的治疗

【全真解析】综合分析题。根据题意,口干、多饮、多尿1周,神志模糊1天且呼气中有烂苹果味,考虑糖尿病酮症酸中毒。应立即给予静脉滴注生理盐水或复方氯化钠溶液大量补液,第一个24小时总输液量4000~5000ml,严重失水可达6000~8000ml。并根据血糖测定加入小剂量胰岛素静脉点滴,以控制血糖。故选C。

70. 男,26岁。2年前因“左股骨颈骨折”行加压螺钉内固定术。近3个月来左髋疼痛,功能受限。查体:左髋活动明显受限。MRI检查:左侧股骨头异常信号。最可能的诊断是

- A. 骨折畸形愈合
- B. 缺血性骨坏死
- C. 骨折不愈合
- D. 骨化性肌炎
- E. 骨折延迟愈合

【参考答案】B

【考点精炼】股骨颈骨折的并发症

【全真解析】综合分析题。股骨颈骨折的并发症包括股骨颈骨折不愈合和股骨头缺血坏死。股骨颈骨折易发生股骨头缺血坏死,旋股内侧动脉损伤是导致股骨头缺血坏死的主因。患者2年前因“左股骨颈骨折”行加压螺钉内固定术,近3个月来左髋疼痛,功能受限。查体:左髋活动明显受限,结合MRI检查显示的左侧股骨头异常信号,考虑发生了股骨头缺血性骨坏死,故选B。



71. 男婴, 6个半月。双胞胎之一, 早产。查体: 面色苍白, 欠活泼, 心肺无异常, 腹软, 肝脾肋下均可触及。实验室检查: 血清铁蛋白 $10\mu\text{g/L}$, 血清铁 $9\mu\text{mol/L}$, 外周血涂片可见红细胞大小不等, 以小细胞为主。考虑诊断为

- A. 地中海贫血
- B. 铁粒幼红细胞性贫血
- C. 生理性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 感染性贫血

【参考答案】D

【考点精炼】缺铁性贫血

【全真解析】综合分析题。据题意分析, 双胞胎之一, 早产儿, 查体示面色苍白, 欠活泼, 血清铁蛋白 $10\mu\text{g/L}$ (低于 $12\mu\text{g/L}$ 为缺铁的依据), 血清铁 $9\mu\text{mol/L}$ (低于 $8.95\mu\text{mol/L}$, 缺铁诊断指标之一), 外周血涂片可见红细胞大小不等, 以小细胞为主, 符合缺铁性贫血的诊断, 故选 D。

72. 女, 23岁, 已婚。停经40天, 阴道少量流血1周。平素月经规律。曾行人工流产2次。妇检: 子宫稍大, 宫颈举痛(+), 左侧附件区可触及约 $5\text{cm}\times 4\text{cm}\times 3\text{cm}$ 大小包块, 质中、压痛。为明确诊断, 首选的辅助检查项目是

- A. 宫腔镜检查
- B. 腹腔穿刺
- C. B超检查
- D. 后穹隆穿刺
- E. 诊断性刮宫术

【参考答案】C

【考点精炼】异位妊娠的诊断

【全真解析】综合分析题。患者停经后阴道流血1周, 妇检: 子宫稍大, 宫颈举痛(+), 左侧附件区可触及约 $5\text{cm}\times 4\text{cm}\times 3\text{cm}$ 大小包块, 质中、压痛, 考虑陈旧性宫外孕, 首选阴道B超检查, 可见到宫腔内空虚, 宫旁低回声区。故选 C。若为输卵管破裂或流产, 临床会有剧烈腹痛及急性失血性休克征象, 宜选择阴道后穹隆穿刺, 抽出不凝血说明有血腹症。

73. 足月新生儿。出生1分钟时躯干红而四肢青紫, 心率90次/分, 呼吸慢而规律, 四肢略屈曲, 插鼻管有皱眉反映, 其1分钟Apgar评分是

- A. 6分
- B. 7分
- C. 5分
- D. 4分
- E. 8分

【参考答案】C

【考点精炼】新生儿Apgar评分

【全真解析】分析记忆题。出生时1分钟躯干红而四肢青紫(1分), 心率90次/分(1分), 呼吸慢而规律(1分), 四肢略屈曲(1分), 插鼻管有皱眉反应(1分), 其1分钟Apgar评分是5分, 故选 C。

74. 女, 35岁。外阴痒伴烧灼感2天。妇科检查: 外阴局部充血, 阴道黏膜表面有白色片状薄膜覆盖。阴道分泌物镜检: 清洁度Ⅱ度, 未见滴虫, 10%氢氧化钾溶液镜下可见假菌丝。应选择的药物是

- A. 放线菌素
- B. 制霉菌素
- C. 博来霉素
- D. 克林霉素
- E. 甲硝唑

【参考答案】B

【考点精炼】外阴阴道假丝酵母菌病的治疗

【全真解析】分析记忆题。根据患者阴道黏膜表面有白色片状薄膜覆盖, 10%氢氧化钾溶液镜下可见假菌丝, 考虑为外阴阴道假丝酵母菌病, 治疗宜选择2%~4%碳酸氢钠溶液冲洗后, 局部给予抗真菌药物治疗, 故选 B。

75. 男, 26岁。3个月前去公共浴场洗浴后, 怀疑自己染上性病, 自感排尿不畅、尿痛, 为此紧张烦恼, 在多家医院泌尿科、皮肤科、传染科反复检查, 虽检查结果阴性, 医生也反复解释, 仍无法打消其疑虑, 整日忧心忡忡, 影响睡眠、日常生活和工作, 患者的诊断是

- A. 疑病障碍
- B. 广泛性焦虑障碍
- C. 抑郁症
- D. 强迫障碍
- E. 精神分裂症

【参考答案】A

【考点精炼】疑病障碍的诊断

【全真解析】分析题。患者去公共浴场洗浴后怀疑自己染上性病, 经多家医院泌尿科、皮肤科、传染科反复检查, 虽检查结果阴性, 医生也反复解释, 仍无法打消其疑虑, 整日忧心忡忡, 影响睡眠、日常生活和工作, 应诊断为疑病障碍, 故选 A。

76. 女, 30岁, 初孕妇。平素月经规律, 妊娠42周, 未临产, 胎动正常。查体: 一般情况可, 心肺无异常, 腹部膨隆, 头先露, ROA, 胎心率130次/分, B超示双顶径9.4cm, 羊水指数5.0cm。该孕妇可能存在

- A. 胎儿成熟障碍
- B. 胎盘功能减退