



国家出版基金资助项目

现代数学中的著名定理纵横谈丛书
丛书主编 王梓坤

HÖLDER THEOREM

Hölder 定理

刘培杰数学工作室 编著



哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



国家出版基金资助项目

现代数学中的著名定理纵横谈丛书
丛书主编 王梓坤

HÖLDER THEOREM

Hölder 定理

刘培杰数学工作室



哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书对凸函数展开了详尽的叙述。本书共分三编:凸函数、再论凸函数、凸集与凸区域。6个附录主要介绍了凸函数的新性质和一些相关猜想、公开问题。通过介绍凸函数的定理、性质,引出凸函数与其他相关定理之间的关系和凸函数的众多应用。

本书适合高等院校师生和数学爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

Holder 定理/刘培杰数学工作室编著. —哈尔滨:
哈尔滨工业大学出版社, 2018. 1

(现代数学中的著名定理纵横谈丛书)

ISBN 978 - 7 - 5603 - 6683 - 8

I. ①H… II. ①刘… III. ①Holder 不等式
IV. ①O151. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 136896 号

策划编辑	刘培杰	张永芹
责任编辑	张永芹	聂兆慈
封面设计	孙茵艾	
出版发行	哈尔滨工业大学出版社	
社 址	哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006	
传 真	0451 - 86414749	
网 址	http://hitpress.hit.edu.cn	
印 刷	黑龙江艺德印刷有限责任公司	
开 本	787mm × 960mm 1/16 印张 27.5 字数 306 千字	
版 次	2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷	
书 号	ISBN 978 - 7 - 5603 - 6683 - 8	
定 价	98.00 元	

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

◎ 代

序

读书的乐趣

你最喜爱什么——书籍。

你经常去哪里——书店。

你最大的乐趣是什么——读书。

这是友人提出的问题和我的回答。

真的，我这一辈子算是和书籍，特别是好书结下了不解之缘。有人说，读书要费那么大的劲，又发不了财，读它做什么？我却至今不悔，不仅不悔，反而情趣越来越浓。想当年，我也曾爱打球，也曾爱下棋，对操琴也有兴趣，还登台伴奏过。但后来却都一一断交，“终身不复鼓琴”。那原因便是怕花费时间，玩物丧志，误了我的大事——求学。这当然过激了一些。剩下来唯有读书一事，自幼至今，无日少废，谓之书痴也可，谓之书橱也可，管它呢，人各有志，不可相强。我的一生大志，便是教书，而当教师，不多读书是不行的。

读好书是一种乐趣，一种情操；一种向全世界古往今来的伟人和名人求

教的方法，一种和他们展开讨论的方式；一封出席各种活动、体验各种生活、结识各种人物的邀请信；一张迈进科学宫殿和未知世界的入场券；一股改造自己、丰富自己的强大力量。书籍是全人类有史以来共同创造的财富，是永不枯竭的智慧的源泉。失意时读书，可以使人重整旗鼓；得意时读书，可以使人头脑清醒；疑难时读书，可以得到解答或启示；年轻人读书，可明奋进之道；年老人读书，能知健神之理。浩浩乎！洋洋乎！如临大海，或波涛汹涌，或清风微拂，取之不尽，用之不竭。吾于读书，无疑义矣，三日不读，则头脑麻木，心摇摇无主。

潜能需要激发

我和书籍结缘，开始于一次非常偶然的機會。大概是八九岁吧，家里穷得揭不开锅，我每天从早到晚都要去田园里帮工。一天，偶然从旧木柜阴湿的角落里，找到一本蜡光纸的小书，自然很破了。屋内光线暗淡，又是黄昏时分，只好拿到大门外去看。封面已经脱落，扉页上写的是《薛仁贵征东》。管它呢，且往下看。第一回的标题已忘记，只是那首开卷诗不知为什么至今仍记忆犹新：

日出遥遥一点红，飘飘四海影无踪。

三岁孩童千两价，保主跨海去征东。

第一句指山东，二、三两句分别点出薛仁贵（雪、人贵）。那时识字很少，半看半猜，居然引起了极大的兴趣，同时也教我认识了许多生字。这是我有生以来独立看的第一本书。尝到甜头以后，我便千方百计去找书，向小朋友借，到亲友家找，居然断断续续看了《薛丁山征西》《彭公案》《二度梅》等，樊梨花便成了我心

中的女英雄。我真入迷了。从此，放牛也罢，车水也罢，我总要带一本书，还练出了边走田间小路边读书的本领，读得津津有味，不知人间别有何事。

当我们安静下来回想往事时，往往会发现一些偶然的小事却影响了自己的一生。如果不是找到那本《薛仁贵征东》，我的好学心也许激发不起来。我这一生，也许会走另一条路。人的潜能，好比一座汽油库，星星之火，可以使它雷声隆隆、光照天地；但若少了这粒火星，它便会成为一潭死水，永归沉寂。

抄，总抄得起

好不容易上了中学，做完功课还有点时间，便常光顾图书馆。好书借了实在舍不得还，但买不到也买不起，便下决心动手抄书。抄，总抄得起。我抄过林语堂写的《高级英文法》，抄过英文的《英文典大全》，还抄过《孙子兵法》，这本书实在爱得狠了，竟一口气抄了两份。人们虽知抄书之苦，未知抄书之益，抄完毫未俱见，一览无余，胜读十遍。

始于精于一，返于精于博

关于康有为的教学法，他的弟子梁启超说：“康先生之教，专标专精、涉猎二条，无专精则不能成，无涉猎则不能通也。”可见康有为强烈要求学生把专精和广博（即“涉猎”）相结合。

在先后次序上，我认为要从精于一开始。首先应集中精力学好专业，并在专业的科研中做出成绩，然后逐步扩大领域，力求多方面的精。年轻时，我曾精读杜布（J. L. Doob）的《随机过程论》，哈尔莫斯（P. R. Halmos）的《测度论》等世界数学名著，使我终身受益。简言之，即“始于精于一，返于精于博”。正如中国革命一

样,必须先有一块根据地,站稳后再开创几块,最后连成一片。

丰富我文采,澡雪我精神

辛苦了一周,人相当疲劳了,每到星期六,我便到旧书店走走,这已成为生活中的一部分,多年如此。一次,偶然看到一套《纲鉴易知录》,编者之一便是选编《古文观止》的吴楚材。这部书提纲挈领地讲中国历史,上自盘古氏,直到明末,记事简明,文字古雅,又富于故事性,便把这部书从头到尾读了一遍。从此启发了我读史书的兴趣。

我爱读中国的古典小说,例如《三国演义》和《东周列国志》。我常对人说,这两部书简直是世界上政治阴谋诡计大全。即以近年来极时髦的人质问题(伊朗人质、劫机人质等),这些书中早就有了,秦始皇的父亲便是受害者,堪称“人质之父”。

《庄子》超尘绝俗,不屑于名利。其中“秋水”“解牛”诸篇,诚绝唱也。《论语》束身严谨,勇于面世,“己所不欲,勿施于人”,有长者之风。司马迁的《报任少卿书》,读之我心两伤,既伤少卿,又伤司马;我不知道少卿是否收到这封信,希望有人做点研究。我也爱读鲁迅的杂文,果戈理、梅里美的小说。我非常敬重文天祥、秋瑾的人品,常记他们的诗句:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”“休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”。唐诗、宋词、《西厢记》《牡丹亭》,丰富我文采,澡雪我精神,其中精粹,实是人间神品。

读了邓拓的《燕山夜话》,既叹服其广博,也使我动了写《科学发现纵横谈》的心。不料这本小册子竟给我招来了上千封鼓励信。以后人们便写出了许许多多

的“纵横谈”。

从学生时代起，我就喜读方法论方面的论著。我想，做什么事情都要讲究方法，追求效率、效果和效益，方法好能事半功倍。我很留心一些著名科学家、文学家写的心得体会和经验。我曾惊讶为什么巴尔扎克在51年短短的一生中能写出上百本书，并从他的传记中去寻找答案。文史哲和科学的海洋无边无际，先哲们的明智之光沐浴着人们的心灵，我衷心感谢他们的恩惠。

读书的另一面

以上我谈了读书的好处，现在要回过头来说说事情的另一面。

读书要选择。世上有各种各样的书：有的不值一看，有的只值看20分钟，有的可看5年，有的可保存一辈子，有的将永远不朽。即使是不朽的超级名著，由于我们的精力与时间有限，也必须加以选择。决不要看坏书，对一般书，要学会速读。

读书要多思考。应该想想，作者说得对吗？完全吗？适合今天的情况吗？从书本中迅速获得效果的好办法是有的放矢地读书，带着问题去读，或偏重某一方面去读。这时我们的思维处于主动寻找的地位，就像猎人追找猎物一样主动，很快就能找到答案，或者发现书中的问题。

有的书浏览即止，有的要读出声来，有的要心头记住，有的要笔头记录。对重要的专业书或名著，要勤做笔记，“不动笔墨不读书”。动脑加动手，手脑并用，既可加深理解，又可避忘备查，特别是自己的灵感，更要及时抓住。清代章学诚在《文史通义》中说：“札记之功必不可少，如不札记，则无穷妙绪如雨珠落大海矣。”

许多大事业、大作品，都是长期积累和短期突击相结合的产物。涓涓不息，将成江河；无此涓涓，何来江河？

爱好读书是许多伟人的共同特性，不仅学者专家如此，一些大政治家、大军事家也如此。曹操、康熙、拿破仑、毛泽东都是手不释卷，嗜书如命的人。他们的巨大成就与毕生刻苦自学密切相关。

王梓坤



第一编 凸函数

- 第0章 引言 //3
- 第1章 什么是凸函数 //14
- 第2章 特殊类的凸函数 //40
- 第3章 p -凸函数与几类不等式 //110
- 第4章 凸函数与凸规划 //121
- 第5章 极小问题和变分不等式:凸性、单调性和不动点 //146
- 第6章 HILBERT 空间凸规划最优解的可移性 //171
- 第7章 凸函数和凸映射 //187
- 第8章 线性约束凸规划的既约变尺度法 //207

第二编 再论凸函数

- 第0章 一道美国数学月刊征解题的解答及其推广 //225
- 第1章 许瓦兹、赫尔德与闵可夫斯基不等式与凸函数 //231
- 第2章 函数凸性的应用 //246
- 第3章 函数的凸性与李普希兹条件 //253

第4章 关于调和凸函数的两个积分不等式 //255

第5章 一类新的伪凸函数 //264

第6章 凸函数的某些性质及其奇异边值问题的应用 //278

第三编 凸集与凸区域

第0章 从函数的凸性到区域的凸性 //289

第1章 关于序凸集的一些注记 //296

第2章 广义凸函数相关集合的稠密性问题 //302

第3章 具有 β -中点性质的非 β -凸集($0 < \beta < 1$) //321

第4章 凸性模估计定理的推广 //330

附录

附录 I 赋范空间中凸泛函 Lipschitz 连续性与函数有下界的关系 //345

附录 II 凸函数的一些新性质 //351

附录 III 多元函数凹凸性的定义和判别法 //361

附录 IV 关于 (α, m) -预不变凸函数的 Ostrowski 型不等式 //371

附录 V 凸函数的性质 //380

附录 VI 非线性分析与优化中的猜想和公开问题荟萃 //399

编辑手记 //425

第 一 编
凸 函 数

引言

第

0

章

§ 1 一个闭区间内取值的凸函数
最值定理的两个应用

定理 0.1.1 $f(x)$ 为定义在 $[a, b] \in \mathbf{R}$ 上的实的凸函数, 实数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 且满足

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = s \quad (na \leq s \leq nb)$$

下列表达式

$$F = f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)$$

F 取得最大值, 当且仅当数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中至少有 $n-1$ 个元素等于 a 或者 b .

证明 这个定理直接从 $n=2$ 的情况可以得到. 事实上, 只需要证明: 如果 $x, y \in [a, b]$ 且 $2a \leq x+y \leq 2b$, 则

$$f(x) + f(y) \leq \begin{cases} f(a) + f(s-a), & s \leq a+b \\ f(b) + f(s-b), & s \geq a+b \end{cases}$$

实际上, 假设 $s \leq a+b$, 则 $s-a \leq b$. 由于 $x \in [a, s-a]$, 则存在数 $t \in [0, 1]$ 使得 $x = ta + (1-t)(s-a)$, $y = (1-t)a + t(s-a)$. 由凸函数的定义, 我们有 $f(x) \leq tf(a) +$

Hölder 定理

$(1-t)f(s-a)$, 以及 $f(y) \leq (1-t)f(a) + tf(s-a)$,
两式相加, 我们得到

$$f(x) + f(y) \leq f(a) + f(s-a)$$

在 $s \geq a+b$ 的情况下, 定理类似可证.

下面我们应用这个定理解决几个自主招生和中国数学奥林匹克中的试题:

例 0.1.1 (2012 年“华约”自主招生数学选择压轴题) 已知

$$-6 \leq x_i \leq 10 (i=1, 2, \dots, 10), \sum_{i=1}^{10} x_i = 50$$

当 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2$ 取得最大值时, 在 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 这 10 个数中
等于 -6 的数共有().

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

解 由于 $f(x) = x^2$ 是下凸函数, 从而由定理可知

$\sum_{i=1}^{10} x_i^2$ 取得最大值时, $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 中至少有 9 个等于
 -6 或 10.

设其中有 m 个 -6 , $9-m$ 个 10, 则余下一个为
 $50 - (-6m + 90 - 10m) = 16m - 40$, 注意到 $-6 \leq$
 $16m - 40 \leq 10$, 即 $2.125 \leq m \leq 3.125$, 故整数 m 只能取
3, 此时 $16m - 40 = 8 \neq -6$, 从而本题选 C.

例 0.1.2 (1997 年中国数学奥林匹克) 设实数
 $x_1, x_2, \dots, x_{1997}$ 满足如下两个条件:

$$(1) -\frac{1}{\sqrt{3}} \leq x_i \leq \sqrt{3} (i=1, 2, \dots, 1997);$$

$$(2) x_1 + x_2 + \dots + x_{1997} = -318\sqrt{3}.$$

试求: $x_1^{12} + x_2^{12} + \dots + x_{1997}^{12}$ 的最大值, 并说明理由.

解 由于 $f(x) = x^{12}$ 是下凸函数, 从而 $\sum_{i=1}^{1997} x_i^{12}$ 取得最大值时, $x_1, x_2, \dots, x_{1997}$ 中至少有 1996 个等于 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 或 $\sqrt{3}$.

设其中有 t 个 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$, $1996 - t$ 个 $\sqrt{3}$, 则余下一个为

$$-318\sqrt{3} - \left| -\frac{1}{\sqrt{3}}t + (1996 - t)\sqrt{3} \right| = \frac{4}{\sqrt{3}}t - 2314\sqrt{3}$$

由已知 $-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq \frac{4}{\sqrt{3}}t - 2314\sqrt{3} \leq \sqrt{3}$, 解之得

$$1735.25 \leq t \leq 1736.25$$

注意到 $t \in \mathbf{N}$, 故 $t = 1736$.

进一步 $1996 - t = 260$.

所以由定理可知: 当 $x_1, x_2, \dots, x_{1997}$ 中有 1736 个取 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$, 260 个取 $\sqrt{3}$, 一个取 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时, $\sum_{i=1}^{1997} x_i^{12}$ 取最大值, 其最大值为

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{12} \times 1736 + (\sqrt{3})^{12} \times 260 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^{12} = 189548$$

例 0.1.3 (1993 年中国数学奥林匹克(第八届数学冬令营)) 给定 $k \in \mathbf{N}$ 及实数 $a > 0$, 在条件

$$k_1 + k_2 + \dots + k_r = k \quad (k_i \in \mathbf{N}, 1 \leq r \leq k)$$

下, 求

$$a^{k_1} + a^{k_2} + \dots + a^{k_r}$$

的最大值.

解 由定理可知, 当且仅当 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 中有 $r-1$ 个 1, 一个为 $k-r+1$ 时取最大值, 最大值为

$$(r-1)a + a^{k-r+1}$$

Hölder 定理

对于凸函数的重要性,在数学奥林匹克中表现最突出.它在许多高难的试题的解答中起到了关键的作用.举一个最近的例子:

例 0.1.4 (2017 年中国国家集训队测试四,韩京俊供题) 设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ ($m \geq 2$) 是非负实数, 证明

$$\begin{aligned} & (m-1)^{m-1} \left(\sum_{i=1}^m x_i^m - m \prod_{i=1}^m x_i \right) \\ & \geq \left(\sum_{i=1}^m x_i \right)^m - m^m \prod_{i=1}^m x_i \end{aligned}$$

并确定等号成立条件.

证法一 当 $m=2$ 时为等式, 下面考虑 $m \geq 3$ 的情形. 记

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_m) &= (m-1)^{m-1} \sum_{i=1}^m x_i^m + \\ & \quad (m^{m-1} - (m-1)^{m-1}) m \prod_{i=1}^m x_i - \\ & \quad \left(\sum_{i=1}^m x_i \right)^m \end{aligned}$$

固定 $\sum_{i=1}^m x_i = S$ 不变, 连续函数 f 在有界闭集

$\sum_{i=1}^m x_i = S$ 上能取到最小值, 不妨设 $(x_1, \dots, x_m) = (a_1, \dots, a_m)$ 时 f 取到最小值. 若 a_i 中有数为 0, 不妨设 $a_m = 0$, 则由均值不等式知

$$(m-1)^{m-1} \sum_{i=1}^{m-1} a_i^m \geq \left(\sum_{i=1}^{m-1} a_i \right)^m$$

也即 $f(a_1, \dots, a_m) \geq 0$, 原不等式得证. 若 a_i 均不为 0, 则我们有 (这一步也可由线性约束的拉格朗日乘数法直接得到)