



国家执业医师资格考试



直通车系列

2018

(第三版)

中医执业助理医师资格考试 易混易错 2000 题

主编 梁轶群 王 飞

- ▶ 高含金量 高频考点全覆盖，含历年真题
- ▶ 高针对性 2000个易混易错知识点深度剖析（含真题）
- ▶ 高附加值 赠送《考试宝典》体验卡
- ▶ 高含金量+高针对性+高附加值=高通过率

中国医药科技出版社

国家执业医师资格考试直通车系列

2018

中医执业助理医师资格考试 易混易错 2000 题

(第三版)

主 编 梁轶群 王 飞
编 委 (按姓氏笔画排序)
许荣荣 余德惠
组织者 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

内容提要

本书立足于考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取前 2000 道考生易错试题 + 易混淆知识点试题，由名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点，特别是包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生复习使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

2018 中医执业助理医师资格考试易混易错 2000 题 / 梁轶群, 王飞主编. —3 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2018. 1

(国家执业医师资格考试直通车系列)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 9811 - 2

I. ①2… II. ①梁… ②王… III. ①中医师—资格考试—习题集 IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 298153 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 麦和文化

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889 × 1194mm $1/_{16}$

印张 14 $1/_{2}$

字数 393 千字

初版 2016 年 4 月第 1 版

版次 2018 年 1 月第 3 版

印次 2018 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市万龙印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 9811 - 2

定价 35.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试包括实践技能和医学综合笔试两部分。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，特组织有关专业教师编写了《2018 中医执业助理医师资格考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足于考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取前 2000 道考生易错试题 + 易混淆知识点试题，由名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点！特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生参考复习。

本书亮点：

1. 专业的编写团队。编写专家组成员均是在高校任职并在中医院从事临床工作的一线教师或医师，对执业医师资格考试有着长达十几年的教学、培训经验。
2. 试题的含金量高。紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。
3. 解析全面详细、举一反三。
4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

最后预祝各位考生在本“直通车”系列的保驾护航下，顺利通过考试。

编者
2017 年 12 月

本书是《小学语文》教材的配套读物，旨在帮助小学生更好地理解课文内容，提高阅读能力。本书收录了小学语文教材中的经典课文，并配有详细的注释和练习题。通过阅读本书，小学生可以加深对课文的理解，提高语言表达能力和阅读理解能力。本书适合小学生阅读，是小学语文学习的必备读物。

目 录

单元一	1
单元二	17
单元三	34
单元四	52
单元五	71
单元六	89
单元七	107
单元八	124
单元九	140
单元十	156
单元十一	172
单元十二	189
单元十三	207

单元一

一、A1/A2 型题

1. 传染病的基本特征为
 - A. 有传染性、免疫性和病原体
 - B. 有传染性、免疫性和流行性
 - C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
 - D. 有传染性、传播途径和免疫性
 - E. 有传染性、流行性、地方性和季节性
2. 五行中具有“从革”特性的是
 - A. 木
 - B. 火
 - C. 土
 - D. 金
 - E. 水
3. 五行中“土”的特性是
 - A. 炎上
 - B. 润下
 - C. 稼穡
 - D. 曲直
 - E. 从革
4. 同病异治的实质是
 - A. 证同治异
 - B. 证异治异
 - C. 病同治异
 - D. 证异治同
 - E. 病同治同
5. 属于五行之“火”的五音是
 - A. 宫音
 - B. 角音
 - C. 商音
 - D. 徵音
 - E. 羽音
6. 自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续者，称为
 - A. 郑声
 - B. 谵语
 - C. 错语
 - D. 夺气
 - E. 独语
7. 独语、错语的共同临床意义是
 - A. 风痰阻络
 - B. 热扰心神
 - C. 心气大伤
 - D. 心气不足
 - E. 痰火扰心
8. 咳声重浊，痰白清稀者属
 - A. 风寒
 - B. 寒湿
 - C. 痰饮
 - D. 燥热
 - E. 肺热
9. 属于配伍禁忌的是
 - A. 人参与海藻
 - B. 人参与藜芦
 - C. 人参与大戟
 - D. 人参与甘遂
 - E. 人参与五倍子
10. 下列配伍中属于“十九畏”的药物是
 - A. 大戟与甘草
 - B. 贝母与乌头
 - C. 官桂与赤石脂
 - D. 乌头与瓜蒌
 - E. 芍药与藜芦
11. 败毒散的组成中不含有的药物是
 - A. 枳壳
 - B. 前胡
 - C. 柴胡
 - D. 黄芩
 - E. 人参
12. 肝主疏泄的基本生理功能是
 - A. 调畅情志活动
 - B. 调畅全身气机
 - C. 促进脾胃运化
 - D. 促进血行和津液代谢
 - E. 调节月经和精液的排泄
13. 下列配伍中属于“十八反”的是
 - A. 丁香与木香
 - B. 人参与莱菔子
 - C. 白及与甘草
 - D. 大戟与甘草
 - E. 人参与五倍子

14. 《素问·上古天真论》载“筋骨坚，发长极，身体盛”，是女子（ ）年龄段的生理表现
- A. “二七” B. “三七”
C. “四七” D. “五七”
E. “六七”
15. 下列各项，不属于“十八反”的是
- A. 甘草与甘遂
B. 乌头与贝母
C. 甘草与大戟
D. 藜芦与半夏
E. 乌头与瓜蒌
16. 下列各脏中，其生理特性以升为主的是
- A. 肺与脾 B. 肺与肝
C. 肝与肾 D. 心与肾
E. 肝与脾
17. 清暑益气汤的功用是
- A. 清暑益气，养阴生津
B. 清暑除烦，益气和胃
C. 清暑利湿，益气和胃
D. 清暑益气，和胃止呕
E. 益气养阴，清透暑热
18. 下列选项中，不属于清暑益气汤组成药物的是
- A. 西瓜翠衣、荷梗、西洋参
B. 西洋参、麦冬、石斛
C. 知母、黄连、竹叶
D. 甘草、粳米、荷梗
E. 香薷、白扁豆、厚朴
19. 下列何项归属五行之“土”
- A. 目 B. 舌
C. 口 D. 鼻
E. 耳
20. 以下哪种情况最易说明阴消阳长的相互转化
- A. 一种能量转变成另一种能量
B. 水变成冰
C. 内转变为外
D. 云转为雨
E. 物质转化为精神
21. 脉象见数时一止，止无定数者是
- A. 结脉 B. 代脉
C. 促脉 D. 迟脉
E. 数脉
22. 按五行生克规律，以下哪种说法是错误的
- A. 火为土之母 B. 金为木之所胜
C. 水为火之所不胜 D. 木为水之子
E. 金为土之子
23. 治疗心悸瘀阻心脉证，应首选的方剂是
- A. 通窍活血汤合甘麦大枣汤
B. 半夏泻心汤合当归活血饮
C. 黄连温胆汤合炙甘草汤
D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
E. 桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤
24. 心悸与奔豚的鉴别要点是
- A. 奔豚日久不愈，可转化为心悸
B. 心悸为持续性，奔豚为阵发性
C. 奔豚不能自控，活动后加重
D. 奔豚为上下冲逆，发自少腹
E. 心悸病情轻，奔豚病情重
25. 下列不属于“症”的是
- A. 恶寒 B. 感冒
C. 咳喘 D. 头痛
E. 口甜
26. 胸痹的主要病机为
- A. 痰浊瘀阻
B. 气血阴阳亏虚
C. 心脉痹阻
D. 寒凝气滞
E. 胸阳不振
27. 被称为“州都之官”的是
- A. 胆 B. 胃
C. 大肠 D. 三焦
E. 膀胱
28. 乳痈热毒炽盛证常用的方药是
- A. 瓜蒌牛蒡汤
B. 透脓散
C. 托里消毒散
D. 橘叶散

E. 柴胡疏肝散

29. 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

30. 乳癖的肿块特点是

- A. 形如鸡卵，光滑，柔韧，活动，无痛
- B. 坚硬如石，表面不平，固定不活动，与皮肤粘连
- C. 结节样肿块，位于乳晕下，按压乳窍溢血
- D. 肿胀疼痛，皮肤灼热红，形成脓肿
- E. 肿块扁圆，多位于乳晕中央，轻度疼痛

31. 乳癖疼痛的特点是

- A. 持续性疼痛
- B. 与月经周期相关
- C. 哺乳期疼痛加重
- D. 运动后加重
- E. 夏秋季加重

32. 治疗乳癖冲任失调证首选的方药是

- A. 瓜蒌牛蒡汤
- B. 透脓散
- C. 托里消毒散
- D. 逍遥萎贝散
- E. 二仙汤合四物汤

33. 慢性肺源性心脏病最常见的发病原因是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 肺部感染
- C. 重度哮喘
- D. 慢性肺栓塞
- E. 肺结核

34. 子处又称

- A. 血海
- B. 血室
- C. 胞络
- D. 胞脉
- E. 天癸

35. 慢性肺源性心脏病急性加重期应慎用的是

- A. 强心剂、抗生素
- B. 利尿剂
- C. 镇静剂
- D. 呼吸兴奋剂
- E. 抗生素

36. 哺乳期最佳断乳时间是

- A. 6个月
- B. 8个月
- C. 9个月
- D. 10个月
- E. 12个月

37. 围产期是指

- A. 孕期28周到产后1周
- B. 孕期29周到产后4周
- C. 孕期38周到产后2周
- D. 孕期38周到产后4周
- E. 孕期40周到产后4周

38. 中医精气神学说中“神”的含义是指

- A. 人体生命活动的主宰
- B. 人的精神意识
- C. 人体生命的基本物质
- D. 人体生命活动的动力
- E. 以上都不是

39. 下列各项中仅在某一特定行政区域发生法律效力的是

- A. 《药品管理法》
- B. 《食品安全法》
- C. 《医疗机构管理条例》
- D. 《天津市献血条例》
- E. 《传染性非典型肺炎防治管理办法》

40. 正常足月新生儿只要情况稳定，呼吸通畅，出生后开始尝试喂奶的时间是

- A. 半小时
- B. 2小时
- C. 4小时
- D. 6小时
- E. 12小时

41. 3个月婴儿哺乳间隔时间一般为

- A. 1小时
- B. 2小时
- C. 3小时
- D. 4小时
- E. 6小时

42. 《内经》：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”这说明阴阳之间

- A. 相互转化
- B. 相生相克
- C. 相互对立
- D. 互根互用
- E. 消长平衡

43. 耳后两乳突之间的骨度分寸是

- A. 3寸
- B. 5寸
- C. 8寸
- D. 9寸
- E. 12寸

44. “重阴必阳”“重阳必阴”属于

- A. 阴阳的互根
- B. 阴阳的对立

- C. 阴阳的转化 D. 阴阳的消长
E. 阴阳的相互制约
45. 前发际正中至后发际正中的骨度分寸是
A. 6 寸 B. 8 寸
C. 9 寸 D. 12 寸
E. 15 寸
46. 根据五行的生克乘侮规律, 若土气不足, 则
A. 木乘土, 金侮土
B. 木乘土, 水侮土
C. 木侮土, 水乘土
D. 土乘木, 水侮土
E. 土乘水, 木侮水
47. 肩胛骨内缘至后正中线的骨度分寸是
A. 1.5 B. 3 寸
C. 4 寸 D. 5 寸
E. 6 寸
48. 根据五行的生克乘侮规律制定的治疗法则, 以下哪种方法不妥
A. 培土生金 B. 培土制水
C. 泻心火以降肝火 D. 补金以生水
E. 火制土
49. 以下反映左、右心房电激动过程的是
A. P 波 B. P-R 段
C. QRS 波群 D. ST 段
E. T 波
50. 五行之“相侮”, 主要是指
A. 邪气亢盛, 子病反侮其母
B. 邪气有余, 母病传侮其子
C. 五行之反克
D. 其不及则所不胜侮而乘之
E. 其有余则乘侮其所胜
51. 下列疾病, 为我国最常见的咯血原因是
A. 支气管扩张 B. 肺癌
C. 肺结核 D. 肺炎链球菌肺炎
E. 风湿性心脏病
52. 前间壁心肌梗死特征性心电图改变出现在以下哪组导联
A. V_1 、 V_2 、 V_3 B. V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 、 V_5
C. V_3 、 V_4 、 V_5
D. V_5 、I、aVL
E. II、III、aVF
53. 引起发热的病因中, 属非感染性发热的是
A. 立克次体 B. 变态反应
C. 肺炎支原体 D. 螺旋体
E. 病毒
54. 典型心绞痛发作时, 心电图的改变是
A. P 波高尖
B. 异常 Q 波
C. ST 段水平压低 0.1mV 以上
D. P-R 间期延长
E. 完全性右束支传导阻滞
55. 关于热型的说法错误的是
A. 伤寒常为稽留热
B. 弛张热是指体温在 39℃ 以上, 一天内波动不超过 2℃
C. 间歇热是发热期和无热期交替出现
D. 肺结核常为不规则热
E. 波状热见于布鲁菌病
56. 尿蛋白 $\geq 1\text{g/d}$ 时, 理想血压的控制目标是
A. $<125/75\text{mmHg}$
B. $<130/80\text{mmHg}$
C. $<135/85\text{mmHg}$
D. $<140/90\text{mmHg}$
E. $<150/95\text{mmHg}$
57. 辛味药的作用是
A. 补益, 软坚 B. 发散, 行气
C. 燥湿, 通泄 D. 收敛, 固涩
E. 软坚, 缓急
58. 可确诊尿路感染的尿细菌学培养菌落计数是
A. $\geq 10^4/\text{ml}$ B. $\geq 10^5/\text{ml}$
C. $\geq 10^3/\text{ml}$ D. $10^4 \sim 10^5/\text{ml}$
E. $<10^4/\text{ml}$
59. 属于配伍禁忌的是
A. 人参与海藻 B. 人参与藜芦
C. 人参与大戟 D. 人参与甘遂

- E. 人参与五倍子
60. 引起尿路感染最重要的易感因素是
A. 导尿术 B. 糖尿病
C. 长期卧床 D. 尿路梗阻
E. 尿路畸形、结构异常
61. 下列各组药物中, 属于配伍禁忌的是
A. 巴豆与牵牛 B. 丁香与三棱
C. 牙硝与郁金 D. 官桂与五灵脂
E. 人参与赤石脂
62. 流行过程的基本条件是
A. 患者病原携带者, 受感染的动物
B. 周围性、地区性、季节性
C. 散发、流行、暴发流行
D. 传染源、传播途径、易感人群
E. 自然因素、社会因素
63. 下列各项, 对小儿生理特点描述不正确的是
A. 脏腑娇嫩 B. 易虚易实
C. 形气未充 D. 生机蓬勃
E. 发育迅速
64. 整个消化过程, 有赖于六腑的哪项功能
A. 胆的排泄胆汁 B. 胃气的和降
C. 小肠的化物 D. 大肠的传导
E. 膀胱的气化
65. 小儿开始更换恒牙的年龄是
A. 2~3岁 B. 4~5岁
C. 6~7岁 D. 8~9岁
E. 10岁
66. 三焦的主要功能是
A. 通行元气 B. 传化水谷
C. 化生精气 D. 调畅气机
E. 通调水道
67. 按公式计算, 正常4岁小儿的收缩压是
A. 75mmHg B. 88mmHg
C. 82mmHg D. 92mmHg
E. 100mmHg
68. 感染病原体后机体仅发生特异性免疫应答而无明显症状, 此种表现属于
A. 病原携带状态 B. 潜伏性感染
C. 显性感染 D. 病原体被清除
E. 隐性感染
69. 子宫的功能是
A. 排出月经、孕育胎儿
B. 排出月经、分泌带液
C. 产生月经、阴阳交合
D. 产生月经、孕育胎儿
E. 排出月经、产生恶露
70. 下列符合医学伦理学研究对象的是
A. 研究人与社会之间关系的科学
B. 研究人与人之间关系的科学
C. 研究医学活动中的道德现象和道德关系的科学
D. 研究道德科学或道德哲学
E. 研究道德的形成、本质及其发展规律的科学
71. 下列各项, 属妇女的主要生理功能的是
A. 经、带、孕、产、乳
B. 经、带、胎、产
C. 经、带、产、乳
D. 经、孕、产、乳
E. 经、孕、胎、产
72. 同病异治之“异”, 是指
A. 证候之异
B. 病因之异
C. 病因和证候之异
D. 病因和病位之异
E. 病性和病位之异
73. 下列各项, 属产褥期生理特点的是
A. 多虚多瘀 B. 气血两虚
C. 阴虚内热 D. 血瘀内阻
E. 气阴两虚
74. 下列各项, 属治法的是
A. 未病先防 B. 治病求本
C. 滋阴养血 D. 扶正祛邪
E. 调整阴阳
75. 人体是一个有机整体, 其中心是
A. 形体官窍 B. 六腑
C. 五脏 D. 经络

E. 奇恒之腑

76. 寒邪中阻，宿食不化，腹痛拒按，舌苔白厚，脉象可见

- A. 滑数 B. 弦紧
C. 结代 D. 细涩
E. 迟缓

77. 下列表述中属于证的是

- A. 麻疹 B. 水痘
C. 头痛 D. 风寒表实
E. 恶寒

78. 下列中属于亡阳的主要症状是

- A. 大汗出 B. 气喘
C. 烦躁不安 D. 尿少
E. 四肢不温

79. 下列各项中，不以脉率快为特点的是

- A. 数 B. 促
C. 滑 D. 疾
E. 动

80. 下列哪项不适用于“阴中求阳”或“阳中求阴”的治疗方法

- A. 阴虚 B. 阳虚
C. 阴阳偏盛 D. 阴阳偏衰
E. 阴阳两虚

81. 下列各项中，指下没有脉气紧张感的是

- A. 弦 B. 紧
C. 长 D. 革
E. 牢

82. 下列脏病传变不属于“五行相乘”的是

- A. 心病及肺 B. 心病及肾
C. 肺病及肝 D. 肾病及心
E. 脾病及肾

83. 属于发散风寒药的药组是

- A. 荆芥、防风、蔓荆子
B. 紫苏叶、香薷、白芷
C. 藁本、牛蒡子、辛夷
D. 白芷、桂枝、葛根
E. 麻黄、羌活、桑叶

84. 不属于“子病犯母”传变的是

- A. 心病及肝 B. 肝病及肾
C. 肺病及脾 D. 肾病及脾
E. 脾病及心

85. 麻黄的功效是

- A. 发汗解表，宣肺平喘，利水消痰
B. 发汗解表，宣肺平喘，化湿通淋
C. 发汗解表，宣肺平喘，通阳散结
D. 发汗解表，宣肺平喘，利水消肿
E. 发汗解表，利水平喘，散寒止痛

86. 不属于六腑共同的生理特点的是

- A. 传化物
B. 实而不能满
C. 藏精气
D. 泻而不藏
E. 受盛传化水谷

87. 生姜善治的呕吐是

- A. 胃热呕吐 B. 胃虚呕吐
C. 胃寒呕吐 D. 虫积呕吐
E. 食积呕吐

88. 下列关于阴阳失调内容的叙述不正确的是

- A. 阳虚而寒，是虚而生寒，以虚为主
B. 阴盛则寒，是以寒为主，但阳之虚象也明显
C. 阳虚多兼有气虚
D. 阳气不足，一般以脾肾阳虚为主
E. 阴阳偏衰表现为正气不足的虚证

89. 发生于肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病是

- A. 疔 B. 疖
C. 痈 D. 发
E. 丹毒

90. 既能发汗解表，又能利水消肿的药物是

- A. 麻黄、荆芥
B. 香薷、紫苏叶
C. 麻黄、香薷
D. 紫苏叶、生姜
E. 荆芥、防风

91. 托盘疔的好发部位是

- A. 手指甲一侧 B. 手指头
C. 手指腹 D. 手掌

E. 足底

92. 羚角钩藤汤的功用是

- A. 平肝息风, 清热活血
- B. 凉肝息风, 增液舒筋
- C. 镇肝息风, 滋阴潜阳
- D. 息风止痉, 补益肝肾
- E. 息风止痉, 活血止痛

93. 患者的病情表现不宜称作

- A. 症状
- B. 病候
- C. 病机
- D. 病形
- E. 病状

94. 羚角钩藤汤中配伍茯神木的用意是

- A. 平肝明目
- B. 益脾宁心
- C. 疏肝通络
- D. 养心安神
- E. 平肝宁心

95. 痫病的临床表现是

- A. 精神痴呆, 喃喃自语, 哭笑无常
- B. 突然昏倒, 四肢抽搐, 醒后如常
- C. 疯狂怒骂, 打人毁物, 不避亲疏
- D. 精神不振, 健忘嗜睡
- E. 烦躁不安, 神昏谵语

96. 川芎茶调散中, 善治少阳、太阳、阳明经头痛的药是

- A. 川芎、荆芥、防风
- B. 川芎、羌活、白芷
- C. 细辛、白芷、川芎
- D. 羌活、薄荷、川芎
- E. 白芷、防风、薄荷

97. 患者水肿日久, 腰以下肿甚, 按之凹陷不起, 畏寒肢冷, 尿少, 舌淡苔白滑, 脉沉弱。其证候是

- A. 风水泛滥
- B. 湿毒浸淫
- C. 水湿浸渍
- D. 湿热壅盛
- E. 肾阳衰微

98. 以小腹胀满疼痛, 小便涩滞, 淋漓不尽为特征的病证是

- A. 热淋
- B. 血淋
- C. 石淋
- D. 气淋
- E. 劳淋

99. 混合痔的好发部位是

- A. 截石位 3、7、11 点
- B. 截石位 6、12 点
- C. 截石位 3、9 点
- D. 截石位 5、7 点
- E. 截石位 2、5 点

100. 太乙膏的功效是

- A. 清热消肿, 散瘀化痰
- B. 活血祛腐, 解毒止痛
- C. 消肿止痛, 提脓祛腐
- D. 消肿清火, 解毒生肌
- E. 温经和阳, 祛风散寒

二、B 型题

(101~102 题共用备选答案)

- A. 隔离患者
- B. 隔离密切接触者
- C. 开窗通风
- D. 搞好“三管一灭”
- E. 注射疫苗

101. 流感的最佳预防措施是

102. 细菌性痢疾的最佳预防措施是

(103~104 题共用备选答案)

- A. 怒
- B. 喜
- C. 思
- D. 悲
- E. 恐

103. 五志中属于“金”的是

104. 五志中属于“木”的是

(105~106 题共用备选答案)

- A. 热扰心神
- B. 痰火扰心
- C. 风痰阻络
- D. 心气不足
- E. 心阴大伤

105. 语言謇涩, 临床意义多属

106. 独语, 临床意义多属

(107~111 题共用备选答案)

- A. 宗气
- B. 元气

- C. 卫气 D. 清气
E. 诸气

107. 肺主一身之气是指
108. 脾肺共同化生之气是指
109. 肺所宣发之气是指
110. 肾所摄纳之气是指
111. 三焦的功能是主持

(112~114 题共用备选答案)

- A. 风寒湿痹
B. 肝热生风之痉厥
C. 阴虚阳亢之类中风
D. 风毒入侵之破伤风
E. 真阴大亏之瘵疾

112. 镇肝息风汤主治
113. 大定风珠主治
114. 羚角钩藤汤主治

(115~118 题共用备选答案)

- A. 阴阳对立制约 B. 阴阳互根互用
C. 阴阳消长平衡 D. 阴阳相互转化
E. 阴阳的相对性

115. 寒极生热，热极生寒说明了
116. 阴盛则阳病，阳盛则阴病说明了
117. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，说明了
118. “动极者镇之以静，阳亢者胜之以阴”，说明了

(119~120 题共用备选答案)

- A. 推动作用 B. 温煦作用
C. 防御作用 D. 固摄作用
E. 气化作用

119. 卫气最主要的作用是
120. 脾气在五脏中的突出作用是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 清暑益气汤 B. 生脉散
C. 银翘散 D. 白虎汤
E. 香薷散

121. 患者身热汗出，心烦口渴，体倦少气，小便短赤，脉虚数。治宜选用

122. 患者恶寒发热，头重身疼，无汗，腹痛吐泻，胸脘痞闷，舌苔白腻，脉浮。治宜选用

(123~124 题共用备选答案)

- A. 大戟 B. 瓜蒌
C. 细辛 D. 五灵脂
E. 朴硝

123. 与乌头相反的药物是

124. 与藜芦相反的药物是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 补血调血
B. 健脾养心
C. 敛阴止汗
D. 益气健脾
E. 温补肾阳

125. 四君子汤的功效是

126. 四物汤的功效是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 正盛邪退 B. 邪去正虚
C. 邪盛正虚 D. 邪正相持
E. 正虚邪恋

127. 邪正盛衰何种情况，致使病势处于迁延状态

128. 邪正盛衰何种情况，致使病势迅速恶化

(129~130 题共用备选答案)

- A. 排出月经、孕育胎儿
B. 排出月经的通道
C. 娩出胎儿的产门
D. 防御外邪入侵的第一道门户
E. 排出恶露之出口

129. 以上各项，属子宫功能的是

130. 以上各项，属阴道功能的是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 气逆 B. 气滞
C. 气陷 D. 气虚

E. 气脱

131. 肺、肝、脾胃病变, 多见哪种证候

132. 脏腑功能低下或衰退, 多形成哪种证候

(133 ~ 134 题共用备选答案)

A. 110ml/kg B. 120ml/kg

C. 130ml/kg D. 140ml/kg

E. 150ml/kg

133. 人工喂养的婴儿每日需加糖牛奶的量为

134. 人工喂养的婴儿每日需水量为

(135 ~ 136 题共用备选答案)

A. 16 寸 B. 13 寸

C. 12 寸 D. 9 寸

E. 8 寸

135. 歧骨(胸剑联合)至脐的骨度分寸是

136. 内辅骨下廉(胫骨内髁下缘)至内踝高点的骨度分寸是

(137 ~ 138 题共用备选答案)

A. aVR B. aVL

C. aVF D. V_1

E. V_2

137. 正常 P 波一定倒置的导联是

138. 正常 P 波一定直立的导联是

(139 ~ 140 题共用备选答案)

A. V_1 、 V_2 、 V_3

B. I、II、III

C. I、aVL、 V_6

D. II、III、aVF

E. V_7 、 V_8 、 V_9

139. 反映侧壁心肌梗死的导联是

140. 反映下壁心肌梗死的导联是

(141 ~ 142 题共用备选答案)

A. 急则治其标 B. 缓则治其本

C. 标本同治 D. 先扶正后祛邪

E. 先祛邪后扶正

141. 气虚感冒患者, 宜选用的治则是

142. 二便不利宜选用的治则是

(143 ~ 144 题共用备选答案)

A. 红细胞管型

B. 白细胞管型

C. 蜡样管型

D. 颗粒管型

E. 透明管型

143. 慢性肾小球肾炎常出现的尿管型是

144. 急性肾盂肾炎常出现的尿管型是

(145 ~ 146 题共用备选答案)

A. 瞳孔正常 B. 瞳孔针尖样大小

C. 瞳孔扩大 D. 瞳孔缩小

E. 双侧瞳孔不等大

145. 可见于急性有机磷农药中毒的是

146. 可见于急性酒精中毒的是

(147 ~ 148 题共用备选答案)

A. 脾病及心 B. 脾病及肺

C. 脾病及肝 D. 阳虚水泛

E. 脾病及肾

147. 口疳的病机是

148. 疳肿胀的病机是

(149 ~ 150 题共用备选答案)

A. 代谢性酸中毒

B. 呼吸性酸中毒

C. 呼吸性碱中毒

D. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

E. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

149. 慢性肺心病患者合并感染时易出现的酸碱失衡是

150. 慢性肺心病大量应用利尿剂后易出现的酸碱失衡是

答案与解析

一、A1/A2 型题

1. C. 传染病是指由病原微生物感染人体后产

生的有传染性、在一定条件下可造成流行的疾病。其基本特征包括有病原体、有传染性、有流行性、地域性、季节性、有免疫性；病毒性一般可终身免疫，流感除外；细菌性一般不可终身免疫，伤寒除外。

2. D。木曰曲直，火曰炎上，土爰稼穡，金曰从革，水曰润下，题目问“从革”，故选 D。

3. C。木曰曲直，火曰炎上，土爰稼穡，金曰从革，水曰润下，题中问土的特性，故选 C。

4. B。同病异治，是指同一疾病由于发病的时间、地点不同，或处于疾病的阶段或类型不同，或患者体质不同，反映出来的证不同，故治疗方法不同。故其实质为证异治异。

5. D。木火土金水，五音对应的分别是角徵宫商羽，故选 D。

6. E。郑声指神志不清，语言重复，时断时续，语声低弱模糊的症状；谵语指神志不清，语无伦次，声高有力的症状；错语指病人神志清楚而语言时有错乱，语后自知言错的症状；夺气指语言低微，气短不续，欲言不能复言的症状；E 独语指自言自语，喃喃不休，见人语止，收尾不续的症状。题目问自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续，是独语的表现。

7. D。独语指自言自语，喃喃不休，见人语止，收尾不续的症状。多因心气虚弱，神气不足，或气郁痰阻，蒙蔽心神所致，属阴证。常见于癫痫、郁病。错语指病人神志清楚而语言时有错乱，语后自知言错的症状。证有虚实之分，虚证多因心气虚弱，神气不足所致，多见于久病体弱或老年脏器衰微之人；实证多因痰湿、瘀血、气滞阻碍心窍所致。ABE 是实证可排除，因为读语为虚证，D 答案较 C 更为恰当。

8. A。此题考察不同性质痰的临床意义。痰白清稀者，多属寒痰。痰白滑量多，易于咳出者，多属湿痰。痰黄稠有块者，多属热痰。痰少而黏，难于咳出者，多属燥痰。CDE 为热痰一般色黄可排除，B 答案寒湿痰性状滑量多，故答案选 A。

9. B。此题考察的是人参的配伍禁忌。十八反：本草明言十八反，半蒺贝藜及攻乌，藻戟遂芫具战草，诸参辛芍叛藜芦。诸参辛芍叛藜芦即藜芦反人参、丹参、玄参、沙参、细辛、芍药。

10. C。十九畏：硫黄原是火中精，朴硝一见便相争，水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧，巴豆性

烈最为上，偏与牵牛不顺情，丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱，川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂，官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。ABDE 属于十八反，C 才是十九畏。

11. D。败毒散的组成有羌活、独活、柴胡、前胡、桔梗、枳壳、川芎、茯苓、人参、薄荷、生姜、甘草。

12. B。略。

13. D。十八反：本草明言十八反，半蒺贝藜及攻乌，藻戟遂芫具战草，诸参辛芍叛藜芦。相反中药 18 种：乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白及、白藜；甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；藜芦反人参、丹参、玄参、沙参、细辛、芍药。大戟与甘草属于十八反，其余均不是十八反。

14. C。《素问·上古天真论》载：“女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子；三七，肾气平均，故真牙生而长极；四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮；五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕；六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

15. D。十八反：本草明言十八反，半蒺贝藜及攻乌，藻戟遂芫具战草，诸参辛芍叛藜芦。相反中药 18 种：乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白及、白藜；甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；藜芦反人参、丹参、玄参、沙参、细辛、芍药。ABCE 属于十八反，D 答案藜芦与半夏不是十八反。

16. E。略。

17. A。清暑益气汤组成：西洋参、石斛、麦冬、黄连、竹叶、荷梗、知母、甘草、粳米、西瓜翠衣。功用：清暑益气，养阴生津。主治暑热气阴两伤证，症见汗多，口渴心烦，小便短赤。体倦少气，精神不振，脉虚数。

18. E。清暑益气汤组成：西洋参、石斛、麦冬、黄连、竹叶、荷梗、知母、甘草、粳米、西瓜翠衣。香薷、白扁豆、厚朴是香薷散的组成，不属于清暑益气汤组成药物，答案选 E。

19. C。人体五官的五行归属为目属木、舌属火、口属土、鼻属金、耳属水。故本题选 C。

20. E。阴阳消长变化反映了事物之间对立制约和互根互用关系的协调平衡。

21. C。结脉：脉来缓慢，时有中止，至无定数。代脉：脉来一止，止有定数。促脉：脉来数而时有

一止，止有定数。迟脉：脉来迟慢，一息不足四至。数脉：脉来急促，一息五至以上而不满七至。迟、数脉仅是脉律的快慢，没有脉律不齐。结、代、促脉均有脉律不齐，区别是结脉缓，促脉数；结、促脉止无定数，代脉止有定数。故答案选C。

22. B。克我者为我所不胜，我克者为我所胜。

23. E。心悸的发生多因体质虚弱、饮食劳倦、七情所伤、感受外邪及药食不当等，以致气血阴阳亏损，心神失养，心主不安，或痰、饮、火、瘀阻滞心脉，扰乱心神。心悸瘀阻心脉证治法：活血化瘀，理气通络，方用桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤加减。答案选E。

24. D。心悸是指病人自觉心中悸动，惊惕不安，甚则不能自主的一种病证，临床一般多呈发作性，每因情志波动或劳累过度而发作，且常伴胸闷、气短、失眠、健忘、眩晕、耳鸣等症。奔豚“发于小腹，上至心下，若豚状，或上或下无时。”奔豚与心悸的鉴别要点：心悸为心中剧烈跳动，发于心；奔豚乃上下冲逆，发于少腹。所以选D。

25. B。症即症状，是患者发生疾病时出现的一些异常现象，是人体发生病变的客观反映，即通过四诊方法可获取的客观信息。恶寒、咳喘、头痛、口甜通过四诊方法均能获知，均是临床症状，而感冒是医生对各种症状表现综合评判后做出的临床诊断，是疾病名称，而非症状。

26. C。胸痹的主要病机为心脉痹阻，病位在心，涉及肝、肺、脾、肾等脏。痰浊瘀阻、气血阴阳亏虚、寒凝气滞、胸阳不振等为胸痹的病因或病理产物，心脉痹阻则发为成胸痹。主要病机是总的概括一个疾病的病机。

27. E。津液在肾的气化作用下生成尿液，下输于膀胱，尿液在膀胱内潴留到一定程度时，即可及时自主排出体外。故《素问·灵兰秘典论》说：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”

28. B。乳痈的内治辨证论治：①气滞热壅证用瓜蒌牛蒡汤加减。②热毒炽盛证用透脓散加减。③正虚毒恋证用托里消毒散加减。乳痈是由热毒入侵乳房而引起的急性化脓性疾病，治疗以消为贵，郁滞者以通为主，成脓者以彻底排脓为要，对并发脓毒败血症者，及时采用中西医结合综合疗法。瓜蒌牛蒡汤、托里消毒散主要用于气滞热壅及正虚毒恋证，橘叶散、柴胡疏肝散清热解毒效果差一般不用于乳痈的治疗。

29. B。宗气的主要生理功能有三个方面：①走息道而司呼吸；②贯心脉而行气血；③与人体的视、听、言、动等功能相关。

30. A。考查点：乳癖的肿块特点。

31. B。乳癖是乳腺组织的既非炎症也非肿瘤的良性增生性疾病，相当于西医的乳腺增生病。其特点是单侧或双侧乳房疼痛并出现肿块，乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关。乳房大小不等，形态不一，边界不清，质地不硬，活动度好。好发于25~45岁中青年妇女，占乳房疾病的75%，是临床最常见的乳房疾病。疼痛与月经周期相关，故答案选B。

32. E。治疗乳癖冲任失调首选二仙汤合四物汤，二仙汤有调理冲任的作用。瓜蒌牛蒡汤、透脓散、托里消毒散用于治疗乳痈，逍遥蒺苒散行气化痰力强，用于治疗乳癖肝郁痰凝证。

33. A。慢性肺源性心脏病，简称慢性肺心病，是由支气管、肺组织或胸廓的慢性病变引起肺组织结构和功能异常，产生肺血管阻力增加，肺动脉压增高，使右心室扩张或肥厚，伴或不伴右心功能衰竭的心脏病。病因以慢性阻塞性肺疾病最为常见，占80%~90%。

34. B。子处是胞宫的别名，又称女子胞、子宫等。血室出自《伤寒杂病论》，有“热入血室”之病名：“妇人中风七八日，往来寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室。”血室即子宫，其余选项都不是子宫的别名，答案选B。

35. C。镇静药容易出现呼吸抑制。

36. B。断奶时间视母婴情况而定，一般可在小儿8~12个月时断奶，若母乳量多者也可适当延期。断奶应逐渐减少以至挺住哺乳，不可骤断。若正值夏季或小儿患病之时，应延迟断奶。8个月为最佳断乳时间。

37. A。围产期，是指怀孕28周到产后1周这一分娩前后的重要时期。妊娠期通常是从末次月经第一日算起，约266日（38周）。妊娠分3个时期：妊娠开始至12周末称早起妊娠，13~27周称中期妊娠，第28周后称晚期妊娠。妊娠满37周至不满42周称足月妊娠。

38. A。中医学精气学说中“神”是指人体生命活动的主宰及其外在总体表现的统称。包括广义的神及狭义的神。

39. D。《天津市献血条例》仅在天津这一行政

区域发生法律效力。卫生法的效力等级是根据各卫生法渊源的制定主体、时间、程序、适用范围等因素的不同，确定各渊源在法律效力上的不同地位。

40. A。正常足月新生儿只要情况稳定，呼吸通畅，生后半小时开始尝试喂奶。一般足月新生儿吮吸能力较强，吞咽功能基本完善，产妇产后之后，应将小儿置于母亲身边，给予爱抚。生后应早期让小儿吮吸乳房，鼓励母亲按需哺乳。

41. D。母乳的喂养视婴儿的个体需要，按需喂养为原则。一般来说，第 1~2 个月不需定时喂奶，可按婴儿需要随时喂。此后按照小儿睡眠规律可每 2~3 小时喂 1 次，逐渐延长到 3~4 小时 1 次，夜间逐渐停 1 次，一昼夜共 6~7 次。4~5 个月后可减至 5 次，每次哺乳 15~20 分钟。根据各个婴儿的不同情况，适当延长或缩短每次哺乳时间，以饱为度。3 个月婴儿哺乳间隔时间一般为 4 小时左右，一昼夜 6 次左右。

42. D。阴阳双方相互资生、促进、助长。

43. D。耳后两乳突（完骨）之间、前额两发角（头维）之间、胸骨上窝（天突）至胸剑联合中点（歧骨）、腋前后纹头至肘横纹（平肘尖）的距离是 9 寸；眉间至前发际正中、大椎至后发际线、肩胛骨内缘至后正中线均为 3 寸；脐中至耻骨联合上缘的距离是 5 寸；胸剑联合中点至脐中、两乳头之间、肩峰缘至后正中线距离是 8 寸；前发际正中至后发际正中、腋窝顶点至第 11 肋游离端（章门）、肘横纹至腕掌背侧横纹距离是 12 寸。

44. C。阴阳双方可以在一定条件下向其相反的方向转化，即阴阳消长。

45. D。前发际正中至后发际正中、腋窝顶点至第 11 肋游离端（章门）、肘横纹至腕掌背侧横纹的距离是 12 寸。

46. B。土气不足，则土所胜水将相侮，土所不胜木将相乘，即水侮土、木乘土。

47. B。肩胛骨内缘至后正中线、眉间至前发际正中、大椎至后发际线的距离均为 3 寸。

48. E。火制土为五行的制化，与题目无关。

49. A。P 波反映心房的除极过程。P-R 段反映自心房过程及房室结、希氏束、束支的电活动。QRS 波群反映心室除极的全过程。ST 段、T 波：除极完毕后，心室缓慢和快速复极过程形成了 ST 段和 T 波。

50. C。相侮是五行生克制化的一种，是反克的

一种表现，即所不胜的反克于所胜的脏腑。

51. C。C 项肺结核为我国最常见的咯血原因。

52. A。前间壁心肌梗死特征性心电图出现在 V_1 、 V_2 、 V_3 导联。答案选 A。如果大部分胸导联或所有胸导联都出现 Q 波或 QS 波，则称为广泛前壁心肌梗死，如答案 B。C 是前壁心肌梗死的典型心电图表现。D 是侧壁心肌梗死的特征性心电图改变。E 是下壁心肌梗死的特征性心电图改变。

53. B。B 项变态反应属于非感染性发热。

54. C。典型心绞痛发作时，心电图的改变：缺血部位的导联常显示缺血型 ST 段压低（水平型或下斜型下移大于 0.1mV）和（或）T 波倒置。

55. B。弛张热是指体温常在 39 度以上，波动幅度大，24 小时内波动范围超过 1℃，但最低体温仍高于正常体温。常见于败血症、化脓性炎症、重症肺结核等。

56. A。慢性肾小球肾炎，高血压和蛋白尿是加速肾小球硬化、促进肾功能恶化的重要因素，积极控制高血压和减少尿蛋白是两个重要的环节。高血压的治疗目标是力争把血压控制在理想水平：尿蛋白 $\geq 1\text{g/d}$ 时，血压应控制在 125/75mmHg 以下；尿蛋白 $< 1\text{g/d}$ 时，血压控制可放宽到 130/80mmHg 以下。

57. B。味辛的药物具有发散，行气，活血的作用；“辛”作为五味之一，能散、能行，有发散、行气、行血等作用。

58. B。清洁外阴后无菌技术下采集的中段尿标本，如涂片每个高倍镜视野均可见细菌，或培养菌落计数超过 10^5 个/ml，称为细菌尿，可诊断为尿路感染。

59. B。十八反，“诸参辛芍叛藜芦”。

60. D。导尿术、糖尿病、长期卧床、尿路梗阻、尿路畸形结构异常均为尿路感染的易感因素，尤其是尿路梗阻为尿路感染最重要因素。如结石、前列腺增生、尿路狭窄、肿瘤等均可导致尿液积聚，细菌不易被冲洗清除，而在局部大量繁殖引起感染。尿路梗阻合并感染可使肾组织结构快速破坏，因此及时解除梗阻非常重要。

61. A。属于“十九畏”内容。

62. D。传染病流行过程的三大环节，传染源、传播途径和易感人群，这也是传染病流行的基本条件，答案选 D。

63. B。小儿的生理特点有生机蓬勃，发育迅速