

元代子部書
八

元代史料叢刊編委會
主編

元
代
史料刊
史叢
續編

泰山書社

元代子部書 八

元代史料叢刊編委會 主編

元代史料叢刊續編

黃山書社

永類鈴方卷第十八

胎前

夫婦猶天地也天地之道陰陽和而萬物生焉夫婦之道陰陽和而男女生焉婦人先須調經百病自不生百病不生孕育成矣然當知氣盛血衰則無孕血盛氣衰乃有体煩以抑氣生血為先若有胎腫惟當安胎順氣若外感四氣內傷七情以成他病治法與男子無異當於各證類中求之但胎前治他證者動胎之劑切須審詳耳

妊娠惡阻

痰逆不思食

惡阻者以婦人性弱或有風氣或有痰飲妊娠後便有些病其顏狀如故脉息和順但覺体重頭昏惡聞食氣好食酸醎甚或作寒熱吐痰滿悶恍惚初娘有此輕者不服藥亦可重者隨上證用下藥

和劑全書

治妊娠惡阻惡聞食氣胸膈痰逆嘔吐惡心

旋覆花

陳皮淨麤炒

桔梗

白芍藥

人參

甘草炙

川芎各半兩

熟地黃三分

赤茯苓三分

半夏制焙二兩一分或炒免動胎氣

右咬咀每三錢姜四片水一盞煎空心熱服鄭氏無旋覆加細辛

紫蘇葉有客熱煩渴口瘡去陳皮細辛加前胡知母腹冷下利去

地黃加桂心胃中虛熱大便秘小便澀去地黃加黃芩六分六黃

錢二分炮濟生依局方加當歸生乾姜去地黃白芍藥

茯苓

治證同上宜與前茯苓湯魚服

葛根

枳實制麤炒

白朮

甘草炙各二兩赤茯苓

人參

乾姜

肉桂

陳皮淨

半夏制炒各二兩肘後

忌桂傷胎千金同

右為末煉蜜元梧子大空心米飲下五十元一方有麥門冬忌

松葉羊肉糖酢等

大胎動 治惡阻嘔吐不食胎動不安或時下

地榆 甘草炙 茯苓 熟地黄 酒蒸焙 當歸

川芎 白朮 半夏制炒 阿膠炒 黃芪

白芍藥 各等分

右咬咀三錢水一盞煎溫服無時一方無半夏地榆有人參桑

寄生一方無白朮黃芪半夏地榆有艾葉是**膠艾湯** 加白

茯苓

白如湯 妊娠嘔吐頭疼眩暈煩悶心虛惡阻集驗無茯苓麥門

冬甘草

陳皮淨 人參 白朮 麥門冬去心各二兩甘草一兩

白茯苓 厚朴制各半兩

右咬咀每三錢水一盞姜五片竹茹彈大煎溫服無時即濟生參

金匱要略

二

橘散無人參

小地黃丸 妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食一方用生乾姜

人參 乾姜炮

右爲末生地黄汁元梧子大每五十元米湯下濟生加制半夏
等分

全方白果散 治惡阻吐清酸水甚苦十余日粥漿不入者

白果一兩人參半兩丁香一分甘草一錢

右細末每二錢姜五片水煎溫服

人參丁香散 治惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食心腹刺痛

人參半兩丁香霍香葉各一分

右爲散每三錢水煎溫服無時

又方 治同上

人參 丁香 柿蒂各一兩 甘草 良姜各半兩

右細末二錢熱湯調無時

醒脾散

治惡阻嘔逆不食甚者中滿口中無味或作寒熱

草豆蔻 紙裹煨去殼 厚朴 制各半兩 乾姜 三分 甘草 二兩 二分

右細末每二錢水一盞姜三片棗二个煎呷服輕者只三服便能食舊有橘紅二兩治寒熱瘧痢不食後人去橘紅以乾生姜代乾姜治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇效產科用乾生姜治阻病極驗

保生湯

治婦人經候不行身無病而似病脉滑大六部俱勻乃孕脉

也精神如故惡聞食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此惡阻也勿作寒病治之宜服

人參 二分 甘草 七分 白朮 香附子 烏藥

橘紅 各半兩

右呷咀每三錢姜五片水一盞煎溫服無時或作末調或惡心嘔

全方卷八

三

吐加丁香生姜煎

香附子 治妊娠胎氣不安氣不升降嘔吐阻食坐起覺重

香附子二兩 霍香葉 甘草各二錢

右為末每二錢入鹽少許百沸湯點

人參 治惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服藥不效用此理血歸原

人參 甘草 川芎 當歸 京芎

丁香各半兩 白茯苓 白朮 陳皮各兩半 苦梗炒

枳殼制各二分 半夏制切炒黃二兩

右咬咀每三錢姜五片棗二入水煎

張氏半夏湯 治證與前半夏湯同

半夏制炒黃 陳皮淨各二兩半 白茯苓二兩 砂仁二兩

甘草四兩

右咬咀每四錢姜十片棗一个烏梅半个煎空心溫服



治妊娠心胸支滿痰逆不思飲食

赤茯苓

前胡

白朮

紫蘇葉各二兩半夏炒制

麥門冬

人參

大伏皮各半兩

右咬咀每四錢姜五片水二盞煎溫服一方無大伏皮人參有六

伏子攢榔



治惡阻嘔吐不下食

青竹茹

陳皮各三兩生薑

茯苓各四兩半夏制三兩

右紙切水六升煮二升半分三服不差類服忌羊肉鰾酢等物

胎動不安

跌蹠頻仆 子懸 子胃 長胎

胎動不安須下者



治妊娠宿有風冷胎痿不長或失將理動傷胎氣多致

損墮常服壯氣益血保護胎臟

牡蠣煅五錢

白朮

川芎各二兩

蜀椒去目炒七錢半

右為末每錢空溫酒調下腹痛加白芍藥亦治帶下

安胎散

見前惡阻門

太全方

治妊娠二三月上至八月胎動不安腹痛已有所見者

艾葉

阿膠

當歸

川芎各三兩甘草二兩

右水八升煮三升入膠令烊分作三服

產寶

治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶

當歸

桑寄生各四分川芎三分豉八合阿膠二分

葱十四莖

右水二升煮八合下膠空溫分二服一方無鼓用銀器煎

集驗無寄生豉有續斷三分銀多少先煎後入藥

黃芩湯

治胎動不安腹痛下黃水

糯米二合

黃芩

川芎各二兩

右水煎溫服

養血心用方 治救急胎動去血腰腹痛

阿膠 川芎 當歸 竹茹各二錢

古以水十盞入銀一斤煮五盞去銀八上件藥三味煮取二盞半入膠煎溶分溫三服空心一日盡未效再作胎動叫呼緊唇青熟艾二兩酒四盞煎半灌之

寄生湯 治胎氣常不安治五个月已後胎不安

桑寄生洗 秦艽 阿膠各半兩 糯米半兩作粉

右以新汲水三升先以寄生秦艽煮二升去滓入阿膠糯米再煮約一升分三服空心忌酒醋三五日

順氣飲 產前服之安胎

紫蘇葉 木香炮 人參 草豆蔻 茯苓各兩

甘草半兩 大伏子一兩如氣弱者不用

右艾咀每三錢水一盞苧根三寸糯米少許煎溫服丹用川芎

葱白煮服佳

安胎寄生湯 治血流下方

桑寄生 白朮各五分 茯苓四分 甘草十分

右以水五升煮二升半分三服若人壯者加芍藥八分若胎不安腹痛加乾生姜四分

簡易川芎散 治妊婦從高墜下胎氣不和轉動不能腹臍疼痛

川芎

右為末每二錢溫酒調下鄭氏名探胎湯妊娠三個月經不行以此驗之濃煎艾湯下腹中微動則有胎若在臍下動者乃血癥也若不動為血不行有痛非娠也

白朮散 治胎氣不和飲食不進

白朮炒 紫蘇各二兩 白芷炒 人參各二兩 訶子

青皮淨 川芎各三分 甘草炙一分

右咬咀每三錢姜三片水一盞煎

聖元 治胎動不安或跌踣傷動胎上痿心惡血暴下或血從口出
子死橫逆悶亂腹冷唇青危悶

大麻仁去殼兩半 貝母

黃芩

大豆黃卷

粳米

秦樹

甘草

乾姜

肉桂

石斛

石膏各兩

當歸

半兩炒

右為末蜜元彈大每一元溫酒化下空心魚服濟生

一方當歸人參各兩半同

一兩甘草二兩葱白握煎服

治胎氣不和接上心

謂之于懸治臨產驚

氣不下名七寶散無芎

大伏皮制

川芎

白芍藥

陳皮淨

熟蘇莖葉

當歸

酒洗各一兩人參

甘草各半兩

右咬咀每四錢姜五片葱白七寸水一盞煎空心溫服

治妊娠胎動不安血氣冲心欲絕及臨產產後隨意加減

當歸酒洗 川芎各二兩

右咬咀每四錢酒一錢煎乾入水一盞并煎三二沸溫服

治妊娠或因煩什胎動不安腰腹疼痛方見前安胎飲下連根葱白煎良

治妊娠自高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹痛下血治子胃又名子痛

砂仁不拘多少熨斗內炒令熟去皮研末每二錢熱酒調艾鹽湯亦可胃虛嘔吐便妙

白朮 川芎各四分 川椒 炒出汗三分 牡蠣煨二分

右細末酒調一錢匕服後若渴大麥粥服之惡阻作元子服并治室女帶下與和劑同

白朮 益血保胎

白朮 川芎 阿膠炒 地黃炒焦 當歸 頭炒各二兩

牡蠣煨粉二分 川椒炒三分

右為末蜜元梧子大空心米飲下三四十元酒醋湯亦可

黃芪 治胎不長和氣思食利四服

黃芪 白朮 陳皮 麥門冬 白茯苓

煎胡 人參各三分 川芎 甘草各半兩

右咬咀每一錢姜三片棗一個水煎溫服

取 治妊娠母因疾病胎不能安須下者一方加蟹爪為末酒調

桂心 瓜蒌 牛膝 瞿麥各二兩 當歸一兩

右咬咀每四錢煎空心溫服

小 治妊娠得病須去胎者

變藥一升為末和煮二升服之即下神效或酒煮

又

妊娠以病去胎

雞子一个以三指撮鹽置雞子中服之立出

又

治胎氣本弱不宜瘦胎服此安胎順氣易產

人參

訶子煨肉 麥芽

神麴

白朮

陳皮各炒等分

右為末每二錢水煎空心溫服

又

治妊娠三四月胎動不安防其欲墮宜預服之

杜仲姜制炒

續斷酒浸各二兩

右為末煮棗肉杵元梧子大每七十元米飲下

妊娠漏胎卒然下血

又

治妊娠三四月腹痛時下血

續斷八分

艾葉

當歸

乾地黄六兩

竹茹

阿膠 雞蘇各四錢

右水一升煎取六合空心再服

產前安胎胎病漏血腹痛

當歸 川芎 阿膠炙 人參各兩 大棗二十个切

右以水三升酒四升煮二升半分三服五日一劑類服三四劑無妨

產後血暈治漏胎去血恐其難產宜常服

榆白皮 葵根 瞿麥各兩 火麻仁去殼木通半兩

牛膝三分酒浸

右以咀每三錢水煎溫服

產後血暈治漏血

野苧根二兩剉炒 金銀各一兩許為一劑酒水平煎耗半溫服

若閃攛胎動欲漏砂仁皮炒令熱透為末二錢酒或鹽湯下