

国家临床执业医师资格考试推荐用书

2018

国家临床执业助理医师资格考试 最后冲刺5套卷 及精析

刘 钊◎编著

紧扣
新大纲

昭昭老师 独家秘笈

表格理解

图形记忆

口诀背诵

考点贯通

重要提示

1. 按照昭昭老师提示的时间节点进行考前冲刺训练，命中率高。
2. 昭昭老师对其中50道重点试题进行视频讲解。
3. 考前15天左右，昭昭老师进行考前点题在线直播。
4. 正版图书双色印刷、凭刮刮卡享用以上所有增值服务。



北京航空航天大学出版社
BEIHANG UNIVERSITY PRESS



国家临床执业医师资格考试推荐用书

2018

国家临床执业助理医师资格考试 最后冲刺5套卷 及精析

刘 钊◎编著

紧扣
新大纲

昭昭老师 独家秘笈

表格理解

图形记忆

口诀背诵

考点贯通

重要提示

1. 按照昭昭老师提示的时间节点进行考前冲刺训练，命中率高。
2. 昭昭老师对其中50道重点试题进行视频讲解。
3. 考前15天左右，昭昭老师进行考前点题在线直播。
4. 正版图书双色印刷、凭刮刮卡享用以上所有增值服务。



北京航空航天大学出版社
BEIHANG UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书是刘钊老师(笔名:昭昭老师)集多年对国家临床执业助理医师资格考试辅导的经验和总结的命题规律,严格按照《国家临床执业助理医师资格考试大纲》编写的5套冲刺试卷及精析,每套冲刺试卷都包括生物化学、生理学、病理学、药理学、医学心理学、医学伦理学、医学统计学、预防医学、卫生法规、内科学、传染病与皮肤性病学、神经病学、外科学、妇产科学、儿科学和实践综合的试题。每套冲刺试卷分为两个单元,每个单元有150道试题,共计300道试题。

本书适合参加国家临床执业助理医师资格考试的考生练习备考使用。

本书特点之一:按照昭昭老师提示时间节点进行考前冲刺训练,命中率高。

本书特点之二:昭昭老师考前将对其中50道重点试题进行视频讲解。

本书特点之三:考前15天左右,将赠送昭昭老师考前点题视频。

图书在版编目(CIP)数据

2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺5套卷
及精析 / 刘钊编著. -- 北京:北京航空航天大学出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5124-2648-1

I. ①2… II. ①刘… III. ①临床医学—资格考试—
题解 IV. ①R4-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第025949号

版权所有,侵权必究。

2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺5套卷及精析

刘 钊 编著

责任编辑 郑 毅

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路37号(邮编100191) <http://www.buaapress.com.cn>

发行部电话:(010)82317024 传真:(010)82328026

读者信箱:bhpress@263.net 邮购电话:(010)82316936

北京时代华都印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本:787×1092 1/16 印张:17.5 字数:658千字

2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5124-2648-1 定价:38.00元

若本书有倒页、脱页、缺页等印装质量问题,请与本社发行部联系调换。联系电话:(010)82317024

前言

刘钊老师(笔名:昭昭老师)是全国医学培训行业的顶级名师,近 10 年来累计助力数十万名考生拿到国家临床执业助理医师资格证书。本书是昭昭老师严格按照《国家临床执业助理医师资格考试大纲》的最新要求,根据 10 余年行业辅导经验编写而成的。曾经使用过昭昭老师历年医考图书的考生在往年考试中惊讶地发现,考点命中之多出乎意料。考生通过本书在检验备考效果不是很满意的情况下,昭昭老师建议可以尽快学习《2018 国家临床执业及助理医师资格考试笔试核心考点背诵版》。昭昭老师将不容易记忆的考点编成顺口溜、口诀帮助大家牢记,以收到临阵磨枪、事半功倍的效果。

昭昭老师将对本书中的 50 道重点试题进行视频讲解。考生可登陆北京航空航天大学出版社网站 <http://www.buaapress.com.cn> 增值服务频道,或扫描“北航考试”微信公众号,或扫描“昭昭医考”微信公众号进行下载或在线观看。

此外,在临考前 15 天左右昭昭老师在线互动助你考前重温、领会考试精髓。不能参加在线直播点题互动的考生,也可凭本书封面上的刮刮卡在线观看录播课程。请考生在考前 15 天左右第一时间登录北京航空航天大学出版社网站 <http://www.buaapress.com.cn> 增值服务频道,或扫描“北航考试”微信公众号,或扫描“昭昭医考”微信公众号,及时了解直播时间、直播参与方式或观看录播课程。

请考生们记得在 8 月 10 日左右来听课哦!昭昭老师在这里助力大家顺利通关!

2018 国家临床执业助理医师资格考试时间表

考试日期	考试时间	考试内容
2018 年 8 月 25 日	9:00—11:30	第一单元
2018 年 8 月 25 日	14:00—16:30	第二单元

冲刺试卷练习时间表

试 卷	做卷时间	做题前要求	得分情况
冲刺试卷一	7 月第一周	完成“笔试重难点精析”学习	
冲刺试卷二	7 月第二周	完成“精选真题考点精析”学习	
冲刺试卷三	7 月第三周	完成“核心考点背诵版”学习	
冲刺试卷四	7 月第四周	完成“精选真题考点精析”学习	
冲刺试卷五	8 月第一周	完成“核心考点背诵版”学习	

请考生在练习冲刺试卷时严格按照考试时间要求完成,把做每套试卷都当作一次正式的考试,检验自己前期的学习效果,考后更要归纳、总结,以收到事半功倍的效果。

最后祝愿考生顺利通过今年的临床执业助理医师资格考试! 昭昭老师与你“医”路同行!

昭昭老师

2018 年 5 月

目 录

试题部分

2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷一)	1
第一单元	1
第二单元	15
2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷二)	29
第一单元	29
第二单元	42
2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷三)	54
第一单元	54
第二单元	67
2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷四)	79
第一单元	79
第二单元	93
2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷五)	106
第一单元	106
第二单元	119

参考答案及精析部分

2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷一)	133
第一单元	133
第二单元	146
2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷二)	162
第一单元	162
第二单元	174
2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷三)	186
第一单元	186
第二单元	197
2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷四)	210
第一单元	210
第二单元	224
2018 国家临床执业助理医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷五)	235
第一单元	235
第二单元	250

参考答案速查表

2018 国家临床执业医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷一)	263
第一单元	263
第二单元	264
2018 国家临床执业医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷二)	265
第一单元	265
第二单元	266
2018 国家临床执业医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷三)	267
第一单元	267
第二单元	268
2018 国家临床执业医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷四)	269
第一单元	269
第二单元	270
2018 国家临床执业医师资格考试最后冲刺 5 套卷及精析(卷五)	271
第一单元	271
第二单元	272

2018 国家临床执业助理医师资格考试 最后冲刺 5 套卷及精析(卷一)

第一单元

A1 型选择题(1~42 题)

每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑。

- 关于孕激素的生理作用,正确的是
A. 促使并维持女性第二性征的出现
B. 使子宫内膜发生分泌期变化
C. 使子宫内膜发生增殖期变化
D. 促进子宫收缩
E. 降低血浆低密度脂蛋白含量
- “夫医者,非仁爱之士不可托也;非聪明理达不可任也;非廉洁淳良不可信也。”此语出自中国哪位哲学家?
A. 晋代杨泉
B. 唐代孙思邈
C. 宋代林逋
D. 明代陈实功
E. 唐代柳宗元
- 不发生周期性变化的组织是
A. 阴道黏膜上皮
B. 卵巢生发上皮
C. 输卵管黏膜
D. 子宫内膜
E. 宫颈黏膜
- 下列关于心力衰竭的叙述错误的是
A. 心排量可维持正常
B. 心室充盈和射血能力受损
C. 是伴有临床症状的心功能不全
D. 常伴肺循环充血
E. 有心功能不全不一定有心力衰竭
- 预防医学的特点不包括
A. 着重于疾病预防
B. 研究对象包括个体和群体
C. 着重于个体治疗
D. 以环境、人群为研究重点
E. 研究方法上注重微观和宏观结合
- 均数为 0、标准差为 1 的分布是
A. 正态分布
B. 标准正态分布
C. 负偏态分布
D. 正偏态分布
E. 标准差分布
- 符合小儿生长发育规律的是
A. 生长发育是量先增加后有质的变化
B. 各系统发育的速度不一致
C. 生长发育没有一定的规律
D. 小儿体格的发育青春期最快
E. 体格发育有绝对的正常值
- “前有狼,后有虎”。这种动机冲突是
A. 双趋冲突
B. 双避冲突
C. 趋避冲突
D. 双重趋避冲突
E. 以上都不是
- 医师在执业活动中享有的权利是
A. 遵守法律、法规,遵守技术操作规定

- B. 关心、爱护、尊重患者
C. 努力钻研业务,提高业务水平
D. 依法获得酬劳
E. 宣传保健知识,对患者进行保健教育
10. 关于滴虫性阴道炎叙述错误的是
A. 阴道分泌物常为稀薄液体或黄绿色脓性分泌物
B. 潜伏期为 4~28 日
C. 主要症状是阴道分泌物增多及外阴瘙痒
D. 主要治疗药物为红霉素
E. 传播方式有直接传播或间接传播
11. A 型行为类型的人好发
A. 原发性高血压
B. 冠心病
C. 哮喘
D. 癌症
E. 消化性溃疡
12. 下列哪一项构成医疗事故的主观方面?
A. 疏忽大意的过失
B. 违反卫生法规和诊疗护理规范、常规的责任过失
C. 故意违反操作规程
D. 技术水平欠缺的技术过失
E. 无意识的错误
13. 不按规定使用麻醉药品、精神药物,情节严重的,由卫生行政部门给予的处罚是
A. 暂停执业活动 3~6 个月
B. 暂停执业活动 6 个月~1 年
C. 给予行政处分
D. 吊销医师执业证书
E. 追究刑事责任
14. 一位亚急性感染性心内膜炎患者,血培养为草绿色链球菌,首选的治疗药物是
A. 氨苄西林加庆大霉素
B. 青霉素加链霉素
C. 头孢氨苄
D. 万古霉素
E. 红霉素
15. 下列哪项不是社区诊断的基本内容?
A. 确定社区的主要卫生问题
B. 确定社区的主要危险因素
C. 找出社区的高危人群
D. 了解社区资源
E. 社区卫生人才的培养
16. 对职业人群进行医学监护的内容不包括
A. 定期体检
B. 就业前体检
C. 职业有害因素监测
D. 离岗或转岗时体检
E. 职业病的健康筛检
17. 属于行为疗法的是
A. 自由联想
B. 森田疗法
C. 询者中心疗法
D. 系统脱敏疗法
E. 认知疗法
18. 对同一组对象进行几次测量,所得结果的一致程度,叫测验的
A. 信度
B. 效度
C. 标准化程度
D. 真实性
E. 常模
19. 不协调性子宫收缩乏力时,首选药物为
A. 静脉滴注胍苯达嗪
B. 肌肉注射杜冷丁
C. 静脉滴注硫酸镁
D. 快速静滴甘露醇
E. 静脉推注氯丙嗪
20. 健康咨询的 5A 模式的第一步是
A. 咨询者对咨询对象的诊断
B. 咨询对象倾诉自己的感受
C. 咨询者评估咨询对象的问题
D. 咨询者明确咨询目标
E. 咨询者制定咨询方案
21. 衡量人群中在短时间内新发病例的频率,采用的指标为
A. 罹患率
B. 发病率
C. 患病率
D. 感染率
E. 发病比
22. 枕先露时,通过产道最小径线是指
A. 枕颈径
B. 枕额径
C. 枕下前囟径
D. 枕顶径
E. 双顶径



23. 以下对临床预防服务的阐述最准确的是
A. 一种临床治疗服务
B. 一种基层卫生服务
C. 在临床场所下实施第一级和第二级预防结合的服务
D. 在临床场所下实施第三级预防服务
E. 在社区中实施的治疗服务
24. 在抽样研究中,当样本例数逐渐增多时
A. 标准差逐渐减小
B. 标准差逐渐加大
C. 标准差趋近于 0
D. 标准误逐渐减小
E. 标准误逐渐加大
25. 早期食管癌的造影表现是
A. 贲门部呈光滑鸟嘴状狭窄
B. 长的不规则线状狭窄
C. 外压狭窄,黏膜光滑完整
D. 食管黏膜呈串珠状改变
E. 黏膜呈局限性管壁僵硬
26. 小儿 10 个月,维生素 D 缺乏性佝偻病激期。其可出现的骨骼改变是
A. 颅骨软化
B. 肋骨串珠
C. 方颅
D. 鸡胸
E. 肋膈沟
27. 11 个月小儿未接种过卡介苗,结核菌素试验结果呈阳性表示:
A. 近 2 周感染结核杆菌
B. 受过结核感染,不一定有活动结核
C. 体内有活动结核
D. 体内已有免疫力,不会再感染结核
E. 对结核无免疫力,需立即接种卡介苗
28. 中心静脉压高、血压低,提示
A. 血容量不足
B. 容量血管过度收缩
C. 心功能不全或血容量相对过多
D. 心功能不全,血容量正常
E. 心功能不全或血容量不足
29. 宫颈黏液涂片干燥后,镜下见羊齿状结晶,是由于下列哪种激素的作用:
A. 雌激素
B. 孕激素
C. 雄激素
D. 前列腺素
E. 促性腺激素
30. 关于动脉粥样硬化,叙述正确的是
A. 主要累及小动脉
B. 基本病变是动脉中膜的脂质沉积
C. HDL 促进其形成
D. 女性比男性多发
E. 多合并有高血压、高脂血症、糖尿病
31. 医疗机构发现发生或者可能发生传染病暴发流行时,应当
A. 在 1 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
B. 在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
C. 在 4 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
D. 在 6 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
E. 在 10 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
32. 主要应采取第一级预防措施的疾病是
A. 职业病
B. 冠心病
C. 糖尿病
D. 阑尾炎
E. 病因不明,难以觉察预料的疾病
33. 能体现人体实验知情同意原则的是
A. 人体实验不需要伦理委员会审查通过
B. 人体实验时使用对照和双盲法
C. 以健康人或患者作为人体实验的受试对象
D. 参与人体实验的受试者只有得到商家的允许后,中途才可以退出实验
E. 弱势群体若参加人体实验,需要监护人签字同意
34. 下列各项中不属于医学伦理学的研究任务的是

- A. 确定符合时代要求的医德原则和规范
B. 反映社会对医学职业道德的需要
C. 直接提高医务人员的医疗技术
D. 为医学的发展导向
E. 为符合道德的医学行为辩护
35. 总体率 95% 可信区间的意义是
A. 95% 的正常值在此范围
B. 95% 的样本率在此范围
C. 95% 的总体率在此范围
D. 总体率在此范围内的可能性为 95%
E. 样本率在此范围内的可能性为 95%
36. 下列各种引流管, 不正确的处理是
A. 要注意观察各种引流管是否通畅
B. 仔细记录引流液的色泽和容量
C. 留置胆管内的 T 形管可在术后 1 周拔除
D. 胃肠功能恢复后可将胃肠减压管除去
E. 腹腔烟卷引流一般在术后 24~72 小时拔除
37. 临终关怀的根本目的在于
A. 节约卫生资源
B. 提高临终患者的生存质量
C. 减轻社会负担
D. 防止患者自杀
E. 缩短患者的生命时限
38. 对从事传染病预防、医疗、科研的人员以及现场处理疫情的人员, 为了保障其健康, 他们所在单位应当根据国家规定采取
A. 防治措施和强制治疗措施
B. 防治措施和强制隔离措施
C. 防治措施和医疗保健措施
D. 防治措施和追踪调查措施
E. 防治措施和紧急控制措施
39. 急性心梗第 3 周出现发热和心包摩擦音, 血沉 30mm/h, 血白细胞 $6.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 55%, 可能是
A. 急性心梗的反应性心包炎
B. 心脏破裂
C. 急性心梗后综合征
D. 伴发病毒性心包炎
E. 肺炎
40. 关于医学实践与医学伦理学的关系, 下列哪项提法是错误的?
A. 医学实践是医学伦理学的理论指导
B. 医学实践是医学伦理学的基础
C. 医学实践是医学伦理学的动力
D. 医学实践是医学伦理学的目的
E. 医学实践是医学检验医学伦理学的唯一标准
41. 检查胎儿成熟度最常用的方法是
A. 检测羊水中淀粉酶值
B. 检测羊水中肌酐值
C. 检测羊水中胆红素类物质
D. 检测羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值
E. B 型超声检查胎儿双顶径值
42. 新生儿寒冷损伤综合征的病理生理中, 不正确的是
A. 血流较丰富
B. 体内能量储存少
C. 皮肤面积相对较大
D. 棕色脂肪含量较多
E. 体温调节中枢发育不成熟

A2 型选择题(43~104 题)

每一道题都是以一个小案例出现的, 每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑。

43. 10 岁女孩, 发热 10 天伴胸痛, 热型不定, 刺激性咳嗽明显。查体: $T39^{\circ}C$, 双肺散在干啰音。胸片: 左肺下



野淡薄片状阴影。该患儿最可能的诊断是

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎 B. 肺炎链球菌肺炎 C. 肺炎支原体肺炎
D. 呼吸道合胞病毒性肺炎 E. 腺病毒性肺炎
44. 29 岁女性,孕 31 周,双下肢水肿 20 天,既往无特殊病史。查:血压 150/90mmHg,尿蛋白定量 2.0g/24h,本例最有可能诊断是
A. 轻度子痫前期 B. 中度子痫前期 C. 子痫
D. 先兆子痫 E. 妊娠合并肾炎
45. 女,46 岁。阵发性腹痛 7 天,伴呕吐 3 天入院,无发热。体格检查:腹膨隆,见肠型,肠鸣音亢进,有气过水声,腹部平片见有多个液平、阶梯状,可能的诊断是
A. 高位小肠梗阻 B. 低位小肠梗阻 C. 结肠梗阻
D. 坏死性小肠炎 E. 结肠癌
46. 女性,52 岁。阵发性胸痛 2 周,每次发作持续 10 分钟左右,运动可诱发,近 2 周胸痛发作频率增加,休息时亦可发作,有陈旧心肌梗死病史,该患者暂时不宜做的检查是
A. 心电图 B. 超声心动图 C. 动态心电图
D. 冠状动脉造影 E. 心电图负荷试验
47. 42 岁妇女,因阴部有块物脱出就诊。妇科检查见部分宫体与宫颈外露于阴道口,宫颈较长。患者最恰当的处理应是
A. 经腹子宫全切除术 B. Manchester 手术 C. 阴道纵隔形成术
D. 阴道前后壁修补术 E. 阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术
48. 1 岁女婴,面色苍黄、毛发稀疏、易怒少哭。查体:体温正常。神清,不会扶站,四肢抖动,踝阵挛,巴氏征(+)。该患儿可能的疾病是
A. 先天愚型 B. 先天性甲状腺功能减低症 C. 癫痫小发作
D. 病毒性脑膜炎 E. 巨幼细胞性贫血
49. 7 个月婴儿,医院出生,按时完成计划免疫和预防接种。其接种的疫苗不应包括
A. 卡介苗 B. 乙肝疫苗 C. 百白破三联针
D. 脊髓灰质炎减毒糖丸活疫苗 E. 麻疹减毒活疫苗
50. 初孕妇,26 岁。妊娠 38 周,骨盆外测量:骶耻外径 19.5cm,髂棘间径 25cm,髂嵴间径 28cm,坐骨棘间径 8cm,坐骨结节间径 6.5cm。该孕妇的骨盆应诊断是
A. 均小骨盆 B. 漏斗型骨盆 C. 扁平骨盆
D. 类人猿型骨盆 E. 佝偻病性扁平骨盆
51. 30 岁经产妇,停经 10 周,下腹阵发性剧烈疼痛 8 小时伴多量阴道流血,超过月经量,检查宫口开大近 2cm。应采取的恰当的治疗是
A. 肌注黄体酮 B. 静脉滴注止血药物 C. 肌注硫酸镁
D. 口服硫酸舒喘灵 E. 行负压吸宫术
52. 患儿刘某,因发热 3 日到县医院就诊,门诊接诊医生张某检查后发现刘某的颊黏膜上有考氏斑,拟诊断为麻疹。张某遂嘱患儿刘某的家长带刘某去市传染病医院就诊。按照传染病防治法的规定,张某应当
A. 请上级医生会诊,确诊后再转诊
B. 请上级医生会诊,确诊后隔离治疗
C. 向医院领导报告,确诊后由防疫部门进行转送隔离
D. 向医院领导报告,确诊后对刘某就地进行隔离
E. 在规定时间内,向当地防疫机构报告
53. 男婴,3 个月,足月分娩。现体重 5kg,一般每天给予 8%糖牛奶喂养,现另需水分的量是
A. 200ml B. 250ml C. 300ml
D. 350ml E. 400ml
54. 男性,68 岁。近 5 年来血压升高,血压最高为 160/110mmHg,尿常规(-),眼底有动静脉交叉压迫现象,心脏 X 线检查提示左心室增大,应考虑诊断为
A. 急进性高血压 B. 高血压病 2 期 C. 高血压病 3 期
D. 高血压危象 E. 高血压脑病
55. 老年女性,绝经 10 年,近 1 周白带带血丝。妇科检查:宫颈中度糜烂,子宫后倾,稍小。双侧附件未见异

- 常,宫颈刮片细胞学检查巴氏三级。该患者绝经后最可能的出血原因是
- A. 宫颈糜烂 B. 子宫颈瘤 C. 绒毛膜癌
D. 子宫内膜癌 E. 侵蚀性葡萄胎
56. 男性,56 岁。乙型肝炎病史三十余年。3 小时前进食烧饼后突然出现呕血,量约 1000ml。查体未发现全身皮肤、黏膜黄染和腹水,如果该患者需要接受急诊手术,最佳手术方式是
- A. 经颈静脉肝内门体分流术 B. 非选择性门体分流术 C. 选择性门体分流术
D. 贲门周围血管离断术 E. 脾切除术
57. 女性,52 岁。胸痛、反酸、胃灼热、嗝气 3 个月,胃镜检查食管黏膜未见明显异常,最有助于明确诊断的检查是
- A. 手术活检 B. C13 尿素呼气试验 C. 24 小时胃食管 pH 监测
D. 腹部 B 超 E. 24 小时心电监测
58. 女,42 岁。上腹部疼痛反复发作 4 年,近 6 天出现腹胀,呕吐。经 X 线钡餐检查诊断为十二指肠溃疡伴幽门梗阻。最适宜的手术方式是
- A. 毕 I 式胃大部切除术 B. 毕 II 式胃大部切除术 C. 全胃切除
D. 迷走神经干切断术 E. 选择性胃迷走神经切断术
59. 女性,38 岁。阵发性心悸 4 年,发作时按摩颈动脉窦心悸可突然终止。发作时心电图示:心室率 180 次/分,逆行 P 波,QRS 波群形态与时限正常。该患者最可能的诊断是
- A. 心房颤动 B. 窦性心动过速 C. 室颤
D. 阵发性室性心动过速 E. 阵发性室上性心动过速
60. 25 岁初产妇,测坐骨结节间径 7.5cm,为判断其能否自然分娩,此时还应测量
- A. 耻骨弓角度 B. 对角径 C. 坐骨棘间径
D. 出口前矢状径 E. 出口后矢状径
61. 1 岁小儿,发热 3 天,体温 39~40℃,家长一直服用中药治疗,今日热退,发现患儿出现皮疹,遂就诊。查体:一般情况好,咽部充血,耳后淋巴结肿大,红色斑丘疹以颈及躯干多见。未见其他异常。该患儿最可能的诊断是
- A. 麻疹 B. 风疹 C. 水痘
D. 猩红热 E. 幼儿急疹
62. 5 岁患儿,高热 10 小时,伴头痛,频繁呕吐,腹泻 3 次为稀水样便。查体:T39℃,血压 60/40mmHg,精神萎靡,全身散在大小不等瘀斑,心肺未见异常。CSF 检查:细胞数为 15000×10⁶/L,蛋白微量,葡萄糖 2.2mmol/L。该患儿可能的诊断是
- A. 中毒型细菌性痢疾 B. 败血症伴感染性休克 C. 化脓性脑膜炎
D. 流行性脑脊髓膜炎 E. 流行性乙型脑炎
63. 初产妇,28 岁。妊娠 43 周,临产后 5 小时。胎头高浮,胎心 140 次/分,宫口开大 2cm。6 小时后自然破膜,立即听胎心,减慢至 80 次/分。本例应首先考虑的是
- A. 脐带脱垂 B. 胎盘功能不良 C. 宫体包裹胎体
D. 脐带缠绕胎儿颈部 E. 胎头受压,脑血流量一时性减少
64. 表示某地 2015 年 5 种不同类型病毒性肝炎发病人数占病毒性肝炎发病总人数的比重,宜采用
- A. 直方图 B. 直条图 C. 线图
D. 圆形图 E. 散点图
65. 男,3 岁。身高 85cm,体重 10kg。皮肤较松弛。腹部皮下脂肪约 0.3cm。该小儿的营养状况属于
- A. 极重度营养不良 B. III 度营养不良 C. II 度营养不良
D. I 度营养不良 E. 正常
66. 男性,44 岁。因气促 3 周就诊。查体颈静脉怒张,血压 90/75mmHg,心界向两侧扩大,心率 120 次/分,律齐,心音遥远,肝肋下 3 指,移动性浊音(一)。最可能的诊断为
- A. 冠心病 B. 肝硬化 C. 急性纤维蛋白性心包炎
D. 急性渗出性心包炎 E. 肺部感染
67. 25 岁初孕妇,末次月经 2013 年 3 月 10 日。于 2013 年 10 月 13 日就诊,检查宫底在脐上两横指,枕左前位,胎心率正常。现在应是
- A. 妊娠满 30 周,宫底高度符合正常情况

- B. 妊娠满 30 周,宫底高度低于正常
C. 妊娠满 31 周,宫底高度符合正常情况
D. 妊娠满 31 周,宫底高度低于正常
E. 妊娠满 31 周,宫底高度高于正常
68. 女性,30 岁。产后 3 天。下腹疼痛 2 天,发热 1 天,阴道分泌物无异味,子宫增大,既往有子宫肌瘤史。首先考虑的诊断是
A. 肌瘤玻璃样变 B. 肌瘤恶性变 C. 肌瘤囊性变
D. 产褥感染 E. 肌瘤红色变
69. 52 岁女性,绝经 5 年。近半年反复阴道流血 3 次,量中等。平时白带少许。最可能的诊断是
A. 子宫内膜炎 B. 子宫内膜癌 C. 子宫颈癌
D. 输卵管癌 E. 老年性阴道炎
70. 女性,50 岁。右下肢疼痛 5 年。让其抬高右下肢 80° ,1 分钟后下肢皮肤苍白,再让其下肢垂于床沿,大约 1 分钟后下肢皮肤颜色方恢复正常。该检查结果提示
A. Buerger 试验阳性
B. 下肢静脉通畅度(Trendelenburg)试验阳性
C. 大隐静脉瓣膜和小腿交通支静脉瓣膜功能(Pratt)试验阳性
D. Perthes 试验阳性
E. Lasegue 试验阳性
71. 56 岁妇女,绝经 8 年,阴道淋漓流血半个月。妇科检查:右附件区扪及手拳大肿物,阴道脱落细胞提示雌激素高度影响。该患者最可能的诊断是
A. 纤维瘤 B. 黏液性囊腺瘤 C. 良性囊性畸胎瘤
D. 浆液性囊腺瘤 E. 卵泡膜细胞瘤
72. 女孩,5 岁。面容特殊,眼距宽,鼻梁平,舌厚肥大,面部臃肿,皮肤粗糙,头发干稀,智力低下,身高 80cm。腕部 X 线检查显示一枚骨化中心。最可能的诊断是
A. 先天愚型 B. 先天性甲状腺功能减低症 C. 粘多糖病
D. 苯丙酮尿症 E. 软骨发育不良
73. 男,50 岁。右下腹隐痛伴低热、贫血 4 个月。下消化道 X 线钡剂造影示回盲部有充盈缺损,升结肠起始部肠腔狭窄。血 CEA 明显增高。下列手术治疗术最合理的是
A. 回肠、横结肠吻合术 B. 全结肠切除术 C. 局部切除
D. 右半结肠切除术 E. 回肠造口术
74. 32 岁经产妇,人工流产后半年,术后一直避孕。断续阴道流血,量不多。尿妊娠试验阳性,查子宫大、质软。胸片见两肺中下部有多处散在棉絮团影。患者最可能的诊断是
A. 吸宫不全 B. 葡萄胎 C. 侵蚀性葡萄胎
D. 绒毛膜癌 E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤
75. 女,27 岁。肛门周围胀痛,伴畏寒、发热 3 天。检查:肛门周围皮肤发红,压痛明显。最可能的诊断是
A. 肛门旁皮下脓肿 B. 肛窦炎 C. 混合痔
D. 内痔 E. 肛痿
76. 5 月龄男婴,近 1 个月烦躁、多汗、夜惊不安。查体:头发稀疏,心、肺检查未见异常,不能独坐。就诊过程中突然发生两眼上窜、面色青紫、四肢抽动。紧急处理首选
A. 10%葡萄糖酸钙 10ml 稀释 1 倍静脉缓慢推注
B. 维生素 D330 万 U 肌注
C. 苯巴比妥钠 40mg 肌注
D. 10%葡萄糖液 15ml 静脉注射
E. 20%甘露醇 20ml 静脉注射
77. 男,42 岁。饮酒后持续性上腹部疼痛 8 小时,向腰背部放射,伴恶心、呕吐,吐后上腹痛不减轻,排尿无异常。入院查体:体温 37.5°C ,脉搏 92 次/分,血压 120/80mmHg,痛苦病容,心肺检查未见明显异常,腹平软,上腹部偏左压痛,无肌紧张和反跳痛,肝脾肋下未触及,Murphy 征阴性,移动性浊音阴性,肝肾区无叩痛,肠鸣音 1~2 次/分。该患者最可能的诊断为
A. 急性胰腺炎 B. 急性胆囊炎 C. 消化性溃疡

- D. 肠梗阻 E. 肾结石
78. 女性,38 岁。患慢性肝炎 8 年,要求给予避孕指导。最适合的避孕措施是
A. 皮下埋植避孕 B. 阴茎套避孕 C. 口服短效避孕药
D. 安全期避孕 E. 长效避孕针
79. 女,25 岁。因间断右下腹隐痛伴腹泻 5 个月来诊,进餐可诱发腹痛伴便意,排便后腹痛可缓解。每日排糊样便 2~4 次,无黏液脓血便。伴乏力、盗汗。查体:右下腹压痛,无反跳痛,未见明显包块。X 线下消化道造影检查发现盲肠环形龛影,升结肠短缩。胸片见左上肺结节钙化灶。该患者最可能的临床诊断为
A. 克罗恩病 B. 肠结核 C. 结肠癌
D. 慢性细菌性痢疾 E. 溃疡性结肠炎
80. 男,32 岁。胃溃疡穿孔行胃大部切除术后 4 天,出现右上腹钝痛及发热,最高体温 38.6℃。腹部线透视见右侧膈肌升高,随呼吸活动受限,肋膈角模糊。最可能的诊断是
A. 胃排空障碍 B. 膈下脓肿 C. 急性细菌性肝脓肿
D. 吻合口漏 E. 急性胆囊炎
81. 33 岁,女性。产后 8 个月,月经周期缩短,妇科检查无异常。基础体温曲线呈双向型,考虑其月经紊乱为
A. 早期妊娠 B. 无排卵型功血 C. 黄体功能不足
D. 子宫内膜不规则脱落 E. 不能确定诊断
82. 女,41 岁。低热、乏力、盗汗伴腹泻、腹痛 3 个月。体格检查:右下腹有压痛和轻反跳痛,X 线钡餐检查发现回盲部有“跳跃征”,最可能的诊断是
A. 肠结核 B. 克罗恩病 C. 结肠癌
D. 阿米巴肠炎 E. 结肠炎
83. 男性,34 岁。3 周前发热、咳嗽、流涕,持续 2 周自愈。近 2 周心悸、气短。否认心脏病史。查体:体温 36.2℃,血压 110/65mmHg,心界不大。血清 CK-MB 水平增高。心电图示窦性心律,心率 103 次/分,P-R 间期 0.21 秒,余未见异常。最可能的诊断是
A. 急性心肌梗死 B. 急性心包炎 C. 心绞痛
D. 肥厚型心肌病 E. 病毒性心肌炎
84. 女性,52 岁。绝经 2 年。近 2 个月,阴道不规则出血,出血量不多。妇科检查:子宫增大、稍软。B 超显示子宫增大,宫腔内实质不均匀回声区、形态不规则,宫腔线消失。下列叙述不正确的是
A. 最有可能的诊断是宫颈癌
B. 原发性输卵管癌可能性小
C. 最有可能的诊断是子宫内膜癌
D. 分段刮宫是最可靠的诊断方法
E. 临床上与绝经过渡期功血难以鉴别,应先行分段刮宫,确诊后再对症处理
85. 28 岁女性,原发不育,月经减少 4 个月,诊断性刮宫未发现异常。妇科检查:子宫稍小、活动欠佳,双侧可触及不规则包块、质硬。最可能的疾病是
A. 月经失调 B. 慢性盆腔炎 C. 卵巢肿瘤
D. 输卵管结核 E. 子宫内膜异位症
86. 男,56 岁。机关干部。患胃溃疡多年,本次因胃出血入院,手术治疗后,病情平稳。此时,医患关系模式为
A. 共同参与型 B. 指导-合作型 C. 被动-主动型
D. 主动-主动型 E. 主动-被动型
87. 女,32 岁。药物流产后 3 天,高热伴右下腹痛 2 天。妇检:脓性白带,宫颈举痛,宫体如妊娠 6 周,右附件有明显压痛。该患者最可能的诊断是
A. 急性阑尾 B. 宫外孕 C. 急性盆腔炎
D. 卵巢巧克力囊肿破裂 E. 以上都不是
88. 妊娠 50 天,行吸宫术后 2 周,阴道持续流血,量时多时少。妇科检查:宫口松,子宫如 40 天妊娠大小,较软,尿妊娠试验阳性,此时最可能的诊断为
A. 子宫复原不良 B. 侵蚀性葡萄胎 C. 子宫内膜炎
D. 吸宫不全 E. 绒毛膜癌
89. 2 岁患儿,已诊断为“化脓性脑膜炎”,曾用青霉素加氯霉素治疗 2 周,病情好转,体温正常。近 5 天又出现发热,抽搐。查体:前囟紧张。脑脊液检查示:外观清亮,白细胞 $12 \times 10^5/L$,蛋白 450mg/L,氯化物



110mmol/L, 糖 4.0mmol/L。应首先考虑的诊断是

- A. 脑膜炎复发 B. 硬脑膜下积液(脓) C. 脑水肿
D. 脑脓肿 E. 脑膜炎后遗症

90. 男, 63 岁。突发腹痛, 停止排气排便 1 天。既往曾因十二指肠溃疡行胃大部切除术。查体: T37.8℃, P100 次/分, BP100/80mmHg, 全腹压痛, 反跳痛(+). 立即拍摄腹部 X 线平片见多发气液平面。诊断性腹腔穿刺抽出血性液体。该患者下一步首选的处理是

- A. 立即肛管排气 B. 快速补液, 扩容 C. 立即手术探查
D. 全消化道 X 线钡剂造影 E. 严密观察病情 12 小时

91. 1 岁小儿, 考虑存在先天性心脏病。血流动力学改变示左心房、右心房、肺循环、右心室血量增多, 而左心室、体循环血量减少。则该小儿先心病的类型为

- A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损 C. 动脉导管未闭
D. 肺动脉狭窄 E. 法洛四联症

92. 男性, 56 岁。4 个月前被自行车把撞伤上腹部, 近 4 周来上腹隆起, 进食后上腹胀满伴恶心、呕吐。查体: 上腹部扪及 18cm×12cm 囊性肿块, 钡餐透视见横结肠下移。最可能的诊断是

- A. 胰腺腺瘤 B. 腹膜后血肿 C. 假性胰腺囊肿
D. 结肠穿孔 E. 脾包膜下血肿

93. 25 岁初产妇, 停经 40 日后出现阴道少量流血伴右下腹隐痛 3 天。今晨起床时突然右下腹剧痛来院。检查: 血压 90/60mmHg, 面色苍白, 下腹稍膨隆, 右下腹压痛明显, 肌紧张不明显, 叩诊移动性浊音(±)。妇科检查: 子宫稍大稍软, 右附件区触及有压痛包块。首先考虑的诊断应是

- A. 输卵管妊娠流产 B. 输卵管间质部妊娠破裂 C. 右侧卵巢肿瘤蒂扭转
D. 急性输卵管炎 E. 急性阑尾炎

94. F 药厂销售代表和某医院多名医师约定, 医师在处方时使用 F 药厂生产的药品, 并按使用量的多少给予提成。事情曝光以后, 按《药品管理法》的规定, 对 F 药厂可以作出行政处罚的部门是

- A. 药品监督管理部门 B. 工商行政管理部门 C. 公安部门
D. 医疗保险部门 E. 卫生行政部门

95. 某镇卫生院 2 名医务人员违反《献血法》规定, 将不符合国家规定标准的血液用于患者。由于患者家属及时发现, 经治医师采取果断措施, 幸好未给受血者健康造成损害。根据《献血法》规定, 当地县卫生局应给予这 2 名医务人员的行政处罚是

- A. 责令改正
B. 暂停执业活动 6 个月以上 1 年以下
C. 罚款 1 万元以下
D. 刑事拘留
E. 吊销其医师执业证书

96. 初产妇, 28 岁。胎儿娩出后无阴道流血, 胎盘娩出后阴道流血不断, 时多时少, 1 小时内阴道流血量达 600ml, 血压 80/50mmHg, 脉搏 116 次/分。此时应采取的紧急措施是

- A. 手入宫腔探查 B. 静注缩宫素加强宫缩 C. 为宫颈裂伤, 立即缝合
D. 为阴道血肿, 立即处理 E. 查凝血功能, 输纤维蛋白原

97. 男性, 45 岁。右上腹痛 2 天, 伴恶心呕吐, 今起疼痛阵发性加剧, 伴畏寒发热。体检, T38℃, 巩膜无黄染, 右上腹有压痛, 诊断首先考虑

- A. 急性阑尾炎 B. 急性胆囊炎 C. 急性胰腺炎
D. 胃十二指肠溃疡 E. 胆囊癌

98. 女, 17 岁。鼻塞、流涕、咽痛、发热 1 天后出现肉眼血尿, 伴颜面部水肿。BP140/100mmHg。尿蛋白(++++)。为明确诊断, 最有价值的进一步检查是

- A. 双肾 CT B. 肾脏 B 超 C. 24 小时尿蛋白定量
D. 肾活检 E. 尿沉渣镜检

99. 女性, 23 岁。月经周期规律, 其末次月经为 2016 年 5 月 17 日, 则其预产期为 2017 年

- A. 2 月 28 日 B. 2 月 27 日 C. 2 月 26 日
D. 2 月 25 日 E. 2 月 24 日

100. 男, 足月儿, 出生后 3 天皮肤出现轻度黄染, 无发热, 吃奶好。肝脾不大, 脐无分泌物。查: 血清总胆红素

175mmol/L,血型母 A 子 O,最可能的诊断是

- A. 新生儿溶血病 B. 新生儿肝炎 C. 新生儿败血症
D. 生理性黄疸 E. 新生儿胆道闭锁

101. 女性,82 岁。高血压病 30 年,夜间阵发性呼吸困难 12 年,间断双下肢水肿、少尿 4 年。近 2 个月上述症状加重,伴厌食和腹胀。查体:血压 180/100mmHg,端坐位,心界向两侧扩大。心率 120 次/分,心律绝对不齐。双下肺可闻及中小水泡音。肝肋下 4cm、质软、有压痛,移动性浊音阳性。肝颈静脉回流征阳性。双下肢有可见性凹性水肿。该患者最恰当的心功能评价为
A. 全心衰竭 B. 右心衰竭,失代偿 C. 心功能 II 级 NYHA 分级
D. 心功能 III 级(NYHA 分级) E. 心功能 IV 级(NYHA 分级)
102. 女,52 岁。因胃溃疡合并多次大出血,行胃大部切除术,该患者术后 5 天出现胃出血,最可能的原因是
A. 溃疡复发 B. 吻合口缝线感染 C. 吻合口部分黏膜坏死脱落
D. 应激性溃疡 E. 术后胃内残余血
103. 小儿身高 80cm,前囟门已闭,头围 48cm,乳牙 20 枚,会跳,并能用简单的语言表达自己的需要,对人、事有喜乐之分。从上述情况判断此小儿的年龄是
A. 4 岁 B. 3 岁 C. 2 岁
D. 1 岁 E. 10 个月
104. 女性,52 岁。20 年前曾患肝炎,近几天劳累,今晚进食后突然大量咯血,有暗红色血块,体检:P100 次/分,BP84/64mmHg,腹部稍膨隆。肝未触及,脾在肋下两指移动性浊音(+),诊断首先考虑
A. 胃十二指肠溃疡大出血 B. 应激性溃疡 C. 胃癌出血
D. 食管胃底曲张静脉破裂出血 E. 肝脏出血

A3/A4 型选择题(105~142 题)

以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。每一道题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑。

(105~107 题)共用题干

女性,52 岁,中上腹饥饿性隐痛反复发作 15 年,伴反酸、嗝气,进食和服用抑酸剂可缓解。

105. 该患者最可能的疾病是
A. 胃癌 B. 胰腺癌 C. 消化性溃疡
D. 慢性胆囊炎 E. 胃溃疡
106. 患者 4 小时前突然出现中上腹剧痛且腹痛持续存在,该患者可能发生的并发症是
A. 急性胰腺炎并发出血坏死 B. 胰腺癌并发肠梗阻 C. 胃癌并发幽门梗阻
D. 消化性溃疡并发急性穿孔 E. 小肠梗阻
107. 如进行腹部检查,最具诊断价值的体征是
A. 腹肌紧张 B. 腹壁柔韧感 C. 胃肠型
D. 肝浊音界消失或缩小 E. 墨菲征阳性

(108~110 题)共用题干

女,36 岁,G3PO,妊娠 33 周,阴道少量出血 3 天,无腹痛,曾自然流产,过期流产各 1 次。入院检查:枕左前位,胎头浮,胎心好,耻骨联合上方可闻及胎盘杂音。

108. 最可能的诊断是
A. 先兆流产 B. 前置胎盘 C. 先兆早产
D. 胎盘早剥 E. 先兆子宫破裂
109. 为明确诊断,首选的辅助检查是
A. 肛门检查 B. X 线腹部平片 C. 腹部 B 超检查
D. 阴道内镜检查 E. 血常规及凝血功能检查
110. 此时,最恰当的处理是
A. 尽快剖宫产术 B. 卧床休息吸氧 C. 期待疗法
D. 确诊后即行人工破膜 E. 静滴缩宫素